

448



PLANTARVM

SEV  
STIRPIVM  
HISTORIA,

MATTHIAE DE LOBEL  
INSVLANI.

Cui annexum est ADVERSARIORVM  
VOLVMEN.

*Reliqua sequens pagina indicabit.*



ANTVERPIÆ,  
Ex officina Christophori  
Plantini Architypographi  
Regij. M. D. LXXVI.



ADVERSARIORVM ILLVSTRATIONES,  
CASTIGATIONES,  
AVCTARIA,  
CONIECTANEA,

Nominum & opinionum CONSENSVS,  
& HARMONIA,  
SELECTIORA quædam REMEDIA &  
SVCCEDANEA.

Cum GVILLIELMI RONDELLETII  
antiballomenon emendationibus tabulis,  
nunquam antea excusis.



## GALLIAE BELGICAE

ANTIQUISSIMIS, SIMVL ET

NOBILISSIMIS ORDINIBVS, GVBERNATO-

RIBVS, DEFENSORIBVS ET MAGISTRATIBVS,

*Operis argumentum & emolumentum.*

ON possum, viri illustres ac totius Galliae Belgicae praefecti, gubernatores ac magistratus clarissimi, huiusce communis patriae nostrae calamitates piis lachrymis vobiscum serio non deplorare, quae detestando atque execrabili hoc bello ciuili tam misere atque hostiliter hinc inde dilaceratur, vt non tantum vrbes, & firmissimas munitiones funditus dirutas spectemus, multaue hominum millia aquis, ferro, fame & incendio extincta, sed etiam mutuis populationibus agricolas passim profligari, exterminari, & Musarum Pieridumque chorum, qui in amoenissima huiusce prouinciae viridaria, relicta Graecia & tantum poetis antiquis decantato Helicone, sua sponte a multis iam annis commigrauerat, ferè hinc infestissimis armis disturbari. Quos casus tam infelices, & damna irreparabilia sine summo dolore aspicere nemo vir bonus ac pius queat. Est enim tota haec Galliae-Belgicae nobilissima & antiquissima prouincia, (quae iam pridem, sub Flandriae aut inferioris Germaniae nomine terrarum orbi inclaruit) tanquam celeberrimum totius Europae emporium, in quod quicquid vsquam terrarum est eximium aut expetendum, cumulatè terra marique aduehitur, omnesque Europae, Asiae, atque Africae thesauri congesti sunt, praeclaris ingeniis, in omni genere artium ac scientiarum excellentibus, fertilissima. Et quamuis is caeli tractus Septentrionalis enutriendis innumeris plantis minus sit idoneus, ob frigorum saeuitiam & longas hyemes & continuas durabilesque ei incumbentes caeli tempestates, atque iniurias, tamen ea est incolarum industria, sedulitas ac pertinax in tutandis a praedictis incommodis tenerioribus plantis diligentia, vt nulla stirps toto orbe inueniri possit, quae non improbo labore & indefessa opera clarissimorum heroum & virorum illustrium, nullis impensis parentium, nouis hinc artibus educetur, alaturque egregie: vnde non immerito in excolenda re herbaria, antiquissimo studio, summisque viris dignissimo, primam laudem Belgis obtulerim. Nam in hac vna prouincia plures herbarum, fruticum, arborumque diuersitates inuenias, quam in antiquissima Graecia, spatiosissima Hispania, Germania, Anglia, Francia, cultissima denique Italia, aut aliquo huic circumiacente regno aut prouincia. Quae quauis innumeros penè sedulos hortorum cultores habeat, hi tamen ex numero mihi cognitorum virorum, & generis stemmate & literis nobilium,



præcipui sunt, D. Carolus de Croy princeps de Chimay, Petrus de Bossu  
 D. de Ieumont, Carolus de Bossu Bruxellarum vicecomes, piæ memoriæ  
 D. D. Reuerendissimus Dominus Gilbertus d'Oignies, Neruiorū episco-  
 pus, & Ioannes de Brancion: Carolus de Houchin D. de Longastre, Ioan-  
 nes Dillius, Ioannes Boifot, Iacobus Vtenhouius, Philippus Deurnagle D.  
 de Vroyland, D. Ioannes de Limoges, aliàs Nonnius, & Carolus Clusius,  
 horti Cæsareæ maiestatis Maximiliani Imperatoris præfectus, clarissimus  
 & exactissimus, vt si quis alius, rei herbariæ scriptor: ipsique regij profes-  
 sores antiquissimæ & nobilissimæ Louanienfis Academiæ Petrus de Breu-  
 ghel, Cornelius Gemma, & Ioannes Viringus; quos, quod in hoc studio  
 cæteros ferè præcellant, hinc honoris causa, vti æquum est, nomino; qui-  
 que in hoc concinnando opere, maximo mihi adiumento fuerunt, sub-  
 ministratis innumeris raris ac singularibus plantis, quas magnis expensis  
 Constantinopoli, ex Græcia, Hispania, Italia, cæterisque Asiæ atque Africæ  
 regionibus, & nuper reperto nouo orbe, instruendorum ditandorumque  
 hortorum suorum causa cōparant; aliisque quam plurimis herbis, quas  
 olim eis ex Italia, Gallo-prouincia ac Lingua-gottica miseram, quarū mi-  
 hi seminaria in turbis Lugdunensibus perierant. Quapropter veritus ne  
 hisce deploratissimis temporibus, earum quoque quæ mihi sunt reliquæ,  
 iacturam facerem: in animum meum induxi, hæc nostrā Stirpiū aduer-  
 saria superioribus hisce annis in lucem edita, auctiora, & emendatiora  
 nunc, multisque nouis additis plantis refarcire, dilucidiusque explicare quæ  
 in priore editione dicta fuerant obscurius, additis herbarū facultatibus ex  
 Dioscoride, Galeno & prisceis, quod scriptis nostris plus accedat auctoritatis  
 & ponderis; melius enim est à fontibus haurire, quàm riuulos consectari.  
 Sunt enim recentiorum complures qui profitentur, summæque gloriantur  
 noua se inuenisse remedia, nouasque præparandorū medicamentorū for-  
 mulas, è quorū numero tenebricosis suis scriptis est Paracelsus, eiusque asse-  
 cla; cū tamen in Dioscoridis, aliisque veterum auctorū monumētis, ha-  
 iuscemodi extrahendarū facultatum herbarū, præparandorūmq; medica-  
 mentorū rationem posteris traditā legamus. At ne rem eandem, quorun-  
 dam more, sæpius repeterem, textum Galeni, Æginetæ, Plinij, aliorūque  
 veterum ad verbum descriptū huic nostro opusculo minimè inferendum  
 iudicaui: tantū lectorem admonui eorum quæ à Dioscoride omissa &  
 ab aliis addita fuerunt, adiectis tamen honoris causa auctorū nominibus,  
 ne quenquā, aut ingenij, aut laborū gloria, quod iniquum foret, defrauda-  
 rem. Quinetiā sæpenumero multos locos Dioscoridis de herbarū viribus,  
 earūque causis per Galenum explico. Galenus namque testatur nullum  
 omnium eorū, qui de re herbaria ante sua tēpora sunt cōmentati, Diosco-  
 ride accuratius, aut veriūs, aut doctius scripsisse, quem vnum sequendum  
 monet, seque eius interpretem esse pluribus locis fatetur; ei soli totā sim-  
 plicium medicamentorum scientiam acceptam refert: neque eum pudet  
 Dioscoridis textum ad verbum passim suis scriptis inferere. Comprimant  
 igitur maledicum os suum inepti blaterones, qui eruditissimi Diosco-  
 dis, &



dis, & omnium doctorum calculo in re herbaria principis, scripta omnia, nihil nisi empiriam esse cauillantur. Est enim turpissima illa imperitorum hominum consuetudo, vt ea improbent ac reprehendant, quæ ob ingenij tarditatem aut sotordiam assequi nequeunt, & propter vitiositatem & superbiam, aliena contemnunt; sua tantum admirantur.

Nec tamen interea vbique causarum, operationum & facultatum rationem curiosius reddere studui, aut simplicium medicamentorum qualitates secundas, tertias, quartas, aut etiam occultas explicare, ea studiosi lectoris industriæ breuitatis causa relinquens: quamquã eas qualitates magna ex parte in quambreuissimam tabulam redegeram, ac similiter notas comparationes, ac signa herbarum inter se aliquam similitudinem habentium, foliorum, radicum, florum, seminum, fructuum, aut aliarum partium in gratiam tironum: sed horum temporum calamitas & impensæ immo-  
dica huiusce operis progressum retardat, aliàs tamen opportunitatem nactus & otium, id quoque, Deo fauente, absolutum in lucem dabo. Nunc quoniam in nominibus stirpium, herbarumque magna est confusio, quod vnusquisque pro arbitrio, vel maximè exoticis ac peregrinis nominibus, eas nuncupet (quod baptizare isti vocant) adieci in studiosorum gratiam eorundem nominum consensum atque harmoniam.

Caterum cum apud me haberem succinctum tractatum G. Rondelletij De vsu & compositione medicamentorum minoratiuorum, præparantium, purgantium & eradicantium, variis remediorum formulis, eum, quod nunquam antehac in lucem fuerit editus, aut prætermisus in eius libro De internis, hisce nostris commentariis in studiosorum gratiam libenter adiunxi.

Suscipite igitur, viri illustrissimi, has Stirpium nostras observationes æquis animis, quas ad cõmunis patriæ nostræ vtilitatem denuo in lucem emittimus. Quas si vobis acceptas esse intellexero, dabo operam vt his locupletissimis Stirpiũ iconibus haud pœnitendus numerus accedat, namque  
*Excitat ipse fauor studium, laudatque virtus*

*Crescit, & immensum gloria calcar habet*, vt ait poëta. Deus Opt. Max. huic cultissimæ prouinciæ, vobis autem gubernantibus, & magistratus munia obeuntibus, magna cum vestra gloria, rerum omnium felicem successum concedat, & pacem vitamque ad felicem producat senectam.







# MATTHIÆ DE LOBEL

FRANCISCVS HEMVS INSVLANVS.

7

**P**ERLEGI, inq<sup>3</sup> manus iam terq<sup>3</sup> quaterq<sup>3</sup> resumpsi,  
*Artis Matthia Doctor Apollinea;*

*Perlegi quod opus docto de pectore promptum*

*Publica mox populi mittere in ora paras.*

*Quàm varium, quàm dives opus! spectare novarum*

*Plantarum formas quot, speciesq<sup>3</sup> datum!*

*Quot facies florum! vario quæis semine natis*

*Et vis est impar, dissimilisq<sup>3</sup> color.*

*Illic tum violas, Amaranthos, tumq<sup>3</sup> Hyacinthos,*

*Narcissos videas, multiplicesq<sup>3</sup> rosas:*

*Irida, caelestem qua mille coloribus arcum*

*Exprimit, & rorem, pratensesq<sup>3</sup> crocos;*

*Atque alios alio celebratos nomine flores,*

*Commendat varius quos odor atque color.*

*Ipse quidem haud unis depictos floribus hortos*

*Fingebam lato me peragrarè pede;*

*Dilectos Cereri quondam, quos fertilis Enna,*

*Quos habet exculto Sicelis Hybla solo:*

*Huius ubi nata assuetis comitat a puellis*

*Carpebat florum sæpius omne genus.*

*Gratia debetur tibi maxima docte Lobelli,*

*Qui ditas plantis Belgica culta novis:*

*Quas è longinquis sparsim regionibus adfers,*

*Percurrisse levi quas pede dulce fuit;*

*Antiqui campos Latij, saturnia regna;*

*Regnaq<sup>3</sup> qua duplicis verberat unda maris;*

*Et totam, donat cui Narbo vocabula, terram,*

*Et quam Francus arat vomere; quamq<sup>3</sup> vaga*

*Anglorum sedem circumsonat Amphitrite;*

*Et te Teutonicis terra habitata viris.*

*Nec satis hoc, vires etiam, dotesq<sup>3</sup> recludis*

*Nativas*



Natus, & quo quaq; sit orta loco.  
 Idq; noua methodo prestas, atque ordine pulchro,  
 Confusam ut lector nil reperire queat.  
 Ergo tolle moras: poscenti excudere formis  
 Calcographo ingenij da monumenta tui,  
 Intra qui populoſa tuos Antuerpia muros  
 Inter calcographos regia sceptrum tenet.  
 Nec mora, fama tui populorum exibat in ora,  
 Fies Eois notus, & Hesperiis.  
 Tunc noua mi tacitum mulcebunt gaudia pectus,  
 Astraq; contingam vertice celsa meo:  
 Dum recolam sub me linguam didicisse Latinam,  
 Artibus & pectus excoluisse bonis.  
 Vnde seges tam lata breui succreuit in auras,  
 Quam tuus immenso fœnore reddit ager.  
 Tolle moras: audi inuenum tot vota precantum,  
 Subdit quorum animis ars tua Phœbe facies.  
 Nocturni versare ardent, versare diurni  
 Quod te fama loquax euigilasse canit.  
 Non poteris vnus tot longum obsistere votis:  
 Pande sinus: portum deserat vncta ratis.

SVMMA PRIVILEGII.

CAVTVM est Regio Privilegio, ne quis alius præter  
 Christophorū Plantinum librū hunc cui titulus est: Plan-  
 tarum seu stirpium historia, intra decennium imprimat,  
 aut alibi impressum in suas ditiones importet, venalemve  
 habeat. qui scius faxit, pœna fisco Regio exoluenda mul-  
 tabitur: ut latius in Regio diplomate expressum est,  
 Dato Bruxella, An. M. D. LXXV. penultima Iulij.

Signat.

I. Blyleuen,



# MATTHIÆ DE LOBEL

## STIRPIVM OBSERVATIONES.

### GRAMINIS OMNE GENVS

*Aduersariorum pag. 1<sup>a</sup>. 2<sup>a</sup>. 3<sup>a</sup>. & quarta reddendum.*

*Vulgatius PRATENSE GRAMEN. pag. 1<sup>a</sup>.*

Belgis } Gallis, l'herbe de praiz, & absolurè de  
Germanis } gras. l'herbe, quasi omnium herbarum vulga-  
& Anglis. } rissima, precipua, & vstitutissima diceretur.

EXILE GRAMEN durius.



Huius semine vtuntur medici ad obstructions viscerum imitatione Apulei, qui herbam gramen decoquit, & cum ea florem terit, & in panno lenit, & imposita splenis dolores finit. Folia iumenta & boues pascunt. Diosc.

Veterinæ saginandæ & lactis vbertati longè præcellit dulce: contrâ improbat acidum, vulgò Saur & aigre.

### GRAMINIS varietates quamplurimæ.

NATURÆ portentoso lusu quamplurimæ graminis varietates præcis & neotericis prætermis- sæ aut neglectæ; solo, cælo, culmo, folio, radice, iuba, pannicula, spica & coma; maioribus, minori- bus; angustioribus, latioribus; graminibus, iuncibus, miliaceis, loliaceis, hordeaceis, triticeis, diutaxat discreta, à quibus quia perspicua, superfedendū, vel ea saltem paucioribus prosequenda duximus.

### EXILE GRAMEN durius.

FOLIOLIS iuncibus acidis vnciam & sesquiunciam altis è pusilla filamentis crebris compacta


B radice



radice oritur fabuletis, ericetis & squalido aridiori; agro Galliz, Angliz, Germaniz & Belgij: panicula & semen acerofa, duriora, pectori minus grata.

GRAMEN Typhinum.

GRAMEN Cyperoides.



TYPHINUM iisdem, quibus proximè descriptum, natalibus gaudet, sed maritimis non secus ac mox subdendum Cyperoides gramen. Radix item pusilla, capillacea: caulis dodrantalis & pedalis.

CYPEROIDES gramen nuncupari potest. Radice in autumno cohaesu sibi implexa, longiusque radicata, cyperi longi modo, ut ab aliis secernatur. Folia habet pedem longa Algæ marinæ quadamentum, & in cauliculo dodrantali & pedali fastigiola unciam & sesquiunciam longa, acerofa Typhini graminis ritu.

GRAMEN Paniculosum Phalaroides, Amourettes vulgo.

HISPANIS pulchellum gramen Amourettes quasi amatorium ob venustatem dicitur: exili, citris & fibris implexa radice in dodrantali & pedali culmine speciosa iubata latiore & lætiore panicula, congesta, per maturitatem candida. Ex Hispania in Belgium semen delatum, opera & sedulitate Caroli Clusij stirpium exoticarum peritissimi indefessique vestigatoris & scriptoris. Narbonensi



honensi agro nonnusquam occurrit. In Gallo-  
Belgio etiam frequens iuxta Auxiacū castrum,  
& vicinis locis passim.

GRAMEN Caninum medicatum. pag. 2°. Belgis  
peen & leedgras. i. geniculatum. Gallis Chien-  
dent. Hisp. Gramenha & Grama.

## GRAMEN paniculosum.



GRAMINIS vires ex Dioscoride, Galeno, Plinio, priscis & neotericis gramineo generi red-  
denda; Aduersariorum foliis primo & secundo.

DIOSC. Trina radix\* illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus† medetur, & vrinae difficul-  
tatibus. Calculosa etiam vesica excrementa comminuit: & ab inflammationibus placat. \* Decocto adicitur vinum,  
ac mel ab aliquibus, & thuris & myrrha & piperis tertia portiones: rursusq; coquitur in aevo vase ad dentium  
dolores & epiphoras. Semen: vehementius vrinam impellit: aluum vomitionesq; sistit.

\* eadem Galenus: modicè enim tum frigida tum sicca.

† & vulneribus vesicae decocta in vin. Plini 4<sup>to</sup> idit.

\* Plin. Gramini Parnasio hederaceo hæc tribuuntur.

Plura Plin. lib. 24. cap. vltimo, quorum vsus exoleuit.

GAL. Radix modicè frigida est & sicca: mordacitatem quandam exiguam & partium tenui-  
tatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat; in humiditate verò & siccitate mo-  
derata. Porro semen alibi quidem excessu refrigerat; in humiditate verò desiccatorium, & tenuium  
partium & subacerbum.

Graminis radix dulcis est & subacerba, moderata, tenuis & exiguè incidentis substantiæ, qua  
circa calfactionem fartus viscerum reseat, colluuiem propellit & deterget. Radix vulnera glu-  
tinat Apuleio.

GRAMEN Bulbosum, nodosum Aduers. pag. 2°.

Iisdem temperamento & viribus, quibus Caninum officinarum, pollet.



GRAMEN Canarium alterum, Ischemi pammic-  
lis maximo Gramini marino arundinaceo con-  
gener. Aduers. pag. 4<sup>a</sup>.

Vsuius gramen Clusij.

CALAMOGROSTIS Aduers. pag. 3<sup>a</sup>.



RARIUS minusque obuium, vel animaduersum istud, intermedium & cognatum cum Ischa-  
mo vulgari & Canino gramine; cuius effigiem & formam, cum radice, tum foliis gerit: sed como-  
sa digitatum sparsa florum iubata factura, Ischemi vulgaris vel graminis Mannæ ritu. Eiusdem cur  
gramineo Canario generis, facultatis & vsus Hispanis, Narbonensibus Gallis, Francigenis quibu-  
item *Chiendent* appellatur. Semen acerosum, scabrum.

Varietas.

Narbonæ maritimis radicum effigiatura & parilitas adeò appropinquat arundini vallatoria  
ut eandem dixeris.

In Gramine sulcato pag. 3. deme ♂: lege culmos Panicis.

In Gramine striato albo linea 36. deme ♂.

ISCHÆMION vulgare Aduers. pag. 4<sup>a</sup>.

CANARIA Plinij Anguillæ.

Et Gallicus Apulei, cuius cacumen est iuxta pedis Galli.

Apul. Herbam tritā cum axungia & pane domestico imponas, canis morsus mox sanabit. Ea-  
dem sic, ut diximus, parata durities discuit. Idem, in Gramine.

Gramen in se trifurcium habens (nam in plura diuiditur) decrescere luna sublatum, pluri-  
mum



## OBSERVATIONES.

13  
 mum valet ad epiphoras oculorum. Repositum habeto diligenter, exinde lippire incipientibus ad  
 collum ligato, celeriter imminentem epiphoram discutere & sanare dicimus.

ISCHÆMON.

GRAMEN Manna esculentum Aduers. pag. 4.  
 Ital. Sanguinella & capriola herba.



Mammarum durities discutere prodicitur.

TRITICI genera. Aduers. pag. 5. &amp; 6.

DIOSCOR. Tritici genera cruda in cibis teretes tineas gignunt: canum moribus profunt mánfa & impossi-  
 ta. Confectus eorum similagine panis, plus alit quàm cibarius. E trimestrium farina panis leuiorem cibum prabet,  
 & qui facile in membra demandetur: farina eorum cum hyosciami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones,  
 quas Græci rheumatismata vocant: item contra interaneorum inflationes, lentigines ex oxymelle tollit.

Sitaniarum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino commodissime illinitur: eadem, si decocta in glu-  
 tini modum delingatur, cruentis excreationibus proderit. Contra tussim & exasperatas arterias, cum mentha &  
 butyro decocta, efficax est.

Tritici pollen fixæ aqua mulsa, aut hydreleo decoquatur, omnem discutit inflammationem.

Panis & crudus & coctus cum aqua mulsa, inflammationes omnes illitu mulcet; cùm molliat & qua-  
 damtenus refrigeret: Sed herbis succisue huic rei accommodatis admisceatur\*. Vetus panis aridus adiectis conue-  
 nientibus, citius aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas imperigines sanat.

Glutinum ex similagine & polline quo charta glutinatur, sanguinem excreantibus prodest; si liquidius ac repi-  
 dum cochlearis mensura detur sorbendum.

Furfures autem in acri aceto decocti & illiti, lepras pellunt, incipientes etiam inflammationes omnes leniunt.



**SILIGO spica mutica.**  
 Germ. Weypfen. Angl. Weet. Belg. Tertwe.  
 Gal. Froment, Bled. Ital. Fourmento, Gra-  
 no & Solina. Hisp. Trigo.

**TRITICVM aristis circumvallatum.**  
 Triticum Typhinum Dod.



In Ruta verò decocto elixi, turgentes mammas sedant. Viperarum ictibus auxiliantur, & torminosis prosunt.  
 Fermentum farinaceum calfaciendi extrahendiq; vim habet, priuatim callos pedum clausosq; extenuat; &  
 cetera tubercula furunculosaq; ex sale concoquit & aperit.

\* violis, Solano, malua, cucurbita, lactuca, & similibus.

† Rosis, caryophyllis, balautiis, mespilorum carne & sorborum, myrchi & Rhois.

**TRITICI temperamentum ex Galeno.**

pag. 6. lege  
 statum.

Vr medicamentum foris impositum, primi est ordinis excalfacientium, non tamen nec rescicare, nec humectare manifestè potest. Habet verò quiddam etiam lentoris & obstruentis naturæ. Quod ex pane fit cataplasma, vim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico, nimirum cum & sale & fermentum adiunctum habeat, quod ex alto trahit, digeritq; Plura pete ex Gal. Suppurat, & calfacit: leniter detergit, sed multò minùs quàm hordeum quod refrigerat & siccat. Pani herbæ admiscuntur ad inflammationes leniendas hac remedij formula.

R. mica panis lb. f. farinae hordei ʒ. ij. lini ʒ. j. f. florum Chamæmeli, Meliloti añ. M. j. foliorum maluarum, violarum, Solani semperuiui vel vmbilici Veneris elixorum in hydrelæo añ. M. j. f. confusis cribratis, adde vitella ouorum tria, olei violati ʒ. iij. olei Chamæmelini ʒ. j. f. fiat cataplasma.

Inflammationi erysipelatosæ adde succi solani hortensis ʒ. iij. succi plantaginis ʒ. ij. succi Hyosciami ʒ. j.

Ex



*Ex fermento medicamentum comprobatum & efficax ad pleuritidem & empyema cui febris coniuncta.*

℞. Radicum graminis canini ℥. iij. Acetosæ cum radicibus M. iij. Medullæ cardui fullonum, M. ij. Cardui benedicti, Scabiosæ, herbarum capillariū añ M. j. passularum mundatarū ℥. j. Glycyrrhizæ ℥. iij. anisi ℥. ij. sicuum N°. 4°. quatuor seminū frigidiorū maiorū añ. ℥. ij. florum cordialiū & Hyperici añ. M. l. Fiat decoctio in aqua Borraginis ad lib. j. f. cui infunde fermentū panis cibarij ℥. iij. coaguli ℥. j. f. Thamarindorū ℥. j. Expressioni dissolue syrupi de succo vel infusionibus Papaveris Rhœadis ℥. vj pro quinque aut sex dosibus. Discutit, abstergit, per vrinas & sudores propellit, ab inflammatione tueretur, eademque mulcet, defluxionem cohibet, febrem delet, & collectiones arcet.

Alia verò ratione Papauer Satiuum, quod incrassat, defluxiones sistit, & inflammationes mulcet, initio exhibetur. Rhœas enim, uti agria omnia, magis est tenuium partium; neque per se, sed abstergentibus, attenuantibus, concoquentibus & expectorantibus additur, ne sit vlla suspitio, & excretionis & expectorationis, ut quidam verentur, difficultas.

*Ad eadem puls ex fermento.*

℞. rad. Althææ, vel corticis radicis vlmi, liliorum añ. ℥. ij. Maluarum, violariæ, florum Hyperici, Chamæmeli añ. M. ij. Coque, contere & cribra; commixtis fermenti panis cibarij ℥. v. farinæ seminis lini & fænigræci añ. ℥. j. f. olei amygdalini vel butyri insulsi, olei violati añ. ℥. ij. fiat cataplasma. Lenit, concoquit, collectionesque discutit.

\*SECALE. Aduersariorum pag. 6°.

Germ. Aucken. Belg. Aogge.  
Ital. Segala. Hiss. Centeno.

HORDEVM Ital. Orzo. Hiss. Ceuada.



Secalium panem eiusque fermentum Antuerpiani Medici potentius digerere, trahere, abscessus maturare, & rumpere tritico pane, experiuntur.

Lege aduers.  
li. 4. annonam  
& sequenti  
maiusculis.

Plin.



Plin. Sordidos efficit panes, agrestibus hominibus idoneos, amarulentos ac lentos atque facile permeabiles; minus alit quam triticum & hordeum.

**Hordeum** **Diosc.** Hordeum minus quam tritici nutrit, abstergit, urinam cit, inflat, stomacho aduersatur, ædemata & inflammationes discutit, duritias cum melle, resina & fimo columbino concoquit. Cum meliloto & papaueris calyce dolores sunt, qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, sanograce & Ruta, illini iuuat. Strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina ad concoctionem perducit, & cum myrtho aut lentisco, aut malicorio, aut siluestribus pyris, aut rubo, alui profuua sistit. Podagricis inflammationibus cum Coroneis aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposta, lepris medetur. Creior vero furina ex aqua atque cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est. Cum aceto subactus idem, & cum pice contra articulorum deflexiones prodest.

Lege palea-  
cus pag. 7.

**Gal.** Primi est ordinis in exsiccano & refrigerando; habet etiam paucillum absterfionis: paulo etiam plus desiccatur, quam farina fabacea, cui non infunt cortices. Cætera enim similia sunt foris ventibus. In cibo autem fabis præstat, quod flatuosam naturam exuat. Fabis quantumcumque coxe-  
ris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentia, quam hordeum, quamobrem eo etiam plus nutrit.

Geminum hordeum Septentrioni notissimum *πικύριον* & *διστύριον*: Picardis, Artesis, cæterisque Gallobelgis polystichon *Soucion* vernaculè, Germanis *Grosse gerst* dicitur. Autumno ad Malti siue *Mauth* & *Wiemauth* confectionem feritur. Radice exit fibrosa, exili, foliis gramineis, stipula binum cubitorum, spica in plerisque versus aristis rigidis & scabris vallata, æstate matura.

Distichon Gallobelgis *Pamelle*, Germ. *Kleyn gerst*, id est, minus hordeum, Martio, Aprili, & initio Maij duntaxat feritur, hyemis quippe & frigoris impatientissimum: vniuersa sui parte gracilius, cubitum & sesquicubitum raro superat: aristis exilioribus delicatioribus, mollicellis, minusque rigidis gemino sui spicatum.

Vniuersa Anglia ad hordei præparationem quam *Mauth* vocant, hoc solo ferè hordeo vititur, idque polysticho ad Cereuisias Britannicas suauissimas & optimas præfert, quæ quilibet septentrionales bonitate longè superant.

*Mauth* autem inibi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusa aqua in horreum aceruat loco ventis minus peruio, quoad germen, per pupillosque radicum cirros & pullulationes (quæ hyeme tardius, vere & æstate biduo aut triduo) emisit. Mox priusquam incalescat sulcatim dispersum, sesquipalium densum, ter, quaterne die & nocte subuertitur aperto aëre: octo vel nouem dies continuos iterando, perficitur. Tandem in tabulato pertuso, igne subdito vel aptato fornaci vimineo calatho acuminato, & superstrato hordeo; igne lento è palea, cremis vel arido ligno admoto fornacis ostiolo, sesquipalmari intervallo ab uno interposito, exiccatur, quoad molis frangi queat; sicque extotum *Mauth* in fornacis capacitatem deicitur: quod ex qualibet hordei mensura ad quartam partem accrescit; & antiquum bonitate, in Zytho componendo, nouum præcellit.

#### *Biera siue Cereuisia compositio.*

*Normannis & Gallobelgis Bierre & Ceruoise. Anglis & Germ. Bier.*

Æ. Malti molis leuiter contriti modios Anglicos octo, aquæ fluminalis limpidioris feruentis, cui aliquot manipuli fursuris triticeis incocti fuerint, quantum satis sit explendo dolio Aureliano. Exactè mixta, infusa calidè persistent tres horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apto subterfluant. Id quod transmissum est (Belgis & Anglis *wort* vocatum) recoquitur semihoram, sesquihoram vel aliquot horas vt melius conseruetur, adiectis libris quatuor florum Lupuli salictarij: mox longo latoque lacu vel depressis labris vix pedem altis perfrigerantur. Et huius decocti frigefacti libris octo vel decem, fermenti siue facis Bieræ vel Alæ potentioris libra aut sesquilibra adduntur, exactè agitando, loco tepidiore permiscuntur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquorem vt commodius fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transcolantur: vasa adimplentur: demumque fermentatione absoluta, exactissimè occluduntur.

Eidem Malto nouam affundunt feruidam, transcolant, eoque Cereuisiam tenuem concinnant. Variis è frugibus, tritico, hordeo, zea, auena fit Maltum, quod ratione conficiendi, Bieræ colores immutat. Trinceum & polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundam & subfuscam cereuisiam efficit. Hordeo disticho, auena, zea, tritico, commixtis quinque vel senis libris farinæ fabaceæ, albida & limpidà redditur. Malti hordeacei partes duæ aut tres; auenæ & triticeæ añ pars vna, sumuntur: farinæ fabarum quantū tritici quarta pars; aquæ quantum satis, pro tenuitate, & potentia Bieræ futura.



Prima nobilitatis Anglorum ALA suavis & vinei saporis potio, cuius hyeme precipuus  
usus, quia minus conservatur.

Recipit decocti Malti (vernaculè wort) libras ducentas, florum lupi salictarii M. ij. quò Malti dolum  
& insipidum saporis exuat. Percoctis & transmissis sensim commisceantur (ut supra monuimus)  
facis biera vel Alæ libræ tres, & Graut Anglorum (Belgæ *Paertbier* vocant) libræ sex vel octo.

Graut enim fit hoc qui sequitur modo.

2. farinæ Malti lib. vj. vel octo: aquæ feruefactæ lib. 12. vel 15. quæ agitata & probe sexies die re-  
mixta tepente camino, stragulis operto & palea condito nitido vase tam diu macerantur, donec Serapij  
lentorem assequantur. Tunc igne, sedulo versando ne vrantur, ad pulvis solidioris crassitiem perco-  
quantur.

Zythos & Curmi Dioscor.

DIOSCOR. Ex hordeo potus fit, cui Zytho nomen est: is vrinam cit, renes & nervos tentat, membranis pra-  
sertim cerebri vestientibus, officiu: inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasim gignit.

CURMI.

Fit & ex hordeo potus quem Curmi nominant; eoque, sæpè pro potu vtiuntur. Verùm capitis dolorem mouet, malum  
succum gignit, nervus nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent in Iberia qua Occidentem spectat, &  
Britannia.

Zythum & Cereuisia Plin.

Ex frugibus fiunt & potus, Zythum in Aegypto, Cælia & Caræa, in Hispania: Cereuisia & plura ge-  
nera in Gallia, aliisque provinciis, quorum omnium spuma cutem foeminarum in facie nutrit.

Quantum ex priscis Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zytho & Curmi, potiones Ce-  
reuisiæ nostris proximas, nec dubiè designasse videntur: præsertim Alæ, quæ vini vicem antiquitus  
supplet Britannis; quorū ipsè Dioscorides meminit, referēs malū succū gignere & nervos tentare: qui-  
bus idem, quod nobis, euenisse potuit, potissimū plebi & Anglicæ rusticæ turbæ, cui ad gulæ delecta-  
menta potentio rem Alæ è cauponariis expetenti, inextrabilis quæstus gratia illā ex Malto lixiuio  
aquæ vice macerato, imponitur; licenim magis compositam & grano potiorē ementitur; caput ferit, læ-  
tamque opilionibus, colonis & nauculis stultitiam conciliat. Nec desunt nonnulli inexplēbiles  
nummorum vasti homines qui Bieræ pro lupuli floribus camini fuliginē substituant, aqua falsa Maltum  
macerantes, ut eo plus sitiantur biera, quo plus sint potæ. Harum potionum & consimilium assiduo  
usu incommoda Dioscoridi memorata percipiuntur: quæ non possunt sine hepatis & viscerum sum-  
mo dispendio assumi. Cerebro & nervis inde affectis & sanguine exusto, fit tuberculorum in facie &  
nasō, ut elephantorum, eruptio, inde apud Anglos in hunc usque diem locus pro merito elogio, Asci-  
uit sibi faciem & nasum rubrum, tuberosum, commendationis Alæ. Maxima igitur in Cereuisia varie-  
tas: pro ratione, quantitate frugum, mixtione, compositione varias qualitates sortita. Germanis & Bel-  
gis Gentiana, Baccæ Lauri, Zeduaræ, Saghet, Helenium, Lauendula, Salvia, Hormini flores, Cuculus  
siue Cucubalus Indianus, (quem insanum seu furiosum solanum faciunt) chamæpitys, coriandrum  
& consimilia vna cum lupulo incoquantur.

Limpidior, potior, bene defæcata biera, cuius quidem faciendæ rationem, ut calidioribus inno-  
tescat regionibus, docuimus; suavis & salubris est potio; alimentum bonum præbet, modò probè & ex  
optimis frugibus pareatur & percoquatur.

Tenuis autem quæ grani minus, plus aquæ, recipit; humectando refrigerat, minusque alit.

Acida malum succum gignit; renes, nervos & caput tentat; tormina, inflationes intestinorum, quæ-  
admodum & recentior epota, stillicidium vrinæ, crassum succum, calculum renum & vesicæ parit.  
Lutetiana crassa, dum recens, pessima.

Additur Lupulus Bieræ vel Alæ duplici ratione; cum ob saporē & conservationem, tum quia cras-  
sum succum Zythum procreare literis prodatur; cuius erratum & noxam emendaret, aperiendo ab-  
stergeret, per venas crassæ pituitosæque excrementa, venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactio-  
nem educeret: docemus, nā Mesue in syrupo è succo Lupuli & Byzantino, aliisque neotericorū compo-  
sitionibus Lupulū, non secus ac fumariam, sanguinem purgare & defæcare, eiusque ebullitiones com-  
pescere: iccoris intemperiem calidam, internosque feruores, febresque biliosas & pituitosas arcere.  
Quem eundem effectum præstant turiones siue Asparagi vere etumpestes, cibo & acetariis.

Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus enenit, ut de Coriandro monuimus Aduersariorum  
pagina 314. Quod caput feriant, è Cereuisia non reiciendi; neque illis causa rheumatismarum & arti-  
culorum defluxionum, ut doctis Anglis per placet, attribuenda; sed potius ingluuiei, crapulæ, mollitiæ,  
blanditiis & gulæ oblectamentis, quibus sunt dediti, ascribere debent; quia Alæ ipsa potenter, sine eis,  
aut lupulo pauxillo coninnata, non secus ac vinum, abditissimas permeat cerebri membranas, eadem-  
que infert incommoda. Lupuli flores non nocent qualitate, sed quantitate, quemadmodum vinum &  
optima quævis temeta.



Ex Malti colamine Castaplasma podagricis utile.

Non secus ac Defruto .i. musto quamdulcissimo Columellæ ad tertias, dimidias Plinio decocto, Batani, Frisij, Angli, & Belgæ, optimæ Cereuisiæ vixt siue musto patrio, id est, infusi Malti colamine excocto pulvis ad neruorum & articularum dolores faciunt, qui leniendo, roborando & digerendo mirè congruunt.

Recipiunt crassamenti Cereuisiæ excocti lib. ij. fel tauri vnum: ebulliant lento igni ad lib. j. postea adde aceti lib. j. pulvis olivani ꝑ. j. pul. florum Chamæmeli, Meliloti, añ. ꝑ. j. c. pul. Rutæ ꝑ. j. mellis & pul. Cimini añ. lib. f. denud ad crassiem percoquantur. Hoc medicamentum mihi communicauit pereruditus medicus D. Baylly apud Auxonienles professor Regius.


*Pisana.*

Ex hordeo Pisana ἀπὸ τοῦ ἡριανῆν, hoc est, pisendo decorticare. quod omnibus frugibus quadrat, nonnunquā etiam leguminibus Galeno teste de alimētis capite de φακοῦ ἡριανῆν .i. ex lente Pisana. Cruda prisca dicitur hordeum, auena, & frugum omne genus decorticatum: Cocta verò coctione diuturna in vnum corpus redacta, quæ pisana tota etiam vocatur, à cremore hordei transcolato varia. Gal. lib. 1.º. alimentorum, capite De hordeo, pisanam crudam etiam fecit hordeum acerosum, quod ad pisanas expetitur.

Hordeum glumis exutum, siue pifana, magis lenit asperitates, nutrit & humectat. Vis deterforia, obstructions referans in acere consistit.

**HORDEVM spontaneum spurium.**  
**HOLCVS** Plinij Anguillare.

**ZEOPYRVVM siue TRITICOSPELTHVM.**  
**HORDEVM nudum vulgo vocatum.**



**HOLCVS** Plin. lib 27. cap. 10. in saxis nascitur siccis: aristis habet in cacumine tenues, culmo quale hordeum restibili. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacertum educit è corpore aristas. Hanc quidem ob id ristidam vocant.



ZEA, Zea, Aduersar. pag. 8.

Germ. Speltz. Gal. Espeautre. Hisp. Spelta. Ital. Spelta &amp; Farro.

Diosc. Plus quam Hordeum alit, ori grata, digeritur in panificia, minus quam Triticum alens.

Gal. Vniuersa sua facultate tritici &amp; hordei media.

Plin. Ex vino ad Scorpionum ictus repida, &amp; sanguinem excreantibus. Item Arteriæ: tussi cum caprino seuo aut butyro, ex fœnogræco mollissima omnium, vlcera manantia sanat.

CRIMNON Diosc. est Semola Gallorum &amp; Italarum.

Diosc. Crassior est ex Zea Triticoq, farina, ex qua pultem faciunt, abundè alit, faciliè conficitur\*, aluum vehementius adstringit, si Zea ex qua fit prius torreatur.

\*Æginetæ &amp; Gal. concoctioni renititur.

SILIGO Tragi. OLYRA Dioscoridis.

Diosc. Zearum generi adscribitur, sed minus aliquanto nutrit, in panes vt Zea cogitur.

BRIZA. Monococcus recentiorum &amp; Dod.

Aduers. pag. 9.

AVENA. pag. 9.

Angl. Oates/Otes &amp; Hauer. Hisp. Auca &amp; Avena.



Diosc. Avena ad cataplasmata utilis, veluti hordeum. pulve huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus. eadem Gal. &amp; Aegineta

Gal. Illita desiccet &amp; digerit mediocriter, sine morfu; temperiem autem habet paulo frigidiorẽ; nonnihil etiam attritionis obtinet, vt ventris profluvia iuuat.

Plin. Decocta in aceto naus tollit.


Vulgus medicorum &amp; plebecula torrefaciunt, facculis excipiunt milij modo ad colicos dolores, ad mouentq̃ue calidè.




BROMOS.



Pag. 9. l. 12.  
lege officie est  
*Bromus sterilis*.



*Axylops*  
*Bromoides*  
*Benjamin*



BROMOS



BROMOS, *Festucago* Ga<sup>l</sup>. pag. 9.

Gallia, aueron: Ital. vena vana i. auena cassa, &amp; orzo saluatico.

Iam demum Matthiolo *Aegylops* altera, non prima epit. 843.

DIOSCOR. *Bromus* herba *Aegylopi* similis, exicatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adducitur: rursus incoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Lineum ex eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt & eo modo vtuntur. Cum succo rosæ cocta in vino grauem oris halitum emendat.

BROMOS sterilis altera; *Festuca* altera Dod. Germ. Dojt & Iulch Belg. Drauick.

BROMOS sterili affinis hæc & perquam similis: apiculis compressionibus Canini graminis, semē oblongum, acerosum, Secalino, cuius est vitium, multò minùs claudenubus, in secali & agrorum marginibus reperitur apud Belgas.

*ÆGYLOPS* *Bromoides* *Belgarum*: *Aegylops* Dod. Belg. gebaerde eene.

*ÆGYLOPEM* inter & *Bromum* herbam media est hæc, quæ Belgis gebaerde eene, quasi dicas; auenam aristis siue barbula donatam. Auenæ cassæ aut *Ægylopi* assimilatur. Semen acutum, hirsutum, oblongum, rufum, glumis occlusum. In Anglia, Belgio, & Gallia inter hordæum & secale nonnusquam occurrat. Num eadem quæ *Ægylops* præstet, incomptum hætenus.

*FESTUCA* siue *ærlyk* Narbonensis & calidarum regionum. Aduers pag. 10.An *Festuca* hordæum Plinij? Ital. Orzo saluatico.

DIOSCOR. Illiæ cum farina herba\* *ægylopius* medetur, † duritias discutit. Succus farina admissus seccatur, & eorundem gratia reponitur.

\* Gal. eadem.

† quia leniter est actis, digerendi vim possidet.

PHOENIX *qōivē* pag. 10. *Hordeum murinum*, vel *Lolium rubrum*: Belg. *Wupse koren*. Ger. *Wintzen helmer*, & *Wald trohor*. Gal. *Iuraye lauauge*. Ital. *Gioglio saluatico*.

LOLIUM Aduers. pag. 10. Germ. *Tuualeh*, *Gue wepfen*, & *Iulch*. Hisp. *Yoio*, & *Zizania*. Ital. *Gioglio* & *Loglio*.





DIOSCOR. Phœnix in vino austero pota alui profluum & emanantem vulua sanguinem sistit, vrina impetis infrenat. Sunt qui ad alligatam in puniceo vellere, & suffusam, sanguinem suppressere prodant.

## LOLIVM.

DIOSCOR. Nomas molitum, putrescentia vlceru, gangranasque comescit, cum raphanis & sale illitum: & ex aceto & sulphure, vino feros lichenas & lepras sanat. Strumas quoque discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino, ungit quæ ægrus ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa vtilissimè ischiadici alluitur, si cum polenta, stibure, myrrha aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

GAL. Desiccet, & exsiccet efficaciter, vt propinquum sit acribus, magis quàm Iris: sed non est perinde vtilis, subtilis essentia. Verùm multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in primo tertij ordinis exsiccantium; secundi verò in fine exsiccantium.

Loliaceam farinam suis soporiferis medicamentis miscet Chymistæ.

VSTILAGO Aduers. pag. 11.

CRATÆOGONON Aduers. pag. 11.



DIOSCOR. Cratæogonum, inquit, traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore ter die post menses purgatos tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptionem quadraginta diebus, & vir modo consimili totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

CRATÆOGONI varietas quorundam & Euphrasia 2<sup>a</sup>. Dod.

QVÆ floribus suave rubentibus secus agrorum margines citur, aliquanto minor, pedali cauliculo, solus Melampyri & Crustæ gallinacæ medius. Euphrasiam secundam Dod. fecit.

MELAM-



MELAMPYRUM, *Triticum vaccinium*  
Tragi, Cordi, & Dod.



PSEUDOMELANTHIUM, *Nigellastrum* Dod.  
*Lolium perperam* Fuchso. *Lichnoides Segetum* Mutoni.  
*Guigo* Tragi. Hisp. *Neguillia*, &  
*Allipiure*. pag. 12.



*Pseudomelanthium*, ut testatur Fuchsius, ex neotericis lichenibus & pforis sanandis, ut *Lolium*, efficacissimum; vulnera glutinat, fistulosis ulceribus medetur, sanguinem supprimit.

Num pello subditum menses trahat, ut ex Hippocrate Dod. refert, ignoramus: sed *Nigellam* vtramque siue *Melanthium* cum *hortense*, tum *campestre*, cuius gemina varietas, melle *Mercuriali* excepta, id prestare non dubito. Cum inter segetes *Melanthium* sylvestre oriatur, suspicio est Hippocratem per *Melanthium* ex tritico illud ipsum innuisse.

Quasvis cutis scedationes seminis farina ex melle illita delet.

ORYZA *Oryza*.

Angl. *Rice*. Hisp. *Arroz*.

*Dioscoridi* & *Galeno* mediocriter alit, & aluum supprimit.

Crassum prabet alimentum.

MILIVM







MILIVM.



STIRPIVM



SORGHO.



MILIVM



MILIVM Angl. *Maile & millet*. Hisp. *Miyo & Milho*.

DIOSCOR. Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit: sistit pulce sua aluum, vti nam cit. Torretur, Plin. & Gal. eadem.

Gal. Primo ordine refrigerat, exicat vero tertio exoluto, aut certe 2°. intenso. paululum etiam habet tenuitatis. Aluum humentem desiccatur.

Varietas. Semine nigro & latiore iuba ab hoc solum diuersum videas.

MILIVM Indicum Plinianum, Frumentum Turcicum Dod.

Triticum Baetrianum Plin. apud Cordum. Aduers. pag. 13. 14.

Germ. *Turckischen korn*. Hisp. *Mijo Turquesco*, Ital. *Fromento Indiano*.

SORGHUM, Melica Itolorum Matthioli & Dodonaei. Aduers. pag. 14.

Germ. *Sorghsamem*. Belgii, *Sorghsaet*.

Viribus Panici conflatur pauperum tabernis & culinis agri Ferratiensis vltatissima.

PANICVM. Aduers. pag. 14.

Angl. *Panick*. Hisp. *Panizo & Panico*.

Mel frugum Diocli, Anguillara.

DIOSC. Panicum eisdem quos milium habet vsus, minus tamen & nutrit & stringit.

Gal. Foris siccatur & refrigeratur.

Herbariorum PANICVM Syluestre.

Aduers. pag. 15.

Perperam Lolium Cordo. Gramen manna alterum Dod.

Ischamou Plin. C. Clusio.

PANICVM aliud Indicum.

& Hisp. *panicula villosa*.



Legenda II.  
Panicum.

Rarius hoc Panicum superiori anno à quodam chirurgo Bristolium Angliae ex nouo orbe delatum,  
D à vul-



à vulgato diuersum nutante panicula, graciliore longiore maximi Amaranthi, pedem æquante, hirsutioris spectatur.

## STIRPIVM

Herbariorum Panicum sylvestre.

Alitibus, vti frugum vitia & graminea, expetitur; minimè in cibis, eoquæ Panico quàm graminum. Mannæ propius.

LACHRYMA Iobi, Lithospermum Plin. & Diospyros. Holoistivm Ruellij herbariorum & Lutetianorum Aduers. pag. 17.

Plin. cap. 11. lib. 27. Aduers. pag. 16.

PHALARIS calapis. Aduers. pag. 16.



Ital. Falari.

Perperam Graminis genus Eufhsio.

Gramen Leucanthemum Dod.

Chamaecissos Oribafy, Italis.

Euphsia gramin Tragi, & tandem gramin alterum floridum Matth. an Holoistivm Lacuna?



Dioscor. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur: Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

Subdit Galenus, cum in se se habeant quidpiam tenuium partium, & calidum.

Linea 6. & 8. parenthesi clauduntur (quo illustiores, &c. magnam similitudinem.)

Dioscor. Holoistivm herbula quadrantalus, humi repens: foliis viticulis, coronopo aut gramin proximo, gustu adstringentibus, radice alba, pratensi vsque in capillamenti speciem, longius line quatuor digitorum. Nasitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta, in vino pote. nam carnes coguntur, decoctionibus addita.

Varietas.

Eandem hanc: herbulam foliis, flore stellato & viticulis, in marginibus agri sabulosi Antuerpiani, sed minoribus multo, etiam Autumno florentem hoc anno videri meminimus.

Holoistivm alterum, aduers. priorum pag. 17. est Filix saxea Tragi.

Holoistivm Monspeliaci varietas, inter Plantagines.



PHALANGIVM non ramosum. Aduers. pag. 18.  
Ital. Falangio.



Aliud quoddam Phalangium voluptatis ergo in hortis Belgicis, Italicis, & Anglicis colitur. Priori Phalangio ei omnia similia præterquam summus pedalis cauliculus, quem sine ramulis in pediculis lactei stellati flores, & semina in pericarpis antedicto similia, sed maiora, ambiunt.

PHALANGIVM Creta Salonensis. pag. 18.  
Alphodelus minor Clusij & Dod.

Nisi à frigoris iniuriis defendatur, emoritur in Belgicis hortis hyemis sæuitia, est enim frigoris impatientissimus.

Dioscor. Folia, semen, flos, cum vino pota, auxiliantur contra \*scorpionum \*Phalangiorumq. ictus: \*tormenta quoque deserviunt.

\*Gal. quia facultatis tenuium partium desiccantis.





MANNA. *Advers. pag. 23. 24. 25. 28.*

**MESVE.** Temperata est, aut paulò calidior, guttur, the racem, ventriculū lenit, terget, bilem clementer purgat, sitim sedat. Quoniam verò imbecilliter vacuat, praefertim cruda (cocta enim citius agit) thymo & hyssopo, vel alio, vis eius vt cassia intenditur. Valentibus autem medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa naturae magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scammonio miscuit, quod à posterioribus est laudatum: alij deinde turbich, alij aliis. Datur à drach. sex ad drachmas quindecim: annum seruat.

**DE ARVNDINIBVS** *Advers. pag. 27.**Kéxav, sine Calamus.**Gal. Roseau. Belg. Giet. Germ. Stroh.**Ital. Canne a far siepe.**Vallatoria sine phragmites Diosc.***ARVND** *Donax sativa nostras, sine Cypria.**Advers. pag. 27.**Gal. Canne. Hisp. Caña. Germ. Stroh. Belg.**Spacuseh Giet. Ital. Calami à far conocchie.*

*Lege pag. 26.  
lin. 10. anteuca-  
na. & paulo  
post sen'neus.*

*Lege pag. 27  
lin. 10. gra-  
minis.*



**DIOSCOR.** Vallatoria sine phragmitis triu' radix per se, aut cum bullis suis illita, spiculis aculeosq, corpore extrahit. Luxata, lumborumq, dolores cum aceto mulcet. Virentia solia tusa & inposita, ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. † corticis cinere peruncta cum aceto alopecia sanantur. Panicula lanugo, si aures intrauerit, exsurdant.

\* Gal. Ceu quadam trahendi vis ei inesset, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimèque acrem.

Paulus eadē. † Gal. Cortex verò combustus, admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur cum nonnulla abstersione, vt exiccet & calefaciat, tertio quodammodo ordine, plus tamen siccet quàm calefaciat.

\* Gal. Adeo tenaciter harena affigitur, vt auelli non possit, auditumque vitiet.

Radix



Radix squammas ossium extrahere creditur.

Arundinis folia melius substituantur pro teneris palmæ pullulationibus in emplastro diachalcitico, quàm radices.

Æginetæ, Phragmites abstergit: folia eius viridia moderatè refrigerant.

CALAMVS odoratus Libani, *كالبان* & *القمامة*.

Dioscor. Melior est fulvus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum quadam acrimonia amarus. Vrinam potu cit, Equare cum graminis aut apij <sup>Plin. ead.</sup> semine coctus, in aqua subter cutem suta morbo, renum vitis, stillicidio vrina, ruptisq; commode bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se, aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo, ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmasiq; odoris gratia commiscetur.

Memini me vidisse Venetiis ad Angeli symbolum Calamum aromaticum, quem Alepo Syriæ Sequinus Martellus doctus & industrius pharmacopœus, fortè delatum ex lacu inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio lib. 12. cap. 22. memoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida, crassitudine paruum digitum æquans; color fulvus, ni labat memoria, saturior, odoratus, parum lentus in mandendo, subæris & amarus.

Iacobus Vtenhousius generosus Gandauensis, stirpium & artis medicæ peritissimus, Calami aromatici dodrantales cannulas araneorum telis plenas, fulvas, geniculatas, digiti minimi crassitudine, gustu planè aromatico, amaricante, Schoenantho præstantiore, Balneolis vulgò *Baignol* Gallie Narbonensis nactus est inter Schoenanthi festucas, quas Massiliam aduectas ex lacu Plinio memorato asserabant.

Multò maiores habuit præclarus vir Augerius D. de Bousbeké Flander Insulanus, Cæsareæ maiestatis Constantinopoli legatus, stirpium exoticarum peritissimus.

Albicans] quia fulvum prius dixit Diosc. videtur referendum ad araneosam illam substantiam, qualè in aliis arundinibus cernere est, nisi velit ex fulvo albicantem significare. alij radici tribuunt.

Vrinam potu cit, cū graminis aut apij] Semina diuretica addit, ut medicamenti actio iuuetur, & sit magis destinatum hydropicis & nephriticis; quando loium ob affectos renes vel vesicam supprimitur, stillicidium què sit quod stranguriam appellant.

Menses & potu & appositu] quia aliqua sunt quæ pota menses, nō apposita movent: vel quia nonnulla imposita menses elicere possunt, quæ nō intro assumuntur; quæ ichores absumendo menses retinent, potius quàm movent: aut quæ sunt amara, aut odore ingrata imponuntur, nec nisi virgati & maximo affectu propinātur: Cuiusmodi sunt Lachrymæ feridæ, Sabina, Bitumen, Assa fœtida, Galbanum & consimilia attrahētia medicamenta simplicia vel cōposita; quæ intro sumpta ventrem laxarent; pessarij autem modo subditi, sanguinem attrahunt, què etiam medicamenti acrimonia expultrix facultas irritata expellere cogitur.

Tussi suffitu medetur] Fumus aërem inficit, quem quia pulmones hauriunt, siccando, humores absumendo, & defluxiones sistēdo egregiè curat. Quod cominodius ut fiat, scitè Dioscorides Terebinthi resinam addit, quo plus vaporosæ fuliginis reddat, quæ potentissimè catarrhos & vlcera pulmonum siccat. Tamen sacris pulmonibus difficillimè spirantibus assatim per infundibulum aut arundinem hi vapores minimè, ob suffocationis periculum, intromittendi; nisi prius medicamento purgante excrementorum copia imminuta, in cubiculo vel lecto occluso fumum sensum hauriant.

ARVND. Indica florida. Cannacorus quorundam  
Advers. pag. 28.





Malagmatis odoris gratia commiscetur] Non solū odoris gratia malagmatis, hepaticis, stomachicis & v-  
tutinis additur, sed ob illas dotes quas habet.

Gal. eadem.

Æginetæ ex secundo calfacientium & arefacientium à temperatis excessu, subtilioris nonnihil &  
astringentis est potentia, vrinam ergo proritat.

Plin. lib. 24. cap. 11. & lib. 12. cap. 22. subdit.

Illa quæ in India Syriaq; nascitur odorū vnguentorumq; causa, cit & menstrua, adnota: medetur  
conuulsis, duobus obolis pota: Iocinori, renibus, hydropi; tussi etiam suffitu, magis que cum resina. fur-  
furibus vlceribusque manantibus cum vino radix decocta: excipitur & succus eius, sitque elaterio si-  
milis. Efficacissima autem in omni arundine quæ proxima radici, efficacia & genicula.

ACORVS. Aduers. pag. 29.

ACORI exactior effigies altera. pag. 29.



CERTE cū huius exoticæ & peregrinæ elegantis plantæ prior effigies è fragmentis aridæ herbæ  
fuerit depicta, priusquam Acorum nascentem nacti essemus, & qui minus recens, sed aridus duntaxat  
nobis visus, ei exactiorem ad viuum expressam iconem antecessendam operæpretium duximus, cuius  
virentem plantam inspectione assecuti sumus hoc anno 1575. Lucea Bulgaria, munere C. Clusij huius  
historiæ clavis. scriptoris, in cultissimo & amantissimo paratissimo D. Ioannis Dilsij, rei herbariæ, om-  
niumque naturæ miraculorum, perquam auidi & periti: foliis Xyridis, sed oblongioribus &  
angustioribus, sesquicubito maioribus, nitidis, atroviuentibus, confinis. ita: huius eximii fragrantia prædi-  
tis, quæ Iridis filicibus nū hyeme marcescunt & vere nūo pullulant. Radices habet: quales in offi-  
cinis prostant nomine Calami aromatici implicatas, nec in rectum; nec altum actas, sed cespitem summo  
in obliquum (vt appositè annotat Diosc.) sparsas, subtus humectosa coma fibratas, albicantes foris,  
intus candidas, gustu acres & amaras, geniculis distinctas, è quibus vtrinque alternatim, alarum ritu ap-  
tantur pullulationes. neque caulem neque florem edidit. quinimo asserit Clusius, relatu C. V. D. Ca-  
roli Rym & D. Augerij de Bousbecke Casais ad Turcartim imperatorem oratorum, nullum vel flo-  
rem vel semen, etiam vbi sponte nascitur, in magno quodam latu ad radices motus præcelsi iuxta  
Piusiam



Prussiam Bithyniæ urbem, proferre: sed duntaxat quædam nucamenta, nucis Ponticæ iulis similia è ramulis ex leui caule prodeuntibus.

**Dioscor.** \*Radici vis calfactoria. Decoctum potu[m] vrinam cit: prodest lateris doloribus, & iecinoris atq[ue] thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienē absumit. vrinæ stillicidio & serpentū ictibus auxiliatur. Insidentibus ad muliebres affectus, Iridis modo, vtiliter imponitur. Oculorū caligines succo discutit. Antidotis radix magno vsu commiscetur.

Plin.\* & Gal. † Consistentia tenui: & hinc lienes induratos iuuat, ceratodis crassitiem deterget & extenuat: sed ad hoc melior est succus. Omnino verò siccificum esse clarum est. Et sanè ordinis esto tertij, in calefaciendo & siccando.

\* Plin. contra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem epoto, contraque serpentes. Omnia vesicæ vitia sanat. Testium tumores, radix decocta in vino, tritaque & illita, mirè discutit. Duticias & collectiones omnes sanat, decocto herbæ fouentibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radix prodest.

Radix Acori siue Calami aromatici officinarum amarulenta est; Galeno tamē Acorus amaricat: quare Galāga maior pro Acoro præferenda; & Calami aromatici radicē pro Calamo odorato Libani vsurpabimus: Galenus Vñeam substituit quā σφαγγον vocant, è cedro vel larice, vel populo præstantissimam.

Per triduum radicis decoctum potum vrinam mirificè diducit & stranguriam sanat Apuleio. & herba in vase apum suspensa, nunquam effugient, neque examinabunt.

**ACORVS nostras palustris.** Aduers. pag. 29.

Butomum Theoph. Valeriano. Pseudovis & Iris lutea Dod.

Belg. geel tisteb. Gal. glaycul & flambe bastarde.

Ger. gel schwertel & Djaehentwurtz.


Angl. Gladden or false Acorus.

**GALANGA maior.**

Perperam officinarum Acorus. Aduers. pag. 30.



*Galanga maior*



*Galanga minor.*

**ACORI nostratis radix** constringit, roborat, cogit, & contrahit: dysentericis vtilis, menses sistit.

Alium in Bohemiæ hortis luteis floribus coli tradunt; Iridemque luteam appellant.

**GALANGA viraque.** Nec tundendo facile cedit. Aduers. pag. 30. } Acori radices frangendo faciles esse




esse vult Plinius, quod Galangæ non continet: proinde hæc Galanga, non est Acorus.

Astringendo ventriculum & viscera roborat, & à flatibus vindicat, concoctionem iuuat; cœliacos, colicos, & à flatibus ortos dolores mitigat. Stomachicum & cephalicum est medicamentum.

Naribus pulvis inditus cerebrum expurgat, sterutamenta mouet. In calfaciendo & siccando terrij est ordinis remissi.

IRIDES. *Aduers.* pag. 30.

*Iris vulgaris.* Belgis blau lisch ouer yee. Gallis, flambe ou glaycul. Angl. flower de lucez / or flower de lper. Ital. Giglio celeste, & Giglio pauonazo. Hisp. el Lirio cardeno, lirio decor de cielo. *J. decus celi.*




*IRIDIS vulgaris varietas.*

Flore cœrulea obsoleto, cinereæue; alioqui nec ita absimilis omni sui parte, sed maior in viretis nostris occurrit.

*IRIS Dalmatica maior.*

Aspectu hilaris peruenustus foliorum exortus, lateratim traiectus, & radiatim alas pauonis explicatas imitatus: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis nitentibus senis foliis, alternatim etiam repandis. Virera Belgica hanc in delitiis habent munere clarissimi medici Pancij Ducis Ferrariensis. Semen profert in siliquis angulosis.



DALM



IRIS *Dalmatica minor*.

Bifloræ Iridi facie, omniq[ue] sui parte perfimilis, sed tota minor, & flores dilutiores aliquanto. Alfonso Pancij medici Ferrariensis doctissimi munere missa & Belgij inquilina facta.

IRIS biflora Lusitanica.  
An astragaloides Aetij?

Perpusilla IRIDIS latifolia.  
Aduers. pag. 32.



IRIS biflora Lusitanica.

Nostro Belgio, Hispanico delata solo, etiam inquilina facta est; vere & autumno florem odoratum violaceum singulis caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus singulum aut alternum villoso candore fimbriatum proferens: densa breuiq[ue] radice, frangentiq[ue] contumace; facie & foliis Dalmaticæ similibus, sed magis sparsis. Flos ut plurimum singularis, vbi tantum repetitur.

## IRIS Lusitanica verna.

Aliud inuenitur genus, Dalmaticæ Iridi maiori cum foliis, tum caule, & ternis quaternisq[ue] floribus simile; sed colore omnino violaceis seu purpura saturioribus: cuiusmodi me vidiſſe inuat hoc vere in antœniſſimis viridariis illuſtriſſimi D. Ioannis vander Delf, & Mariæ Schetz.

## Perpusilla IRIDIS latifolia varietates.

Chamæiris, ex quo eam è Monſpellienſi agro in Belgium & Angliam tranſmiſi, frigido humentiq[ue] ſolo excepta, non ſecus ac innumere calidarum regionum peregrinæ ſtirpes, ſoli & calis temperie, varias ſubit mutationes. Caulis illi quippe dodrantalis, nonnuſquam pedalis; flores albi aut lutei, aut violacei; alibi caule vidui, dilute rubentes, violacei, ſtriati, & ex luteo pallentes, obſervantur.

Irides Auſtriacas humiles ſpecioſis rubris floribus, & violaceis odoratis, clariffimo viro D. Brancioni Vienna miſit elapſo anno C. Cluſius vnâ cum Chamæiride purpureo odorato flore.



*Iris Perpusilla sylvestris angustifolia.*

Alterum Iridis genus iamdiu descripserunt, & vocarunt Chamæiridē herbarij nostri, foliis gramineis, rigidis, spithameis & pedalis, pusilli gladioli similibus, floribus expansis, cæruleo-violaceis, aliquādo, purpureo-violaceis, nouē foliolis confatis, caulis palmaris & dodrantalis. radix gracilis, minimo digito duplo minor, acris, gustu Xyridis: in Germania & Belgio frequentior prouenit.

*IRIDIS angustifolia sylvestris varietates.*

Belgarum sedulitate in nostris hortis cultæ vi-  
suntur angustifolia & latiore folio sesquicubitali  
Irides. Sed vtrique flores terni & quaterni iuxta  
cauliculi cubitalis ramulos, cæteroquin cum su-  
periore haud absimiles. Eas virentes primū vi-  
dendi copiam fecit in suo viridario peritissimus Al-  
lardus Ruerius doctor Medicus Insulanus: postea  
Ioannes Doune, alias bogelsang: vtrique non pauci.

*IRIS Lutea variegata.*

Adducenda & huc sanè quàm rara Iridis species.  
Flores sunt lutei Chamæiridis MonsPELLIACÆ, tribus  
repandis foliis peregrina elegantia striatis, obscure  
violaceis. in Belgij hortis prouenit munere doctissi-  
mi Clusij.

*IRIS Chalcedonica maxima, variata.*

Vidisse & meminisse iuvat superioribus diebus  
Iridis florem Bruxellis delatū luculentæ magnitu-  
dinis, maculis fortuitis, transuersis & obliquis,  
giluis, cinereis & puniceis variatum, foliis tan-  
tillum gladij ritu vndantibus. Cætera cuncta Iridi  
vulgatæ aut Dalmaticæ similia. Hanc debemus C.  
Dominæ Dindeuælde, quæ hunc luculentum florē  
alebat studiosè in horto D. Tifnac.





## IRIDIS varietates quamplurima.

Iridis complures adhuc varietates habemus, munere clar. heroinæ Catherinæ de Brimeu vxoris D. Conradi Schetz, Colonia, Lugduno, & ex Hispania delatas, sed mihi necdum floruerunt.

**Dioscor.** Radix dum munditur sternutamenta<sup>a</sup> mouet. Vis omnibus excelsatoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum qui agrè reiciuntur, crassitiam digerunt vel attenuant; bilem, crassamq; pituitam ex hydromelite drachm. septem epota purgant. Somnū conciliant; lacrymas ciunt; torminibus medentur. Eadem pota ex aceto serpentium<sup>b</sup> ichibus auxiliantur, lienosis conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura<sup>c</sup> effluit. Menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum seminarum foribus viriliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis venarum spiracula ischiadicis<sup>d</sup> infunditur. Fistulas ac sinus carne explet<sup>e</sup>. Radices ex melle glandū<sup>f</sup> modo subdita partus extrahunt; quinetiam cocta & illita strumas veteresq; duritias emolliunt<sup>h</sup>. Sicca quoque vlcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna cum vilitate illinuntur. Admota cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lenigines & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat. Pessū malagmati<sup>g</sup> & acopis inferuntur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

<sup>a</sup> Et caput purgat Plin. <sup>b</sup> crassa & choleras. <sup>c</sup> & araneorum; scorpionum, in pane vel aqua, addit Plin. <sup>d</sup> genitura absุมit, Plin. <sup>e</sup> & lumbis cum resina illinitur Plinio. <sup>f</sup> sarcotica est.

<sup>g</sup> Glandū modo, scitè collyrij modo vertunt. <sup>h</sup> Succo duritias omnes emollit. Plin.

<sup>i</sup> capitis præcipuè suppuraciones veteres. <sup>j</sup> Aegineta eadem asserit.

Addit Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus præcipua est, tinearūque vitio laborantibus instillari. Contra canum morsus ex oleo imponitur, & contra perfrictiones; sic & neruorum doloribus. Dolori capitis cum coroneis malis aut struthis illinitur. Crapulas quoque & orthopneas discutit. Vomitiones cit duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cum melle. Ad paronychias farina eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat.

**Mesue.** Radix est calida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa, sedat dolores, pituita crassam, & mistā illi bilem purgat, ac præter hæc aquas serosas, idq; clementer. Materiam crassam, lentam, hærentem in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac promptè educit, visceraq; omnia expurgat. Hepatis quoque ac lienis, & vicinarū partium tollit obstructiones: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumorem, duritiem, & similes sanat, aut lenit. Omnes quoque tumores etiam duos, & strumas digerit; præsertim neruorum & iuncturarum: maximè cum betæ vel brassicæ succo, vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgiam veterem sanat: præsertim cataplasmate imposita, & succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet, & per nares detrahit vim maximam excrementorum in partes alias, per meatus occultos alioqui defluxurorum. Succus autem ex ea vt abstintio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento factam, multum iuuat, & ab eodem spirandi difficultatem. Vterum præterea expurgat. Pessū quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlcerā antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quale etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere iniicitur, aut emplastro imponitur. Os si colluitur aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit: supposita item hæmorrhoidas aperit. Inuitam feminis vacationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique irinum neruos & iuncturas firmat, spasmodum ex repletionē, cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagræ, pleuritidem, peripneumoniam oblitum iuuat, catarrhum coquit, somnum conciliat temporibus inunctum: aurium dolorem instillatum, auti, narium graueolentiam ipsis iniectum corrigit. Fit autem ex floribus iridis, & radicum dimidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mullā & pauca spica, vel cum sero lactis melle, mastiche: ad affectus autem thoracis & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

Vis omnibus excelsatoria] omnes vi calfaciendi pollere ait; quod Aegineta sine aliqua gradus limitatione docet; ait enim abundè calefacere, abstergere & concoquere siue maturare. Intellexit fortè ad secundum gradum, vt coniectura fert, quia sarcoticis annumeratur; quæ talia esse solent, & vltra secundum gradum calfacere & siccare non debent; ne materiam generandæ carnis aptam & necessariam absumant; nisi superflua caro adsit. Alij ad secundum completum vel initium tertij excessus; minimè quartum, quod tamen doctissimus Dod. credidit, recens potissimum; cuius purgandi facultas in calore minimè consistit, sed succo abstergente, attenuante, nitroso, crudo, flatulento, ventriculo & visceribus molesto, nisi probè castigato.

Extenuans] Dioscorides addidit facultates secundas & tertias. Est enim medicamentum non solum calidum; sed etiam tenuium partium, quemadmodum succus limonum, oxalidis, berberis, agrestis siue omphacij, reliquorumque acidorum, quæ extenuant crassos & lentos humores citra calfactionem.

Contra tussim efficax] Cum tussis à diuersis causis fiat, in qua tussis efficax, distinguere oportet præteritum

E 2 est:

Calfacit 2.  
& exsiccat 3.  
Fuch.  
Calida & sicca ordine 2.  
Aucennæ  
sarcotica.



Tussis.  
Sternuta-  
mentum  
Nausea.

est: Nam tussim ex collectionibus & tumoribus sub septo transverso minimè curare manifestum; quæ à septi compressione fit, non secus ac illa quæ ab hepatis inflammatione deprehenditur. Tussis enim ab acris humoribus irritatio est in membris & organis respirationi seruientibus facta, vt expellat infesta excrementa; sicut sternutamentum, capitis; & nausea, ventriculi.

Neque conuenit in defluxione pulmonum vel arteriæ à tenui materia, cùm sit attenuans medicamentum; densare enim opus est: si calida materia; frigidis condensantibus, papauere, opio, vel lentis; spissis, Gummi Arabico, tragacantho, si frigida; tenuis, Iuiubis, Sebesten, & aliis moderatè calidis, Penidiis, semine lini, fœnigræci, radice altheæ, maluæ & similibus: aut medicamentis compositis syrupis Ziziphorum & de Hyslopo, qui conspissantia lenta recipiunt. Tussis à sanie exudante ab inflammatis pulmonibus, costis, trachæa arteria vel eius ramis; quæ si tenuis, incrassanda; si crassa, extenuanda, vt in empieumate. Quæ duntaxat à refrigeratis pulmonibus fit; solo habitu retento, qui calfacit, curabitur, si leuis sit. A lentis crassisque, vel diuturniore mora densatis, pulmonibusq; infarctis educendis Iris efficacissima. Minus conuenit tussi post materiæ educationem, ob facilitatem irritatam expultricem, cui narcotica ad sensum minuendum vel leniendum; potiora sunt.

*Humorum qui agrè eiciuntur attenuant.*] Cur ad tussim & in qua tussi valeat, Diosc. indicat quæ difficilè è thorace exeruntur, attenuat, quibus extenuatis facilè reiciuntur. Fortè aliquid vltius significare voluit his verbis, qui agrè eiciuntur, siue è thorace, ventre, renibus educenda sint excrementa. Extenuant & incidunt Irides omnes, vi calfactoria & partium tenuitate: quare paulo post subdit, *mensēs, vinas, sarnū hepatis & splenis.*

*Crassa & cholera purgat.*] Crassa extenuando ad supradicta referuntur, vel ad ea quæ reiciuntur; duo significare volens; humores purgare & eosdem purgare in maiore quantitate. Iris enim cholagogum medicamentum est, quæ cum hydromelite bilem crassam vel pituitam extergendo & attenuando, euacuat. Hydromel enim medicamentis purgantibus additur, vt educationem faciliore reddat: eadem qua ratione Aloes bilem purgantibus, extenuantibus & incidentibus commixtis in Hierapicia Galpuitam crassam euacuat.

*Epota*] quasi dicat, non imposita: quod de recenti intelligendum; sicca enim non purgat.

*Drachmis septem epota.*] Drachmis septem legendum, quia crassa, euulsu difficilia. Plinio lib. 21. cap. 20. alium soluit drachmis duabus cum melle; tussim, tormina, inflationes pota, lienes ex aceto, contra serpentes & araneorum morsus ex posca valet; contra scorpiones duarum drachmarum pondere in pane. Cholicum medicamentum docent Plinij verba, qui alium duabus drachmis purgare dicit, & drachmas duas sufficere ad scorpiones: Sed aduersus venena oportet maiorem quantitatem exhibere, vt vis medicamenti venenum superet.

Mesueo laxat aquam citrinam, humiditates viscosas & melancholiam: aperit oppilationes; verum mœsticiam infert; sed quando miscetur aliis medicinis oppilationes referantibus, iecur & viscera roborantibus noxa minuitur. Aqua & melle cocto castigatur. Dosis in decoctis ab aureis duobus, ad tres vel quatuor; & sicca contusa à 3. j. ad 5. ij. ex melle cocto.

Nostis practici hodie succi recentis hydropicis propinatur ab 3. j. ad 3. ij. cum tantillo cinnamomo, alaro, nardo, caryophyllis aut Syrupo è cichorio Nicol. Igne excocti succi aut densati à drachmis duabus & semisse ad 3. iij. & quatuor, recens tamen crudus potentius agit.

*Somnum conciliat.*] odore suauis caput replet, & cerebri ventriculos vapidis fumis imbuat, non secus ac vini, ciborum repletio; labor & alia multa non siccitate & calore, quæ potius vigilias inducunt. Neque in morbis acutis, aut calidis & siccis corporibus, sed in humidis, vel dissoluendo humiditatem, vel capiti vapores offundendo; vt crocus, myrrha, anethum, ocyrum & huiusmodi nonnulla; quorum maximus est vsus. in quibus valde humida & narcotica stupefactoria dare non licet, vt in pleuritide, peripneumonia & aliis affectibus in quibus expectorandum. Syrupus è papauere albo vel nigro, spiritum & omnem pectoris excretionem compescit: quare eo parcendum, vel illi Iris addenda, quæ & somnum conciliabit, & humorum cum incrassationem impediet, tum expulsionem & excreationem iuuabit. Num intro sumi vel imponi debeat, nihil Dioscor. Dicemus & intro assumptam vel temporibus impositam, vt vult Mesueus, prodesse.

*Lachrymas ciunt.*] Lachrymas ciunt quæ cerebrum comprimunt, vel actrimonia feriunt, vel dolore afficiunt. Iris quia acris, lachrymas cit, vt cepe & acris collyria dolorifica; & risus, comprimendo oculos; & splendor nimius, violentia quadam.

*Horribus, conuulsis, ex aceto pota.*] Acetum (nisi aqua dilutum,) neruis noxium, acre & molestum; ideo aptius conuenire videtur cum oxycrato siue posca perfractionibus refrigerationibus & horribus in quibus nerui afficiuntur; quia Plinius contra serpentium & araneorum morsus ex posca valere scribit, & ex aceto ad lienos, quibus acetum optimè conuenit, cuius beneficio ad partes remotas peruenit; & crassum succum extenuando lienem minuit.

*Quibus genitura effluit*] quia genituram absorbit exsiccando; gonorrhœæ, siue resolutioni vasorum spermaticorum etiam medendo; nam refrigeratis & conuulsis conuenit.

Menses



*Menses ex vino.*] Si menses ob venarum vteri obstructionem à lentis & viscidis humoribus sanguini crassiori permixtis, supprimantur.

*Ischiadicis infunditur*] clystere infunditur, quia intestina per peritonium cum parte affecta consensum habent. Iberis, Cardamine, Nasturtium & eiusmodi, consimili modo infunduntur, quia calfaciunt, attenuant & digerunt materiam frigidam impactam, à qua fieri solet Ischias.

XYRIS, Eupis. Aduers. pag. 32.



Zingiberis filiqua  
cum granis suis.

ZINGIBERIS. Aduers. pag. 33.

In Belgio, ob soli & cæli humidum superfluum, in folia abit, marcescit, flaccescit, tandemque emoritur Zingiberis radix: eapropter ceparum & bulborum quorundam ritu effodienda, & vti vitis pampinis spoliata, emulsariis aliquot stolonibus propaginibusve effractis transferenda videtur. Semen aromaticum subalstringens gustu, Zingiberis colore album, cardamomo maiori ferè par, sed oblongius, minusque feruidum, in triquetra item filiqua, rugosa, duriuscula, villis quibusdam & cirris obducta, chamæiridis pusillæ filiquæ non dispari. De eadem Aduersariorum pag. 445. in Cardamomi historia.

Dioscor. Zingiberis cibo conueniens est; & cum condimento assumitur. Excalfactoriæ vim & excoquentem habet; aluum leniter emoluit; stomacho utilis est: efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In antidota addi solet. In summa, piperis viribus respondet.

Aginetæ Zingiberis radix potenter quidem excalfacit, neque primo tamen statim occursum, inuitæ cuiuspiam humiditatis, & crassioris essentia (quàm piper, Gal.) Gal. eadem. particeps est: Ideo terebinibibus facillè tentatur, sed constantem seruat caliditatem.

Gal. Humiditatis inuitæ] illaboratam humiditatem & crassam, quemadmodum Piper longum, in se retinere videtur; quare diutius perseverat quæ proficiscitur à Zingibere aut pipere longo caliditas, quàm quæ ab albo aut nigro. Porro vbi totum

E 3

corpus



corpus calfacere celerimè consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celerimè à caloris nostri contactu incalescant, & promptissimè vndeque ferantur. Verùm vbi partem quamvis refrigeratam calfacere studemus, contrà agendum: nimirum quæ tardè calefcentia plurimo tempore perdurent, ea præbendo.

Stomachicum, cephalicum, hepaticum, & veneris incentiuum, potissimum recens vel conditum, calidum & humidum adhuc est medicamentum; exsiccatum verò, calfaciens & desiccans ordine tertio. Obstructiones hepatis à crassa pituita incidendo, digerendo, calfaciendo, siccando referat; Intestinorum, ventriculi, & pulmonum fæctus abstergit & dissipat. superuacuo humore absumpto, cerebrum & memoriam roborando iuuat. aciei caliginosæ oculorum medetur.


CYR CYMA officinarum, *Cyperus Indicus* Diosc. Aduers. pag. 33. & 34.

DIOSCOR. Manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilotri vim exhibet.

COSTVS omnis. Aduers. pag. 34.

DIOSCOR. Vbi ei excalfactoria, vrinam ciet: menses pellit: vitii quæ vuluam malè habent, tam impositu quam foru & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesque, ex vino & absynthio. venerem ex mulso stimulat, \* latas ventris tinea ex aqua pellit † hor-

COSTVS cum caulis ferulacei frustulo radice pulla, num Diosc. Indicus Costus  
Costus Indicus Clusij.



roribus ex oleo, ante febrium accessiones, & nervorum resolutionibus oblitur. vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admistis helenij comageni præduris radicibus adulterent: quod deprehensu facile est, siquidem neque gustu feruet helenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Æginetæ, pauculæ quidem amaritudinis, plurimæ verò acrimoniæ & calidæ qualitatis particeps.

Gal. \*Horroribus] ob acrem plurimam & calidam quæ in se qualitatē simul & facultatē obtinet, adeo vt exulceret: sic etiam in ischiadicis atque in summa in quibus excalfacere partem quamvis aut ex alto in superficiem extrahere aliquem humorem est opus, ad costum confugitur; idè vrinæ & menses prouocat: ad rupta, conuulsa & laterum dolores conuenit.

COSTVS facie radicis Centaurij maioris.

Iam decem & quinque annis elapsis Venetias adferri cœpit Costus ille nigrior, facie & concretione radicis Centaurij maioris vel Gentianæ, grauis, odoris eximia Iridis suauitate, mixta tamen, cum tantilla hirci graueolentia. Cuius exterior cortex pullus; densus verò ex cinereo flauescit. Num sit vt ferula niger Dioscoridis Indicus Costus, penes doctiores iudicium esto. Antidotis minimè excludendus; & si gustu peramatus, & ingratus.

ZERYMBET Serapionis & ZEDVARIA, eiusdem radicis partes. Aduers. pag. 35.

SERAP. Excalfacit Zednaria & siccatur ordine secundo flatus discutit, & propria quadâ facultate impinguat. Post assumpta graue animæ virus, quod allium, capra, vel vinum excitauit, abigit. Venenosorum animalium moribus opitulatur, alui fluxione sistit, vteri abscessus resoluit, vomitiones reprimat. & coli cruciatus tollit, itemque ventriculi: alui tinea quascunque enecat, & in antidotis additur.

Restituo Aduers. pag. 35. lin. 25. & vtrique vt nominis, sic eiusdem radicis partes meritò dixerim nec secus inuicem differre, quam Cyperus rotundus vel longus à suis cohærentibus radicibus anfr-

ctibus



## ZERYMBET Serapionis &amp; Zeduaris eiusdem radices partes.



Quibus spectantur; cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antuerpiæ in Myropolio simplicium distillum Francis Pennini. Eoque Serapio, &c.

Item pag. 36. lege, & huius partem Zerumbet.

Et paulo post, veriores esse cum sibi mutuo cohereant. Et deme, per omnia similiores; ut Castani bulbi cum cæteris ænantis; exemplisque aliis superius ostensum fuit.

ZERYMBET Serapionis.  
Belg. Black Zeduar.



## CYPERVS.



CYPERVS. Aduers. pag. 37.  
Hist. Iunca cheyrosa, Iunca auellanada.  
Iuncus { quadratus } Celsi.  
          { angulosus }  
          { triangularis } Plinij.

Dioscor. Calidavis inest; venarum spiracula laxat, vrinam cit: ad calculos aquamue subter cutem vtilissime bibitur. Aduersus Scorpionum ictus remedio est. Perfrictionibus vulvae & præclusionibus fori prodest. Pellit menses. Contra vlcera oris, etiam si depascant, voremq; sari. Paulus eadēna eius efficax. Malignis calfacientibus, & vnguentorum spissamentis bene adici solet.

Ægin. Calidus pariter & siccus temperamento est, absque erosionē: qua de re vlcerebus quæ præ nimia humiditate ægrè coalescunt, cicatricem mirabiliter inducit.

Pellit menses. Gal. quia calfacit & siccatur sine mordacitate, & quiddam astringens habet.

Ægin. Inest præterea Cypero quædam secandi facultas, qua lapillos atterit, & lotia mensesque prolicit. Farinam dicit, quia Cyperus rotundus in farinaceum puluerem facile abit.

CYPERVS



*CYPERVS longus odoratior.*  
*Belgiæ & Angliæ Wilben Gategaen & Galinga.*  
*Hisp. Iuncia olorosa.*



*CYPERVS aquaticus septentrionalis.*

Scrobibus item & riulis ad Scaldæ amœnissimâ fluentia pone nouam Antuerpiam urbem, iisdem foliis & iubata pannicula prouenit. Radix nonnullas, sed paucas, teretes, oliuares, oblongiores, instar filipendulæ emitens glandulas, gustu astringentes, nulla odoris gratia.

*CYPERVS rotundus litoreus inodorus.*

In Angliæ borealis & Belgij fluminû litoreis, leuifluentorum quæ riulorum, & maris alluionibus, Cyperi genus non inelegans, radicum longè lateque sparsa sobole, multis & bicubitalibus implexatum filamentis, Cypero rotundo parium, oritur. Folia angulosa; caulis cubitalis, & sesquicubitalis, nitidus, triquetrus; in quo racemosa iuba, congesta. Gustu subastringit radix frigida & sicca; odoris & saporis experts.



TRASI



TRASI cum  
flore.SPARGA-  
NIUM al-  
terum.



TRASI Veronensium siue esculenti Cyperi. Aduersf. pag. 37.

Dulcibinum Guilandini.

Cyperus dulcis Theoph. Dod.

Ital. Trasi dulce, & dolzolini.

Humenti Belgico solo complures capillares radices edit.

Venerem stimulant, abstergunt moderatè humectando; eoque expectorationem iuuant.

PAPYRVS. Aduersf. pag. 38. 39. 40.

DIOSCOR. Papyrus qua charta sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vilitatis ad laxandas fistulas, madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatus, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes: & mansam expuunt. ipsis radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascencia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet. Verum melius id combusta charta præstat.

Eadem Gal. Macerata aut vsta vtilis efficitur: Igitur oxyerato, vinòque macerata, recentia vulnera glutinat, maximè in circulum circumposita. Verum hic quidem est, ceu materia quæ medicamina fanantia accipiat. At vbi vsta fuerit, medicamen est \*exiccatorium velut & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus inferior est quam papyri.

\*Aegineta  
eadem.

TYPHA, Tûen. Aduersf. pag. 40.

Bel. Lischboden & doufen, quia lanugo eius in aures incidens, surdos efficit. Ger. Marenholben, Molskolben. Hispan. Behordo, seu lunco Amacodrado.

IVNCVS odoratus. Σχῶν & ἀποιανθὸς.

Schoenanthum. Aduersf. pag. 42.

Ger. Camdicheheu. Officinæ, Belgii, & Itali Schoenanthum. Ang. Squinanthum. Gal. pasture de Chameau.



Lege pa. ar.  
H. 4. Genere. 15.  
L. Thoma p. 10.

DIOSC. Typha flos suis adipe eloto exceptus ambustis medetur.

Exsiccat moderatè & abstergit. Sanguinis fluores imposita sistit.



IVNCVS



## IUNCUS odoratus.

Diosc. Ignea mordacitate ad linguam. Floris, culmorum, radicibus est vsus. Vim urinæ ciundā habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vitilis sanguinem reuoluentibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris, & renum, miscetur antidotis. Radix astringentior est, ideo fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis, 3. vna, cum pari pondere pipetis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium foras, vtile est.

\* Quia modicè calfacit & adstringit Galeno, cum partium tenuitate. Flores hodie asportantur euanidi, idè calamulis vti præstat.

Marinus gramineus IUNCUS. Aduers. pag. 42.  
Pseudoschananthum.

IUNCUS leuis vulgaris, 2019 G. Aduers. pa. 43. & 44.  
Germ. Vinzen Schimelen. Belg. Biesen. Angli.  
Guisches. Gal. Ionc. Hsp. Iunco. Ital. Giunco.



Fluius Schœnanthi speciosus flores papposos Iunci odorati quadamtenus, dense congestos, in vulpinam caudam quincuncialē & sex uncias longam, sericeo argenteoq̃ nitore, alopecuri ritu fastigiatos collegit Franciscus Penninus, Sūrp̃tum & Pharmaceutices peritissimus, in lit ore mediterraneo MonsPELLensis agri pone Aquas-marianas siue Aquas-mortuas, vernaculè Aiguesmortes, via qua itur Pelscaire.

NARDUS, Nāp̃s G. & Nāp̃du rāyis. Aduers. pag. 43.

Gallus & officinis Spica-Nardi Germ. & Angli, Dyckenard. Hsp. Azumbar aut  
Espigehil. Ital. Spigo & Spigo Nardi. Nardus Gangitis Anguil.

Dioscor. Vim habent exca'factoriam, & excitantem: urinam mouent, alium potu sistunt, vuluæ profusiuā sanientq̃, apposta supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rosonibus, inflationi, iocinori, re-gio morbo, † renum vitio. \* Aqua autem incolla fori ad infessum, vuluæ inflammationibus medentur: ad glabras ocu-lorum genas valent, si qualem eas ad densiorem pilum reducant, perfusus humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fistulis nono non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastil-los coacta.



† \* GAL. Quia Nardi spica exaltat, facit excessu primo, desiccatur secundo iam completo. Composita est ex allringenti sufficienter substantia & acri, calida non multa, & quadam leuiter amara. In ventre ac intestinis consistentes defluxiones desiccatur ad hæc & eas quæ in capite & thorace.


IVNCVS levis vulgatus.

DIOSCOR. Vriusque Iunci semen tostum, ex diluto vino potum, sistit aluum † & rubra seminarum profusio. vrinam cit: capitiq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici Iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

† GAL. Quod composita sit earum temperies ex terrea videlicet essentia leuiter frigida & aquea, leuiter calida vt & inferna desiccare possint, & sensum frigidus ad caput vapores mittere, quibus somnolentos efficiant.

Leg. æthiopi.  
In Iuco ma-  
ritimo pag.  
44. leg. Perus  
paguloi li. 8. &  
li. 11. Neuro-  
plasterum quæ  
sociois.

IVNCVS aquaticus minor capitulis equiseti,  
Reddendus proximè Iuncum aquaticum maximum.



IVNCVS Cyperoides floridus paludosus. pag. 44.  
Gladulus palustris Cordi, & aquaticus Dod.



Huic alter congener, sed multò minor, lacustribus & lenè fluentibus aquis Austroyel paguli in agro Antuerpiano, inaximo prouentu oritur, radice innumeris implexa fibris & culmis nudis, leui vulgato iunco paribus, sed racemosis capitulis Hippuridis aut Asparagi ritu fastigiatis, & ad imum singulis geniculis donatis.

IVNCVS bombycinus. Advers. pag. 44.  
Tomentum & linum prænse Cordi. Germ. Witten Wollen.

Confectum ex vino coctum torminibus ventris Cordo.



SPARTVM alterum C. Clusij. Hisp. Albardin.

SPARTVM Plin. Claf. Prouincialibus Elpho  
Hispanica. Hisp. Sparto.

Posteritati exactissimè Spartum patefecit C. Clusius, cuiusmodi Bruxellis me vidisse memini in horto Stirpium amicissimo & ditissimo egregij & doctissimi viri D. Ioannis Boissot, cubitalibus compressis, iunceis, atrourentibus foliis, quæ successu temporis contrahuntur, rotundumq; iuncum texturæ aptum referunt. Stipulæ sesquicubitales, & lanosi comosique flores arundinis ritu. Semen scabrum & acerosum. Pluribus Valentini agri & Bæticæ locis oritur prope Carthaginem nouam.

SPARTVM alterum Plin. C. Clusio.  
Hisp. Albardin.

Est & aliud quoddam Sparti genus non admodum dispar, quod etiam debetur C. Clusio exoticarum Stirpium peritissimo, qui scriptis hæc exactissimè significauit. Molliore, tenuioreq; est iunco quàm primum; panniculam fert breuem Martio, & pericarpio quodam siue membraneo folliculo, vti Narcissi, cepæ & similium ferè flores, inclusam. Nascitur Muricano regno humidioribus locis. Sportularum texturæ minus aptum, sed ad lineos saccos, quos lectis substernant, implendos accommodum.

SPARTVM nostras, Spartum 3<sup>m</sup>. Clusij.  
Maris occidui Angliæ, Hiberniæ versus, sabuletis



letis semimerfa hæc tanta feracitate luxuriat, vt rigidis mucronatis foliis, iter illac facientiū cruribus spissimè cruenta vulnera inferat. Radice iunceæ arenæ cumulis depacta. folia rigida, sesquipedalia & duorum pedum, in mucronem durum fastigiata, Schœnanthi siue iunci marini. In caule bicubitali flos lanosus & acerosum semen arundinis vallatoriæ, cui parcit omne pecus, & veterina.

ASPHODE-  
LVM minorē  
album, vide  
sup. inter  
Phalangij  
differentias.

ASPHODELVS maior albus. Aduers. pag. 45.  
ασφodelος. Hipp. Gamones & Gamonites.

ASPHODELVS luteus minor. Aduers. pag. 45.  
Iphyon Theoph. Anguil. & Erizambas  
Arabum quorundam.

In caule de-  
siderantur  
folia.



Teadem Ac-  
tius ex vino  
pota.

#### ASPHODELVS maior.

**Dioscor.** Radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres: quæ ex asfalcium. Urinas & menses epotâ ciunt, lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachma pondere potâ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones astringunt, laticri tali magnitudine commanducata. a serpente demorsis datur aptissime, verum trium drachmarum pondere: foliis, floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. item vlcera sordida depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculofq; decoctis in facie vini bulbis. recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, siq; perquam vtile oculis medicamentum. ad purulentas aureas per se cum thure, melle, vino & myrrha trius, prodest. in contrariam autem infusus, dentium dolore mitigat. Cinis \* è radice illius, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excoriatas radicebus igni decoctum, illitum exulceratis perionibus & ambustis igni, conducit. surditatis, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam ritiliginem, linteis ante a perficetam in sole, illita radix emendat. Semen florefq; in vino potâ, scolopendræ & scorpiionis venenis mirum in modum resistunt: alium purgant.

\* GAL. Quia calidior & exsiccantior subtiliorq; æ, ac digerere potentior efficitur.

GAL. Radix utilis est sicut Ari & Dracontij, nempe extergentis & discutientis facultatis.

APVL. Ad dolorem tibiurum vel pedum. radicum succo & oleo amygdalino vnges quod dolet, mirificè sanabitur: etiam si tumores fuerint, ipsam tufam & subactam impones.

Herbæ asphodeli radicem decoque, & ex aqua mulsa porui dato, hepatis dolorem mirificè tollit.

ASPHODELI



LIRIOSPH  
DELVS luteo-  
us Liliflorus.  
Aduerf. pag.  
45.  
Lilium non,  
bulbosum  
Ded.



ORNITHO-  
GALVM spi-  
catu Monf-  
pellienfium  
flore lacteo.



LIRIO.



## LIRIOSPHODELVs phœniceus.

Varietas.

Huic ex miniato flauente flores rutilant, foliis porri, asphodelo albo vel LIRIOSPHODELVo vegetioribus, latioribusque, sed reaulis supernè. Caulis item rotundus, durior; binos ternosque cubitos interdum superans, cuius summo liliacei itidem flores strinti, liliū puniceum minus, æquantur. Radix tuberosa, teres, Asphodeli lutei minoris.

Ephemerū  
& Hemero-  
calis.

Sunt qui Ephemerum & Hemerocalidem dixerunt à conditione fugacis floris, quem parum diu & aliquot horas duntaxat seruat.

ASPHODELI Galeni crediti & ORNITHOGALII maioris Monspeli. discrimen.

Galeni Asphodelo flos intus forisque ex albo flauescit, neque candore lacteo, ut Ornithogali flos renidet; neque auersa parte herbidus. Radix verò minor, oblongior Ornithogali spicati.

## ORNITHOGALVM spicatum minus.

Huius alteram speciem omni sur parte longè minorem Belgica vireta cultiora alunt, cuiusmodi Licet D. Joannis Dilij, & D. Mariae de Brimeu vxoris D. Conradi Schetz.

Theocriti & Poetarum HYACINTHVs Anglicus flore Iridis, cuius eadem effigies Aduers. pag. 47. quam pictor non bene exurexit.

IRIS bulbosa Dod.

Ang. Fleur de luce & Gladiolus maior.

Hispanicus poetarum HYACINTHVs.

IRIS bulbosa angustifolia flore vario Clusij.

Hisp. Lirio Illyrico.



Hispanicus poetarum HYACINTHVs.

Nec ita diffidet ab Anglico quem natura dardala ex Hispaniæ Castuliæ collibus, vulgo Valle-Dofyl, nobis



bis largitur, foliis rigidis Asphodeli & Potri mediis, canulatis & aërfa parte striatis: In caule singulari, sesquicubitali flos suavis odoris vt plurimum vnicus, plerumque geminus, & interdum ternus, alternatim fugax, Xyridis latior, tribus foliis repandis, albicantibus, medio luteis; supernis totidem cæruleis intercurrentibus lineis albis: semine Gladioli paulò maiore, & siliqua Poetarum Hyacinthi Anglici nostri exiliore. Hunc vnâ cum plurimis rarioribus plantis non modò alit in horto Guilielmus Driefsch, perindustrius & peritissimus pharmacopœus Antuerpianus, munere Raphaëlis de Coxia Flandri apud Machlinienses eximij pictoris, sed etiam plerique elegantiae studiosi suos cultissimos hortos hoc ornant.

Variat hæc aut flore breuiore, aut saturiore aut dilutiore colore, breui item longioreq; radice.

**HYACINTHVS Poetarum luteus.**

*Iris bulbosa luteo flore Clusij angustifolia.*

*Hisp. Reilla Buey.*

**HYACINTHVS Poetarum luteus semine in**

*siliquis pregnans.*



**HYACINTHVS Poeticus luteus Lusitanicus.**

Alium Belgio nostro inquilinū factū videas, à superiore duntaxat luteis floribus dilutis, nonnunquā saturatis, diuersum, & foliis exilioribus & pallidioribus; floribus latioribus, inodoris, & contractis Anglici Poetarum Hyacinthi modo. Collibus petrosis ad Tagum supra Olyssiponem pingui solo sponte Varietas. oriri auctor est Clusius, qui eius bulbos inde ad amicos in Belgium misit.

**Poetarum HYACINTHVS latifolius. Iris bulbosa latifolia Hispanica Clusij.**

*Lusitanis & Hisp. Lirio espadanal. i. ensiformis. videtur congener cum Hermodactylo non venenato.*

Multo minus frequens hic Septentrionalibus: maioribus & latioribus Pancratij foliis alternatim & imbricatim implexis, in angustum desinentibus: flos summo coliculo cæruleus, nonnunquam can-



didus, nouem constans foliis. Radix bulbosa, gustanti dulcis, Hyacinthi Poetici Anglici ferè. In Belgio ab elegantiorum amatoribus studiosè alitur, tamen nec florem nec caulem ibidem loci edit, quàmuis fignoris iniuriam ferre potis sit. Sponte oritur in Lusitaniæ Bæticæque collibus non procul ab Ana flumine, & copiosè circa Antequeram & Cordubam; floret istic Ianuario & Februario mensibus, Clusio auctore.

HYACINTHVS Poetarum latifolius.

HYACINTHVS Poeticus Hisp. gemino Gladioli  
reticulato bulbo.

Sisynrichium Cordi, Dod. & Clusij. Hisp. Nofelha.



Hyacinthi poetici 5<sup>a</sup>. conspicua varietas, quem perbellè Sisynrichium Dödonæus hariolatur. Flores Iridis, vnius vel alterius horæ, citissimè euanescentes, & marcescentes, quatuor aut quinque alternatim fugaces, imis tribus repandis foliis Iridis cæruleis; tribus medio & ad basim luteis; elatioribus item ternis hirsutis, bipartitisque. In caule dodrantali folia bina in terram reflexa. Radici gemini bulbi, Gladioli modo. Semen item rubrum in folliculo oblongiore Gladioli, sed minus. Opiliones Hispani radicem lubens esitant, & Nofelha vocitant, quasi nuculam auellanam. vnde non immeritò esculentis bulbis Bulbi esculenti quis eam annumerarit. Pensilibus hortis Belgij in delitiis est, beneuolentia Clusij qui bulbos misit ad lentius amicos è vicinis collibus Olyssiponis.

NOSELHA



*Ornithogalum* Theoph. Clusio.  
*Noselhammior*: *Lirio* & *Macneae* Hist.

*Iris tuberosa* Dod. & Belgarum.  
*Lonchitidis* prior Diosc. Vlyss Aldroando.  
*Aduersi* pag. 363.  
*Perperam* *Hermodactylus* verus Math.



Nulla sui parte dissimilem; sed tantum exiliorem; minorem fecerunt. perperam aut nihil discrimi-  
 nis animaduertit clarissimus vir D. Ioannes de Brancion, in cuius horto raris stirpibus ditissimo vi-  
 dimus.

Inuenitur hoc Valentino regno & Murciano, Clusio asserente.

Ad ventris tormina vtile incolarum auditione refert Clusius, sed illico saltandum & corpus exer-  
 cendum ei qui eius radicem deuorauerit.

*Iris tuberosa* Belgarum.

Eandem, quam nostri hodie Iridem tuberosam nuncupant, cum doctissimo Aldroando peritiores  
 Itali plerique Dioscoridis priorem Lonchitidem sanxerunt, quod nulla extaret planta propius Lonchi-  
 tidem adumbrans. Folia illi Hyacinthi poetici, porracea, striata, rigida, quadrangula, in mucronem  
 cuspidatim fastigiata. Flos quadamtenus Iridis; cuius foliola repanda, seu galericuli h'antibus comicis  
 personis similes, obscurè virentes, fimbriis nigricantes. Semen inuolucris clausum, (*Lancea simile, trian-*  
*gulum, Diosc.*) angulosum. Radix tuberosa varè depacta; quæ in plures digitatim, flore marcido, propa-  
 gatur: vnde Hermodactyli nominis occasio. Quem ad viuum depingi Bononiæ curauit beneuolen-  
 tia clarissimi præceptoris Vlyssis Aldroandi, eruditissimus D. Nicolaus Espillerus Insulanus medicus.

ab hac nostrate tantillum variare videtur.

*Dioscor.* Radix in vino pota\* vrinam citet.

*Hermoda-*  
*ctylus.*

Gal. eadem.



GLADIOLVS *Indostensis*.  
Aduers. pag. 47.

GLADIOLVS *Italicus* binis florum ordinibus  
cinctus. Aduers. pag. 48.



**DIOSCOR.** Superior radix cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeosæ corpore extrahit: panos cum lo-  
bæ farina & hydromelite discutit. quæ de re huiusmodi emplastris inferi solet. menses imposita trahit. superiori radice  
ex vino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta, st. riles cere tradunt. Superiorem quoque vtiliter infantium entero-  
cælis cum aqua potui duri præcipiunt.

**GAL.** Xiphij radix, & maximè altera quæ superior est, attrahentem, digerentem & exsiccantem  
facultatem etiam possidet.

*Varietas.* Nonnunquam multis adnatis bulbulis & folio angustiore cernitur. Albo item flore repe-  
ritur in Hispania, sed rarius.

*aliàs amoni.*

**APVL.** Ad fistulas quæ in corpore nascuntur. Herba xiphij radice vncias sex, amyli vncias sex,  
aceti cyathos duos, adipis vulpini vncias tres ex vino pisabis, in panno lines & impones, miraberis  
effectum.

Herba Xiphij radice superior pars sicca trita & æquis ponderibus mixto vino, capitis ossa fracta ex-  
trahit: aut si quid in corpore suppuratum fuerit, vel si pedibus calcata sint ossa serpentis, contra ea ve-  
nena efficax est.

Ad vesicæ dolorem, & ad eos qui vinam non faciunt. Herbam gladiolum effodias, siccatum cor-  
ticem radice eius conterito, & cum vini cyathis duobus & aquæ calidæ cyathis quatuor immiscas, &  
sic potui dabis, miram rem experieris.


Ad splenis dolorem. Herbam gladiolum maturissimam lectam & siccata & in puluerem molli-  
ssimum redactam, & in vino leuissimo mixtam potui datam, mirificè dicimus splenem desiccare.

Ad colici vel præcordiorum dolorem. Herba gladioli bacca trita ex caprino lacte, melius si asini-  
rino, reperfacta dato bibere, desinet dolor.

HYACINTHVS



*HYACINTHVS Germanicus liliflorus, stellatus.*  
Aduers. pag. 48.



*HYACINTHVS autumnalis.*  
Aduers. pag. 48.



*HYACINTHVS Angli-  
cus & Belgi-  
cus.* Aduers.  
pag. 48.

*Hyacinthus*  
non scriptus  
Dod.



*HYACINTHVS autu-  
nalis maior.*



HYACINTHVS Germanicus liliflorus, stellaris. Flos martius stellatus Germ. Aduers. pag. 48.  
Narcissus caeruleus Tragi. Satyrium Erythronium Dod.

HYACINTHVS bifolius Theoph. Satyrium trifolium Dod. Belg. Dierckhens, diminutivè.

Varietas.

Huius minor species folio ut plurimum gemino, & flosculis stellatis cœruleis non absimilibus. sed omniam nora.

HYACINTHVS autumnalis maior.

Pensilibus etiam Belgij hortis alitur hic Hyacinthus superiori similis, sed radice, foliis latioribus, floribus, item & caule procerioribus & habitioribus.

HYACINTHVS Orientalis Græcus. Aduers. pag. 48. HYACINTHVS orientalis maior polyanthos.

Expunge  
Hyacinthum al-  
terum Orien-  
talibus.



Varietates. { Quem Zumbel Indi vocant caulē habet Serpentariæ modò maculosum, & tortilia folia.  
Constatinopolitani Hyacinthi, ubi defloruerit dūtaxat maculis viperis caulis variat, cuius  
triplex differentia folio & flore: Angustifolius, latifolius, & polyanthos alter, siue minor.  
Præcox dilutiore est flore. Serotinus autem saturiore, hilari, cœruleo, amæno.

HYACINTHVS Orientalis maior polyanthos.

Orientalis  
alter mutilus  
& deprava-  
tus Mart.

A medio cubitali caule ad summum usque, in unam partem vergente florum peramænorū cœruleo-  
rum ordine, luculente magnitudinis, calathi aut alabasticuli similium, spectatur. Folia latiora. Bulbus  
Narcissi par. Horto generosi viri D. Ioannis Brancionis inquilinus.



HYACIN-  
THVS como-  
fus minor.



DIFCABI  
candidis flo-  
ribus.



HYACINTHVS *Dioscor. comosus maior. Aduers. pag. 49.*  
*Germ. Bynling/ blauto meertzenblum. Hisp. maios flores. Gal. vaccet.*  
*Hyacinthus neotericorum Dod. Hyacinthus maior Tragi. Syluest. Hyacinthus Cordi.*

\* alij legunt  
*calicis.*

**Dioscor.** *Hyacinthi radix pueris cum vino albo illita, impuberes seruare creditur. Siftit alium: pota vrinans impellit, phalangiorum moribus auxiliatur. Semen astringentius est theriacis expetuum: regum morbu emendat cum vino potum.*

HYACINTHVS *comosus minor. Aduers. pag. 49.*

*Hyacinthus neotericorum primus Dod. & Bulbus esculentus. Hyacinthus syluest. Cordi.*

*Hyacinthus exiguus Tragi. Hyacinthus Botryoides Herbariorum.*

**DIPCAD** *Chalcedonicum, & Italarum. Bulbus vomitorius Martb.*

Hyacinthi  
 comosi va-  
 rietas.

*Radix cum maxima, adulti Narcissi bulbum magnitudine superat; cui pro gracilibus & tortilibus fibris, duriuscula lignosa, crassiores, sceniculi æmulæ, subsunt viaces & contumaces radices, porrectæ humiq; insertæ; quæ etiam biennium & triennium bulbo effracto D. Bracionis horto virentes perstiterunt. Foliis est procumbentibus, ima basi latoribus in acutum fastigiatis: Flos pallidus ex luteo herbaceo & cinereo purpurascit, qui expansus & apertus duntaxat suauissimum spirat odorem.*

**DIPCAD** *candidis floribus varietas gemina.*

Varietates { *Quæ niueo candore, nonnusquam & purpura diluta conspiciuntur, folia supernè latiora ferunt.*  
*Floribus cerulouirentibus alioqui superioribus similis in hortis nostris visitur.*

**ERIOPHORVS** *sive BVLBVS Bombycinus*  
*commentitius.*

*Bulbi ERIOPHORI genuina effigies.*



*Posteritatis memoriæ triū peregrinorū bulborum icones portentosas hic inserere consiliū fuit: d D. candi-*



candidiff. Do donzo literis proditas; Antonij Cortusi, exoticarū stirpiū indefeffi vestigatoris, munera; quæ bene uolentia & solito candore generoli viri D. Brancionis patefactæ, rarū sui mihi præbuerunt spectaculum. Is tamen nō solum elapsis annis effigies coloribus suis penicillo expressas; verum etiam bulbos Eriophoride præclaro D. Brancioni miserat; penes quæ egregiè creuit & propagatur Cephæ aut Scillæ squammosis tunicis quadam lanugine intertextis compactil radice; è cuius vimbone crassior fibratum coma porrigitur: minimè dehiscenribus squammosis cuticulis, aut veluti nucleis, stipata, vt pictura adumbrat; sed multis teretibus adnatis bulbis: Folijs verò oblongis Pancratij marini Monspelliensium, quæ in villos discerpuntur. De bombycino flore diu ambegimus, fictiūque suspicati fumus, aut alterius exoticæ plantæ florem rebamur, quemque frustra multis artibus & lenocinijs elicere studuimus cum in Italia, tum in Belgio. Verū cū anxij animi quid de eo statuendum foret, essemus; tandē paucis elapsis diebus nobis dubiū exemit Carolus Clusius noster, vt mox dicitur.

*Bulbi ERIOPHORI genuina descriptio.*

Cum plurimum differat ab illo exotico bulbo Eriophoro effigies illa tomentosa vnā cum suis bulbis Cortuso missa, florem perspectum non habuisse liquidò constat: hincq; licet documentum videre imbecillæ humanæ sedulitatis. Sed ne deinceps temere inductionibus argutisue picturis credamus, & fallamur à quibusdam, qui audacter, nec res visas, nec auditione cognitās peruertunt potius quàm produnt, bulbi Eriophori flores genuinos omnibus rei herbariæ studiosis palam fecit clarus, fidus, & exactus herbariæ scriptor Clusius noster, vt qui res ipsas inspectione notas habuerit. eius verba paucis & perspicuis huc adducere memoriæ nostræ subsidio, instituti consequutione & serie, opere precium duximus. Ex foliorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rectus, Scillini caulis æmulus, læuis, nudus, virefcens, superiore verò parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam in denos vel plures versus distinctam viridem primum, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: constant flores senis foliolis stellatim expansis, triangulo vimbone in medio protuberante, Hyacinthi Autumnalis floribus propemodum similes, inodori, colore cum suis pediculis cæruleo, & internis staminibus, quorum apices initio purpurei sunt, & vbi se explicarunt, veluti pallefcenēte quadam farina aspersi. Incipit florere ab imo, vti Scilla solet.

Eriophori meminit Theoph. lib. 7. histor. cap. 13. eum in litoribus nasci, lanamque sub primis tunicis habere, ex qua togæ & aliæ vestes conficiuntur.

*TIGRIDIS flos, an Dracunculi species?*



Rarior multo exoticus flos Tigridis vocatus, quem nunquam nobis visum fatemur. Illius iconem coloribus affabrè expressam piæ memoriæ clariss. D. Ioannes de Brancion pro nostra amicitia communicauit: virentibus oblongis angustis & acuminatis folijs è pullo radice bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis fortuitis punctibus variato; è cuius medio suauè rubens stilus exeritur. Omnibus herbariæ studiosis ipsa planta hætenus incognita. Eius bulbus edulis fertur.

*NARCISSI Aduers. pag. 50. 51. 52.*

Gall. Narcisses & Iannettes: Ital. & Hisp. Narcisso.

DIOSCOR. Radix cocta, siue estur siue bibitur, vomitoria est. ambustus igni prodest, cum exiguo melle trita. precisos nervos illitu glutinat. luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit. vitia cutis in facie, vitiliginisque cum semine vrtica, & aceto emaculat. cum eruo & melle, vlcera mordaces expurgat. abscessus rumpit concoctione repugnantes. infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

Gal. Radix vsque adeo exiccandi facultate pollet, vt & maxima vulnera glutinet vel ad incisiones

H

vsque

**Narcis-**  
**svs** poeticus  
 megiocro-  
 ceus & me-  
 dio purpu-  
 reus. Dod.  
 Hisp. Lino  
 blanco & Ce-  
 bolina. Ad-  
 uerf. pag 50.



**NARCIS-**  
**svs** totus  
 albus.



N  
 sv  
 lute

NA  
 sv  
 polya



usque quæ citra tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attractorium.

Facultates Hyacinthi & croci habere videntur, digerendo, constringendo, glutinando & sopiendo. Ad præscissos nervos, hernias & morbos vterinos utebatur Rondelletius. Radix quia viscida, nervos glutinat cum equifero, centinodio & confimilibus siccioribus medicamentis. eoque non secus ac Symphytum ad hernias, vesicæ & renum vlcerata, commendatur.

APVL. Ad vulnera quæ ex se nascuntur. Herbe narcissi radix cōtusa cū oleo & farina vice cataplasmatibus imponitur vulnere, & sanat mirificè. Ad phthisicos vel colicos. Herbam narcissum tusam & potui datam, colicis vel tussientibus prodesse dicimus. Si autem volueris oleum facere, herbe narcissi florem in oleum mittes, & perunges infirmum, miraberis rem certam.

NARCISSVS medioluteus. pag. 51. Hisp. Lirio.

Varietas { Huius speciei Narcissum præcoccem faciunt herbarum peritiores, Belgæ cum Clusio nostro, laioribus floribus & folijs.

NARCISSVS totus albus. Hisp. Iunquillos blancos.

Narcif. me- { Nonnunquam omnino candidis floribus visitur, cæteroquin cum superiore haud absimilis.

diolutei va- { Hic paucioribus floribus & folio albido, rigidoque variat. Belgicis hortis vterque etiam rietates. { inquilinus factus opera C. Clusij qui bulbos euulsos ex Lusitanie & Baticæ vdis locis & maritimis ad amicos misit.

NARCISSVS albus polyanthos. Chalcedonicus elegantior, hilarior & rarior.

an Narcissus octauus Matth. non descriptus?

Posteritatis sedulitate antiquis & Dioscoridi indictus nobis innotuit, qui Constantinopoli missus à Carolo Rym, equite Flådro D. van Eekenbecken, viro familia & literis clarissimo, & apud Solimanū oratore Maximiliani Cæsareæ maiestatis, exoticarum stirpium parentis benemeriti Ioannis Brancionis orto in delitijs habetur, floribus multiplicibus & foliolis aspectu iucundis, niueis, peramænis; corona media lutea orbatis; cuius vicem multiplex florum fætura supplet: quodam tamen lutei specimine permisto inter foliola dispersè adseruato.

Varietates. { Ibidem loci tortilibus, reflexis folijs, prolixioribus & laioribus variat. Visitur etiam angustioribus folijs, flore ex luteo pallente.

NARCISSVS totus luteus montanus Theoph.

Pseudo Narcissus Clus. & Dod. luteus syl.

Aduers. pag. 51.

Bulbus Codion Theoph. non Cordianinum, ut vertit

GAZA.

Hisp. Campanilla.

NARCISSVS luteus multiplici flore.



NARCISSI  
Montani Theoph.  
Varietates

Facie nō dissimili, sed latioribus folijs, maioribusque floribus omnino luteis croceisue. cætera eadem planè. Hæc alit̃ cum mox subdendo Narcisso Ioannes Baillet Insulanus & Mutenus harum peritissimi & seduli investigatores. Interdum & multò minor spithameo vel semipedali cauliculo: flos item nostratis Narcissi, sed minor, & oblongior magisque luteus.

Xyridis modò purgate asserunt radicis decoctum rustica plebs & opiliones, vomitiones moliri certum.

NARCISSVS Luteus multiplici flore.

Huius lutei Narcissi è multiplici floris fertura varietas Belgicis amicorum hortis visu digna: cætero quin. omnia prorsus eadem. Tornaci primùm repertus in horto cuiusdam pauperis.

NARCISSVS luteus iuncifolius præcox. an Bulbus vomitorius? Aduers. pag. 51.

Hisp. longuillos.

Non procul à Toletò sponte oritur in pratis montanis, Clusio auctore.

DIOSCOR. Bulbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus, radicem similem, corice nigro. Ea radix mansa aut decoctum eius potum vesica malis medetur, vomitiones mouet.

Gal. multo est calidioris temperaturæ quàm esculentus bulbus.

NARCISSVS Iuncifolius serotinus paucioribus folijs & floribus dumtaxat diversus.

NARCISSVS luteus  
iuncifolius  
præcox.





NARCISSVS *Autumnalis parvus Clusij, Batavis Tonnada.*

Vncialis plantula est: Octobri mense flos albus, medio luteus, odoratus, Narcissi: è gracili cauliculo exit. Radix item Narcissi luncifolij minor, mucro pragnans. floret sine folijs ad Anam flumen in Turdulis, Clusio afferente: Belgis hætenus incognita.

NARCISSVS *omnium minimus Hispanicus.*

Huic omnium minimo foliola exiliora & rotundiora quàm autumnalis Hyacinthi ad terram reflexa: flosculus albus, lutei montani Narcissi æmulus, sed longè minor in cauliculo palmari. E radicibus montium Pyrenæorum versùs Oceanum occidentum in horto studiose alit Ioannes Muttonus pharmacopœus Neruiensis peritissimus.

NARBONENSIS *Lilionarcissus luteus montanus,*  
*Tulipe species minor Monspellensis herbariorum.*  
*Aduers. pag. 51.*

BONONIENSIS *LILIONARCISSVS luteus,*  
*sive Tulipa.*



Bononiensis Narbonensis, folio, caule & flore proximus; omnia tamen vegetiora & grandiora: quandoque flores in caule bipartito geminos stellatos & nonnunquam ternos videas, iucundo leucioj lutei odore.

LEUCO-  
NARCIS-  
SOLIRION  
pratensis.



## STIRPIUM

LEVCONARCISSOLIRION paucioribus  
florib. Aduers. pag. 52.  
Leucoium bulbosum hexaphyllum Dod. Narcif. septimus  
Matth. non descriptus.



LEUCO-  
NARCIS-  
SOLIRION  
minimum.



LEVCONAR-  
CISSOLIRION mi-  
nimum autumnale.

Leucoium bulbosum mi-  
nimum autumnale  
Clusij.



Similis verno mi-  
nimo. sed florem  
sex foliolis Leucoij  
bulbosi hexaphylli  
mutantem, vel orni-  
thogali, autūno edit.  
folia exiliora viri-  
dantia autumnalis  
Hyacinthi. Radix  
aliorum more cepa-  
cea concretionem.  
Nascitur non procul  
à Badajos, floretque  
Nouembri & Octo-  
bri Clusio auctore.  
In Belgio depacti  
bulbi perierunt.



*LEVCONARCISSOLIRION pratense vernum. num VIOLA alba Thesph.*  
*vel Moly? Rondellio Multiflorum. Aduers. pag. 52.*  
*Leucoium bulbosum polyanthon Dod.*

*LEVCONARCISSOLIRION minimum. Aduers. pag. 52.*  
*Leucoium bulbosum triphyllum Dod. Narciss. 6. Math.*  
*an Herbaceus Plin.?*

*LILIONARCISSI varietates quamplurima: an Purpureo-Narcissi Plin. Aduers. pag. 52.*  
*reddenda. Turcarum Cafe Lale, Zampul & SATYRION quorundam.*

Naturæ luxu & lusu huius quàm multas venustissimas florum varietates in delitiis habent D. Carolus de Croy serenissimus Princeps de Chymay, magnæ spei adolescens; præclari & generosi viri D. Ioannes de Brancion, D. Ioannes vander Dilt, Domina Maria de Brimeu vxor Contrardi Scetz, Georgius Rye & Ioannes Muttonus. Eas igitur quia me vidisse memini elapso anno benevolentia D. Brancionis magnæ in hac parte peritiæ, & parentis benemeriti, ob florum peramœnam venustatem, concisè perstringere visum fuit.

Omnibus Tulipæ, siue Lilionarcissi speciebus foliorum numerus in caule pedali & sesquipedali ternus, quaternus; quandoque quinarius, septenus & octonarius: flores senis foliolis, interdum pluribus, quorum vngues flauent, calathum effigiantes, constant: quorum alij præcoces, alij autem serotini.

*LILIONARCISSVS purpureus.*

*LILIONARCISSVS Chalcedonicus rotus*  
*lurem, sanguineo puniceo par*  
*& similis.*



TULIPAN sine *Lilionarcissus luteus latifolius, obtusus,*  
*phoeniceis rubentibus oris.*

LILIONARCISSVS luteis oris, flore parulo.

LILIO-  
 NARCIS-  
 SI Adverf.  
 pag 52.  
 lege /em folio-  
 lis lin. 33.



1 Flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat. Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor, & nonnunquam plurafolia, liliaceis & porrinis media: interdum innatum bulbum in folio notauimus apud D. Ioannem vander Dils; cuiusmodi in Moly Homérico.

2 Luculento pendente flore, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium cingente sanguineo subfusco: calyculorum oris & media carina foris luteis: cætera cuncta sanguineo fusco exoletis similia: medio intus stamine nigro, staminibus croceis obducto. Semina, vti reliquorum, compressa in oblongo tripartito membraneo anguloso folliculo; quæ itidem sata colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant, vt longo vsu diligentissimè animaduertit clariss. vir D. Ioannes Boissot.

LILIONARCISSI  
 præcocius aut serotini san-  
 guinei puniceus è flore  
 varietates septem.

1. Eriophori vocati radix cepaceo inuolucro obducitur, molli sericeo tomēto facta, castaneorum ritu: flos vt reliquorum; sed calathi fundus siue foliorum vngues atrii & medio lutei conspiciuntur.
2. Luteo, & medio pullo, fundo.
3. Maculoso, medio fusco, folio.
4. Sanguineus toto calathi fundo pullo.
5. Vngue toto luteo.
6. 7. Vngue pullo, triangulis luteis: flore odorato, aut inodoro.



Totus luteus maior Chalcedonicus, sanguineo puniceo par, & similis: odoratus Croci æmulatione & inodorus: præcox & ferotinus aut pallidus.

Niveo candore & rubore confusus coccineus.

Purpureus sanguineus, puniceusque obsoletus, candidioribus oris, carinam intercurrente albo rubore mixta & diluta linea, imo ad basim croceo vngue.

Purpureus coccineus, rubentibus oris, medio folio exteriori candicat; vnguis luteolus; summo medio tenus coccineo luculento cruore.

Coccineus purpureus punicans, tribus exterioribus mucronatis foliis; internis verò retusis.

Rubellus pendente flore in acutum modicè fastigiato.

Rubidus candore mixtus, nitidus, niueis oris.

Niveus, extremis & summis rubidus oris, vndantibus in caule foliis.

Candidus, striatis suavè rubentibus oris.

Patulus, rubidus, candicans.

Rubicundus, rutilans, luteola carina.

Sanguineo, puniceusque saturo liuescens, summis candicantibus oris, expansus, folio latiore, mucronato.

Obsoleta purpura, summo albicans, purpurante medio.

Imo & summo luteus amœnus, medio coccineo, sanguineo.

Luteus striatis rubentibus oris.

Rubellus niueis oris striatis.

Luteus hilaris oris phœniceis.

Niveus totus, fundo tantillum luteo.

Luteus, phœniceo confusus mixtus.

Luteolus phœniceus, dilutus.

Luteus coccineis rubentibus oris.

Candore & rubore confusus, Rosæ dehiscentis pallidæ colore.

Luteophœniceus luteouirentibus oris; septenis peramplis foliis.

Purpureoiliaceus.

## FRITILLARIA.

FRITILLARIA sive *Lilionarcissus purpureus variegatus*.  
*Meleagrus flos Dod.*

E *Lilionarcissis* *Fritillaria* est; agro Aureliano oriunda; è quo delata studiosè à Ioanne Mutono perbono & perito apud Nervios myropola, alibi que passim Belgicis cultioribus stirpiumque ditioribus hortis alitur. E bulbo *Narcissi* veluti bipartito & tenui pedali & sesquipedali caule folia prodeunt oblonga angusta *Croci* vel *Ornithogali*: flore unico aut duobus luculento, nutante, deorsum vergente, *Tulipæ*, senis villis staminibusque luteis pallentibus, totidemque foliolis, labeculis & notulis pullis & dilutè purpurantibus, variato. Facultates hactenus inexploratæ. Semen albidum, compressum siliquis *Hemerocalidis* minoribus, *Tulipæ Bononiensis* paribus, clauditur.

*CROCUS* sine flore. *Aduers. pag. 53.*  
*Hist. Açasian.*

**DIOSCOR.** *Theſſalus* ipsum tantum odoratum esse voluit. alijs exitiosum, tribus drachmis, ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet. urinam cit. Eleganter colorem præstat. qui ex passo biberint, crapulam non sentient. oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet. additur in potiones, qua interaneorum causa temperantur. ad vulus etiam sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur. venerem stimulat. vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet. auricularis collectionis

*Lilionarcissi præcox  
multiplex è colore &  
figura differentia.*



lectissimis vtilis. Quo facilius conteratur, in calido fœtilli oleo succari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix expressa pota.

## CROCOMAGMA.

DIOSEOR. Fit etiam expressu vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma vocant. Optimum est odoratum, modice myrrham oleus, graue, nigrum, ligni expers, laue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis, quale est quod à Syria deferitur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersione. Vrinam cit. calfacit, concoquit, & emollit. Vires croci proportionem quadamteuus representat: quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

CROCVS sine flore.

CROCI flores.



\* AEGIN. &  
Gal.  
Paululum  
quid est in  
genis obtinet  
Gal. quod  
frigida, ex-  
reumque.

Crocus in calfaciendo secundum, in exiccando primum sortitus ordinem, \* astringendi & concoquendi virtute pollet. Proinde concoquendi vim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca astringitione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum calfaciant, paucula adest astringitio, ea parem habent facultatem essentis emplasticis nominatis, quas cum iunctas caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse constant.

Exusu sum, tribus 3. ex aqua potis. ] Calore aut frigore, vt Euphorbium, Cicutæ, Hyoscyamus, minimè exitiosum. Serapioni magna quantitate assumptus, ad tertium ordinem calfacit, & desiccatur ad 2<sup>m</sup>. Tres drachmæ potæ tanta hilaritate homines conspergunt, vt nimio risu exoluantur. Inebriat potentissimè ex vino potus, & hominem adeo latum reddit, vt insanum efficiat. Tussientibus & pleureticis vtilis, obstructions reseruat.

Caput petere & ferire testis est Gal. lib. κατὰ τόπον. 3. v. croci in Hierapicra satis esse asserens.

Quæ adeo exhilarant, sanguinem spiritalem cordis in extremas partes diffundunt, itaque auocatis spiritibus, lipotimia & mors sequuntur.

Plurimam Croco syluest. Aduers. pag. 53.

CROCVS





*CROCUS Montanus autumnalis. Lusit. & Hispan.*  
etiamq; nostris vulgo, Pic de Borro,  
id est, *Pes asininus*.

A domestico croco distare fulcatis foliorum lineis vtrinq; albis, notum est: alioqui radice & floribus non vlla sui parte dissimilibus, sed dilutè purpurantibus, è quorum medio luteus stylus, tribus flammeis phœniceisue staminibus cinctus, exeritur: Belgis hortensis & inquilinus factus, è maritimis Lusitaniæ collibus delatus.

*CROCI syl. montani varietates. Aduers. pag. 53.*  
*Hisp. & Lusit. Arçastan saluage.*

In Calcaris, vulgo *L'esperon*, algido Norbonensis Galliæ præcelso monte, Septembri mense, pascuis pone tuguriola & lares rusticas, inter Meum, Gentianas, & Helleboros florentem album vnâ cum purpureo syl. Croco me vidisse memini.

*CROCI syl. verni & autumnalis è colore & flore differentia septem.*

*Albus duplex.*

1. Eadem istis differētia quæ Nozilicę maiori & minori. Flores il-
2. lis albi, purpureis violaceis lineis striati. Eos ex Italia præclarus vir D. Brancionus accepit.
3. Albus tertius, violacea purpurea basi est. } Valerandi Donrai
4. Totus violaceus purpureus. } munera.
5. Purpureum obsoletum, pullis lineis striatum, D. Brancion

Alfonfi Pancij Ferrariensis medici doctis, beneuolentia & munere alit.

*Minor 1.*

Flore Croci violaceo ex pediculo vnciali sese pandente, medio foris luteo pallido, staminibus viduo: virentibus foliis oblongis, perangustis gracilibusue. Semen pericarpio clauditur, fuluum. Radix auellanam æquans, subadstringens.

*CROCUS vernus secundus Clusij.*

*Hisp. Cebollina. i. parua Cepa.*

*Crocus vernus*  
*Hispan. duplex, nobis item communicatus à Clusij viro D. Brancione.*

Huius aliud genus obseruauit C. Clusius in Beturicę collibus, Lusitaniæ conterminis, foliis & radicis cortice externo persimile, sed flore paulò minore, ex albo purpurante, vixque è terra prominēte, qui ostenis foliolis cōpositus esset; quatuor exterioribus paulò maioribus; gemina candida radice, vna alteri incumbēte, Superior habitior & firma est, edulis & dulcis; inferior languida & flaccida.

*C. Clusij munere.*

*Minor 3.*

Alter iuncea surrectis interdū foliis, minus procumbētibus, vnico aut duobus flosculis minoribus multò & cęruleis, sed extremis tribus foliis ex viridi dilutis. Radix non absimilis, sed habitior. Hęc Gadibus iuxta priorē eruebat Clusius.

*CROCUS vernus serotinus primus,*  
*Flore purpurorubente, violaceis lineis ibiatis.*



*CROCUS vernus albus secundus, caeruleis oris.*  
*Sparsis in latera folius.*



*CROCUS sylvest. vernus tertius,*  
*Flore albo purpurviolacea basi. Aduers. pag. 53.*



*CROCUS syl. minor Hispanicus, flore patulo:*  
*vulgo Nozslia minor, & nozellas. i. nucula, a*  
*radicis forma quam etiam gustu refert.*  
*Crocus vernus minor primus Clusij.*



*CROCUS*  
*vernus pur-*  
*purviolace-*  
*us totus,*  
*quartus Va-*  
*lerandi. Ad-*  
*uersar. pag.*  
*53.*  
*A. bo colore*  
*varior, pedi-*  
*culo ceruleo,*  
*alias albo, in*  
*Ostensi vallis*  
*ad radices*  
*praecell. Ber-*  
*nardi motis.*

*CROCUS*



CROCUS *flueſt. Hiſp. vulgo Noſſilicha maior.*  
*Crocus vernus tertius Cluſij.*

Κόλχικον COLCHICVM ſive ſtrangulatorium  
 EPHEMERVM. *Aduerſ. pag. 53.*

*Ger. Teitloſen, & wild ſaffran. Belg. Tÿtloſen.*  
*Ital. Zaffrano ſaluatico.*

Narciffus purpureus Plinij & Virgilij D. Ioan-  
 ni Boiſor, apud Theoph. floreſ autumnſo poſt ar-  
 cturum circa æquinoctium.

Perperam Moly H. Trago, quia huius floſ mi-  
 nimè lacteus.



COLCHICVM candido flore Anglicum. pag. 54.  
*An Moly Homericum radice nocua?*



COLCHICVM *Leſtanicum ſerotinum.*

Bulbus adnatum ſibi annexum habet; floſ albi-  
 dus, nitidus, tantillo ſummis folijs rubore confu-  
 ſus: alioqui perſimilis effigie & magnitudine vul-  
 gato noſtro Colchico, quale Lieræ Brabatorum flo-  
 ſuit Septembri & Octobri in amœniſſimo, cul-  
 tiſſimo, ſtirpium quæ exoticarum diſtiſſimo paradi-  
 ſo D. Mariæ de Brimeu vtoris generoſi viri Con-  
 radi Schetz, munere clariffimi D. medici Aluari  
 Nonij Antuerpiani harum ſtudioſiſſimi & peri-  
 tiſſimi.

Colchicum Syria-  
cū Alexandrinum. Ad-  
uers. pag. 54.




Colchicum minus  
semine præ-  
gnans.



Colchicum minus flore scens.

Colchicum montanum Clusij.



Huius minorem speciem olim latissimis præ-  
tensibus pascuis ad mōus Lupi Norbohenfis radi-  
ces, ad diuersoriū publicum, via qua Gangē vrbe-  
culā itur, collegimus. Septembri flosculus stellatus  
croceus, aut Colchici vulgaris, purpureo cæruleus,  
etumpit; sed minor. Idem esse audio cum Colchi-  
co montano Clusij nostri, quod olim seuerat in  
horto clarissimi D. Brancionis pro Erythroëo,  
foliis croceis, angustioribus, in cauliculo vix pal-  
mum æquante, & interdum etiam maiore. Semen  
subrotundum Colchici vulgaris in filiqua tri-  
quetra.

Dioscor. Colchici radix comesta, fungorum mo-  
re strangulando enecat. Remedia sunt eadem quæ fungis.  
Bubulum etiam lac potum auxiliatur.

HERMO-



HERMODACTYLI non venenati officinarum.  
COLCHICVM Illyricum sine Gracum non  
venenatum Anguillara.



Venetis munere Alberti Mattinelli Alepo Syriae euullās à fratre Cequino habui Colchici Anguillarae plantas, pronis palmaribus septenis, densis & duodenis foliis Colchici, striatis, mucronatis, reflexis, in angustum fastigiatis, imbricatis, & lateratim stipatis, è quibus in pusillo pediculo flores exeruntur lutei, pallentes, terni vel quaterni Colchici parui minores, staminibus item concoloribus. Siliqua non dissimilis. Radix foris cepae concrezione; intus euanida & vieta; quia in caulem, folia, flores, fructum & semen vis tota eruperat. Anguillarae & Cequino assentiendum, quibus acceptam refero. mihi tantum siccata aridaque visa.

Ephemeris non lethalis Diosc. facultates.  
Aduersar. pag. 55.

Iris agrestis Gal. sine Ephemerum non lethale, folia & caulem Lilio similem obtinet: radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum, digitipossimum crassitudine, adstringens, & boni tuiusque odoris. Ex quibus palam fit facultatis temperaturaeque esse mista, nempe repellentis, & halitus euaporantis. Testificantur opera quae particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix † eius in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statim folia congruunt. Oportet autem ea in vino decocta priusquam pus moueas, illinere.

† Quidam volunt esse radicem Pentaphylli, sed folia reclamant.

MESVE. Calidus est ac siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementosa, flatulenta, nauseabunda, qua ventriculo nocet, praesertim quando in eum ex partibus aliis excrementa confluunt. Puitam crassam, praesertim à iuncturis trahit, ob id podagrae, & aliis arthritidis differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam cataplasmate admotus, praesertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguat, sperma auget, vlceribus confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, zingiber, piper longum libysticum, mentastrum, mastiche mista, Hermodactylum prohibent, ne suo humore excrementoso & flatulento laedat ventriculum, neue status crassos & nauseabundos in eo excitet, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò Hermodactylus cum pauco zingibere, & succo raphani, vel cum scilla assata, aut scillae succo, & zingibere, & pauca spica, in trochiscos fingatur, purgat celerius & plenius: (per se enim tardè & imbecilliter vacuat). Myrobalani quoque roborando stomachum hermodactylos citò deturbant, & humorum in ventriculum affluxum prohibent: Datur ab aureo vno ad aureos duos; annos tres seruatur.

COLCHICVM

**COLCHICVM** luteum, aut Ephemero non venenato  
Dioscoridis congener?

*Narcissus autumnalis* Marcelli Virgilij Muto, n.  
flore luteo pallente.

*Narcissus autumnalis* quorundam Clusio.

*Lirium alterum* Theoph. Dod. vulgò Cibollina Albo-  
rana. Hisp. Açucenas amarillas. i. *Lirium luteum*.

Radice, caule, flore, folio, ortu, totaque planta  
propior facie Colchico, cui flos par in spithameo  
caule senis foliolis stellatus, sed luteus, qualem  
Ephemeris non venenati siue Hermodactyli offici-  
narum Rondelletius afferrebat. In Lusitaniae mon-  
tosis spontaneum est. Belgij hortis autumnò vna  
cum Colchico floret. Italis pèsilibus hortis alitur.


Varietas. { Angustioribus foliis & cauliculo do-  
drantali surrecto duntaxat variat in hor-  
tis nostris.

ὀρνιθόγαλον, **ORNITHOGALON** candidum  
vulgare. Aduers. pag. 55.

Belg. wit veldapup. Gal. churles & oignon  
blanc champestre. Hisp. Leche Gallina, id  
est, Gallinaceum lac.

Bulbus *Leucanthemus minor* Dod.

Lege pag. 56.  
lin. 3. castr.



**ORNITHOGA-  
LON** luteum.

Aduers. pag. 56.

Ger. Ghel felswi-  
ber, & ackerwi-  
ber.

Bulbus Syl. Fuchs.  
& Tragi.

Sisyriochion Cordi.

Bulbus esculentus  
Lacuna.

Varietas. Huius  
ornithogali lu-  
tei species mul-  
tò minor, foliis  
lògè exilioribus  
& angustioribus  
in viridariis no-  
stris prouenit.

**ORNITHO-**



ORNITHOGALON *carneum pallens*.

Ornithogalis qualibet sui parte valde cognatum & affine, sed flos cæruleus, Hyacintho autumnali penè par & similis. Ex Turnacensi vrbe primum D. Brancioni muneri missum.

Dioscor. Ornithogali radix editur cruda & cocta. Emollit, discutit.

Ornithogali lutei radix sub cineribus cocta, addito melle, trita & imposita humidis & depascentibus ulceribus, prodest. Duros tumores emollit & discutit.

LILIONARCISSESS *polyanthos*. *Lilium Alexandrinum* Neotericorum. Ornithogalon minus Dod.

*Narcissus quartus pictus* Matth.

Ital. *Hyacintho del pater nostro*, propter glomerulos floris.

Inter Lilionarcissos & ornithogala media est hæc venusta planta: radice quippe Ornithogali: folia oblonga Narcissi prodeunt, imum caulem glabrum singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo alis diuisum, quibus liliacei, lactei candoris calicis instar senis foliolis radiati flores Iunci aquatici, Allij vrsini longè maiores, Tulipæ minores obtusi, è quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur. Stamina luteola glomeratum fundum pulli ambientia. Belgij hortensis vt rarus, ita vsu incompertus. Odor suauis, aromaticus. Huius radicibus me donauit Aluarus Nonius, magnæ spei & eruditionis D. medicus Antuerpianus.

BVLBVS ESCULENTVS, DIOSC.

Hisp. Bulbo bueno para comer.



Diosc. A nobis estur: stomacho & aluo vitilis, rufus, & qui ex Aphrica deferitur. Amarum verò & Scillinum, stomacho aptior est, & concoctionem adiuvat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt, vènerem stimulant, linguam tonsillâsq; exasperant. multum alimenti præbent. carnes creant. inflationem pariunt. luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. spicula extrahunt. gangranas & podagras ex melle, aut per sese: hydropicorum tumores, & canum morsus, cum melle & piperis polline illiti cohibent. sudores compescunt. stomachi dolores mitigant. furfures & vlcera quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. sugillata varisq; per se aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant. fractis auriculis vnguibusq; ex polenta medentur. ydem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi. cremati verò & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrâsq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum: quoniam nervos tentant.

GAL. Frigidior & crassior est, lentumq; succum procreat: nam & coctu difficilis est & flatuofus, & vènerem prouocans: attamen illitus, ob amaritudinè simul & adstrictionem, abstergit simul & glutinat & nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amaritudinem in extergentibus esse substantijs, adstrictionem verò in glutinantibus: at ficcitas vtramque consequitur.

Κεράκων, CERA. Aduers. pag. 56. Hisp. Cebolla.

Diosc. Cera longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & secca quàm viridis, & cruda quàm Eadem Gal. cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, & extenuant, fastidium pariunt, & expurgant. aluo vitiles sunt. ea detractis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudini.

berudinihus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem perunguntur. suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus. canis morsibus cum aceto, ruta, & melle illinitur. cum aceto autem perunctas in sole vitilignes sanat. & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. \* varos cum sale reprimat. contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. cina aluo prodest. in auribus sonitū ac grauitatem emendat. ad purulentas aureis, & eliciendam earundem aquam valet. alopecia † earum succo perfricantur. qui celerius quam alcyonū pilos euocat. largiore cibo cepa capitis dolores ciet. coctāque vehementius vrinam pellit. eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus aquo vescantur. elixa, & cum passu vuis & fico illita, tuberculi concoquit, & celerrimē rumpit.

\* quia succus aquæ & æræ caliditatis Gal.

GAL. Ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia autem eius potius crassarum est partium. Vnde etiam hæmorrhoides aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terreæ substantiæ est, eiusque calidæ. Tota cepa flatuosa est manducata. Itaque quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum gignunt.

E cepa antidotum longè optimum ad luem pestiferam, quo piæ memoriæ Valerandus Donrez Flander Insulanus multos liberauit.

#### CEPA.



℞. Cepam magnam incauatam, cui incoquantur sub cineribus Theriacæ vel Mithridati, Terebenthinæ Venetæ vel Cypriæ añ. ʒ ij. foliorum Rutæ M. f. Deinde teruntur, & ex aceto optimo, per cribrū cernuntur, pro potu. Dosis vnciæ tres & quatuor. Residuum eo modo quo cataplasma, loco affecto imponitur. Postridie assumentum est scilicet quadrachma Electuarij sequentis.

℞. Boli Armeni rosacea loti ʒ ij. ʒ ij. Radicum Tormentillæ, fol. Rutæ, aloës añ ʒ iiij. f. Cinnamomi & granorum Iuniperi añ ʒ vj. Galangæ, Caryophyllorum, feminis oxalidis, cornu Cerui, Scordei, Coralli rubri añ. ʒ iiij. Radicum Gentianæ, Helenij, Aristolochiæ longæ, Zedoariæ, vel Costi añ. ʒ. v. Conseruationis Rosarum, Buglossi añ. ʒ. ix. Theriacæ Andromachi veteris ʒ iii. Mellis despumati & percocti lib. quatuor, additis succi putaminū Nucum vel Horum Inglandis ʒ. quatuor; & aceti Rosati ʒ vj. misceantur, fiatque opiata inflar.

pag. 58. in Cepa Ascalonitide, Anglis Scalyon vocata, lege cruda, lin. 11.



SCILLA, sive CEPA MARINA Hispanica, sive. SCILLÆ Hispanica floruli stellati, Ornithogali  
 flore: carinato liq. & Pancreatij medio folio humi  
 procumbente. Aduers. 57.  
 lege Hist. Cebolla albarraña & cepa marina.



lege lin. 23.  
 flores stella-  
 tes Ornithogali.  
 & demum fra-  
 gantia.

Dioscoridis verba, quæ in proxima leguntur  
 pagina, huc reponenda.

GAL. Admodum incidentem facultatem ob-  
 tinet; non tamen admodum calidam; sed secun-  
 dum hoc eam quispiam secundi ordinis† censet  
 exalfacientium. præstat autem eam assam, aut  
 elixam fumere: sic enim virium eius violentia ex-  
 soluitur.

† Incidit, calfacit & desiccet ordine 2°. Æginetæ.

MESVE. Scilla, autore Galeno, bifariam v-  
 tilis, tum quòd humores expelli apparat, tum  
 quòd apparatus vacuat. Melior est, quæ alteri cõ-  
 nexa eruitur (sola enim & singularis, vt etiam pro-  
 pe thèrmas orta, est venenosa) sapore dulci, acri,  
 amaro, luminis splendentibus, ex agro libero, ca-  
 lida ordine tertio: sicca prope tertium. Substantiam habet superficiariam igneam, acrem admodum:  
 ac terream adustione amarâ: aëriam denique mediocrem, eamque dulcem. Humores crassos ac  
 lentos, & bilem atram incidendo, tenuando, terendo, vt promptius expellantur apparat, & ma-  
 ximè oxymeli ex ea scillites, & eosdem ipsa purgat. Quapropter capitis affectibus (cephalgia, ce-  
 phalæa, epilepsia, vertigini, scotomati) neruorum, & iuncturarum, pulmonis & thoracis, præsertim  
 electarium ex succo ipsius & melle sumptum lambendo, confert. Idem vocem claram reddit, & oxy-  
 mel scillites, & acetum scillites. Eadè splenis obstructione & tumore sanant, putredine in corpore pro-  
 hibent, ob id sanitatè tumentur, iuuenile corpus diu seruant, sed emaciant. Gingiuas quoque laxas sanant,  
 dentes commotos ore colluto acetum scillites firmat, oris fetorem tollit, & halitum reddit odori-  
 ferum, dolorem ventriculi sedat, coctionem iuuat, corporis colorem commendat, corpus molle &  
 laxum confirmat, quouis modo vsurpatum: scilla enim tenuat, incidit, terget, foras trahit, resolu-  
 it materiam crassam lentore partibus adhaerentem: à putredine vindicat, vlcera, vrit. Assata scilla  
 facilius soluit; immissa autem aceto, humores crassos, lentos, altius merfos expelli promptos red-  
 dit, laminæ autem ipsius mazâ: separatim inuolutæ sub cinere calido quantum sufficit, co-  
 quantur, exoluuntur, in vsum veniunt: vel ipsæ laminæ vase luteo vitrato, sursum stricto, oper-  
 culato, pergamento includuntur. Dies quadraginta per æstiuos dies insolantur vase identidem ver-  
 so, vt ex æquo vndique caleat: extracta vsurpetur, vel cum æquali farina orobi fiant trochisci, quan-  
 do opus est, vtendi. Ex his sic assatis etiam fit acetum scillites; vel cum paulo mox vbi à scilla exem-  
 ptæ sunt laminæ, aceto mersæ, insolentur in vase simili à Veris initio ad Aestatis finem, pòst vsurpetur.  
 Datur autem potio à drach. quinque ad drachmas duodecim: oxymeli autem scillites ab aur.  
 sex ad vnc. tres: trochisci autem à drachmis duabus ad drachmas quatuor. Mediocrem ferre coctio-  
 nem potest scilla.

APVL. Ad hydroposim. Herbae scillae bulbis torretur, deinde circumpurgatur, & medium eius in aqua decoquitur; cum bene coctum fuerit eximitur, & ex eo tres oboli potui dantur cum melle & aceto hydropico, & euacuatur per urinam. Scillae quod est in medio eius cum oleo commode seruescitur, atque ea quae dolorem exhibent perungitur, sanabuntur. Radix pisata cum aceto & pane imposita panaricum mirifice sanat. Scyllae folium subiectum linguae, sitim compescit.

SCILLA rubentibus radicis tunicis folio Aloes carinato. Aduers. pag. 57.

Pancratium verum Clusij.

PANCRATHI marini è floris colore varietas.

Aduers. pag. 57.

Hemerocallis Valeriana Clusij. Narcissus Constantinopolitanus Matth. non descriptus, vi ex imagine suo more apparet. Ital. Giglio marino. Hisp. Amor myos, & Squilla\* menor.



Diosc. Scilla vim acrem atque feruentem habet. assatam ad multa vtiliorem esse constat. Polline ad crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficiens intesta fuerit, qua exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius sunt, nam quae ita non assatur, interancis maxime noxia est. Torretur uero in olla, indito operculo, quae in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medicum, directus viuo tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat, traiecitque lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidē parte se contingant.\* his scilla seeminibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vimur. Ad rimas pedum, interna pars cruda scillae in oleo seruescitur, aut cum resina liquefacta, imponitur. decocta in aceto demorsis à vipera, cutis plasmata est, ad singulas asse partes adiectis octonis rosti salis, cochlear vnum aut alterum datus ieiunio, ad emolliendam al-

\* Hic preparandi modus ignavia & infirmitate pharimacorum exoleuit.



anum. in potu autem & odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere volumus, hydropicis & stomachicis, quibus innatat cibis, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, & ore reijicientibus, tres obolos, in delinctu ex melle sumpsisse satis est. coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maximè ut concoctionem adiuuet. strigmenta per alium extrahit. cocta, & simili sumpta modo, eosdem prabet effectus. sed cauendus scilla vsus, his qui intestinum sentiunt vlcus. ad pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen & in carica aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla tota in limine ianua suspensa, mali medicamenti noxam arceat.

PANCRATII marini è floris colore varietas.

Prorsum Pancratio Monspelienfi idem; sed huic flores luteolos Hispanica littora dant; qui etiam interdum purpurei, & quandoque punicae produntur.

Diosc. Pancratium, quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore, aut subpurpureo, gustu amaro acferuente: foliis liliq., sed longioribus. Scilla vires & preparationem habet. eodemque pondere in morbis efficaciter assumitur, cui tamen mitior quam scilla facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisque cum hydromelite commodissime dantur.

Afouzenas de las Indias.

Pancratio Monspellaco similis est bulbo & femine: num eadem sit, asserere non ausim, ut cuius flores nondum apparuerint. in hortis pensilibus Iohannis Mutoni Neruiensis pharmacopœi fidiissimi & doctissimi exit folio Narcissi.

SCHOENOPRASON, Ascalonica  
Math.

PORRVM vulgare. Ital. Porro.  
Hisp. Puerto.



Diosc. Inflationem facit, noxium succum creat, tumultuosumque somnium parit; urinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed ladit exulceratam vesicam, renisque. Cum pituitana vero collum esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in desestionibus ad praefusiones

clusiones vulua & durities vitilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit<sup>a</sup> & multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam astringentiam vim habet. Quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguini profluvia sistit, maxime sinaribus erumpat. Venerem stimulat.<sup>b</sup> Contra omnia thoracis vitia, tabemque pro delictu efficax: Arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxiliatur. Ipsam quoque cum aceto aut Thuris polline, lacte aut rosaceo vitulæ aurum<sup>c</sup> doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum Rheo, quæ ad obsonia vruntur. Epinyctidis<sup>e</sup> medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachma bina cum equali baccarum myrti pondere potæ.

<sup>a</sup> Subdit Gal. quanquam ne sic quidem vim perdit extenuandi.

<sup>b</sup> Semen calfaciendo, extenuando.

<sup>c</sup> Pli. phthisicis, destillationibus longis, regio morbo vel hydropicis, vel succus, vel ex ipso citibus prodest.

<sup>d</sup> Cum felle caprino. Plinio.

<sup>e</sup> Et alijs vlceribus cum melle trito. Plin. Epinyctidis ] vlceribus aciem hebetantibus, & in oculi angulo perpetuo humori emananti. Plin.

Eadem quæ Diosc. Paulus, Plinius, Aëtius & Gal. qui subdit, Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososque incidit.

Plin. capitis dolores, si in aures fundatur, dormiturusque in aurem duobus succi cochlearibus, vno mellis.

E succo Porri looch ad anginas pituitosas aliosque catarrhos frigidos fauces precludentes efficacissimum. Recipit Amygd. dul. mundatar. ꝯ iij. ficuum numero quattuor, Bdellij mollis ꝯ. f. sacchari candi, & succi porri in duplici vase dissolutorum, & in serapiu coctorum, q. f. excipiendis prædictis. Succu Glycyrrhizæ ꝯ ij. misceatur, vtatur lambendo & fauces tangendo intincto Porri capitulo.

PORRVM sylvestre inodorum.

Omnia Porro similia sunt, sed exiliora & inodora. Liex Brabantorum in horto D. Ioannis Dissij alitur.

PORRVM Tonsile & capitatum. Advers. ꝯ8.  
Hisp. Puerro cabeçudo.

AMPELOPRASON, ἀμπελοπρασον, siue Porrum  
fyl. Ger. Wild Lauch. Angl. Wilde leek. Hisp.  
Puerro saluage. Ital. Porrandillo.





Ampeloprason vinetis, aruis, marginibus, fenticetis & dumentis Gallia & Belgij gaudet. folio exir Allij syluestri tenuifolij nō abssimili, sed maiore & acriore, in bicubitali caule. Radix bulbosa, nō ex nucleis, sed singulari capite cōstans, porri minor, durior, acrior, nōnullis adnatis sese propagās. Flore, & nucleis, seminis vice, triticeis granis paribus in glomeratis capitulis nō disparibus allij syl. tenuifolij.

Diosc. Ampeloprason stomacho magis aduersatur quā \*porrum; plus autem calfacit. Vrinam, & menses vehementius ↑ cit. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

\*Gal. Quia acrius & siccus est domestico, sicut agria omnia reliqua domesticis.


† Gal. Sed & crassos & lentos humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa obstructione liberat. Hac quoque ratione vrinam saepe prouocauit, vbi à crassis & lentis retinebatur humoribus. Aded verò est calidum, vt illitum cataplasmatismodo, exulceret. Dictum est autem antè, quod quæcum in modum sunt calida, extremi sint ordinis.

SCORODOPRASSUM. Σκοροδόρυον. Germ.

Äckerknoblauch. Gal. Ail porreau. Ital.

Aglio porro. Hisp. Ajo porruno.

SCORODOPRASSON alterum.



Belgicis hortis hodie inquilinum factū, folio Porri latiore, caule quaternum & quinum cubitorum & bulbo crassiore, nucleis quinis & senis è squammatis cuticulis coacto: odoris radiosi, Allij, vegetioris.

Diosc. Qualitatum Porri & Allij particeps, vnde promiscuas sibi vires ex utroque vendicauit, effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum porri modo dulcescit, & in olerum vicem transit.

SCORODOPRASSON alterum.

Gracilioribus & longioribus nucleis bulbus stiparum membraneis inuolutis atro flauentibus: flos & folia allij exliora: odor & sapor Scorodoprassi. Hoc in meis Italicis peregrinationibus in spertulas conieceram.

Subp. 67.

*Exhodon.* ALLIVM. *Bel. Boeth. Gal. Ail*  
& aux. *Ital. Aio & Aglio. Hipp.*  
Ayo.

ALLIVM *versum. Advers. pag. 59. Germ. Werr.*  
Pund; knoblauch. *Ital. Aglio de gli*  
orli.



\* situm re-  
primis Ac-  
tio.

**DIOSC.** Vis Allij acris est; excofacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflammationes facit; stomachum exic-  
cat: situm\* gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu bebet. Magna in  
alio utilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat. Veterem rursim crudum coctum lenit. potum autem  
cum origani decocto, pediculos & lendes enecat. Cremati cinis illitus fugillationibus cum melle, & alopecij  
cum Nardino yngvine, medetur. Eruptiones papularum cum oleo & sale sanat. Vitilignes, lichenas, lentignes,  
ulcera capitis manantia, lepras & furfures cum melle exprimit. Cum thure & tada decoctum, dentium dolorem  
leuat si in ore contineatur. Contra venenatos muris aranei morsus cum ficubus frondibus & cumino illinitur.  
Fertissima coma ius feminarum defensionibus additum menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem  
gratia sufficit, factum ex eo & nigra olina intritum, quod graci *μυρσάνθη* vocant, esu cit vrinam, ora vena-  
rum patefacit, † hydropicis vtile.

† **PLI.** Diocles. Hydropicis cum Centauro, aut in fico duplici, ad euacuandam aluum, quod ef-  
ficacius prestat viride cum coriandro in mero potum, Contra anginas imponi tritum, & gar-  
garizare prodest. odore serpentes abigit.



*OPHIOCORODON* Advers. pag. eadem.  
*Allium Serpentinum*. Ital. Aglio serpentino.

*MOLY* Dioscorideum putatum.  
 Advers. pag. 39.



**DIOSCOR.** Eosdem effectus prebet anguinum, quod & *Ophioscorodon* dicitur. Latas ventris rineas in cibo sumptum abigit. urinas detrahie. contra viperarum ictus, & priuatim hamorrhoidi prodest: ita vt non aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut trium in eodem ebibatur. Contra rabioforum morsus, & illius & cibo valet.

Allia deficcant & calfaciunt Galeno 4<sup>o</sup>. ordine, easdemque cum cepis facultates habent.

*Allium Theriaca rusti-*  
*corum.*

Frigidissimis & pituitosis morbis conuenit, colicisq; inde cruciatibus ortis. lumbricos, & flatus pellit; venerem stimulat, quibus frigore extincta. calidioribus natura minuit exsiccando.

Temperamento calidis, capiti, oculis, pulmonibus & renibus perniciosum; vti prægnantibus & lactantibus, mentes educendo.

*MOLY* Dioscorideum putatum.

**DIOSCOR.** Bulbosa radix mirum in modum valet ad vulua apertiones, si trita\* cum Irino vnguento in pessa\* alij legunt cum Lolij farina.

L

MOLI

MOLY *Serpentinum* vocatum.


Dioscorideo Moly perſimile ortu; folio ad terram item reflexo, odor. & bulbo. ſed flos candore rubens, cui ſubiaceſcunt bulbuli nitidi Indici Moly ritu. Radix cepaceo prædura inuolucro obtegitur. caulis pedalis & ſeſquipedalis. Belgis hortenſe eſt.

## MOLY foliis NARCISSI.

Alterum proceritate, & caule non abſimile; ſed floribus caruleis, & foliis compreſſis Narcissi ſimilibus, & ſerè paribus; oblongis, & albis rad. cis bulbis porraceis ſimul implexis & cohartibus magno capitulorum ſtipatu: allium odore præferentibus, cuius aliquot bulbos adhuc habemus munere Raphaelis de Coxia, ſummæ humanitatis & ſtirpium magni admiratoris, qui non modò exoticarum ſtirpium haud paritendum numerum, ſed & eaſdem affabrè arguta manu ſummoq; artificio pictas, vt ſi quis alius apud Belgas, nobis dederit.

MOLY Liliflorum, balbum in folio gerens,  
Theoph. & Homericum fortè.  
Adunſ. pag. 60.

ANVL. Herba moly contuſa & impoſita, do-  
lorem matricis auferret potenter.





CAVCAFON, Moly Indicum vocatum.

LILIVM candidum. Aduers. pag. 60.

Belg. Witte letie. Angl. Withilip.

Lilium siue Rosa Lunonis Apul.



Indicum Moly, quod nos Lutetia vidisse primum superioribus annis meminimus in horto Castellani, summo caule bulbosus sphericus peramplum pericarpio membranaceo oclusos gerebat: qui depacti facile propagantur. Folia, bulbus & reliqua, cum superiori similia.

LILIVM candidum.

Dioscor. E Liliis vnguentum temperatur, quod aliqui linum, alij susinum appellant; nervos, & priuatim vulua duritias, emolliens. Folia herba illita contra serpentium ictus auxiliantur. seruesacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in aereo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat. vuluam emollit. menses ciet. vlcer a cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis praeficit, luxatisq; medetur. vitiligines, furfures, & lepras emendat. vlceraq; in capite manantia expurgat. abstergit faciem & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur. ignibus sacris semen & folia cum vino illuminantur. Tradunt & rubra esse lilia in Syria autem, & Pisdia Pamphilia efficacissima vnguentis nascuntur.

Igni ambusta. ] Quia siccant, abstergunt, & digerunt moderate Galeno.

Vuluam emollit. ] Quia citra morsum digerit & emollit Gal.

Faciem erugat. ] Galeno cum melle, vt potentius abstergat. Primi ordinis est abstergentium. In- Galen. signe medicamen ad omnia quae exsiccare postulant absque morfu, seu vulnera omnia ingentia, & maxime quae in capitibus musculorum eueniunt; & quaecunque vlcerum humida, flaccidaue & diuturna sunt, quaeque aegre ad cicatricem perducuntur.

Lilij flos temperaturam mixtam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrea substantia.

Plin. ad clauos pedum in vino radices decoquit.

A P L. Ad morsum serpentis. Herbae lilij bulbum conterito, & expressos succos potui dato: ipsum etiam bulbum tritum morfui adponas, mirabiliter sanabitur.

Ad luxum. Herbae lilij folia tusa & imposita efficaciter sanant; & si tumor fuerit, sedant tumorem.

L 2 LILIVM


*Lilium purpureum minus.*  
*Alberf. pag. 61. et 61.*  
*Bulbum cruentum Hippoc.*  
*Lilium croceum Fuchs.*  
*An Hemerocallis, five fyt. Lilium*  
*Dieft. aut congener?*  
*Cern. Goltgilgen. Hipp.*  
*Lirio amarillo.*



*Lilium purpureum minus. pag. 61.*



*Lilium cruentum bulbos*  
*generis fructu alis*  
*duobus caute.*



*Lilium cruentum quartum, secun-*  
*dam caulem bulbulis donatum.*





*Lilij cruenti  
varietates.*

Martagon, cui flores rutilant, bulbos nucleis stipatos summo caule alis diuiso profert.  
Polyanthos, folia habet deorsum repanda.  
Martagon tertium, foliis est virentibus, Lilij cruenti modo.

Quartum Lilio purpureo maiori subpar, flore Martagonis rutilo: & secundum caulem sesquicubitali bulbulis à medio ad summum vsque ornat.

## SULTAN SAMBAC.

Propter amœnitatem & floris decus, Sultan Sambac, vel fortè magno Sultano dicatum, Lilij hoc genus appellatum videtur. Radix illi lilij cruenti, sed notulis labeculisque purpurantibus variata, qualis, munere D. Aluari Nonij medici C. Antuerpiani horum studiosissimi, peritissimi, & perguâuidi, à nobis alitur in horto Guiljelmi Driefsch perboni pharmacopœi. Florem nondum videre contigit; vt cuius radix nuperrimè Constantinopoli missa Sultan Sambac nomine.

## MARTAGON candidum Chalcædonicum.

Indidem delatum visendæ venustatis, vt si quod aliud, istud lilium asseritur: folia lilij albi nostratis candidiora, & radix item cognata. Neque florem tamen, neque semen in Belgio videre datum habet.

LILIUM Montanum. Aduers. pag. 61.

Lilium syl. Dod. Hemerocallis herbariorum.

Hyacinthus poetarū Tragi. Aphrodels famina Fuchf.

MARTAGON Italarum & Matthioli.

HEMEROCALLIS Chalcædonica:

Purpureo sanguinea polyanthos.

Gd. Lis iaulne, à radice colore. Belg.

Aelie van Catuarie. Germ. Gold

wurtz weibele.



Admodum rara hæc Belgis: quam propter florum luculentam fœturam & peregrinam elegantiam in deliciis habent, & summa diligentia in fictilibus alunt clarissimi viri D. Ioannes de Brancion & D. Ioannes vander Dill. E bulbis nucleisquammatim cōpacto Lilij candidi, maiore; maximo Martagoni pari, & concolori, caulis cubitalis, quem ab imo ad summum vsq; liliacea folia cōfusi & fortuito stipat. Flores hilares purpureo sanguinei; Lilij montani ritu ad pediculi extrema item reflexi, peramœna fœtura summum caulem decorantes.

DIOSCOR. Hemerocallidis radix trita & pota, aut cum melle & lana in pessa apposta, aquam & sanguinem inducit. Folia trita & imposita, mammarum ex partu & oculorum inflammationes mitigat: sed & radix & folia ambustis vtiliter imponantur.

## LILIVM PERSICVM.

## STIRPIVM

LILIVM Persicum, vulgo Pennachi Persiano.

Rarius Germaniæ, Galliæ & Angliæ; Lieræ Belgarum solum vifitur in horto amœniffimo stirpiumq; exoticarum diuiffimo generofi vni D. Ioannis Dillij. Caulis ternum cubitorum, quem fusè ambiunt folia carulouitridantia, mucronata, Liliis cruentis patia. Flores nutantes, nolas effigiantes obfoleta purpura nigricant. Radice bulbosa fiffa, minimè squamis loricata, albida, aucta parte fiffili & plana, porrectis fubtus fibris obfcure flauentibus. Cuius fit facultatis, neminem periculum feciffe intellexi.

LILIVM fve CORONA Imperialis,  
TURFANI & LALE .i. flos herbariorum.



Nec multum à Liliis abest Chalcædonicum Lale, quod in fdem Belgij hortis Lieræ D. Dillio, & illuftri heroinæ Mariæ Schetz, de re herbaria benemeritis, prouenit: fefquipedem alto caule; foliis longioribus Lilij montani. Flores rubentes nutantes Lilij Perficiritu nolas effigiantes, quales pictura docet, non potuimus obfcuare. caulem quidem edidit hoc anno, qui tamen fummo ftatim marcefcere cepit. Radix cepacea concrezione tetri & virofi colchici, vti tota planta, odoris. In Belgium miffum Lale, Turfani & Coronæ Imperialis nomine.

LILIVM



*Lilium conuallium*, vel vernum Theoph.  
*Perperam Ephemerum non lethale* Fuchs.



*CYNOSORCHIS maioris secunda species.*  
*Aduers. pag. 62.*  
*Cynosorchis altera* Dod. Angl. *Doggia coddia*.



*Lilij conuall. è florib. colore differentia.*  
 Agri Louanienfis, qua itur Thenas Drabantorum  
 urbem, syluosis flores edit candore & rubore con-  
 fusè mixtos.

FUCHS. & DOD. cor roborare, iecur & cere-  
 brum prodidere: item succum decoctum ad syn-  
 copas, apoplexias, vertigines, comitiales siue epi-  
 lepsias, paralyses, oculorumque caligines discuti-  
 endas. Suauissimum flos spirat odorem, cuiusmo-  
 di oxyacanthæ, cuius itidem stillatiua ad epilepti-  
 cos insultus commendatur.

## ORCHIDES.

*CYNOSORCHIS* Morio. *Aduers. pag. 62.*

*Germ. gespenkt knabbenkraut.*

*Orchis mas angustifolia* Fuchs. *Satyrium Apulei.*

*Orchis delphinia palustris* C. *Gemma.*



Maculis pullis variis Morio testiculus mas neo-  
 tericorum, flore delphini, propendente corniculo.

APUL. Ad vlcera difficilia & cicatrices nigras.  
 Radix tusa & imposita, vlcera expurgat, & cicatri-  
 ces curat. Herba succo cum melle optimo oculos

inûges, & lippitudines & dolores tollit sine mora.  
 Si quis ad mulierem non poterit affectari, obli-  
 gatus. Herba præpisci radicem, id est testiculū de-  
 xtrum, qui maior est, teres cum piperis albi granis  
 quadraginta septem, vt in se habeat semina nanciam cū  
 herba suprascripta, & mellis vncias \* quatuor, &  
 in vino optimo medicamentum folues, & pondo  
 scrupulorum nouem per triduum sumes: ad mu-  
 lierem affectaberis conuulso.

\* alias tres.

CYNO-

## CYNOSORCHIS

Morio femina. pag. 62.

Orchis del-  
phinia mon-  
tana C. Gem  
mæ.

Perfimilis mari, sed  
aliquantò minor: Flo-  
ribus cuculatis casti-  
dis hiatis specie, por-  
recto corniculato sta-  
mine.

Diosc. Eduntur  
radices coctæ, ut bulbi; ex  
quibus si maiorem edant  
viri, mares generari di-  
cuntur: si minore femi-  
ne, alterum sexum. Ad-  
dunt, in Thessalia mollē  
mulieres in lacte capri-  
no bibere, ad stimulandos  
coitus: avidā verò, ad in-  
hibendos. & alterū alte-  
ri<sup>9</sup> potius solui. Nascitur  
in petrosis & sabuletis. \*

\* Eadem  
Aegucta.

TESTICULUS  
vulpini varie-  
tates. Aduer.  
pag. 62. Sera-  
piades Fuchs.  
& Dod.

Testiculus  
vulpinus  
primus.  
Angl. *Hares  
balls*.  
Hisp. Sary-  
rion.



## STIRPIUM

\* GAL. Radicius

TESTICVLVS bircinus. Aduerf. pag. 61.

bulbosæ ac geminæ vis  
inest humida & calida,  
ac gustantibus dulciuf-  
cula est. Cæterū maior  
radix multam videtur  
habere humiditatē ex-  
crementitiā, & flatuo-  
sam; quapropter epota  
venerem excitat \*. Al-  
tera verò, minor vide-  
licet, è contra, nimirū  
admodū elaborata: ut  
sic eius tēperamentū; ad  
calidius & siccus ver-  
gēs. Itaq; hæc radix tā-  
tū abest, ut ad coitū sti-  
mulet, ut etiam planè  
contrā cohibeat ac re-  
primat. Eduntur bul-  
borum more toste.



TESTICVLVS vulpinus secundus.



TESTI-



## ORCHIDES.

Neutiquam posthabenda de Orchidū differētiis sententia Clariss. viri Cornelij Gemma professoris regij in celeberrima Louanienſium Medica ſchola; qui cerē non modò sex & triginta Teſticulorum icones arguta & propria manu affabrè effigiatas, mihi liberaliſſimè communicauit; verumetiam eorūdem Syluam & Naturæ opes preſtus ex minutiarum obſeruatiōe & perſpicuè digestas literis incomparabili modeſtia & eruditiōe plenè pro ſtudio atque amore erga me, cū iam hæc Orchidum familia excuderetur, ſignificauit. Cuius ſanè iudicio, & quarum elegantia oblectatus nō abs re futurū indicauit, ſi poſteritatē ab obliuione vindicārē, vt eas illi mecum acceptas ferāt, illiſq; tanti viri coniecturas, quæ Dioſcoridis delineationi aptius congruere viſæ ſunt, minimè reſpuant rei herbaria ſtudioſi; cū tamen è tam varia Orchidum tribu arduum ſit appoſitè Dioſcoridis genuina Satyria proſiteri. Sed hanc anxietatis plenam diſquiſitionem miſſam faciamus, quando opera noſtra naturæ ditanda & illuſtranda hiſtoria ſtudet, viſq; nominum & opinionum doctiſſimorum viro- rum conſenſum, & quam aggreſſi ſumus methodum, minima quæque digerendo (nullum enim vel deſpicatiſſimum naturæ operum noſtra cognitione indignum) proſequeremur; exordium à maiore mox ſubdenda Orchide ſumemus, quæ, vt uſu potior, ſic & verior recepta eſt.

SERAPIAS Dioſc. Cornelio Gemma, ſive Baſilica  
Syderites vel Erythraea ſtorū omnino purpurei  
& aliarum omnium facilè  
princeps.

SERAPIAS Dioſcor. 2<sup>a</sup>. C. Gemma, ſive Orchis  
Baſilica altera Syderites flore candidiore, thyroſq;  
magis compreſſo, & ſoliis latioribus uſque ad ver-  
ticem inflexis, circa caulem argenteis.

CYNOSORCHIS noſtra maior.  
Aduerſ. pag. 62.

CYNOSORCHIS maior altera noſtra.  
Aduerſ. pag. 62.



ORCHIS Saurodes vel Scincophora, Lacertarum amulatione, Cornelia, Gemma, sine Tragorchis altera.

vulgaris Testiculus Hircinus, seu Tragorchis & Leporis testiculus nostras. Advers. pag. 62.

Floret circa finē Maij, ac ferè vsq; ad mediū Iunij. prouenit in collibus muscolis, præsertim inter conualles vmbrosas.



TRAGORCHIS minor & verior C. Gemma, sine Coriosmites vel Coriophora flore instar Cimicium.

ORCHIS Melittia, sine Apis cadaueralem exprimens, Belg. Wien.



ORCHIS Myodes prima C. Gemma, floribus muscam exprimens. Serapias 3<sup>a</sup>. Dod.







VULPINUS Testiculus, siue Orchis Myodis late Narbonensis, congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus fucum, colore & effigie praesferentibus. Aduers. pag. 62.



Sphagodes C. Gemma. Gal. mouche-guespe. Belgicè, Wetspe. TESTICULI Vulpini varietas. Aduers. pag. 62. Huius è sola magnitudine, & floribus intensi & remissi colore varietas gemina conspicua.



ORCHIS Myodes altera C. Gemma. folio lauiore & flore grandiusculo.



ORCHIS Ornithophora, vel Ornithes, folio laui C. Gemma. TESTICULVS Vulpinus noster papilionis alas expansas referens. Aduers. pag. 62.

## STIRPIUM

ORCHIS Ornithophora foliis  
maculosis C. Gemma.

Sunt huius speciei differentia ac-  
cidentales plurima.

Floribus { purpureis  
              { suppurpurascētib;  
              { albis.

Fo- { prae grandibus,  
lis { parvis,  
      { ovalis figura, (bis  
      { ex lato in acutū definetū-  
      { ex acuto  
      { in amplū  
      { & rotun-  
      { dum.

Floret medio  
Aprilis ferè &  
quandoq; sub  
initio vel finē  
Martij mensis



ORCHIS stratiotica, vel Stratiotes maior, sine Militaris C. Gemma, quam merito Basilicam tertiam li- ceat vocitare.



ORCHIS Stratiotica minor C. Gemma.



ORCHIS Batrachites, vel Batrachioeides C. Gemma. Belg. bofskens. i. ranule à florū fi- gura.

Ex eorum genere quæ sexus ambigui sunt, ut & Hermaproditicū testiculum iō male appelles. Sunt enim mediæ inter Serapiades & Cynosorchis, maximè quoad formam radicū.



ORCHIS



ORCHIS  
Hermaphro-  
ditica secun-  
da C. Gem-  
ma, siue Or-  
chis Psycho-  
des diphylla.



TESTICU-  
LVS odora-  
tus. Aduers.  
pag. 63.  
Orchis spira-  
lis C. Gem-  
ma.



TEIORCHIS, vel Triorchis alba  
Spiralis vel autumnalis C. Gemma.  
Testiculi odorati varietas.\*



ORCHIS  
Frisia li-  
toralis.

TRIORCHIS lutea  
3<sup>a</sup>. C. Gemma.  
Tertiae huius diffe-  
rentiae signum sub-  
dit C. Gemma, sed  
oblongioribus radi-  
cis oliuaribus bul-  
bis.



\*Non aliud à superiore, sed pluribus  
ut plurimum oliuaribus oblongis bul-  
bis donatur.

Pumilum testiculum facie, ortu & folio  
Orchidis Pliniana, sed rotundiore alit  
in fœtibus D. Dilsius munere Clusij  
nostri. qui eius bulbillos Vienna Austriæ  
in Belgium transmisit. florem nondum  
conspexi.

TRIORCHIS lutea altera C. Gemma, folio rotundio-  
re & latiore quam superioris, virentiore, trifolia, &  
nonnihil hirsuta: videtur eadem aut congener cum  
ORCHIDE Frisia litoralis:


Quæ gemina inferiora folia bifolij, Plantaginis  
latitollæ angustiora edidit, & in dodratali caulicu-  
lo herbaceos siue luteo virentes flosculos in horto  
D. Brancionis.

ORCHIS minor Leodienfis.  
*Triorchis lutea*, flore luteo C. Gemma,  
 siue *Basilica minor*.

*Serapias* & *Triorchis* quorundam.

Terna folia, angustiora, Quinquener-  
 uia Plantaginis amula promit; laeuore  
 & viriditate Auricula vrsina, vti supe-  
 rior. Flos itidem in cauliculo exili Te-  
 sticuli odorati pari. Radix ternis & qua-  
 ternis pusillis pendulis testiculis subest,  
 quibus diuaticatur & propagatur. Col-  
 libus agri Leodienfis gaudet.

*Triorchis lutea* C.  
 Gemma.



SERAPIAS mas la-  
 uii folio, floribus dilute  
 purpureis notulis con-  
 spersis. Satyrium Ba-  
 silicum primum Dod.  
 Palma Christi herba-  
 riorum. Belg. hande-  
 hens crupt. Germ.  
 Crutz-  
 blum.

SERAPIAS ser-  
 mina pratensis, foliis  
 notulis inspersis, siue  
 Palma Christi. Ad-  
 uers. pag. 63.  
 Satyrium Basilicum  
 alterum Dod.






SERAPIAS *candido flore*  
*montana maculatis foliis.*  
*Cynosorchis montana folio*  
*maculoso C. Gemma.*

SERAPIAS *minor rubello*  
*nitente flore, angustifolia,*  
*nullis in spersis punctulis.*



Pratis item eadem  
 niueo flore crebra vi-  
 situr; cetera haud ab-  
 similia.



SERAPIAS *palustris latifolia.*  
*Cynosorchis palustris platyphylla,*  
*folio laui latoq., flore albo sub-*  
*purpurascente C. Gemma.*  
*Pracocior est violacea*  
*Cynosorchis.*

SERAPIAS

SERAPIAS palustris altera leptophylla.

Cynosorchis palustris altera  
C. Gemma.

Serius florens, coma violacea, foliis interdum laevibus, interdum maculosis,



SERAPIAS montana folio laevi.  
Cynosorchis montana folio laevi  
C. Gemma.

CYNOSORCHIS



OBSERVATIONES.

93

CYNOSORCHIS Dracon-  
rias foliis & floribus impensè  
rubris C. Gemma.

Floret circa finem Aprilis aut  
initia mensis Maij. Nascitur  
in humidis &  
vliginosis, præ-  
ferum vbi ni-  
grior terra est.



CYNOSORCHIS Ma-  
crocaulos vel Conopsas  
sive galericulata  
C. Gemma.

Floret circa medium  
finemq; mensis Maij  
vlque ad Iunij ferè  
medium.



SATYRION castra-  
rum vel Eunuchum ex ge-  
nere Cynosorcheos Cornel.  
Gemma.




CYNOSOR-  
CHIS pala-  
stris laetifolia  
& angustifolia  
sive leucophyl-  
la omnium  
religiosa C.  
Gemma.









## ORCHIDVM GENERA.

Primum genus est Cynoforchidum: secundum Serapiadum, tertium verò Dactylidum vel digiti v-  
nium atque alterius speciem aptius præferens.

Cynoforchides voco duobus ordinibus præditos pectinum ritu, ut singuli velut singulas manus præ-  
ferant interdum duobus digitis, interdum pluribus, qui si à radice reliqua præfererentur tanquam  
processus meri vel apophyses, optimè congruent Dioscoridis notæ, ut Cynoforcheos vel canini testis  
nomen imponi possit. atq; ad hoc vnicum genus infinite species relegantur, quâquam quæ sub eodem  
insigni militant, potius feminei sexus ideam quàm masculam representent.

Serapiades autem exactè virilis testis imaginem referunt, atque in hac præcipuè animalculorum di-  
versissimorum species mirabili Naturæ fecunditate atque ludibrio depinguntur.

Medium inter hæc genus est à Dioscoride quoque sub Cynoforchide comprehensum, quòd etiam  
oliivis oblongioribus siue compressis bulbosæ partes illarum optimè congruant, nili non similes esse  
putemus, quia in oblongiores digitos enervantur.

## De generibus Cynoforchidum.

Cynoforcheon primas Oreades feci siue montanas. Crescunt sæpius inter querceta locis asperis atque  
vmbrosis. erumpunt Martio mense quandoque & sub Februarii finem. florent sub finem Aprilis, &  
initia Iunij mensis, interdum cubiti altitudine flore odoratissimo, interdum candido, interdum penitus  
maculoso: folia supernè viridita subter argenteo fulgore conspicuo, qui membrana quadam detracta  
tenuissima protinus exolefcit: fibras prætenues habet secundum totam longitudinem expositas.

Nereides vel palustres admodum variæ sunt, placuit tamen solas essentielles differentias, nimirum ex  
forma vel illius imitatrice figura tum in foliis, tum in floribus delumpta discrimina recensere. Equidè  
hactenus propè vndecim numeravi.

Xiphoides omnes florent paulo ante initia Maij vsque ad medium Iunij mensis.

Harum miranda maximè est Dracontias, quam puto ad Erythronium proximè accedere, si feminis  
ratio à Dioscoride designata congrueret, ac bulbis tantum vnicus foret. verum quis scit an depranato  
codice Græco pro *λινισπέρμα* sit legendum *λινθοπέρμα* vel *κρινισπέρμα* atque quod ait in descriptione alre-  
rius Satyrij *πέζαν βλαστεινόν ὅσον μίλλον*, valde ambiguum est, num quantitate, num alia ratione similem ve-  
lit; ut etiam prius illud Satyrium Psychoeidi nostro non penitus dissimile videatur. nam & *πυρρὰ* fuleū  
dici potius quàm rutilum credo, atque hoc *εὐρευνδὴ* significat aptè candorem rubore tinctum; quod in  
Psychoidi altera in foliorum ambitu (cū primū emergunt) sæpius observavi.

Ea verò quæ mucrone acutiorè prædita est, accidentarias differentias præter numerum habet, id est,  
coloris, odoris, magnitudinis, liquoris & macularum specie ac notis inter distinctas. Essentiales reliquæ ex  
tabula patent.

Platophylla folio lato laciniOSO elegans planta sæpe ad sesquicubiti altitudinem surgit, flore violaceo.  
floret feriis, ac circa initia Iunij mensis: gaudet valde limosis atque palustribus.

Conopsæa vel Macrocaulos ad duorum cubitorum altitudinem sæpè pertingit: flores illi purpurei  
admodum elegantes & odorati, ut in Serapiade basilica prima, atque secunda, nisi quòd color Conop-  
sæa magis dilutus, & hæc æternis velut formella propria videatur: Gaudet pratis, sed tamen non vsque  
adeò humidis, ut priores: quin potius medio quodam solo ac temperato.

## De Serapiade.

In Serapiadum genere principes sunt regales triplici differentia à nobis exarata. donantur hoc no-  
mine ob regalis sceptri diadematis ac trabæ similitudinem.

Maiores

Maiores tum prima tum secunda foliis constat exacte virentibus instar porri, oblongis, pinguibus paulo latioribus, interdum leuiter inflexis; testiculi exacte rotundi, cauliculus dodrantalis saepe procerior; flos venustissimus, exacte purpureus, interdum leuiter subpurpureus, dispositus fere in umbellae dilatantis speciem, nulla tamen odoris gratia, planta rata admedium, a me primum in mœnium Louanienfium conuallibus deprehensa.

Altera flore minus purpureo, magisque in aëiem explicato: floret veraque a principio Iunii mensis saepe usque in medium Iulij constante specie & venustate mirabili. erumpunt folia circa Solstitium hyemale, gaudet umbrosis & asperis, muscoso solo & maxime graminetis, coniunx istorum est Conopsea.

Conopsea.

Proximae sunt Strateumaticae vel Anthropinae quae tamen iudicio plurimorum ceteras pulchritudine vincunt, flores ut galeae vel galeati homunculi truncis duntaxat manibus pedibusque.

Prior eminentiore caule, folio amplissimo, id est, longè simul & lato & subrotundo inter initia, flos intus candidus, maculis purpureis interstinctus, foris velut fibris purpureis ac citrinis impersius rubens; huius prouentus vberior in syluula Floridae vallis, erumpit mense Decembri, floret a Maij auspiciis ad finem usque.

Cognatum huic alterum genus, folio quidem lato, sed breuiore, coma magis propendula, propiusque confertis floribus, & ad vnum latus nutantibus galeis: color foris ex albo & caruleo nonnihil cineritio mistus: intus habet maculas coloris puniceae, hi ad nos è montosis & asperis non procul à Bruxellensi ciuitate mittuntur. Flos apprimè venustus utriusque generi, sed inodorus.

Munro.

Præter has Strateumaticas vel Militares vidi aliquando & tertium genus folio lato, lilij foliis quam simillimo, oblongo scilicet & in mucronem subrotundum desinente, cui flos lilij lacteus planè columbarum effigiem alis exportectis pedibusque quam optimè repræsentans. Hanc à multo tempore non visam mihi etiam ut vellem pictam accuratius dare non potui. Gaudet montosis & aridis: floret eodem tempore cum Anthropinis.

De Vespiis & Apibus nihil addam particulatius, eo quod à ceteris herbaria rei cultoribus exarata & in Scerpiadum genera sint relata: quanquam Crabrones ab Apibus non vsquequaque distinxerint, uti nec apiculatum genera duo, ac rursus duo muscarum, foliis ac florum specie differentia.

Ornithophora.

Satyria Ornithophora sunt permulta, sed tamen aptius auicularum nomen maiores obtinent, quibus purpurei flores vel volucrum alis expansis, vel delphinas cauda protensiore delineant. alteri istorum folia sunt maculosa, alteri plana & porraceo vitore perfusa. Florent ambo mense Aprili, & fere reliquas Satyriscorum species antecurrunt. Folia primum erumpunt in Februario. Gaudet umbrosis & maxime coryleis, terra porosa & musco obsita.

Delphinia.

Delphinia minores nostra quoque commentatione non indigent, cum ab aliis neotericis abundè sint explicatae.

Tragorchis.

Tragorchim duplicem pinximus: Minorem flore fuliginoso, cuius tamen est magna varietas, figura, color & odor Cimicis, folium non absimile minori Delphinio Satyrisco, gaudet irriguis, floret cum Delphinis.

Scincophora.

Altera quam Scincophoram diximus, à Rembertto & aliis delineata est, frequentior in mœnibus Louanienfium.

Pumilio.

Minor Basilica siue Pumilio flore luteo nonnihil herbaceo instar regij diadematis, odore fragrantissimo: vis ad excitandam Venerem præ ceteris admiranda. Hispani proinde *Amor di donna* iure appellat, testes parui, rotundi, solidi, cortice rufo obducti: folia emergunt prius Maio mense vel circa finem Aprilis: floret mense Iulio usque in Augustum, valde se multiplicat sub terris. Gaudet montosis.

Spirale Satyrium.

Alter Pumilio flore candido odorato, rectè Spirale Satyrium vel Autumnale vocetur. Estque ut plurimum Triorchis aut Tetrorchis, oblongis bulbis instar oliuæ compressæ: folia Rhombotide, impenfè viridia cum fulgore subatro. Flores in spiram aptè dispositi, forma diadematis, ut priori. Erumpunt folia mense Septembri, flore iam marcescente; ac perseverant usque in Maium. inde verò per æstatem obliuescunt. erumpit autem cauliculus mense Augusto, florens usque in Septembrem. Quis scit an alter horum sit planta, cuius meminit Theophrastus. forsan & odoris fragrantia & virtus idem docent, si soli natalis felicitas conspiraret.

Ptychoides.

Inter Dactylides Ptychoeides, maiores tantum ab aliis exarantur. nos præter illas & duas alteras vidimus, vnam folio grandiore, interdum triplici aut quadruplici genus insecti referens, quod Papilionem vocant. Minores sunt odoratis. flore. montosis & aridis valde proueniunt inter erycas. Florent circa medium Iunii & aliquoties circa initia.

Hermaphrodita.

Hermaphrodita oblongis cruribus, solo gaudet palustri: flos erumpit mense Iulio, omnino candidus, tener qualis Oreadum.

Acridotides.

Acridotides vel Locustephora caulem & florem omnino consimiles ferunt cum Satyrio abortiuo diphylo, sed plura folia, foliorumque species alia, & alius ordo & radices geminae ut in Ptychodi. Flos barbae hircinae, Locustæ aut Cicadæ similitudine, gaudet mediocri solo, praus syluosis, aperit se flos medio mensis Maij.

Hætenus Cornel. Gemma.

Dioscor.



**Diosc.** Testiculus alio nomine Serapias, Andrea auctore, vocatur, quoniam radix multifida sit: folijs est porri, lutiorebus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili. Quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. abolet fistulas. & illitum inflammationes lenit. arida radices nomas inhibent. sanantq; putredines, & oris vlcera cacoethe. alium sistunt è vino pota. De hac eadem qua de testiculo canis, produntur.

Aegin, Orchis quem Serapiada cognominant, aliqui verò triorchin, vehementius quàm superiot, deficcant; quapropter laxos humores discutit, vlceraque sordida & putrescentia expurgat. Herpetibus medetur: torrefacta multò impensius deficcant. Quia verò leuiter astringit, ventrè quoque cum vino † pota compescit.

**ERITHRONII** è florib. colore & folijs differentia. pag. 64.  
Satyrium & Dens caninus Belgarum. Hermodactylus  
& Pseudohermodactylus, Ital. & Matth.



Aut flos purpura rubet, aut candore micat, aut purpura & candore confusus pallet.

Hermodactylus & pseudohermodactylus Italorum putatus folijs constar infernè angustis, quæ radicis ceruici innituntur.

**SATYRIUM** Advers. pag. 64.

**Diosc.** Radicem in vino nigro austero bibere convenit, contra episthotonum. Vendum ea, dum concumbendæ incesit cupiditas: siquidem ea prouiores ad venerem fieri affinant.

Ob flatuosam & excrementitiam humiditatem, Gal. teste.

**SATYRIUM ERITHRONIVM.**

**Diosc.** Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur, radix stimulat; eoque magis bibatur in vino.

**SPARGANION** alterum superius reddendum proximè effigiem suam Observationum pag. 41. vbi omissum fuit.


In Brabantino agro, simpliciori, alis viduo caule minore: ex interuallis per verticillos distinctis, è Varietates, quo sporum globuli oriuntur molliores minisque spinosi & echinati.

**HOLERA & HOLERACEA.**

N

RAPVM

R. APV. in d. u. obliuatum. Adh. f. pag. 66.  
Hisp. Nabo redondo.



**Diosc.** Decoct. R. Api radix alit, inflammationem parit: humentem ac fluxam carnem creat. Venerē stimulat. Decocto po ligra, perniouesque fouentur: contriti que rapo atque imposito unantur. si excauata radici rosaceum ceratum adigitur, & feruenti cinere liquecat, exulceratis perimionibus proficiet. Cyma eius decocta mandantur, & vrinam ciunt. Semen antilosis & iberiacis, praesertim qua sensum doloris uiserunt, anodyna vocant, idoneum est. Potu contra venena salutare est. Venerem concitat Rapiam. murti conlitum, minus amenti sufficit; sed multo magis appetentiam recreat.

Fluxum carnem creat. ] Gal. concocta difficilis si crudior edatur, bis cocta aptior.

Venerem concitat ] utpote spiritum flatuosum procreans, sic & ra'lix. Gal.


Rapi satui succus, in corpus digestus, temperato crassior est, ideoque crudum succum in venis congeret.

R. APV. syl.

**Diosc.** Adhuc in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totiūq; corpore, vitimur, praesertim qua ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.







NAPYS  
Aduerf. pag.  
6. 116.  
Nalocca-  
mun &  
Naps.



RAPHA-  
NUS minor  
purpureus.  
Aduerf. pag.  
67. 1. 11.  
das Matth.

N 2

N 4-



NAPVS Aduers. pag. 67.

**Diosc.** Colli napi radix inflat. modicum alit. semen eius potum venenorum vires hebetat. auditus admiscetur. Conditur sale radice. Gal. Eadem, quas Rapa, vires obtinet. secundo ordine calcacit, & humectat primo.

**RAPHANI OMNE genus.** Aduers. pag. 67.

**Tertia RAPHANI è colore differentia.**

Belgis & Italis frequens Raphanus est, radice foris pulla, intus verò candida.

**Diosc.** Radix, quæ Græcè raphanus dicitur, ex calcacit. flatu gignit. oris suavis est: sed stomacho aduersatur. ructus ciēt. vrinam pellit. alio aptior. summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuet. cum autem præsumitur, cibum suspendit. quare vomituris commodissimè datur ante cibum. sensuum aciem excitat. decocta contra veterem tussim, & pituita crassitiem in pectore, efficax est. cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet. hydropicis commodissimè illinitur. lienosis vtiles. sugillata cum melle rapit: & nomas amolitur. contra viperarum ictus auxiliatur. alopecias ad pilum reducit. lentigines cum loliacea farina emendat. hu qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit. vrinam mouet. menses cit. lienem extenuat. Cum aceto illitum gangrenas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis perquam vtiliter gargarizatur. Contra Cerasi morsus, potum ex vino auxilio est.

**ARMORACIA** Dioscor. Raphanus syl.

**Diosc.** Tam solum quàm radix in olera recipitur: sed hæc ex calcacit, vrinam concitat: astuosa est.

Aestuosa est. Raphanus syl. calidior est Lunaria græca:

Gal. Ex calcacit excessu tertio, desiccacit secundo, & extenuat. Agrestis autem in vtroque efficacior. quin & semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest digerendi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem conducit. Sarii radícula sola crudaque vrbani hominibus vt plurimum prima mensa ex garro sumitur, alui ducendæ gratia: pauci autem acetum admiscunt.

Rustici verò frequenter cum pane elitant, non secus ac Allia. Cæterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cæna crudas eas edunt, concoctionis iuuandæ gratia. Ipsi quidem id se experientia abundè compertum habere dicunt; nullus tamen eos citra damnum potuit imitari.

Plin. Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos comminuunt & eiciunt calculos. Hydropicis proiunt ex aceto & sinapi sumpti, & lethargicis. Hippocrates capillos mulierum defluos fricari Raphanis, & super vmbilicum imponi contra tormenta vuluæ dicit.

**SINAPI** satinum Eruce aut Rapi folio. Aduers. pag. 67. Hipp. Moltaza.

**SINAPI** agreste Apij aut potius Laueris folio. Aduers. pag. 68.




SYNAPI



SYNAPI *fluestre minus Bursa pastorii folio.*  
*Hisp. Mostaza saluage.*  
*Aduers. pag. 68.*

ERVCA *fatua; Erysimum Gesneri.*  
*Hisp. Oruga. Ital. Rucheta.*  
*Aduers. pag. 68. 69.*



Diosc. Ad calfaciendum,\* extenuandum, extrahendum, efficax est. ad eliciendam capitis pituitam<sup>b</sup> mā-  
 dūtur. contra pradueros tonsillarum tumores, ac veterem callosamque arterie scabritiem, succus ex aqua & melle,  
 convenienter gargarizatur. sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum. comitialibus<sup>c</sup> quoque auxiliatur. se-  
 minas vulvae strangulatu oppressas exurit. lethargicis,<sup>d</sup> derafo capite, illinitur. cum fico<sup>e</sup> admixtum, donec rube-  
 scat locus, & ad coxendicam cruciatus impositum, ad lienes,<sup>f</sup> & omne genus dolores confert, cum permutenda va-  
 letudinis causa, ex alto vitra extrahenda<sup>g</sup> sunt. alopecij illitum medetur. faciem purgat. singillata cum melle, adipe  
 aut cerato rapit. fera imperigines, & lepra, eo cum aceto perunguntur. contra febrium circums aridum bibitur, aut  
 potui, potentia modo, inspergitur. extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus, vtiliter admisceri solet. tri-  
 tum, gravitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad<sup>h</sup> hebetudines oculorum & genarum scabri-  
 ties magna vtilitate illinitur. expressu recenti semine succus in sole siccatur.

\* Calfacit & siccit Gal. ordine quarto.

<sup>b</sup> Tenetur in ore aut gargarizatur cum aqua mulsā Plin. ad dentium dolorem manducatur: ad vuam  
 gargarizatur cum melle & aceto.

<sup>c</sup> Comitialibus] cum fico & cumino tusum Plin.

<sup>d</sup> lethargicis, tetanicis & opisthotonicis Plin.

<sup>e</sup> Plin. Semine & radice musto madefactis.

<sup>f</sup> Lienes] ab humiditate & flatibus, Plin. subdit, Thoracis & omnis generis.

<sup>g</sup> Eadem Plin. caustica vi pustulas faciendo.


<sup>h</sup> Hebetudines] cum melle caligantes oculos Plin. qui subdit: Ad scorpionum ictus & serpentium  
 tritum cum aceto illinitur. Fungorū venena discutit. Stomachō vtilissimum contra omnia vitia, pul-  
 monibusque. Excreationes faciles facit in cibo sumptum.

ERVCA.  
fil. Adersf.  
pag. 69  
Hild. Onga  
17. u. C.



STIRPIUM

ERVCA *sylvestris angustifolia*. \*



ERVCA  
Nasturtio co-  
gnata tenui  
folia Na-  
sturtium sy-  
Chenop.



\* Propter ordinis consecutionem, communes & affines naturam, & effigiem inter Erucam & Iri-  
onem, hic inferenda fuit. Primit quippe inflexis  
cubitalibus caulis liculis flores luteos. Erucæ sylve-  
stris. cornicula siliquarum sinapi sunt aut Nasturtij  
sylvestris, ubi semen acre, vti folia angustiora, Erucæ  
sylvestris concoloria, sed minimè divisa, Tara-  
conis ferè paria, quæ Erucam aut Irionem sapiunt;  
quibus idcirco affinis natura putatur. In horto  
Coldëbergij nostri nō vulgaris peritiæ viri oritur.

ERVCA Nasturtio cognata.

Ethæ minus frequens & obuia hinc inferen-  
da. Folijs eximè laciniosis, altiusque in istis quàm  
Nasturtij horretis. C. kile Scapulis, Erucæ  
marinæ dictæ, similibus & concoloribus. Caulis  
multis concavis alis, hirsutus, asper, pedè æquans.  
Flores pallentes, & semen secundum ramulos to-  
tos acris saporis Nasturtij in vaginulis. D. b. tur  
hæc C. Clusio, qui eam in Valentino agro, Martio  
florentem, & femine prægnantem, reperit.

Diosc.



**Diosc.** Cruda Eruca venerem largiore cibo concitat. semen eodem effectu prodest. urinam cit. concoctioni prodest. alio perquam commodata. semine ad condimenta utuntur. quod, vii in longum tempus asservetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maxime in iberia, qua occidentem spectat. cuius semine pro sinapi incolae utuntur. urinam vehementius pellit, multo satius acrior.

Venerem concitat] quia flatulenta, Æginetæ; recens potissimum.

Gal. Olus hoc manifestè calfacit, adeò ut non facilè solum absque lactuca edatur. Caput magis dolore afficit, si solum edatur.

Temperamento Erysimi similis.

Plin. Concitatrix Veneris: idcirco iungitur lactucis ferè in cibis, ut nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Eius semen scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestio- las omnes innascentes corpori arceat; vitia cutis in facie cum melle illitum; lentigines ex aceto. Cicatrices nigras traducit ad candorem cum felle bubulo. Semen attrahit potentissimè & digerit. Eadem qua sinapi ratione alopecij medetur.

**ERVCA GERATINA dicta Italorum. an Sophia Belgarum: an num potius Matthioli Erysimum?**

Aliam tradunt parietinis & muris, virgis longioribus, exilibus Eruca sylvestris; floribus luteis & corniculis fenigræci exilioribus; ubi semen acre Nasturtij, quod cancris mederi asseritur.

**IRIO sive ERYSIMVM** Aduers. pag. 69. Nobilis Eruca & Irion Cordi. Cleome Oßau  
Horij Anguillara, Germanorum & Fuchs. Verbenæ semina, vernaculè Epfenkraut  
weiblin. Lust. Rinchaum.

Deme Arg.  
Cadiolæ &  
hæd lecte.

**Diosc.** Semen contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extusuntur. regio morbo & coxendicibus prodest. contra venena in delinctu cum melle datur. illinitur ex aqua aut melle viliter \* cæcis carcinomatibus, parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus, in totum extenuat, & calfacit. mirius † multo ad elypheres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatum, pinfit, a farina oblitum perasseretur.

Gal. Irionis semen, sicut gustu Nasturtio simile apparet, ita facultate igneum est & excafactorium. vile est cum edegmatis ad promouendas crassorum lentorumque in thorace & pulmone humorum eruptiones.

Subdit Plinius. Datur pleureticis, torminibus coliacis. infantibus quoque utilissimum: item sedis virij & articularijs morbis cum melle & fico. Medetur & suspensio. Item fistulis cum axungia veteri, ne intus addatur.

Ischiadicis cum Iberide & Nasturtio inijecitur.

Syr. de Erysimi efficacissimus; cuius beneficio iunentulas decennio raucedine laborantes, percurant.

**℞.** Erysimi totius recentis M. vj. Radicum Helenij, ruscilaginis succo adhuc prægnantium, glycyrrhizæ añ ʒ ij. borraginis, cichorii, capillorum Veneris añ. M. i. f. florem cordialium, anthor, stachadis vel Beconice añ M. f. aut ʒ vj. pastularum mundatarum ʒ ij. incisis & contritis fiat omnium decoctio ex arte in sufficienti q. aquæ hordei, hydromelitis, & ʒ. vj. succi Irionis, ad lib. duas vel tres. expressi in dissolue sacchari q. s. fiat syrupus: quo diu & continuò utendum, purgato corpore.



**ERYSIMVM**  
Matth. alteru.  
Aduers.  
pag 70.

**ERVCA**


**ERUCÆ** species quarū vna hæc tamen esse videtur, posse substitui pro Irione, virium affinitate asseueramus: sed Erysimū Matthioli neque alterum, neque primū Dioscoridis Irionē folio Erucæ syl. vestris vel domesticæ ritu diuiso inficiamur. Huic enim alteri folia Lapsanæ, sed minora, Botrydi paria, & falcata cornicula, stipatim ab imo summo tenus cauliculos sesquicubitales ambientia. Flosculi lutei, & semen flauū vrētis gustus, per similia alioqui genuino Erysimo Erucæ folio, cuius cornicula in cacumine cauliculorū conspiciuntur, vt Diosc. ait. Antuerpiæ in horto stirpium diuissimo Petri Coudenbergij pharmacopœi doctissi. semel satum, semet ipsum suo semine ferit, & singulis annis renascitur.

Semen sesquidrachmæ pondere ex ovo forbili tribus diebus continuò deuoratum, seminis profluvia cohibet Matthiolo. Contrā in vino potum, calculos renum pellit.

**LAMPANA** Aduers. pag. 70.

**BARBAREA** siue Pseudobunias, Aduers. pag. 70. 71.  
Angl. Wildt Hertwall.

lege lin. 33.  
plantam.



**Diosc.** Syluestre olus plus alit quàm rumex, & stomacho vilis. Cuius folia, caulesque coquantur in cibo. Gal. Esā succos prauos creat: cæterum illita abstergendi nonnullam digerendique potestatem possidet.

**BARBAREA.**

Calida & sicca initio secundi existit; terreæ substantiæ nonnullius particeps, ideo gargarizatur ad anginas pituitosas & vuas relaxatas. Succus commodè clymeni vice & ritu extensorijs siue Mundificatiuis, vulgò vnguentis ad sordida vlcera, miscetur. Vrinam ciet; calculos & fæctus vesicæ docto aut cibo pellit, vti lauer, cuius ferè par gustu.

**BARBAREA minor.** Herba S. Alberti Bononiensium.

In Gallia, Germania, & Belgij hortis visitur herbula folijs arouirentibus Bugulæ, blattariæ & Isatidis syluest. minoribus, nigrioribus: floribus & corniculis copiosis longè minoribus Pseudobunias siue Barbareæ. hætenus vsus nullius.



## Sium alterum: Olusarii facie.



Huc referenda alia non ita absimilis planta, stagnantibus item vdisque scrobibus & lacustribus, pone novam urbem Antuerpianam oriunda, iuxta Scaldæ amantissima fluens. Radix innumeris implexa gracilibus & tortilibus fibris pullis glebæ limosæ inseritur; è qua cubitales & ternum cubitorum caules Cicutæ assurgunt. Folia Laveris Dioscoridei, ambitu serrata, speciosa. Flos in umbellis è luteo viridi pallescens: Semen apio hortensi ferè par; quod gustu ad Cuminum, Daucum Creticum & Citrei mali corticem accedere, & plusculum caloris habere videtur.

## SION sine LAVER.


Diosc. Coctum crudumque calculos rumpit & excernit; menses & partus extrahit; urinas cit. Dysenterici in cibo auxiliatur.

GAL. Excalfacit tantum quantum gustu odoratum, atque digerit.

O

SION



SIO N Mat  
thioli & Ita.CARDAMI-  
ne altera, si-  
ue S. sym-  
brium Car-  
damine se-  
cundum.

SIO N Matthioli &amp; Italicum.

Matthioli Sio prouenit rignis & riuis vbi Car-  
damine, folio ad Nasturtium hortense & Cardami-  
nen accedente. Cauliculi pedales & interdū cubi-  
tales. Flores albi, & cornicula Sij Cratæa, gustan-  
ti acres. Plurima hæc Taurinis Pedemontanis col-  
lium & montium riuis, vbi collegimus cum Pe-  
tro Rapalino pharmacopæo Taurinensi simpli-  
cium peritissimo.

CARDAMINE, siue symbriū alterum Diosc. pa. 7.  
perperam Nasturtium agreste, siue Iberis Eufio.

Cardamum Apulei & Nasturtium Italicum.

Nasturtium syl. Corai, & pratense Tragi.

Germ. Gaurthblum.



Diosc. Cardamine exalfacit, vrinæ mouet: estur-  
crudum, purgat lentigines, cutiq; vrinæ in facie, noctibus  
impositum, pruriginis, detractum.

GAL. Nasturtio simile quoddā gustu præfert:  
cū succum semen, tertij ordinis exalfacientij &  
desiccantij, humidum adhuc & vinde, secundi.

APUL. Herba Nasturtij, succum naribus ini-  
cies, caput deplet & de phlegmate purgat. Hoc Na-  
sturtium non feritur, sed per se nascitur circa ima  
parietum. Semen tritum & cū adipe anserino mi-  
xtum, albitionem furfuris de capite eiiciet. Herba  
& pulegium ex aqua decoctum bibere dato, emen-  
dabit & discentiet cruditatem. Ad strumas, herbam  
cū lometo trita super strumas impones, superposi-  
to folio oleris. Ad furculos sanandos, herba nastur-  
tium cum fermento imposito: concoquit & sanat.

CARDA-



## CARDAMINE altera, sine Sisymbrium Cardamine secundum.

Iberis & agriocardamum Eub. Germ. Gauchblum & wildeckrefz. Flos cuculi Dod. alia ab Armoraria pratensi.  
Belg. cleyn waterkerfje, & Coecktoey bloeme. Gal. passerage sauvage, à caloris acrimonia.

Exit altera Cardamine pradis ydis Angliæ, Belgij, Germaniæ, & frigidarum regionum, ubi Cardamine, quam foliis imis refert. In pedali caule v. plurimum singulari folia exiliora Nasturtij hortensis siue Cardami similia. Flores lactei purpurâtes Erucæ, aut Napi, Cardamines prioris maiores, gustu, vti vniuersa plantæ, & viribus Sisymbrij referentes. Clysteribus & cataplasmatibus, Lepidij, Nasturtij, Sinapi, & congenerum herbarum ritu, coxendicorum, commode misceantur.

## CARDAMINE trifolia.\*

NASTURTIVM. Advers. pag. 72.  
Gal. Narbonensibus Nastort. i. nares torquens,  
ab effectu. Hisp. Mastuerco.



\* Quibusdā Belgij cultioribus & stirpiū dictioribus hortis repertu facilis Nasturtij Cardamines gustu & facie plantula palmatis, folio quadamtenus Sisymbrij Cardamines, sed positu terno Oxys Pliniane ritu, humi procubēte. Flos in pediculis albus Isopyri vulgaris aut Cardamines. Radix multū fibrosa.

## NASTURTIVM.

DIOSC. Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre, excalfacit. Stomacho aduersatur, aluum turbat, tinea excutit, lienem imminuit, partus \* exanimat, menses cit, venerem stimulat. Sinapis & erucæ simile est. lepras & imperigines absterget. illud cum melle lienem extenuat, fauos expurgat, pulmonum vitia extrahit. Sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atque eas sissitu fugat. capillorum destituta cohibet. carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit. coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur, tumores collectionesq, discutit, emittit furunculos, illud cum muria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor.

\*fœtus in vtero necat.

GAL. Adurentis faculatis particeps est, sicut sinapi: proinde coxendicis & capitis dolores: atque adeo quodcumq; aliqd tubrificationem postulat, eo perinde atque sinapi excalfaciunt. misceantur quocq; remedijs asthma: ricorum, tanquam scilicet id quod crassos succos valenter incidere valeat: velut & sinapi: nam omnia et simile est. Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida vetò adhuc & viridis, propter aqueæ humiditatis admisionem, multo semine inferior est: adeoque sic mordacitas eius moderata est, vti cum pane ea vti liceat, ceu obsonio.

Hoc Galenicū sit cuiquē theorema vniuersale, quoties nimia caliditatem, & ariditatē veremur. Vt mur igitur virentibus adhuc & tenerioribus, pullulantibusque, quoties agri & morbi natura requirit.


THLASPI  
Draba folio.  
Aduerf. pag.  
73.



THLASPI  
Candide um-  
bellatu fbe-  
ridis folio.  
Aduerf. pag.  
75.



Albifloribus  
in hortis no-  
stris variat.



TH  
vu.  
Va  
lio.  
pag.

TH  
incan  
Mech  
ic.



## THLASPI incanum Mechliniense.

Finitimo Mechliniæ ruri Thlaspi genus alterum fruticat oleæ foliis, multisque summo diuisis hirtis ramulis, pedem & sesquipedem longis. Flos albus, & in pericarpis rotundiusculis summū caule ambientibus exiguum semen minus cæteris acre.

## THLASPI fruticosum folio Leucoij marini min.

Virgæ numerosæ sparsæ, crebribus leucoij minoribus foliis: flores candidi copiosi, & semen compressum Thlaspi parui. Radix lignosa, fibrosa, in Belgij hortis.

## THLASPI fruticosum spinosum Narbonense.

Senticosum hoc nō nisi sterilibus cauitibus rupibus prope Namausium & Monspelliū fruticat, dodrantalibus ramulis, multis alis diuisis, nonnihil spinosis & sinuosis Poterij ritu. Folia oleæ, pusilla, albida. flores candicant. Semen acre glumis occultum.

## THLASPI fruticosum alterum.



Folio est Thymbræ hirsuto, & rigido: cauliculos emittit plures, pedales, fraticis specie, è quorū summis flores albi, & semina in compressis folliculis.

Dioscor. Calfaci, bilem per superna & inferna Sanguinolenta euacuando purgat, acetabuli mensura potum. Ischiadicis in clystere infunditur. Potum sanguinem ducit & interiores abscessus rumpit. mensis cit, & fetus necat.

O 3

BVRSA

&amp; Plin.



BURSA pa-  
floris.



BURSA pastoris. Aduers. pag. 76.

Pastorea bursa trita carpis imponitur, addita plâ-  
tagine ad tertianas spumas, purgato prius corpore.

RESEDA maxima, eiusq; varietates. Aduers. pag. 76.  
Perperam Pucumpon Angli.



CAKILE Se-  
rapionis.  
Aduers. p. 77.

Screnè pur-  
gare asserit  
Anguillara.



RESEDA varie-  
tates è sola magni-  
tudine.

Maiores foliis, florib; & cau-  
liculis bicubitalibus, & ter-  
num cubitorum duntaxat va-  
riar, præsertim maxima, quæ  
elegantie studio apud Belgas  
in hortis feritur, à superiore  
tortilibus ramulis diuaria-  
tis iucundo spectaculo de-  
num interdum & duodenū  
cubitorum & foliis multifi-  
dis diuersa.

IBERIS  
l. 6. iustit



**IBERIS** *Caydamantica*. Gal. Cresson sauvage, & Passerage sauvage. Angl. Sciarica kresse, & wild de kresse. Ger. wilder kerls. Hisp. Mastuerco saluage. Ital. Nasitort saluatico. Aduersf. pag. 77.

Lege lin. 32.  
res unus nemi.  
nis.

**Diosc.** Radices calfacientes & adurentes sunt: ipsa enim Ischiadici cum salsa axungia emplastri modo utiles, quaternis boris alligata, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

**ARABIS**, sive **DRABA**. Aduersf. pag. 78.




**Diosc.** Herba cum pitisana coquitur in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonis admiscetur.

**MYAGRUM**. Aduersf. pag. 78.  
*Sesamum Cordi, & Tragi*: Matth. vero, quorundam *Sesamum*.  
*Erysimum* Gal. & Theo. h. Dod. Ger. *Flaas*  
*dottern*, & *Leindottern*.

**Diosc.** Semen contusum igni torret, perunctuq; virgis ad lucernarum lumina vinctur. Hoc pinguis scabrities corporis lenigari, atque exsoluari constat.

**GAL.** Emplasticeam vim obtinet.

**MYAGRUM**



MYAGRVM alterum Thlaspi effigie.

SENECIO, *sive* ERIGERON *Aduers.* pag. 79.  
Gal. Senecion. Angl. Groundell. Ger. Greutz  
Wurtz. Hisp. yerua cana, Cardo morto, &  
Bon varon. Ital. Spelliciosa.



Anglis & Belgis hortenſis eſt; folio paruo Narbonenſis Thlaſpi puſilli ſive Alyſſi, vel Leucoij mari-  
ni minimi. Floſculi confertim ſtipati vmbellam exprimentes, ſtellæ lutei Eryſini vel Thlaſpi, liidem  
quibus Cameline oritur natalitiis.

SENECIO, *sive* ERIGERON.

DIOSCOR. Folia cum floribus refrigerandi vim obtinent: quapropter cum exiguo vino aut per ſe illita folia, te-  
ſtium, ſedisq; inflammationes ſanât: quin & ex manna thuris cum reliquis vulneribus, tunc neruorum quoque medentur.  
Illi per ſe cū aceto pappi idem munus præſtant. Verùm recentes epoti, ſtrangulant. Totus autem caulis ſi coctus in paſſo  
potui detur, ſtomachi dolores à bili contractos perſanât.

Miſcetur fomentis lithotribis & vterinis patietariæ modo. Hyeme folia acetariis miſcentur.

PLIN. ſubdit. Lanugo eius cum croco & exiguo aquæ frigidæ trita illinitur epiphoris. Toſta cum  
mica ſalis ſtrumis. Erigerum quoque cum farina ſive manna Thuris & vino dulci, teſtium inflamma-  
tiones ſanât.

ÆGIN. Refrigerante & modicè diſcutiente mixtis conſtât viribus.

APUL. Herba ſenecion tuſa & ſubaſta cum axungia vetere, & impoſita, mirificè ſanât vulnera.

Ad vulnera, ſi mane eam adorans ex terra colligas, & tundas cum axungia vetere, in plagam im-  
poſita, plagam aperit & expurgat. Item ſi eam ſimili more poſt meridiem colligas, & cum axungia ve-  
tere miſceas; impoſita plagæ, aperit & perſanât. Piſtata cum axungia vetere, pedum dolorem tollit, &  
neruorum potentiſſimè ſanât. Floſculi cocti bene & ſubaſti, imponantur vt malagma ſtomacho, ſum-  
me dolorem ſanant.

Ad lumborum & coxarum dolorem. Herba ſenecion per ſe trita & ieiuno in potu data, validiſſimè  
prodeſſe fertur. Ad podagram. Trita cū ſale, & vt malagmatis genus appoſita pedibus, æque proficere  
certum eſt. Si quis ferro percuſſus fuerit, herba tuſa cum axungia vetere ſine ſale, & facta quaſi cerotum  
& in plaga impoſita, faciliſſimè vulnus ad ſanitatē perducit.

INCANA SENECIO.

Syluoſis & ſabuloſis agrorum marginibus Erigeri ſpecies tomentofa oritur: à vulgata cæteroquin  
non ita diuerſa, Brabantino agro & Neruienſi familiaris.

ERIGERON



*ERIGERON tomentosum alterum.*

Calidarum regionum hæc Senecionis species indigena. Rarè in Belgio nec nisi in horto D. Brâcionis reperitur folijs altioribus lacinijs ferratis, Serridis sylvestris, tomentosis: radice, flore, & paposa cæsarie Senecionis.

*IACOBÆA Senecio Aduers. pag. 79.*

*Ital.* Carduncello maggiore. *Senecio* siue *Erigerum maius*.

Ad anginas, tonsillarumque inflammationes perutilem gargarizaram experientia docet. vulneribus & depascentibus ulceribus fistulosis medetur: & ne serpani, cohibet decocto & succo.

*BOTRYS. Gal.* piment & millegrains. *Hisp.*

bien granada. *Ital.* lisue *Aduers.* pag. 80.

*DIOSC. Orthopnæas lenis in vino pota.*

*Aegin.* Planta insigniter odorata est; quæ cum vino pota, non nisi recta ceruice spirantibus, quos orthopnicos appellant, opitulatur.

Hac de re commendatur & primam laudem sortitur Zigero Cobelgirs D. seniori Medico Antuerpiano experientissimo. Menses & vrinas mouet, tenuitate partium, incidendi & abstergendi vi.



*SERIS sylvestris, Ambubeia. Hisp. Almerones & Cicoria. Ital. etiam Tornasole. Leg. Ang. Wild Cichope. Ger. Wilde wegwarten, quas viarum custos. Aduers. pag. 82.*

*SERIS sativa. Ital. & Hisp. Cicoria domestica, Aduers. pag. 82.*



## SERIDES.

*Diosc.* Viraque refrigerat, & adstringit. Stomacho vtilissima\*. alium sifit cocta, si cum aceto assumatur. † sylvestres stomacho meliores. quandoquidem astuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. cardiacis, per se, aut cum potentia, vtiliter illinantur. podagris & oculorum inflammationibus auxilio sunt. herba cum radice illita, percussus a scorpione subuenit. ignisfuro cum potentia medetur. succus cum cerusa & aceto, valet ad illius eorum quæ refrigerationem desiderant.

\* item iecinori & renibus *Plin.*

† Vrinæ tormina soluit *Plin.*

*Plin.* Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Regium morbum in multo si sine febre sit, discutit. Vesicam iuuat. Mulierum purgationibus quidem decoctum in aqua adeo prodest, vt emortuos partus trahat. viles quibus genitura effluit, alterno dierum potu.


*Simeo Sesehus.*

Obstructiones auferendi vim habet, vt nullum aliud olus. sanguinis fluorem sedat, & inflammationes iccoris discutit, & icteros iuuat. Iecur proprietate quadam roborat. Mediocriter somnum inducit. Veneris appetentiam extinguit, & semen genitale, in ijs qui frigida habent temperaturam, minuit. Semen febres ex flaua bile ortas iuuat: at lieni nocet.



**HEDYPNOIS** Plin. *Aphaca* Theoph.  
Aduers. pag. 82.

**CHONDRILLA** *caerulea*, Cichorij fol. laciniosis folijs: Gallis  
nonnullis Laiteron. Ital. Terracrepolo. Hisp. Lietugas &  
Liechugas dentre los planos. Aduers. pag. 84.



**HEDYPNOIS.**

lin. Stomachum dissolutum adstringit cocta, crudaque sistit aluum; & dysentericis prodest magis cum lacte, Rupta & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat.

**CHONDRILLA.**

**Diosc.** In ramulis gummi Mastiches simillimum magnitudine faba inueniri solet, quod cum myrrha tritum, & limbo appositum instar oliua seminarum menses trahit. Fusa cum radicibus herba adiecto melle diuiditur in pastillos; qui intro admissi virilagine emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit: si inuncta succo acus pilis admoveatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decocta in vino, aut per se potus, alui sistit.

Inrybis & Lactucis Gal. refertur.

**CHONDRILLA altera** **Diosc.** Dens leonis **Dod.**  
cui tamen radix longa non rotunda subest.

**Diosc.** Aliud habetur Chondrilla genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum: caulem succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescente, succosa. cuius & caulis & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos refectit. Nasctur in laetis & cultis.

*CHONDRILLA* rara purpurante flore, semine  
nitido deciduo: an *Chondrilla* altera Matth. Belg.  
*Crupina*, detorto vocabulo à *Cruppen*, hoc est  
recpere, quia semen manu contrectatum  
se subducit ac prorepit.

*VERRVCARIA* *Chodrilla*, *Chondrilla* prior Diosc.  
Clusij, *Zacyntha* Matth. Ital. *Cichoria verruca-*  
*ria*, & *Mazza di Caualliero*, & *Maz-*  
*za ferrata*. Angl. *Gumme*  
*turcozzj*.

Hæc anony-  
mos in.  
Advers.  
descripta &  
deprauata  
pag. 189.  
proximè Su-  
perbam re-  
centiorum,  
delenda.



Hæturia, Syriæ & agri Norbonensis collibus non procul à Lupo monte plantula nō inelegans exst,  
quæ Chodrillis referenda videtur. Dodrantes & sesquipedales geniculatos cauliculos erigens, su-  
periorum chodrillorum consimilium; nec flores ita dispares gerit, purpurantes in capitulis squam-  
mulis cōpactis Chondrillæ purpuroceruleæ Belgarum. Sed semen laceæ aut Carthami syluestris, ni-  
grum, pellucidum.

*VERRVCARIA Chondrilla.*

Folia habet crassiora Hieracij, incana, circinatis Eruce aut Erysimi lacinijs, sed minus profundis in-  
multifidis dodrantalibus & pedem æquantibus cauliculis glomerata, & veluti torulis canulata semi-  
num capitula clauam exprimentia: ideo Mazza di Caualliero & Mazza ferrata Italij dicitur, & *Za-*  
*cyntha verrucaria*, è *Zacyntho* Græciæ delata. Flos luteus, parvus Hieracij, radiatus, simplex,  
pappi diffuens. Vniuersa planta succum fundit fuluum, qui aliquando prægnat in ipsis caulicu-  
lis, ideo vocata Anglis *Gumme turcozzj*.

Præmoris à cane rabido eius decoctum vtiliter exhiberi tradit Clusius.



MONSPELLENSIVM dens leontis *Asphodeli bul-*  
*bulis*, an *Chondrilla altera* Diof. *Aduers* pag. 83.  
*Cichorium Constantinopolitanum* Matth.



DENS leo-  
 nis vulgi.  
*Aduers*, pag.  
 84. *Offic.*  
*Taraxacon.*  
*Corona*, &  
*caput Mona-*  
*chi*. *Chondril-*  
*la Galeni* An-  
*gnil.* *Ital.* *Pi-*  
*scia* *leto*, &  
*Dēce dicane*,  
 & *Piūo dicā*.  
*Hisp.* *Dien-*  
*te deleon.*  
*l. 19. lege*  
*Chondilla*.  
*Chondrilla al-*  
*tera* *Dodo-*  
*ngi*.  
*Succus lipp-*  
*rudinibus* &  
*oculorū inā-*  
*mationibus*  
*medetur.*

IXOPVS Cordi.

*Seris Longifolia* Muton. an *Chondrilla altera* Diof.

Cord. Intybacea herba est: ea numerosa emit-  
 tit à radice capite folia, longitudine dodrantali, la-  
 titudine vnciali, acuminata, & vndique per ter-  
 ram strata; partim etiam in obliqua erecta: è quo-  
 rum mediò vnus atque alter aut hōnunquā plures  
 exeunt dodrātales, & interdum pedales & cur-  
 bitales coliculi, teretes tenerique: in quortum ca-  
 cumine, circa veris medium singuli sunt orbicu-  
 lati flores multis luteis capillamentis vni calicē in-  
 sidentibus, constantes: qui deinde in pappos re-  
 soluti auolant, vnā cum oblongo & inferius an-  
 nexo semine. Radice nititur perenni, pedali duum  
 digitorum crassitudine, foris nigra, intus candida,  
 carnosa & fungosa: quā præcisā copiosum mittit  
 liquorem, colore in lacteo modicè cinereum, qui  
 digitis tractatus aut gustatus, substantia visco simi-  
 lis fit, & in longum ductilis, siccatus verò rufescit,  
 paulatimq; nigrescit. Tota herba gustu dulcis est,  
 chōdilla prioris modo. Liquor nō ignauiter etiam  
 adstringit, o.lore verò nullo commendatur. Nasci-  
 tur editis, ar. ricis, montanis locis.

Hæc quam scitè & affabrè deliniat Cordus plu-  
 rimam fudit cliquosus Nerviorum ager iuxta rupes  
 & macerias.



INTYBVM  
 facium lati-  
 folium, En-  
 dia & Sca-  
 ri la offic-  
 rium.  
*Aduers* 85.

lege Angl.  
 witte exdis  
 ue. *Hisp.*  
 & *Int* *Endi-*  
*nia* & *Scar-*  
*ria* & *lin.* 9  
 pag. 89. & *ba*  
*contingent.*



**ENDIVIA**  
vulgatior of-  
ficinarū, Se-  
nis domesti-  
ca altera la-  
tucina  
Diosc. amara  
angustifolia.  
Aduers. 86.  
Lactuca syl.  
Fuchf. &  
Marth.



**SONCHVS**  
tenerior acu-  
leis ASPE-  
RIOR aut  
horridiuscula  
Aduers. 87.

Deme mino-  
ribus. l. 19. &  
que sequun-  
tur. & leger  
vni folia la-  
ciniosa Dēis  
Leonis, alteri  
vero lactuca-  
cea sunt, Di-  
placi magni-  
tudine, &c.



**SONCHVS** lauis tenerior latifolia. Aduers. pag. 87  
; Hisp. Corayas. Ital. etiam Lactucella, Cripini, &  
Lactuosoli. & Gallia, Palais de lieure.  
Angl. Cicerbita.



**Diosc.** Viriusque vi refrigerat. modicè adstringit.  
vnde afluanti stomacho & inflammationibus illius profuit.  
Succus eorum stomachi rashes forbitione mitigat. lac eli-  
cit. in vellere appositus sedis, ac vulua collectionibus opien-  
tatur. tam herba quam radix illa vibratis à scorpione icti-  
bus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latius  
constans folijs, caulem in ramos exeuntem folia distin-  
guunt. sed ad eadem pollet.

Gal. subdit, Terrestre eius temperamentum  
postea quàm resiccatus fuerit, redditur, modicam  
habens caliditatem.



*SONCHVS alter folio profundi lacinijs sinuato hederaceo.*



*SONCHVS alter folio lacinijs sinuato hederaceo.*

Altius laciniata folia habet, quorum summa Hederae folium referunt, aeterna parte rubentia, nullis spinulis hirta: flos Endiviae sylvestris, caulibus cubitalis; in ruderibus & ruinosis Nerviorum, & Brabantorum frequens: radice fibrosa.

*HIERACIVM minus Aduers. pag. 83.*

*Ang. Gawke web.*

*Diosc.* Refrigerandi vim habet & modice adstringendi, ideoque astuanti Stomacho & inflammationibus illi-  
tium prodest. Succus erosionem Stomachi in sorbitione mitigat. Herba ipsa cum radice illius scorpionum ictibus auxiliatur.

*HIERACIVM minus praenotata radice.*

*Aduers. pag. 83.*

*Diosc.* Vim suam ad eadem ad qua superior, im-  
pendit.

Plin. Succus sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum: arcet nubeculas, cicatrices adu-  
sionesque omnes, praecipue caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Item suc-  
cus aluum purgat in posca potus ad duos obolos.

HIE-



HIERA-  
CIUM mi-  
nus præmor-  
faradice. Ad-  
uert. 88.

Videtur La-  
gopus & la-  
ctuca Lepo-  
rina Tragi  
& Apulci.



HIERA-  
CIUM Sa-  
baudum.  
Aduert. pag.  
88.

Marcinibus  
nihil frequen-  
tius agri An-  
tuerpiani.



HIERA-  
CIUM mi-  
nus præmor-  
faradice. Ad-  
uert. 88.

HIERA-  
CIUM mi-  
nus præmor-  
faradice. Ad-  
uert. 88.



*HIERACIUM Narbonense falcata filiqua, Calendula semen & pedem alauda  
experiente.*

Notissimum MonsPELLIENSIBUS istud: vbi inter fegetes & in agrorum marginibus Boito-  
netto finitimis luxuriat, folijs oblongis Hieracij vel Chondrillæ marinæ: gracilibus alis multis  
diuisis cauliculis, & floribus luteolis Lampfanæ similibus: semen in falcatis paruum calendula ritu  
exilibus corniculis radiatum ab vno petiolo aptis, alaudæ cancri vel aranei pedes præferentibus.

*LACTUCA sativa folio Scariole, Germ. Lattich,  
Belg. Aertawe. Gal. Laiçtues. Angl. Lettuce.  
Hisp. Lechuga & Lettuga. Ital.  
Lactuca. Aduers. 89.*

*LACTUCA capitata crispis Brassicæ folijs.  
Aduers. pag. 90.*



*lege insensita.*

**Diosc.** *Lactuca sativa*, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur. somnum conciliant. al-  
num emolliunt. lac euocant. verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illoræ esse prodest. Epotum semen\* assiduas  
libidinum imaginationes in somno, compescit, & ventri refragatur. ipse verò frequentiores in cibo, claritati oculorum  
officiunt. inflammationibus & ignibus sacris opitulatur. maria conduntur. cum in caulem exierunt, vim quan-  
dam nanciscuntur succo aut lacti sylvestris lactuce similem.

\* quia genitura profluuium cohibet Gal.

**Gal.** Humidum & frigidum olus, non tamen extremè; siquidem edendo non foret, verum ma-  
ximè secundum aquæ, vti sic dicam, fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommo-  
dum est, & ad parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edu-  
lum sitim arcens.

**Plin.** subdit: Frequentior in cibo vsus claritati oculorum officit.

*LACTUCA sylvestris. Hisp. Lechuga saluage.*

**Diosc.** *Sylvestris lactuca sativa* similis est. amaro gustu est, & viribus, aliquantum papaueri similis. vnde  
lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, petus in aceto nullo succus ad duos obo-  
los.

† Gal. teste.  
\* Gal. eadem

los. argentea† caliginemque repurgat. contra adustiones efficaciter\* illinitur, cum lacte mulierum. in summa, fo-  
nium allicit. doloris leuamentum præstat. menses trahit. contra scorpionum & phalangiorum ius bibitur. Semen, non  
aliter quam satius, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venetrem arcet. Succus ad eadem valet, sed viri-  
bus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolutum.

LACTUCE syl. varietas.

Eadem agro Romano folijs nigris maculis variata visitur, qualem Coldenbergij nostri ditissimus hortus alit.

ARVL. Ad oculorum caliginem. Dicunt aquilam quum in altum volare voluerit, prospicere re-  
rum naturas, lactucæ syluaticæ folium euellere, & succo eius sibi oculos tingere, & maximam inde  
claritudinem accipere. Herba igitur lactucæ syluaticæ succum cum vino optimo vetere & melle  
† acapno, quod sine fumo collectum est, mixtum in ampullam vitream condito, & eo vtaris, sum-  
mam medicinam experieris.

† Alias Atti-  
ca.

BRASSICA vulgaris satius. Germ. Roel. Angl. Heale  
& cole. Gal. Choux verds ou colletz. Hisp.  
Colthes. Ital. Cauole liscio. Aduers. 91.

DIOSC. Brassica satius aluo est idonea, si modo  
leuiter feruifacita edatur. nam percocta aluum fistit. sed  
multo magis bis cocta, aut quam lixiuio coquitur. stoma-  
chum autem male habet. acrior est assuta. in Aegypto  
propter amaritudinem non estur. caculentibus, & tre-  
mulus esse prodest. summo cibo sumpta crapulam dis-  
cutit, & vini noxam restringit. melior stomacho cyma:  
sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. ea condita sto-  
macho inimica est. aluum contrahit. Crudus succus cum  
nitro & iride deuoratus, aluum emollit. cum vino quoque  
epotus viperarum moribus auxiliatur. cum feni graçi sa-  
rina, podagris & articularum vitij illinitur. prodest &  
sordidis vlcibus, & vetustis, illitus, caput purgat na-  
ribus infusus. menses extrahit, cum loliacea farina inditus.  
Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt in-  
flammationibus,† tumoribusque. epiphyridas, ignem sa-  
crum, lepraque sanant. carbunculos ex sale rumpunt. flu-  
entes capillos retinent. cocta, addito melle, aduersus† de-  
pascencia vlcera, gangranasque valent. lienosisque, &  
aceto cruda profunt. manfa, deuorato succo, resusam vo-  
cem instaurant. Decoctum eius potu aluum & menses  
ciat. Flus post conceptionem in pello subditus, partum ab-  
ortu vitiat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto na-  
scitur, potum tineas repellit. in amidota theriaca additur.  
faciei cutē leniginisque expurgat. Virentes cauliculi cum  
radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos  
laterum dolores mitigant.

Si modo leuiter feruifacita. ] succus eius aliquate-  
nus purgat: corpus verò eius ventrem fistit.

Caculentibus ] cum Attico melle angulis solum-  
ratis. Plin.

Cibo sumpta. ] antecedente in cibis caueri ebrie-  
tatem, postea sumpta crapulam discuti. Plin.

† Quia quiddam in se absterforium habet. Gal.

Lepras. ] Lepras & pforas cum alumine rotun-  
do ex aceto. Plin.

Capill' retinent. ] cum alumine & aceto. Plin. Lienosis. ] ex vino albo per dies 40. sumpta. Plin.

Vocem instaurant. ] Simeon Sethus idem. In Aegypto ] quanto ea siccior scilicet temperatura. Gal.

Lentiginis. ] & quæcunque alia quæ modicam absterfionem postulant, adiunat. Gal.

Cremati ] Caules brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iant vim  
adurentem participant: hac ratione ei veterem adipem commiscantes, ad inueteratos laterum dolores,

& si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Gal.

Brassica esculenta desiccandi vim habet; tum esa, tum foris imposita, non tamen etiam admodum  
acrem: alioqui & vlcera glutinat & mala vlcera sanat.

Gal. Semen lumbricos interficit. Sanè amaræ qualitatis particeps semē est, sicut videlicet omnia alia  
medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt.

† Depascencia vlcera, gangranas. ] Plin. etiam carcinomata quæ nullis alijs medicamentis sanari  
possunt, foueri prius aqua calida iubet; & bis die tritam imponi. Sic etiam fistulas eluxatas &  
tumores reuocari, quæque discuti opus sit. Insomnia etiam, & vigilias tollere decoctam, si ieiuni  
edant quamplurimam ex oleo & sale, cumino, polenta: si ita sumatur sine pane magis profu-  
turam.

eg. l. 8. pag.  
91. medullosa.



Gal. & Pil.





**BRASSICA**  
florida bo-  
tryus. Bel.  
**Blornhoe**,  
len. Gal.  
Choufory.  
Ital. Caolo  
fiore. Ad-  
uent. 91.



turam. Inter reliqua bilem detrahit per vinum nigrum pota. Quin & urinā eius qui brassicam esitarit, asseruari iubet; calefactamq; nervis remedio esse. Auribus quoque ex vino succum brassicæ tepidum instillari suadet; idque etiam tarditati audientium prodesse asseuerat; & impetigines eadem sanari, sine vlcere. Græci biles detrahere non percoctam putant; item aluum soluere; eandemque bis coctam siltere: vino aduersari, vt inimicam vitibus. Lactis vbertatem cibo facit Hippocrati. Cōtra singultus cū Coriandro, anetho, melle, pipere & aceto. Illitam quoque prodesse inflammationibus stomachi. Sugillata verò & alios liuores purallita. Epicharmus testium & genitalium malis hanc vtilissimè imponi asserit. Efficacius eadem cum faba trita. Item conuulsis cum Ruta. Malum & melancholicum succū procreat Simeoni Sertho. Visum hebetat, & somnium per contraria infomnia inturbat. Cocta cum pingui carne plurimum noxæ atque vitij amittit.

\*Gal. scilicet  
& alij.

**BRASSICÆ sibirica varietates.**

Floridæ Brassicæ vice institores & holitores Itali geminam Brassicam ad nos miserunt: quarū prior foliorum neruo medio tenus laciniatas incisuras Artemisiæ, Eryngijue campestris, habet.

Alterius verò sibirica magis, laciniosa minus, sunt folia. Vtramque alebat sed ulus & perbonus cuius Antuerpianus Ioānes Douue, aliās Vogelsang, stirpinum, fruticum, & arborum per tissimus & amantissimus.



BRASSICA  
fimbriata.



FEYATU-  
bia. Aduerf.  
P. 294.



BE  
H  
das  
tas  
pag

BE  
bra  
tion  
verf



BRASSICA. fl. DIOSC. Marina monospermos. Advers. pag. 92.

DIOSC. Cyma in laxius cocta, ori non insuavis. Folia illius vulnera conglutinant; & inflammationes; tumoresque discutunt.

APVL. Ad tumores quoscunque. Herbae brassicae sylvarum folia cum axungia vetere pisata, & comixta quasi maligna induces linteolo grosso aut in aluta, & impones; sanabitur. Ad lateris dolore. Herbam brassicam sylvarum impones ut supra. Ad podagram. Herbam brassicam conficies ut supra. Quod si vetustissimus dolor fuerit, eo magis efficacior erit salus.

BETA. Advers. pag. 93.

DIOSC. Nigra coquitur cum lenticula, ut ventrem efficacius sistat, multoque magis radix. Candida alio virilis est. Vtraque verò propter nitrosum humorem quem habet, mali succi est. Unde succus earum cum melle naribus induritis caput purgat. Aurium etiam doloribus auxiliatur. Decoctum radicum & foliorum, furfures & lentes deterget. Perniones foris mitigat. Crudus solys vitiliginis nigro prius perfrictos, alopecias prurientes, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque, cocta medetur.

leniter coquitur Beta Plin. addito aceto, ut ventrem molliat, validius cocta fluctuationes stomachi & ventris sistit. Ad sistendum videtur melius convenire ex aceto perecocta.

efficacius) ob iunctam adstrictionem aliquam. Gal. exurgendo. Gal. infusus ijs. Plin. eadem Plin. Alopecius] crudam illinuntur Plin.

Gal. Nitrosc facultatis est particeps, quia tum extergit, tum digerit, & per nates purgat. Ceterum cocta nitrositate omnè exuit, fitque facultatis phlegmonis aduersa, leuiter discutientis. Porro ad detergendum digerendumque validior est beta alba: ideo aluum ad excretionem stimulat, & nonnunquam stomachum mordicat ijs quibus ille sensilior obtigit. Huius ceterum aliorum olerum exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quam malua, aptius accommodatur; magis autem ubi cum sinapi estur Sinapi nostri hodie cum Zingibere.

Plin. Candida beta cocta, & cum allio crudo sumpta; contra tineas, ciet vrinam. medetur dyentericis iniecta, & morbo regio. Dentium dolores sedat illius succus: & contra serpentium ictus valet; sed radices duntaxat, peritonibus occurrit decocta. Alba succus epiphoras sedat, fronte illita: aluminis paucò admixto, ignem sacrum.

BLITVM. Hist. Bredos, &amp; Bledos.

Ital. Biedoni, Blito, &amp; Gelosia.

Advers. 94.

BETA Sylvestris spontanea marina.

Sabuletis maritimis angustiore folio & crassiore sponte oritur sylvestris Beta nigra, gustu falso & nitroso, ceteroquin haud abfimilis.

## BLITVM.

DIOSC. Estur oleris modo, alio virile: nullius in medicina usus.

Plerique hodie Galli pharmacarij Blita cum Beta clysteribus ex medicorum præceptis miscent.

Plin. Ventrem adeo turbat, ut cholera faciat aliquibus, stomacho inutile. Dicitur aduersus scorpiones porum è vino prodesse, & clavis pedum illini. item lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti illo cibo putat.

Gal. Blitum olus est esculentum, humidum, frigidaque temperatura in 2° excessu. Qui porro Atriplicis, Blitumque gustabilem qualitatem intelligit, brassicaeque saporis commeminit, lactucam in Brassica, ac horum olerum in medio esse non differtur. Siquidem illa egregie desiccat: hæc contra planè humida aquosaque sunt. Quapropter non ex solo oleo, garoque, sed addito aceto sapius meliusque assumuntur; alias namque stomacho infesta sunt. Diximus autem eiusmodi olera nonnihil assurgendam aluum momenti afferre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricitatem sortita sint. Alioquin id ipsum periculum exiguum est, quoniam nulla ipsi aeris nitrosae adeest qualitas, quæ aluum ad excretionem irritare possit.

Q3

AMA-





AMARAN-  
THVS. Ad-  
uers. 95. per-  
petua Circa  
Tago.  
Pals x fue  
flumma  
Tioph. An-  
gul.

Amaranthi re-  
frigerant, ad-  
stringunt, &  
siccant.

leue semen &  
flores.  
itidem. om-  
nium rariissima.



AMAR-  
THVS  
gufti-  
limpli-  
cata pa-  
cula.

AMARAN-  
THVS maior  
floribus pan-  
niculosis spi-  
catis. Bitum  
maius Matt.  
Aduers. 95.



AMAR-  
THVS ho-  
tericeis, li-  
guineis, re-  
culacis flo-  
bus, hilar-  
re alpe. 95.  
Aduers. 95.



AMARANTHVS *angustifolius simplici spicata pammicula.*

Ab imo summo tenus singulis spicatis floribus coccineis saturè puniceis luxuriat. cuncta reliqua non dissimilia, sed folia angustiora, exiliora. Hic primum nobis indicatus & communicatus ab illustrissimo & nobilissimo viro Duce Arenscotio.

AMARANTHVS *Tricolor. Celosia Tragi.*  
Aduers. pag. 95.



ATRIPLEX *sativa. Ital. etiam Reppice, & Hisp. Armuelles. Aduers. pag. 96.*  
*Chrysolachanon, siue olus aureum. \**



\* DIOSC. Estur olerum modo elixum; alium molli: crudum vel coctum illitum panos discutit. Semen eius potum cum aqua mulsæ morbum regium sanat.

Morbum regium. ] Semen eius abstergentis est facultatis; proinde ad morbum regium ex iecoris obstructione ortum vtilis est Plinio & Galeno.

Gal. Frigida 1º. ordine, humida 2º. Celeriter ob lubricitatem ventrem permeat: parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phygetis quidem incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac veluti feruentibus, hortenſis; videntibus verò, declinantibus & indureſcentibus commodior est sylvestris.

PLIN. subdit: Coquitur difficile. Stomacho aduersatur, lentigines & papulas gignit, vulvarum vitijs infunditur cum beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Vtiliter illinitur podagricis. Vngues scabros detrahere dicitur sine vlere. Sunt qui dent semen, arterias & tonsillas nito addito perficerent, alium moueant, cocto aut per se, aut cum malua aut lenticula concitantes vomitiones.

\* Vomitiones. ] semen drachmarum pondere vel trium vomitiones molitur. Serap.

Sylvestri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur medicina.


PRESANSERINVS, *Atriplex sylvest.*

Pedem Anserinum vicem solani hortenſis supplere ait Fuchl. Aduers. pag. 97.

ATRI-




ATRIFLEX  
fyl. vulgarior  
sinuata. Ad-  
uct. 97.



lege Amph. x.

ATRIFLEX  
maritima re-  
pens. Ad-  
uct. 97.



Ar-  
syl-  
re-  
ri-  
At-  
Ma-  
u-

Ar-  
olid-  
ria-  
oler-  
fuit-  
Ad-

POLYS-





TOTA  
BONA  
Spinaciae fa.  
cie. Aduerf.  
pag. 97.



ATRIPLEX  
fyl. Polygo-  
ni aut Hel-  
xines foliis.  
Aduerf. pag.  
98.

## POLYSPORON Cassani Bassi Anguillare.

A feminis florisque muscoli botrydi nō dissimili fatura, quibus onusti numerosi cauliculi, polyspermon vocata videtur. sed cauliculi sesquicubitales, exiliores & numerosiores: imis foliis Solani, aut Atriplicis syl. summis minoribus multo & delatioribus. Hac mirè capiuntur pisces, auctore Cassano Basso, cui subscripsit Anguillara experimento nixus. Radix alba gracilis.

## ATRIPIEX Halimoides.

Æstiuæ est, caules edens ternum & quaternum cubitorum; & folia Halimi: flores & semina racemosa cæterarum more. Mihi primū vīsa in viridario Ioannis Muroi Nerviēnsis pharmacopæi peritissimi. Semitas & rudera amat.

TOTABONA, spinacia facie. Aduers. pag. 97. Rumicis tertium genus Fuchf. & Turneri secundum Belg. Lammcken's oogen, & goede Heyndrick.

## HELIXINE siue Parietaria. Aduers. pag. 98.

DIOSCOR. Folia<sup>a</sup> refrigerandi spissandiq; naturam habent, quæ ex causa sanant illius sacros ignes, adusta, condylomata, panosincipientes<sup>b</sup>, tumores, inflammationesq;. Succus eius cum cerussis, ignibus sacris, & vlcibus quæ ferpunt, commodè illinitur, imponiturq; podagræ cum hircino adipe, aut cerato cyprino. veterem rufum emendat<sup>c</sup> instar cyathi haustus, consillus<sup>d</sup> inflammationem sentientibus vtiliter & gargarizatur, & oblinitur. aurium dolorem cum rosaceo instillatus lenit.

<sup>a</sup> Gal. Vis ei inest abstergerendi, & leniter constringendi, cum humiditate subfrigida.

<sup>b</sup> Gal. & Plin. In initio & augmento vsque ad statum. <sup>c</sup> Idem Plin.

<sup>d</sup> Guttura incipientia turgescere Plin.

Gal. subdit: Incipientibus etiam phygetis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum iis qui diutina tussis vexantur, illam exhibuerunt. Evidens certe extergendi experimentum præbet in vasis vitreis.

Exerit alopecias & impetigines Aëtio, priuatim assidue illita. Sedis hæmorrhoidas aperit: fistulis medetur, & sinus cohibet tria, cum modico sale apposita.

Hæmorrhoidas conficatas, extergendo aperit, Clystere, decocto & stillatitia epota urinas ciet: calculos terit & pellit.

APVL. Ad podagram. Herba perdicæ coquitur in aqua, & ex eadem aqua fouebis pedes vel genua, deinde ipsam herbam tussam cum axungia impones pedibus panno indutam, vel super genua, sanabit mirè.

PHYLLON mas seu Arrhenogonon, & Theligonon femina. Aduers. pag. 99.

DIOSC. Arrhenogonon potu, masculi sexus sacre partus, vt theligonon feminei proditur. Horum Cratenas confutit<sup>e</sup> author est: sed huiusmodi historia tenuis, mihi produxisse visum est.

In ph  
Theop  
100  
fuden  
Theop  
denat





MERCVRIALISM. *Aduers. pag. 100.*  
Hisp. Mercurial.

MERCVRIALIS *semina.*



DIOSCOR. Vtraque in oleribus manditur: ad alium ciendam\*, cocta in aqua epoto iure, bilem aquamq; detrahant. Idem Gal. trahit. Constat ut mares gignantur hunc facere: ut semina, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoveantur.

*Mares & semina gignantur*] Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edantur. Plin. ut folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo, altero die purgationis mulieribus per triduum; quarto die à balneo coire eas. Hipp. miris laudibus in mulierum usu prædicauit illas. Easque ad hunc modum adhuc medicorum nemo novit. Ille eas vulvæ cum melle vel rosaceo, vel irino vel lirino admovuit. Item ad ciendos menses, secundasque; hoc idem præstare potu fortique dixit. Instillavit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Aluo folia imposuit; epiphoris, stranguriæ & vesicæ. Decoctum eius dedit cum Myrrha & thure. Aluo quidem soluendæ vel in febris, decoquitur quantum manus capiat in duobus sextariis aquæ ad dimidias. Bibitur sale & melle admisto; nec non cum vngula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui vtramque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt; sed stomachum lædunt.

GAL. Digerentis admodum facultatis in cataplasmate quisque esse experietur.

APUL. Ad ventris duritiam. Herbam mercurialem coques, & tritam ex passo dabis, statim detrahet, & stomachum purgabit. Aut semen eius tritum ex passo dato: idem detrahet & purgabit.

Ad menstrua cienda. Herba mercurialis cum oleo irino vel rosaceo admota, mox prouocat sanguinem menstruum. Ad epiphoras oculorum. Herba mercurialis folia cum vino albo vetere impone: Si aqua in aures introierit: herba mercurialis succum tepefactum in aurem stillabis, mox liberabis eum.

CYNOCRAMBE. *Aduers. pag. 100.*

*Gal.* Chou de chien, & Mercuriale sauage.  
*Germ.* Wildt bingekraut, & hunds-kol. *Belg.*  
 Wilde Mercurial, & bingekraut. *Anglus,*  
 Wild Mercurp. *Hisp.* Verca perruna. *Ital.*  
 Mercorella bastarda.

HELIOTROPIVM maius. *Aduers. pag. 101.*  
*Barbar.* herba cancri. *Angl.* Scorpions tale.  
*Ital.* Heliotropio.



DIOSCOR. Folia cum caulibus epota aluum ciens: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem, aquamq; detrahitis.

#### HELIOTROPIVM.

DIOSCOR. Decoctum herbae ex aqua, fasciculo manus plena, potu pituitam bilemq; per aluum extrahit. contra scorpionum ictus ex vino potum, & illud prodest. ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnam ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartanas finire: tria vero tertianas. illud semen formican-tes verrucas pensileq; & thymos, & erinacidas exiccat. Folia, infarium destillationibus, quas siva seu vocant, podagris, luxurijs, vitiliginibus illuminantur. menses ciens, partus trita & imposita pellunt.

*Aegin. eadē.  
 Lege folius  
 ocynt. & li. 23.  
 palu. 10/11  
 bina.*

HELIO-



**HELIOTROPIVM parvum** Diosc. *Heliotropium minus* Clusij. *Triclon* Plin.  
Aduers. pag. 101.



**SOLANVM hortense.** Aduers. pag. 102.  
*Cubebalum* Plin. Dod.  
Hisp. Morella, & yerua mora.



**Dioscor.** Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tinea teretesq; excutit. Pensile verrucas, quae acrochordones vocantur, cum sale illita tollit. Scorpionides herbula est, foliis paucis, semine saepe scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus praesentaneo est auxilio.  
Ad caneros depalcentes efficacissimum.

**SOLANVM hortense.**

**Dioscor.** Natura ei refrigerandi. quare folia ulceris qua serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum pollin. potentillinumur, agilopa, capitisq; dolores trita & imposita per se sanant. astuanti stomacho auxiliantur. parrotillas, cum sale detrita, illita discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera qua serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad agilopas, cum pane, infantum adustioni, quam siriasin vocant, cum rosaceo persusus proficit. in collyrio, aqua v. lous vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus. aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. succus fuluo gallinarum corallium fimo subactus, & limbo appositus, agilopis praesentaneo est remedio.

Bibitur stillatiua ad febris ardores.

Refrigerat & adstringit Gal. 2.º. ordine: medium autem absolute in humectando & exiccando.

**SOLANVM** *helleboraceum*. Aduers. pag. 102.  
*Solanum vesicarium*, quoniam vesica & calculus  
 prodest Plin. Hsp. Acarreador de sueño,  
 Vexiga de perro.

**SOMNIFERYM** *Solanum lethale*. Aduers. pag. 103.  
 an *Soporiferum* Plin. 3 Hsp. yerua mora mayor  
 y acarreadora de sueño.



**Dioscor.** *Vim vsuq; hortensis. Solani habet, verum cibis nequaquam expetitur.* \* *Regium morbum purgat, semine poto; & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatur in umbra; reconditur, ad eadem valens.*

\* *Quia iecur & viscera obstructione liberat. Gal. eadem.*

**SOMNIFERYM** *Solanum.*

**Dioscor.** *Radix cortex, in vino drachma pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adiciatur, alienationem mentis faciunt. Eadem Gal. & Plin. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillus inseritur, & medicamentis quae doloris lenamenium praebent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. radix succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.*

*Tertij ordinis est refrigerantium Galeno. Si quatuor eius drachmae sumantur, mortem inferunt: si pauciores, insaniam. Vna si foris corpori illinatur, vlcera maligna & depascentia curat; sed ad talia radices cortex optimus est.*

*Plin. Etiam opio velocius ad mortem. Praesentaneum remedium etiam ad dentes mobiles firmandos, si colluerentur: huic tamen exceptionem addidere, ne diutius id fieret: delirationem enim gigni eo. Radix trita ex oleo percussis auxiliatur.*



**SOLANVM manicum** Diosc. *Erucaefolium: an Christophoriana Herbariorum?*

**Dioscor.** Radix drachma unus pondere pota ex vino, facit species varias, imagineſq; non iniucundas, obuer- Idem Plin. ſari. ſed duplicatus hic modus, ad treis vſque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus, interimit. Remedio eſt aqua mulſa copioſius pota, & vomitione reiecta.

Radicis cortex refrigerat 2°. ordine incipiente. Gal.

**SOLANVM Somniſerum Cluſij foliis Hyoſcyami lutei.**

*Somniſerum Verticillatum Matth. Hiſp. Yerua mora que acarrea locura.*

**SOLANVM Pomiferum herbariorum.**

*Piper de Guynee vulgo, quamuis minime vrar.*



Italo ſemine in Belgij hortis, egregij viri & generoſi D. Brancionis. & Coldenbergij, folio, facie, & caule Hyoſcyami lutei ſolanum videre me memini. ſed floſculi luteoli ſummo caule bicubitali, alabaſtracula poculaue exprimentes, breuioribus petiolis, inherentes. Semen rubrum, ſolano hortenſi par in pericarpio quadamtenus Cacubali recentiorum ritu.

Malacæ in rudibus ſponte oritur Cluſio auctore.

**SOLANVM Pomiferum herbariorum.**


Nec huic diſſimile, ſed fructu ſiue pomo phœniceo, iucundiſſimo ſpectaculo, Glaucio putato, ſiue amoris pomo dicto ferè pari; folio Hyoſcyami lutei. ſolani maiori; floſculis item ſolani hortenſis, Hiſpano ſemine Iacobo Plateau Neruienſi ſtirpium auidiſſimo & perito primùm creuit penultima æſtate: Deinde in cultiſſimo horto C. viri D. Ioannis de Limoges, alias Nonnio. æſtiva eſt planta, vt hortenſe Solanum.

STRAMO-

STRAMONIVM peregrinum. Aduers. pag. 103.  
Lycopersicū Gal. Capuo-

κλάδος  
Dodon.  
Hyoſcyamus Peruanus Cordi. Nux Met. Matth. & Itolorum.  
Ger. Streh. offel. Belg. dozi appel. Ital. Paracoca.

Y. i. i. n. a. t. o. -  
n. d.



AN CACVBA  
IYM Plinij?  
Aduers. pag.  
104.  
Cyclaminos  
altera Luca  
Chini.  
Alſine repēs  
C. Cluſij.



Dioscor.

ST  
DE  
& A  
Pl  
Ita  
Ad  
10  
Ple  
cun  
Hit  
das  
dia  
fa I

Leg.  
17

Mon  
circ  
Adu  
104.  
Cycl  
alter  
Siliq  
indit  
so an  
gnofu  
in M  
Theop  
10 lb  
Anag  
Lutic  
1. Ma



## CIRCEA Monspel.

Diosc. Radix odorata, exsiccans. Nasitur in apricis, saxis, & vento perflatis. Radicis tusa pondo quatuor, in sextarijs tribus vini dulcis, per diem & noctem macerantur, potuque triduo vulvas expurgant. Semen in sorbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

Præcipitatis & ruptis etiam muliercularum experimentis, medetur.  
Floribus albis nonnuquam in Anglia variat.

## CIRCEA Lutetiana.

SOLANVM tetraphyllum, sive Herba Paris. Aconit.  
Pardalianches purpureum Fuchf. Angl. Onebertie.  
id est, unico acino. Solanum Monococcon Gesf.  
Aconitum Monococcon Cordi; ædip non  
Atticus Tragi. Aduersf. 105.



Circæa Lutetiana dixerunt plantam, Solani, Perficariæ aut smilacis folijs, in cubitali gracili, nitido colore, Xerampelino cauliculo; & flosculo racemoso, concolori albido, Atriplicis. Angliæ, Franciæ & quibusdam Belgij hortis spontanea.

MANDRAGORAS vterque. Angl. etiam Mandrage.  
Hisp. Mandragula & mandracola. Ital. Mandra-  
gola. Aduers. pag. 106.

MELANGENA, vel Mala insana. Hisp. Veran-  
genas. Ital. Melongena & Pettranciani.  
Melongena Auerrhois & Auicenna. an Man-  
dragoras. Theoph. Aduers. pag. 107.



† Etiamque  
splenis Ron-  
del. cum fri-  
gida & sicca  
fit, calidissi-  
mum & ma-  
lactis. vr  
spica, vitex  
& lacry mæ.

**Diosc.** Mandragoram, aliqui Antimalum, alij Circeā vocant, quoniam videatur radix ad amatoria cōducere. pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. Succus sit ē cortice recentis radice rufo, & pralis subiecto: qui insolutus vbi concreuerit, scilicet re. onditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantio ignatior. Delitratū radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias cauant, & desecatum in seruant. cyathoque vno vtuntur in perungulis, & doloribus, & ante sectiones vitionēque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem arram, purgat, inque extrahit. verum potu largiore, vita admittitur. medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pesus quoque emollientibus, admiscetur, semiboli pondere inditus, per se menses & partus expellit. subditi sed pro balneo, somnificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentis conuenienter oculorum inflammationibus, & collectiombus, quas vlcera citant, cum polenta allinuntur. duritias omneque, & suppurationes, strumas, & tubercula discutunt. Stigmata sine exaceratione delent, si quindis sanis diebus, sensum persententur. folia feruntur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur. strumas atque tubercula, cum aqua dissolat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit circa coctionem vinum ē cortice radice, ad hunc modum: Ternemina in vini dulcis merretam, conijciuntur. Dantur Ead ex eo termi cyathi, is qui secari aut ambiri debent, vt ante dictum est. siquidem nullo tunc afficiuntur dolore: sed vterno quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur. nem expressus ex eis succus, non experto, rubra seminum profluia sistit. Scarificat a punctis que mris, in aperta radice, erumpentibus hrysma, cauo vase recipitur. liqumentum autem succo lacteo præstantius est. sed non vbi que, vt experientia docet, radices lactum succum delubrymant.

**Gal.** Tertij ordinis refrigerantium: veruntamen & cuiusdam caliditatis particeps est; & in pomis humiditatis: proinde soporem conciliandi vim ea habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, nō tantum refrigerat; sed & deliccat: reliquum quod intus est, imbecillum existit.


#### MANDRAGORAS Morion.

**Diosc.** Alium tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta speciem enati in folijs albi mandragore, minoribus, albis, doctantibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo minor palmo, pollicemque crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa obsonare, drachma pondere deuorant, vsum rationis interciperent. Obdormi enim homo eo fere quo comederit habitus, sensus impos, ternis quaterisque, ex quo data est, horis. Ha medici vtuntur, cum siindendi, vrendique necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cū manico solanopori.



*Hyoscyamus niger.* Angl. Henbane. Hisp.  
Velenno & Meimendro. Aduersf. pag. 107.

*Hyoscyamus albus.*  
Aduersf. pag. 107.



**DIOSC.** Ambo insaniam gignunt, & soporem: ideo in communivisu damnantur. tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis rudribusque nascens, cuius occasio si non adfit, risum vsurpari oportet. niger, ut deterrimus improbat. Recentis semine, caulibus solisque tustis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum vsque prorogatur. nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem succo lacteo praestantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrys quae doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. contra acutis calidisque fluxiones, dolores aurium, † atque vulua mala, prosunt. cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, ceterarumque partium inflammationes placant. Semen eadem prabet. tusti, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax. contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaueris semine & aqua mulsa, bibitur. podagris subuenit. testibus inflatis, mammisque tumulentibus a parvulis, triu ex vino illinitur. alijs quoque cataplasmati, quae doloris lenamentum praestant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, vtilissime imponuntur. recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur. cum vino terna, quaternaeve pota, sanant algidas febres, quae epialos vocant. cocta oleum modo solia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignant. idem efficitur et aduni si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta dentes in dolore colluuntur.

† Oleum ex semine auribus infusum tentat mentem, Plin.

Albus tertij ordinis refrigerantium: reliqua duo venenata.

**P. V. L.** Eius succus similis est Meconi herbae. Herbae succus tepe factus cum oleo rosaceo & in aurem instillatus, aurium dolorem mirifice tollit: & si vermes fuerint, necateos. Herba symphoniaca cum stercore ouillo & modico aceto, factum quasi malagma, imposita tumorem omnem tollit. Ad inguinu dolorem: eiusdem radix alligata pedum dolore tollit, & tusa omnis cum sua radice & super pedes imposita mirifice tumorem tollit, & dolorem pedum auferit. Herbae symphoniaceae succum da bibere, cum summa admiratione locinoris & pulmonis dolores sanabit. Ad muliebris spectinis dolorem. Herbae symphoniaceae succum mixtum cum croco dabis in potionem, & miraberis effectum. Ad vulnera, chironia & araneorum morsum. Herbam apollinarem cum axungia vetere sine sale libra vna teres, & vinum vetus cyathis vno, sine fumo simul commiscet, & facies quasi malagma, & vulnera impones, sanabitur mirifice.



## Oleum Hyoscyami circulatorum.

Liquamenti genus è nigro hyoscyamo, quod oleum vocant, agrytæ audaculi, versutioris sue impostores vsurpant; eludendæ plebeculæ, doloribus sedandis accommodum, stupefaciendoq; longè optimum, præsentissimisq; viribus. quod quia celant, hîc monere libuit. Tusani Hyoscyami vniuersam plantam Iulio & Augusto mensibus (\* superstitione inter duas Dinæ virginis ferias) fidei vasi indit. m. cui subtus foraminula, & aliud vas excipiendo liquamento aptum, insunt; circumliniis operculo & spiraculis inhumant. Putrescere sinunt, vsque dum subtus liquor extillarit; quem vsibus medicis recondunt.

\* quia præparandum, quando herba est in suo vigore.

Molis etiam effractum semen, pressu oleum reddit, dentium aliisq; quoslibet dolores mulcens.

Dubius HYOSCYAMVS luteolus solanifolius.

HYOSCYAMVS niger Matth. & quartus.

Ital. Iulquiamo nuouo. Aduers. pag. 107.

Potius calfacit quàm refrigera, vt minus rectè Matthioli scripsit.

POMÀ AMORIS, an Glaucium Diosc.?

Aduers. pag. 108.

Lycopersicum quorundam.



## GLAUCIUM.

Varietas. { Surrectis cubitalibus cauleulis Hispano semine in hortis nostris variat. omnia non dissimilia, sed minora multo.

Diosc. Folia in olla fidei semisrigidis cibariis calfaciunt indigena, vsque dum flaccescant; deinde contusis succum exprimunt. Cuius est vsus ad oculorum medicamina, vt pote cum inter initia refrigeret.

Gal. Adstringit cum quodam fastidio; tum adeo manifestè refrigerat, vt solum sepe terisypelata, vt que si videntia non fuerint, curare possit. Mistura eius complicita est ex aqua terreæque substantia: vtraque sanè frigida: verum non summè; sed eoa aqua fontana.



PAPAVER cornutum flore phaniceo. Aduers. pag. 109.  
quod floris colore rubro in Belgicis hortis variat.




PAPAVER corniculatum.

Diosc. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet. †. prodest his qui crassa quedam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua malsa poto. Crustas\* emarginant, illita ex oleo folia: floresq; argema ac nabeculus iumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui Glaucium hoc papaveris genere salu. ut existimant, falsi quadam foliorum cognatione.

† Gal. Ob vim incidendi & abstergendi.

Gal. Folia & flores sordida admodum & maligna ulcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet, vlcetibus iam expurgatis: adeo enim abstergere valent, ut & puræ quoque carnis nonnihil eliquet.

\* Hoc vitium robore non fordem duntaxat, sed & crustam vlcetibus detrahit.



PAPAVER sativum.  
Advers. pag. 110.

PAPAVER album & nigrum polyanthum sive  
multiflorum.

Papaver ni-  
grum a me  
sativum albim  
enasti nature  
lusu & meta-  
morphosi.



Diosc. Esativi papaveris genere, quod hortense est. semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. eo etiam ex melle pro sesama utuntur; thylactin vocant. capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre verò, caput infidens demissumq; & nigrum semen; quod pituitis nominatur. nonnulli tamen & ipsum rheas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum fori conciliabit. bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. tunduntur quoque virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tusti arteria fluxionibus, & coeliacorum affectu, doloris levamentum prabet. Efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acatia. Papaveris nigri semen tritum vino bibitur, contra citam aluum, & seminarum profluvia. In perugilijs fronti temporibusque illinitur, ex aqua.

PAPAVER album & nigrum pleno flore.

Et ille duplo maior, niueo candore nitens, & tanto pulchrior flos, quem horti Belgij in delitijs habent ad coronamenta: non sanè alius generis à simbrato albo aut nigro sativis; nisi florum incifura & lacinij profundis, faturam perelegantem sortitur; quæ multipla serie maiores & confertiores, rosarum dehiscientium æmula gratia, visum oblectantes, ipsis malvæ hortensis pares floribus cernuntur. Color renidet albus; aut coccineus, sanguineus, aut niueo candore & rubore confusus: interdum ora crisata ex albo purpurascunt. Seminibus me donavit maximæ & optimæ spei non minùs peritus quàm nobilis Carolus de Croy princeps de Chumay, studiosissimus & summus stirpium admirator.

OPIVM



**Diosc.** Opium eius, magis refrigerat, inspissat, siccaturque, sumptum erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit. tusti atque coeliacorum valetudini auxiliatur. verum si copiosius hauriatur, nocet, cum letargicos efficiens interimat. ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. aurium dolori, cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur. inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus, cum aceto, podagris, cum lacte mulieris & croco, somnum accersit, subditum sedi pro balano. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur. leue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur. dein adnotum lucernis, non atra luceat flamma, extinctum denique, odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuca succo, adulterant. Veri in glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: grummi vitiatum, splendet, & infirmum est. Nec desunt qui edementia deuenierint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus auctor est, visum eius damnavit, oculorum lipitudinibus & aurium virgis infundi vetans, quoniam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illos eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus visum dumtaxat offendi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicit. Qua commentitia esse, experimento deprehenduntur. siquidem affectus, virium huiusce medicamenti, fidem faciunt. quare non alieni fuerit scriptis mandare, quonam modo is excipiatur succus.

## MECONIVM.

Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & praelo exprimunt, terentisque in mortario, digerunt in pastillos. id meconium vocatur, multum opio ignauius. Porro opii faciunda ratio hac est: Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem, digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concretum inueniatur. etenim quatum, aut postero die etiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus detradatur.

**PAPAVER Rhæus.** Hisp. Amapolas, Rosella, papolas. Ital. Papauero saluatico rosso.

Aduers. pag. III.



Rhæadas flore albo Carolus de Houchin D. de Longastre stirpiū auidissimus & doctissimus indagator in Gallobelgio reperit. etiamq; multiplicatis floribus in agro Brabantico secus Lieram collegit illustris vir D. Ioannes vander Dilt.

**Diosc.** Huius capita quinq; aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua malsa pota, alium leniter emolliunt, ad idem præstandum mellis plantentulis, & dulciarys libis admiscuntur. Folia cum calycibus illuca, inflammationes sanant: eorundem sora & persusione, somnus allicitur.

Gal. Validius semen refrigerat, ita ut nequaquā eo quis innoxie solo uti possit, sicut sauno siue domeltico melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat.

Non modò incrassandi vim obtinet, & irritentis humoris insulsum inflammaticne sue cōpescit, sed etiam quadam partium tenuitate & digerente facultate pollet, non secus ac pleraque agria satius acriora: quod manifestò ex succi vel syrupi valido diutissimè persistente aut permanente odore; diiudicatur; ideo collectiones thoracis discutit. Idque efficacius ut præster, coagulū ei permiscetur aliāue pro morbi implicatione, & partis affectu ratione, ut monuimus superius in fermēti panis mētiōe. Amatus in  
Hoc sanè non carebat, & satius, periculo se-  
centurijs eadem.

Apvl. Ad epiphoras oculorum. Herbæ papaueris syluatici fructū, id est, calyculos cum suo semine

pistatum cum aceto oculis impones, sedabit dolorem. Ad hemicranium & capitis dolorem. Herbam papauer syluaticum pistam cum aceto fronti impones, sedabit dolorem. Papaueris syluatici succo si quem perunges, somnum ei cum sopore obijciat.

ARGENT.

## ARGEMONES duplex è capitulo differentia.

ARGEMONE capitulo torulis canulato.  
Argemone Lacuna. Aduers. 112.

ARGEMONE capitulo longiore.  
videtur idem cum Argemone Cordi.  
Aduers. pag. 112.



Diosc. In totum Papaueris sylvestris similis est: folia habet Anemonis, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo Papaueris Rhœadis oblongius & summis partibus latum, radicem rotundam. Succum croci colore acrem dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illius inflammationes compeſcunt.

Abstergit, digerit Gal.

Geminæ plantæ Papaueris Rhœadis primo intuitu in Angliæ Sommerſeti & Gallo-Belgij ſegetibus, radicem, florem & folia hirsuta in caule pedali & ſesquipederali oftendant. flores verò punicei Papaueris Rhœadis minores, decidui: quarum minori \* capitula Rhœadis angustiora, longiora, & hispida sine codio. Maiori item echinata & hispida, sed glomerata & torulis canulata capitula, in cuius vertice specimen quoddam cupuli aut codij relinquit, vtrique semen Papaueris Rhœadis minus.

Eadem quæ  
Minor Anemone per-  
petam Mon-  
ſpelienſium.  
pag. 113.

Arvi. Herba argemonia viridis per se trita, & si arida fuerit in aqua calida intincta vt facillimè teri possit, illita suggillationes & liuores oculorum maturè discutit. Ad ventris dolorem: herbâ viridem cum sua radice tritam, & potui datam, prodesse dicimus & in omni loco iuuare. Si autem arida fuerit aqua tepida infusa, idem proficere creditur. Herba viridis trita & apposita, omnia vulnera, vlcera & canceromata facile sanare apta est. Si autem arida fuerit, aqua tepida infusa, idem proficere creditur. Herba contrita & apposita mirè doloribus vel tumoribus ex luxu concitatis succurrit. Argemonia drachmis duabus in vini cyathis duobus potui data, mirificè discutit venenum. Herba contusa & imposita percussuram ferro aut sude factam sanat. Verrucas, in aceto tusa & imposita, tollit, in cibo sumpta spemem consumit. Ea quæ secanda sunt, herba contrita, & imposita, aperit & perſanat.

ANE-



*ANEMONE tuberosa* radice. *Advers.* pag. 113.  
*Anemone angustifolia* altera *Clusij*,  
*Anemone tertia* *Dod.*

*ANEMONE flore multiplicato coccineo*,  
*Anemone quarta* *Dod.*  
*Angustifolia tertia multiplex* *Clusij*.



In Belgij hortis flore purpureo, violaceo, vel albo variat.

*ANEMONE flore multiplicato coccineo*,  
*Anemone quarta* *Dod.*

Suavissimo aspectu perelegans cognationis consequutione hunc sibi locum vendicat. Rarius occurrit, nisi in cultioribus viretis Belgicis, foliis, & cauliculo superiori similis. Flos multiplici foliorum fatura radiatus & duplicatus, purpura coccinea rubens. Radix tuberosa vnciam crassitie aequat & superat. foris pulla & rugosa, subtus aliquantum fibrata, intus candida: qualem primum Constantinopoli delatam vidimus in stirpium exoticarum ditissimo horto piæ memoriæ C. V. D. Ioannis de Brancion; deinde Lieræ hac ætate iucundissimo spectaculo florentem in horto D. Ioannis Dilsij.

T

ANEMONE



*ANEMONE maxima polyanthos Chalcedonica,*  
vulgò Gioul catemer.

Aliud etiam Anemones genus Byzantio delatum, omnium sanè maximum & speciosissimum Belgij nuper inquilinum factum: Foliis ad vulgaram violaceam Anemonen accedit, sed latioribus, habitioribusque, acerrimi gustus; & floribus multiplici peramœna fatura, initio viridantis, per maturitatem dehiscens Rosæ æmula gratia, rubido rubellæque nitore, medio centro glomerati, externis verò foliis viridi & tantillo rubore confusi, spectantis oculos allicit; cuiusmodi meminisse iuvat me vidisse in hortorum deliciis illustrissimi D. Ioannis Dilsij, & clarissimæ matronæ Mariæ de Brimeu, vxoris magnifici viri Conradi Schetz: radice tuberosa, crassa, bulbocastani colore & cœctione, citris fibrata, gustu austero, ingrato. Cauliculus pedalis, & interdum maior.



*ANEMONE*



*ANEMONE tuberosa, bulbocastani radice.*

*An Anemone lutea Gal. ? Aduers. pag. 114.*

*Prima Dod. Latifolia altera Clusij.*

*ANEMONE latifolia prima Clusij.*



Inter exoticas Anemones species in Belgio frequentior & vulgatior tuberante radice & foliis altis & minutius diuisis Geranij bulbosi, aut aconiti facie batrachoidis herbulæ. Flos diluta purpura rubet; nonnunquam candicat, duodenis, plus minus, foliolis radiatus; quibus fastigiata succedunt capitula cincinnis & cirris villosa, Ranunculi.

*ANEMONE latifolia prima Clusij.*

Hanc ingenuè fateor me non vidisse, quam tamen ordinis consecutione hæc ipsiusque verba subdenda duximus, cum Clusio nullus scriptor exactius, pressius aut doctius hanc historiam posteritati patefecerit.

Satis amplis foliis circinataæ ferè rotunditatis, per ambitum serratis, duris & firmis, longoque pediculo fulvis, supernè intensius virentibus, infernè plerunque purpurascens, ut cyclaminis (flore odorato) folia propemodum feruidissimi gustus: radice (nam florentem non vidi) tuberosa & longiuscula, Tormentiellæ vulgaris æmula; fibris aliquot dependentibus; foris nigra, intus alba, solida, ingrati admodum saporis; quæ nauseam mouens, quodammodo strangulet, deinde linguam aliquantulum vellicans. Lapidosis quibusdam Lusitanicæ collibus iuxta Tagum atq; etiam inter vepres inueni. Exilit Decembri & Ianuario. Hactenus Clusius.

*ANEMONE tuberosa Geraniifolia.*  
*Anemone secunda Dod. &*  
*Tenuifolia Anemone tertia Clusij.*

*ANEMONE tertia Matthioli, flore albo,*  
*luculenta magnitudinis.*



Rarior multò hec nec vspiam in Belgio, sed duntaxat in hortis cultioribus generosi D. Brancionis & Georgij Ryensis Mechliniæ mihi animaduersa: radice itidem tuberosa Tormentillæ, aut superioris Anemones æmulatione. Folia & cauliculos profert geranij Robertiani, Ranunculi nemoralis vel pratensis vulgatiore, media: floribus cyaneis, albis aut rubris medium luteolum Asteris attici ritu cingentibus: femine glomerato, racemoso, Ranunculi.

*ANEMONE tertia Matthioli.*

Et hæc non absimilis folio Ranunculi albi sine Aconiti batrachoidis quinque partito, sed aliquanto minore, sesquipalmaris & dodrantalis cauliculus, floribus albis Elleboro nigro æmulis & paribus quinque foliis radiatis: tenui fibrata radice Astrantiæ nigre aut Ranunculi. Rarior hæc nec nisi in cultioribus Belgij hortis.

ALABASTRITES.



ALABASTRITES *sive* DENTARIA alba  
D. Brancionis. Anemone trifolia Dod.  
& herbariorum.



PULSATILLA rubra. Adversf. pag. 114.



PULSATIL-  
LA vulgaris.  
Ger. Hocken-  
kraut. &  
Muehen-  
schell.  
Adversf pag.  
114.

PULSATIL-  
LA alba.



T 3

ALA...

ALABASTRITES *sive* DENTARIA alba D. Brancioni.*Anemone trifolia* Dod. & *herb. morum*.

Huc tidentem accersenda, quam à terno crenato folio Meliloti Germanici, trifolium Anemonem dixere herbariorum nonnulli. In cauliculis palmaribus & sesquipedalibus flores initio lactei; deinde marcescentes & dehilcentes niueo mixtos confusè car dore rubentes; quales esse solent Ranunculi nemorosi, cui etiam radix non absimilis. Tam ignotæ vires, quam rara planta minusque obuia. In Belgii nisi in viroto claris. Brancionis mihi visa.

Dioscor. Vis utriusq; Anemones acris; ea de causa succus naribus infusus, caput purgat: commanducata vix pituitam trahit. decocta in passò & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem & hebetudines emendat. Sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum præsana decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstrua ciunt, velle apposita: illita quoque leproas eximunt.

Pituitam trahit] Gal. quia attrahendi & extrahendi & ora vasorum referandi facultatem obtinet.

Phœnicei floris Anemonem impositam, ulcerare auctor est Plin.

PULSATILLA vulgaris, perperam Anemone Cordi. *Herba venti* Tragi. *Aduers.* pag. 114.

PULSATILLA alba.

Maiores hac aliquantum foliis, maiorisq; elegantiæ floris albi, peramœni, horto D. Dilshj etiam oriunda, opera seduli investigatoris Raphaelis de Cocchia apud Mechlinienses summi artificis pictoris, stirpiumque admiratoris.

PULSATILLÆ varietas, *Aduers.* pag. 114.

In flore caruleo perpetuò clauso conspicuam differentiam videndi copiam fecit Coldenbergij ditissimus hortus. Cæteroquin cum superioribus re ipsa vna, nisi folio esset superuienti. Ranunculis vixibus subpar.

Recentiorum ADONIS. *Aduers.* pag. 115.

Videtur adde Theoph. à floris flammæo igneque colore.

Inter vernos flores Theoph. recenset cap. 7.

Anemone tenuifolia Cordi.

Eran. hemian. Gejneri & Dod.

LAPATHVM *sive* Rumex. *Aduers.* pag. 117.

LAPATHVM acutum, Oxylapathum. Ger. *Stendwurtz*, *Spindwurtz*, *Streichwurtz*, *Litterwurtz*. Belg. *patich*, & *perdicke*. Angl. *Dock*. Gal. *parelle*. Hispan. *Romaza*, *paradella* & *Lappaça*. Ital. *Rombice*.





HYDROLAPATHVM maius. Advers. pag. 117.

HYDROLAPATHVM minus.



Importante proventu lenè fluentibus aquis, riuis agri Amnerpiani ad portam Lutosam, & portam Rubram, alibiq; passim vdis provenit. Ortus, modus & vsus Lapathij acutifolij siue acuti vocati, sed folia angustiora exaltioraue, & radix fibris magis capillata scapos emittens dodrantales, pedales, cubitales & nonnunquam sesquicubitaliales, ramulis multis diuissos, copioso semine onustos.

**Dioscor.** Omnium decocto clere alius emollitur. crudi illius, metacerides, rosaceo aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua aut vino vtiliter bibitur, contra dysenterias, & calculorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. quod si quis in potu presumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illæ crude, lepras, imperigines, & scabrosos vngues persanant, sed antea locus aceto & nitro in sole persicandus est. pruritus cor, oris decoctum eorum sedat, si foveatur, aut in solis balnearum conficeretur. cocta in vino & in stillata, aurum dentiumq; dolorem mulcent. strumas parotidasq; discutunt. lienem cum aceto extenuant. aliquid molendi strumæ radicem gestamine vtuntur, eas collo appendentes. trita & adhaerentia seminarum profusum sistunt. cum vino autem potæ, regio morbo medentur. calculos vesicæ comminuant. menses cuncti scorpionum ictibus auxiliantur.

hec satis superque in vltimo reuocata.

**Hippolapathon.** Advers. pag. 117.

**Dioscor.** Hippolapathon olus est magnus, in paludibus nascent, easdem habet vires quas supradicta rumicis genera. Sed imbecilliores Gal.

Feminarum profusum. Gal. Semen eorum quandam manifestam etiam adstrictionem obtinet; adeo vt dysenterias & diarrhoeas siue profusum sanet, & maxime Oxylapathi.

Gal. Lapathon moderate digerentem sortitum facultatem est: at Oxylapathum mixtam; nam simul cum eo quod digerit, nonnihil quoque repercutit. **Hydrolapathum** plus cæteris adstringit.

**Apuleius.** Si qua dritia in corpore orta fuerit: Herba oxylapathon cum axungia vetere \* suilla pistata, & ex pane domestico facta vt malagma, & imposita, mirifice sanat. Ad paniculam quæ in inguine nascitur: Herbam lapathon contides cum axungia vetere sine sale, sic vt axungia dupla sit ad herbam, & his bene commixtis facies exinde velut rotundulam, & inuolues in folio coliculi, & mittes eam sub cinerem calidum; & cum caluerit, tunc impones super paniculam, & panno ligabis lineo. Hoc enim exintium est & valde optimum. Herbam lapathon tusam cum axungia, & factam quasi malagma, induces in linteolo mundo, & impones super apostema, mirifice aut spargit aut facit collectionem, & aperit vlcus.

\* alias omittit

**Hippo.**

*HIPPOLEPATHVM sativum latifolium.*  
*Rhamonachorum. Patientia vulgi.*  
*Aduers. pag. 117.*

*HIPPOLEPATHVM rotundifolium.*  
*Pseudorha recentiorum.*  
*Aduers. pag. 118.*



*PONTICVM Rha. Aduers. pag. 118.*

**DIOSCOR.** Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem & omne genus dolores, ad consulsu, lie-  
 nosos, hepaticos, tormina: ad renum vesica & pectoris vitia: aduersus intempra cordia, & vulue mala, coxendicum  
 dolores, \* sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus; contra febrim circuitus, &  
 venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem quo agaricum pondere & cum eisdem liquoribus, si febrim  
 caveant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa. Si rabem experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso: si dissolutio  
 est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, mandatur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Liuentia, lichenasq; tollit, cum  
 aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquan-  
 to calore.

\* Ad sanguinis excreationes in Rha pontici locum radix Rhabarbari nostri cholagogi, & radix Ccn-  
 aurei maioris perperam Rhapontici credita irrepserunt.



RHA capitatum folio Enula, Centauri maioris  
facie. Aduers. pag. 118.

RHA Ponticum alterum angustiore folio.



Valde affine superiori capitato Rheo, ex Italico semine habent D. de Bracion & Georgius Ryensis; sed folia angustiora multo, acuti Lapathi paria, auersa item parte incana; & caulis rectus, capite fastigiatus squamulis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui concoloribus pleno. Semen Cnici syl. compressum ægrè maturat in Belgio. Radix Centauri maioris, fungosior.

M E S V E. Rhabarbarum etiam clemens, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas complexum. Calidum siccum ordine secundo potiùs, quàm primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda; altera æreæ, & ignea (à qua rarè efficitur) superficialia, quæ suam terream essentiam adurendo amaram effecit, & purgatoriam, & obstructa liberantem. Has autem substantias macerando separari, ut calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò pituitamque illà vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde natos sanat, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas, etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum punctorium. Hac verò hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarum partium sistit: ex casu quoque aut ictu contusa, rupta, fracta, interna, & externa sanat, si eius drach. vna cum mummæ granis duobus, & rubiæ tinctorum grano vno & diuidio, & vino austero bibatur. Oleum quoque eius contusis & contractis musculis vtiliter illinitur: singultum item & dysenteriam sanat, præcipuè assum, & cum succo plantaginis & paucò vino austero potum. Innoxium est Rhabarba-

rum, omni tempore tutò datur, omni est ætati salubre, atque adeò pueris & prægnatibus. Efficaciùs autem agit sumptum ex sero lactis, præsertim caprini: aqua quoq; intybi & apii, vel plantaginis cocta, & colata maceratum, idque omninò cum spica nardi, actionem eius imprimis iuvante, expressumque. Quòd si ad liberandas obstructions propinandum est, vini albi, puri, & odori modicum macerando admisceatur, expressumque eius tunc sumatur, & cum deterfione ac purgatione opus est. Quòd si post purgationem viscera adstringendo roborari volumus, pulvis eius triti datur: si adstrictio maior expetitur, assum datur: si maxima, vstum.

## EXTRACTVM RHABARBARI,

vulgò ESSENTIA RHABARBARI purgatrix, Catapotiorum, caterorumq; purgantium medicamentorum, quæ tantilla quantitate blandè euacuat, nunc in aulis principum vsu longè frequentissimo, optimo.

Spiritus vini  
& aqua vitæ  
longè diuer-  
sa, de quibus  
suo loco.

Deme vintul-  
ris. 118. li. 36.  
paulo post le-  
ge gluino-  
sum lin. 38.  
39. deme vit-  
gulas. & lin.  
48. lege re-  
dinabit.

Tusum vel minutim concisum Rhabarbarum, solè vel igni inter papyros siccatum, spiritu vini optimi (minimè aqua vitæ è facie vini vel zythi distillatæ) per diem & noctem tepidiore loco maceratum; postmodò confectum manibus expressum, modico cinnamomi addito, quantitate qua volueris sumas. Humor dein phiala operculo oclusa excipitur. Mox iterum nouus vini spiritus affunditur; tertio, quartoque exprimitur, donec spiritum vini colore minus inficiat. Demum mixti liquores vitreo vase circumlinito in balneo vel potiùs vapore aquæ calentis distillantur; postea crassamentum ad vsum reponitur; cuius dosis ʒss. plus minus, pro ægrotantis natura. Spiritus vini in alios vsus seruetur; in quo vis laxandi minimè conquirenda; quia experientia comprobauimus, stillatitios, Diaphœnici, Indi, confectiõis hæmec, medicamentorum purgantium liquores, etiam ternis & quinis vincijs, plus turbare quàm purgare. Quinimo nuper Iulianus de le Cambe horum peritissimus apud Antuerpienses pharmacopœus afferebat Syrupi rosati ex infusionibus vitreis organis percocti, stillatitiam aquam summè adstringere, dentes tremulos firmare, oris halitum commendare, aphthis & quibusvis oris vlceribus mederi.

Eadem ratione & modo quæuis alia medicamenta purgantia pro delicatis concinnari possunt: quorum operatio egregiè iuuatur & acceleratur spiritu vini, noxaque minuitur pro medicamenti natura & scopo Medici.

RHABARBARI extractum per spiritum tartari Theophrastice & chymicè.

LAPATHVM sanguineum. Aduers. 119.

De liquore  
Tartari &  
spiritu vini  
cap. De vitæ.

Cinnamomi electi libra; liquoris sacularum vini preparati, vulgo tartari, libræ duæ: aquæ cætaurij minoris lib. 1. & semis; aquæ rosarum semilibra, hæc in ampulla per diem & noctem macerantur, distillanturque ex balneo, eo vsque dum omnis humor prolektus fuerit. In hoc Rhabarbati electi libra maceratur dies octo: deinde sacculo imposita sub prælo validè exprimitur, & abiecta radice, liquor excolatus iterum ampullæ infunditur, & addita Syr. ros. fol. vel è florib. Persici semilibra ad mellis spissitudinem incoquantur. Datur iunioribus sesquidrachma, adultis semuncia ex iusculo piscozum vel cicetum modicè coctorum.





*Oxalis* <sup>sive</sup> *Lapathum Oxalida*. Gal. Ouseille  
 & Aigrette. Gallobelgi nostris Surelle. Hisp.  
 Azederas, Azedas & Agrelles.  
 Aduers. pag. 119.

*Oxalis tuberosa*.



*Oxalis tuberosa*.

Minimè prætermittenda illa radicibus tuberosis filipendulæ vel cenanthes, perquam spectabilis  
*Oxalis* exotica; etiam folijs, caule & semine hortensis quam toto habitu præfert. In Belgio rara, & ge-  
 nerofo D. Brancioni à Doct. Pancio piæ memoriæ Ferratiensi medico munere missa.

*BISTORTA* quasvis asseritur Britannica. *Dracontia* Plin. Fuchs. & *Limonium* Gesnero.  
*Dracunculus* Plin. Dod. fol. beta à dracunculis natura diuersa. Germ. Aaretwurcz,  
 Belg. Hertis tonghe. Gal. Bistorte. Hisp. Bistorta.

*Diosc.* Britannica vim habet astringentem; priuatim depascentibus oris, & tonsillarum vlceribus accommo-  
 datam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione opus est.

Adstringere etiam asserit Gal. qui subdit; Quidam reponunt tanquam inter stomachica medi-  
 camenta efficacissimum. Vulnere glutinatoria; frigida & sicca.

OXALIS  
verrucosa  
tenuifolia  
finisita.  
Ital. Aceto-  
sella & San-  
nicola.  
Aduer. 120.



BISTORTA  
que affer-  
tur Britan-  
nica.



Coch.



COCHLEARIA Britannica. Aduersf. pag. 122.



LIMONIUM, Behenrubrum Cordi.



PYROLA,  
Limonium  
Cordi & Ger-  
manorum.  
Belg. Wint-  
tergruyn.  
Ital. Sam-  
buca. Ad-  
uersf. 122.

Exsiccat, ex-  
recessu tūto,  
refrigerat  
secundo.



TRIPLO-  
LIVM sub-  
garc.

LIMONIVM, Behen rubrum Cordi, Ital. Bietola saluatica.. Aduers. pag. 121.

Diosc. Semen adstringit: ritum ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis cœliacisq; praeest: rubra seminatum profusua sistit.

TRIPOLIVM luteum.

Luteo flore alit Muttonus munere præclari & generosi viri D. Caroli de Houchin D. de Longatte, stirpium admiratoris summi & doctissimi, lectum litoreis Gallobelgij.

TRIPOLIVM minus  
Aduers. pag. 123.

HERBA DORIA.  
Aduers. pag. 124.

legelin. 31.  
PUNTIOTIDEN.



Folia  
le pro  
pictor  
Aduer  
124. n  
anima  
fa.

Tripolij va-  
rietas.

{ Ad Padi ostia longè minus prouenit Monspeliaco, minorem Conifam folio, radice & flore vix æquans.

Diosc. Radix odorata, calidi gustus; quæ drachmis duabus in vino pota, aquam vrinaq; per aluum extra-  
hit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.  
Acris radix, & calida 3. excessu Gal.

CONSOLIDA aurea nemorum Limonij folio; Aduers. 125. Conuenit cum Alismate Matth. & Chrysanthemo  
latifolio Dod. In Erisia secus Zuiphen & Hack fort, frequentissima.

AVREA



VIRGA AUREA *altiera ferrato folio.\**

\* Tantopere huic effigie, habituque toto conuenit, ut neutra ab altera discernere queas, nisi magnitudine & foliorum diuifura: aflurgit namque hec procerioribus duplo caulibus maioribus, magis ferratis folijs: Belgis hortensis est, Italoque femine orta putatur.

AVRZA VIRGA Villancurini. Gal. Vergé d'or.  
Aduers. pag. 125.

Leucographis Plin. & Herba scripta Anguillarae, à confectis nonnullis notulis, quibusdam locis potissimum, conspicuis.

Bibitur ad rupta, vulnera, præcipationes, hernias, & alui fluores. aphthis, depascentibus oris ulceribus & anginis, medetur. detes tremulos firmat. lege imum.

SOLIDAGO *Sarrasénica*. Germ. Heidnisch wondkrauth. Belg. Depdenschen wondencrupt.  
Gal. Confoulde sarrasine. Aduers. 125.

Hepati & visceribus dissolutis, robur addendo & obstructions referando; morbisque inde ortis, Regio morbo & diuturnis febribus, medetur.

*Aquatica.*



*Aquatica PLANTAGO. AN ALISMA suo  
DAMASONIVM. Limonium Anguh.  
Ital. Plantagine aquatica.  
Aduers. pag. 126.*

*ALISMA pusillum angustifolium muricatum;  
sive Plantago aquatica minor.*



*Diosc. Radix acris, odorata; cuius si 3 vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporē marinū deuorauerunt, aut à  
Idem Plin. rubetis ranis demorsi sunt, aut opiū hauserunt. Torminibus atque dysenteria, per se aut cum pari modo seminis Dau-  
ci, potui datur. Conuulsis & contra vitia vulua prodest. Herba sistit aluum. Menstrua pellit, tumores illita mitigat.*

*Gal. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, ca-  
su experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandam facultatem obinet.*

*Plin. Strumis imponitur ex aqua caelesti foliū tritum, vel radix cum axungia tusa; ita ut imposita  
folio suo operiatur, sic ad omnes ceruicis dolores, tumoresque quacunque in parte.*

*ALISMA pusillum angustifolium.*

Minutis *Quinqueneruia* Plantaginis angustioribus & liolis, deorsum versus reflexis, perpulchra  
planta. Cauliculus gracilis, sesquipalmaris, è fibrosa radice sparsa speciosa coma referta, numerosis  
muricatis exilibus capitulis tribuli ritu. Hanc primus mihi ostendit eruditus medicus Thomas Pen-  
neus Anglus, locis vdis Angliæ oriundam, ab hac non diuersam, puto illam esse quam in scrobibus  
hoc anno floribus. Aquauca Plantaginis pone nouam urbem Antuerpiæ reperi.



## SAGITTA minor. Aduersf. pag. 127.

Lege li. s. at-  
que aquatica, &  
paulo post  
minoribus.



BIFOLIUM. Aduersf.  
pag. 127.  
Pseudorchis bifolium Dod.  
Gramē Parnassi quorūdā.  
Belg. tweeblad.  
Ger. Zwepblat.



MONOPHYLLON recentiorum. Aduersf. pag. 127.  
Germ. & Belg. Einblad.  
Gramen Parnassi Cordi & Leoniceri.\*



\*Radix trita luis pestifera bubonibus mederi fit  
tur neotericis, si statim initio drachmae pondus, ex  
aceto, vino aut aqua sumatur.

X

Recentiorum

Recentiorū  
CALCEOLYS  
Marit. Aduerf. p. 127.  
Damatoniū  
nothū Dod.



PLANTAGO  
maior inca-  
na. Aduerf.  
p. 113.



PLANTAGO



PLANTAGO quinqueremis. Aduers. pag. 128.

PLANTAGO marina. Aduers. pag. 128.



ROSEA Plantago pannicula sparsa. Aduers. 128. Sarothodes, &amp; Corematophora, sive Scoparia C. Gemma.

Rosea Plantaginis varietas.

Sola differentia Belgicis agris &amp; hortis, in pannicula spicata sparsa, onusta innumera foetura herbaceorum flosculorum racematim coherentium.

MARINA Serpentinis propior, propter notulas rubras, in foliis transversas, obliquas &amp; fortuitas. Friliis Rupde vocatur, qui esunt ex lacte &amp; pulicula, ventrem solvere &amp; flatus discutere asserentes.

PLANTAGINES. Aduers. pag. 128.

Angl. etiam waepheides. Hispan. Llante. Lusit. Chantage.

DIOSCOR. Duo Plantaginis genera, multo virilior magna est. Vim habent folia exicatoriam, constringentem, quare omnibus malignis vlcibus, & fluxioni opportunis atque elephantiacis, sordidusq; illis profunt: profusum sanguinis, vlcera qua serpunt, epiphytoides, carbuncules, nomasq; cohibent. vetera vlcera & inaequalia cicatrice obducunt. chironia sanant. supus conglutinant. morsibus canis, ambustus igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, egilopis, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, celiacisq; sumptum subuenit. datur & in locum betae cum lenticula coctum. & ad aquam inter cutem, cui leucophlegmatia nomen est. datur & herba decocta post aridas epulas, sic vi media antecedit. comitialibus & suspensiosis data proficit. Foliorum succus collatus subinde oris vlcera purgat. cum cinolia aut cerusa igni sacro medetur. fistulis infusus prodest. lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria. gingivis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. contra rabie datur in potu. aduersus stragulationes vulvae, in vellere subicitur, etiam si vulva fluxione laboret. Semen ex vino potu alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decolla radix & maducatu, & colluio ne, dentium dolores sedat. eade cum foliis, vlcibus renu & vesica in passo datur. Ferunt tres radices cum tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutiedis strumis vitant.

Rheumatismata sistit Plin. & stomachum roborat sumpta. † Eade Plin. Succus sanguinem vomitibus datur Plin.

Gal. Vlcera maligna. ] Quaecunque medicamenta cum hoc quod refrigerant, vna etiam adstringunt, ea & ad vlcera maligna omnia, & ad fluxiones & putredines profunt, atque etiam adeo ad dysenterias: nam & sanguinis eruptiones sistunt, & si quid adnatur, refrigerant. Sinus quoque glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certè nulli secundum est arnoglissum, idque temperaturæ symmetria. nam siccitatem obtinet morfus expetentem, & frigiditatem quæ nondum obtusesciat. Semen eius & radix similis sunt facultatis, attamen siccioris, & minus frigida. Semen etiam subtilium est partium; radices autem crassiorum. Et huius herbae folia exsecrata subtilioris & minus frigida facultatis sunt, nempe distillato ex eo ac digesto excremento aequo.

Idem Plin. Idem Plin.

Ille ratione radicibus vtuntur ad dentium dolores. præterea ad iecoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoque & multo magis semen. Hæc enim quandam abstergendi in se facultatem habent, quam & in herba viridi inesse satis conici potest, verum ab humiditatis copia vinci.

Refrigerat simul & desiccatur, & in vtroque secundi recessus à mediis est. Mixta est temperatura: habet enim quiddam aqueum frigidum, & austum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum.

APV L. subdit: Plantaginis radix in collo suspensa, capitis dolorem mirifice tollit: succus reperfusus fomentando ventris dolorem tollit. Et si tumores fuerint, tusa herba & imposita tollit tumorem: succus potui datus, & interiora sanat, & thoracem hominis purgat mirifice. Plantaginis semen tustum & in puluerem redactum & in vulnera aspersum, sanabit ipsa vulnera. Et loca ea quæ à nimio calore vruntur, ipsa tusa & imposita refrigerat & persanat. Ad lumbricos: herbam Plantaginis contundes, & succi eius cochlearium vel ligulam dabis bibere. Ipsam quoque herbam tusam vmbilico imposito. Si qua duritia fuerit in corpore, Plantago pisata cum axungia sine sale, & factum quasi malagma, imponis id duritiæ, & discutit. Ad podagram & omnem perurorum dolorem & tumorem: herbæ Plantaginis folia contusa vel pisata cum modico sale & imposita, optime facere certum est. Si cui pedes tument ex itinere: Plantago contusa cum aceto imposita tumorem tollit.

HOLOSTEVM Salamanticum maius Clusij. pag. 18.  
Idem congener cum Monspeliaco sed multo maius.

POTAMOGETON, sue Fontalis.  
Aduers. pag. 128. & 129.  
Germ. Zankkraut. Nostris Fontepncrupt.  
Hisp. Espigada & Vezina de Rios.



E sola magnitudine differre facit Clusius quod aridis collibus Salamitice vicinis prouenit, & iuxta Valentiam Hispaniæ secus vias. Cuiusmodi etiã meminimus in agro Monspeliensi, ni labat memoria.

POTAMOGETON, sue Fontalis.

DIOSCOR. Refrigerat & adstringit; prurizibus, viceribus vetustis & iis quæ pascendo serpunt, confert.

Similiter Polygono Gal. sed essentia eius crassior, quàm Polygoni est. Plin. eadem ferè.

MALABA-



Malacothor. MALABATHRYM. *Advers. pag. 129.*  
*Tamalapatra Garcia & C. Clusij.*

GENTIANA maior. *Advers. pag. 129.*  
*Hisp. Gentiana.*



Gentiana  
 transmissa  
 purpureis  
 floribus C.  
 Clusius.

Leg. pa. 130.  
 lin. 9. Smar.  
 lin. 10. eandem  
 ed.  
 lin. 11. Lencor.  
 semen.

DIOSCOR. Eadem Nardo sortitur vires. sed efficacius omnia praestat; vinam vehementius ciet, ac stomacho magis prodest Malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibus tritum, & in vino seruetur commode illinitur. Subditum linguae, oris haeritum & suavitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat; & ab erosione tuetur.

Gal. Malabathri folium cum spica nardi simillimam facultatem obtinet.

GENTIANA maior.

DIOSCOR. Vt radice excaesoria, & adstringens contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta & vino pota, auxiliatur. extracti succi drachma. laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis, prodest. hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. radix collyrii modo subdita, partus eicit. imposita, ut hycium, vulneraria est, & vlcum cuniculorum depascentium medela. succus praecipue eodem effectu prodest. oculis inflammatione laborantibus illinitur. pro meconio collyrii acerbis immiscetur. radix vitiliginem absterget. \* Succus extra-  
 hendiratio hac est. Contusa radix quinque diebus aqua maceratur. postea in eadem tanquam decoquitur, dum extent radices. & ubi refriguit aqua, linteis excollatur. mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: sic illiq; reconditur.

\* Extractum  
 Gentianae  
 Diosc.

Gal. Radix admodum efficax, cum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione. Nec mirum si haec possit, cum impense amara sit.

Plin. subdit: Praegnantibus non bibenda. Tanta huic vis inept, ut iumentis etiam non-tussientibus modo; sed illa quoque trahentibus auxiliatur pota.


AsVL. Ad aures malas: herbae Gentianae si dederis ut supra potum, miraberis virtutem eius.

X. 3

GENTIANA

*GENTIANA minor*, *Crucista*. *Advers.* pag. 130.  
*Lege Ger. Speerenstich, Crewstwartz, & Modelger.*  
*Gal. Gentiane croisee. Ital. Gentiana minore.*

*PNEUMONANTHE Cordi.*  
*Advers.* pag. 130.  
*Gentiana minoris species.*  
*Calathiana viola Plin. Dod.*



Vlceribus fistulosis illinitur. venenis, contagiosis & pestiferis morbis auxiliatur. Thoracis vitia emendat, & eadem quæ Gentiana, præstat, sed inefficaciùs.

*PNEUMONANTHE Cordi.*

*Gentianæ facultates, sed imbecilliores, refert.*

*E floribus colore varietas.*

Vnam duntaxat & sui similem, sed floribus albis alit hortus eruditissimi professoris in Academia Louanienfi Petri Brughelij.

*GENTIANELLA sive Pneumonanthes varietas.*

Ab hac non adeò diuersa; nisi strigosior tota, quæ humenibus Brabantiae ericetis oritur, Autumno & Augusto flores caruleos promens.

*GENTIANELLA*



*GENTIANELLA minima. Aduersf. pag. 131.*

Provenit etiam copiosè in Angliæ, Belgij & Gallie Septentrionalis colibus, vbi floribus albis aliquando, sed rarò occurrit.

*GENTIANELLA Alpina. Verna Clusij. Cantabrica quorundam.*

Helvetiæ nostræ Gentianellæ, campanulæ flore similima. Flos amœnus, cæruleus, singularis, oblongior, calathæ effigie, foliolis quinis partitus. Folia, ortus & gustus Centaurei lutei. Radix gracilis, fibrosa, implicata. Celsis montium iugis gaudet: vbi etiam, vti superior Heluetia, vere floret.

*GENTIANELLA verna Clusij.**HELLEBORVM album sive Veratrum.*

*Aduersf. pag. 113.*

*Angl. Hellebor. Hisp. etiam Vedegambre blanco. Norbonensibus Vetauræ.*

*ELLEBORVM album floribus atrorubentibus præcox.*

ELLEBORVM

## ELLEBORI albi differentia.

Variat flore { Albo  
                    { subviridi.  
                    { & atrorubenti in horto Mutoni.

HELLEBORVM album floribus atrorubentibus pracox.

Ante aliud germinat foliis etiam maioribus, latioribus & longioribus. Ex horum medio caulis exit, tricubitalis aut amplior, in quo flores non albi, sed atrorubentes, stellati, quibus succedit semen foliaceum, alterius æmulatione. paucioribus fibris radix longior donata.

**DIOSCOR.** Galaticum & Cappadocicum candidiora, & pulvere quodam obrita celerius strangulatus mouent. Vomitione<sup>a</sup> autem varios extrahit humores, collyriis admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. partus impostum necat, menses pellit.<sup>b</sup> sternutamenta excitat. mures<sup>c</sup> interficit, cum melle & polenta subactum. absument carnes, si coquantur vna. datur per se ieiunus, & cum sesama, aut pisana succo, aut halica aut lentis cremore, cum aqua mulsæ, aut pulre, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Præparatio corporum, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius portione scripti aruit, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione, de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pulvis sorbitione, aut copioso halica cremore: aut paucum antea dari cibum præcipientes, statim verarum offerunt, iis præsertim quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat. Hoc enim modo deiectionis nihil periculi minatur, quod cibo manus non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdita, ex oleo balani, cum aceto.

<sup>a</sup> Causasque morborum extrahit. Constat hoc medicamentum comitiali morbo mederi. Plin.

<sup>b</sup> Plin. idem. <sup>c</sup> idem Plin.

Ægin. Tam candidum quam atrum iuxta calfaciendi, siccandi que vim in tertio excessum ordine possidet.

Gal. Excalfacientis simul & extergentis<sup>†</sup> facultatis est. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, lepraque accommodatus est. Quinetiam si in fistulam callo \* induratum infundatur, duobus tribusve diebus callum detrahit. Dentibus si cum aceto colluantur, prodest.

Plin. Optimum quod celerrime mouet sternutamenta, sed multò terribilius nigro, præcipue si quis apparatus poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestiuas somni vires, singultus infinitos aut sternutamenta, stomachi dissolutiones, tardiores vomitus aut longinquiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum vitium erat, quod propter hos metus parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius fumitur. Themison binas non amplius drachmas donauit. Sequentes & quaternas<sup>†</sup> dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum imprimis exire. Præterea micum inuentum est, quod incisum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, medulla cadit. Hæc in nimia purgatione data, vomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nebulo detur die, quippe impatientes cruciatus existunt. Nam æstate potius quam hyeme dandum; non est in dubio, corpus septem diebus præparandum cibis acerbis, abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus, pridie cæne abstinentia. Album è dulci datur, aptissimè verò in lacte aut pulre. Nuper inuenere dissectis raphanis inferere Elleborum, rursusque comprimere Raphanos, ut transeat vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor fere horas incipit: totum opus septenis peragitur horis. Medetur in morbis comitialibus, vertigini, melancholicis, insipientibus, lymphaticis, elephantia albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusque tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischiadicis, quartanis, quæ aliter non desinant, tussi veteri, inflammationibus, torminibus redeuntibus. Vetant dari senibus & pueris. Item mollibus & feminæ corporis animæque exilibus, aut teneris, & feminis minus quam viris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, vel tumeant, minimeque sanguinem excreantibus, vel latere vel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus pituitæ, cum axungia illitum. item suppurationi veteri. Muscæ necantur albo trito, & cum lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur.

**MESUE.** Elleborus duplex, albus & niger, idemque salubrior albo: quin & albus symptomata terribilia minatur: niger autem corpus incolume, & velut iuuenile tuetur. Eligendus in eo genere est saporis acri, gustantem mordente, colore alari, fragilis, medius ampli & gracilis, recentis & vetusti, grauius & leuius, aut potius leuior quam grauior: leuius autem ac sine asperitate. Radix eius est præstantior, & in ea fibrarum ac radicularum cortices: Vere aut æstate colligatur. Albus autem minus est tum acer, tum mordax: neque mox acrimonia eius apparet, si amarior est nigro. Cætera nigro facultate est similis, nisi quodd diuini feruari potest. Niger est calidus siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluat, carnem ulceribus supererescens exedit. Addè, quodd si is ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorius reddit. Albus autem calidus siccus in medio tertii, similiter terget, mordet: sed vomitu multo purgat, & sternutamenta violenter mouet. Vitandus autem hic est, quodd strangulet. Niger autem omnium consensu sumendus, præsertim castigatus natura & arte: solis robustis & animosis dandus, & Vere ipso. Datus autem, quando & cui conuenit, temperamentum facit melius: ob id mores quoque

† Aegi. eadē.  
\* nigro tribuit Aegin.

† quatuor drachmas & nos declinamus.



quoque probatior reddat, & corpus incolume, ac velut inuenile efficit. Hæc enim propria ipsius sunt opera, Hippocrate auctore. Corpus enim totum excrementis corruptis expurgat: clementer ac sine molestia vacuat bilem vtramque, & pituitam: sanguinem proinde puriorem reddit, attrahendo scilicet excrementa in venis sanguini mista, non à solis cavitatibus partium, sed à toto corpore, ac etiam remotis partibus, & cute ipsa. Ad cerebrum quoque purgandum, & caput totum, & sensuum instrumenta, & nervos, & viscera, & vesicam & vterum, est efficacissimus: cerebrique affectibus, vt cephalalgia, hemicrania, mania, melancholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aquarum in oculos defluxui apertè confert: iuncturarum quoque morbis, vt nodis, & tumoribus scirrhosis aliis: strumis etiam. In summa, est velut theriaca, & per antonomasiam medicina elephantia, canceri, herpetis, erysipelatis, exanthematum, phagedænarum. Pulvis quoque tenuissimus ellebori nigri, visum roborat: Acetum quoque cum hoc decoctum, auri instillatū, tinnitui confert, & auditum roborat. Idem acetum si os colluat, dentium dolori confert: præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartana biliosa, reliquis affectibus melancholicis sanatu. contumacibus: urinam, & menses mouet: corporis colorem & odorem bonum efficit, ac etiam oris, cutis affectus, albos virosque quouis vtendi modo sanat: ex aceto affricus cuti, eius fæditatem & panos delet. Albus autem vomitu inmodico & violento symptomata excitat terrenda: foris autè affricus cutis vitia, scabiem, impetigines, lentigines valenter iuuat. Vterque autem fistulis & vlceribus putridis ac malignis medetur. Albus igitur quia huius tempestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum, præsertim suffocans, viteretur. Nigri autem virtus ad nostra vsque tempora est tolerabilis, licet etiam difficilis. Sanis enim corporibus elleborus est molestus, inquit Hippocrates, arte autem & industria nostra castiga-

HELLEBORINE siue Epipactis recentiorum  
& Belgarum. Aduers. pag. 132.

tum, quando & cui oportet, rectè propinamus: agitque salubriter. Filius autem Zesar manna melli simili tepida quantitatem corticis radicula- rum ellebori aptam horis octo macerat, cola- rum dat, in quo virtus est ellebori. Idem fit in melle vuato, aut iure gallinarum vel carniū, aut oxymelite, aut vino dulci, aut condito, aut sy- rupo, aut sapa aliqua, superaddentes polentam vel orizam, aut pulrem, & forbitioni per se datur. Vtriusque verò ellebori virtutem ex corpore de- turbat mulla decoctum vuarum passarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum, cum oleo nucum, vel amygdalarum dulcium, vel simili: pul- verem verò ellebori fumere tutum non est. Da- tur autem à siliquis sex ad tertiam drach. vnias, vel vsque ad drachmam vniam.

EPIPACTIS, siue HELLEBORINE.  
*Alisma quorundam Cordo.*

#### VARIETAS.

Flore stellato ex violaceo rubello secus Smer- pont Picardie inter Pulsatillas sedula manus præ- clari viri Caroli de Houchin. D. de Longastre, ha- rum studiosissimi & doctissimi, legit.

HELLEBORINES *rara species.*

Hanc beneuolentia eruditissimi medici D. Hermetis Clerici nactus sum, è suis Italicis



Y

pere-

peregrinationibus. Elleborastro nigro affinis ea admodum est floribus herbaceis stipatim confertis: folio tamen plantagineo helleborines albæ ad Sigillum Salomonis accedente.

**NARDVS** Celtica; *Saliunca officinarum* Gallia, Germania, Hispania & Angliæ.  
*Nάρδος κελτική*. *Aduers.* 132.

**Diosc.** Ad eadem que Syriaca, pollet: sed vehementius vinam cit, & stomacho vtilius est. Inflammationibus iecinoris, & selle fusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij decocto bibitur; item aduersus lienem; renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Nardi Celticæ radices atque cauliculi abiectis folijs vsurpantur Diosc. Galeno verò flores in tertio Andromachi medicamento.

**NARDVS** Celtica altera videtur *Caltha alpina* Gesneri. *Plantago Alpina* quorundam.  
*Aduers.* pag. 133.

**HIRCVLVS**, *Nardo Celtica* similis herbula.  
*Aduers.* pag. 133.

**SAPONARIA.** Belg. *Sceytrupt*.  
*Aduers.* pag. 133.

*Struthium* sine radícula est Cunder Auicenn. Valerando.  
 Calida & sicca est.





**PERSICARIA** vrens *Hydropiper*. *Cratægonum* Cordi.

Germ. Wasser pfeffer & muckenkraut. Belg. Wa-  
terpeper. Gal. Cultage. Ang. Earthmint. Hsp.

Pimenta aquatica. Ital. Pepo aquatico.

Advers. pag. 134.

**PERSICARIA** siliquosa nostra, **NOLI ME**

**TANGERE** vocata, est *Esula sylvestris* Tragi.

Advers. 135.

**PERSICARIA** pusillarepens.



**Diosc.** Folia vna cum fructu imposita, ædemata & durities veteres discutunt, ac suggillata delent.

Calida & sicca Gal. minus tamen quam piper.

Oleum *Hydropiperis* ad nodosam tophaccamue podagram chymicum & empiricum arca-  
um.

Recipit succotum *Hydropiperis*, *Leuistici* vulgaris, & *Pastoriae* bursæ añ. q. T. quinque ver-  
ecum nigrorum capita, & ranas quindecim. Ebulliant in balneo in lib. quatuor olei ad osium  
ssolutionem, & transfusa ad vsum reponuntur: potenter digerit, & ex alto trahit imposita herba,  
sed tophis & ædematosis tumoribus illinitur vtiliter.

**PERSICARIA** miis. Germ. Berückkraut/flockkraut. Belg. Berückerupt & vloochrupt.

vulneraria est pota & illita. Advers. pag. 134.

Floribus albis Antuerpie ad portam Rubram & Lutosam provenit.


*Pusillarepens* **PERSICARIA**.

Antuerpiani agri glareosis sabulosisque vdis quadruplo minor humi repit flosculis aliis candidis,  
tis purpurantibus, reliqua facie similis.

In agro Neruiensi altera multò maior provenit folijs hirsutis, gustu acerbis, floribus albis, aut pur-  
pureis. quidam Britannicam appositè dixeret.

Britannica.

BALSAMI-  
NA (sempra  
perfoliata).  
Aducci. 134.



CAPSICUM  
fruticosum  
blagum. Ad-  
ucci. 134.



RH  
NV  
STI  
NA



**CAPSICVM**, *Piper Indicum* longioribus siliquis. Germ. Indianische Pfeffer. Belg. Wysslie peper. Gal. Poivre d'Inde & de Bresil. Aduers. pag. 134.  
*Piperitis Cordi*. Siliquastrum Plin. & Tragi; perperam *Piper longum* Diosc.

Utilitas & usus non dispar hydropiperi ad duros & frigidos tumores. Cutis sedationes delere exmelle illitum proditur.

**RAPHANVS** sylvestris officinarum, *Lepidium Aegineta*. Germ. Pfefferkraut.  
 Gal. Passerage. Ital. Piperella. Aduers. pag. 135.  
*Lepidium minus Cordi*, & Tragi.

**Diosc.** Vñ foliorum *Lepidij acris* & exulcerans, quapropter, ischiadicis trita, praesentissimum est auxilium, si cum *Helenij radice*, quarta hora parie, illinatur. Lienosis simili modo prodest: lepras eximie. Radix appensa collo, dentium dolorem liberare existimatur.

Clinicæ & obstetrices radicem potui puerperij ad facilitandum partum exhibent, eoquæ ab illis studiose alitur.

*Crassa radice* **RAPHANVS Rusticanus**, *Lapathij folio*. *Thlaspi* & *Simapi Persicum*: *Armoracia* Tragi: *Thlaspi Crateua* Diosc. Gal. Raiffort sauage.  
 Ital. Raffano & Rauano.

Raphano Rusticano lacte aut Zytho macerato ad stomachacem, Scorbutum nuncupatum, Frisij feliciter vtuntur.



**DENTARIA** *Rondelletij*. Aduers. pag. 136.  
*Lepidium Aegineta* Monsp. *Molybdæna* Plin.

Carpis imposita ex sale, corpore purgato tertianam notham soluit; horroresque quartanæ cum oleo Rutaceo & è piperibus, inuncta dorsi spina.

Plinio, *Molybdæna* commanducata, si oculus subinde liniatur, plumbum, hoc est morbi genus, ex oculo tollitur.

#### LEPIDIVM annuum.

Herba alia est quæ à simili cum figura, tum ortu foliorum, *Dentillariæ* *Monspelliaciæ* *Lepidij* cauli incumbendum, herbarijs nostris *Lepidii dicta*. Caulis ite bicubitalis multifidus: flores albi, & semen foliaceis *Thlaspi* involucris clausum, acre gustu: radix fibrosa. In Belgio hortense; hyeme virens, folijs *Lepidio* maioribus.



## HORTORVM COSTVS

Aduers. pag. 137.

BALSAMITA maior Dod.

*Mentha corymbifera* Cordi. *Alisma* Tragi. *Lepidium*  
Diosc. quorundam. Ital. Herba di S. Maria &  
Salvia Romana.

Capitis dolores finire asserunt recentiores: he-  
par roborare natiumque calorem instaurare: ca-  
lore, tantillo amarore & adstrictione moderatis,  
fluxiones siue rheumatismata sistit: concoctionem  
iuuat, mulierculis expetita ad placentas. Se-  
men vermes necare asseritur, stomacho & cordi  
amica.


## ALYSSON Dioscor. puratius.

Aduers. pag. 255.



LUNARTA  
Græca, BOL-  
BANAC Bel-  
garum. Ad-  
uers. 137.  
perpetam  
Raphanus  
syl. primus  
& Armora-  
cia Fuchlio  
Absergit,  
modice cal-  
idit, urinas  
cit, vti Ra-  
punculus.

Lunaria Græ-  
ca semper  
virens radi-  
ces habet fi-  
brosas, mini-  
me bulbotas



Diosc. Eius decoctum singultus sine febris postea  
d'scurit, idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odore-  
tur.



ss. lege  
holeraceo  
aero, &  
longe.  
tur, cum melle trita, vitia† curis in facie, & lentigines emendat, confusa in edulio, rabiei canis\* mederi putatur.  
domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus atque animalibus fascini amuletum. purpureo luteo circumli-  
gata, pecorum morbos abigit.

Easdem facultates tribuit Gal. Alyssu quas Dioscor.

† Gal. Alysson nuncupata, quod mirificè iuuet demorfos à cane rabido. Sed & rabienti quo-  
que data, sepe in totum sanavit: atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit. Dictumque prius  
est talem facultatem ex sola percipi experientia, & planè nulla constat methodo. Quod si quis ad  
multa experiatur, cognoscat facultatem habere mediocriter siccificam & digerentem, cum hoc ut  
absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & vitiliginem & maculas faciei à sole proгна-  
tas expurgat.

VIOLA MATRONALIS, & *Dianthus*,  
*Viola alba* Tragi. Belg. *Wit*; winter  
biolen. *Aduers*. pag. 137.



VIOLA Mariana.  
*Raphanus* syl. Diosc. Dod.  
*Aduers*. 137.



lege *Viola Ma-*  
*riana* an sit  
Diosc. Me-  
dianus?

*Vis* 'Rapun-  
culo similis.

*Viola matronalis* { Suauissimi odoris, totamque minorem & floribus albis alit in horto Ioannes Mu-  
varietas. tonius.

Tussi medetur, conuulsis & difficulter spirantibus. Vrinæ & sudores propellit. Incidit, ab-  
stergit, & digerit.

EPIMEDIUM, *Advers. pag. 138.*Epimedium  
Angul.TRACHE-  
LIVM mi-  
nus. *Advers.*  
139.lego lin. 14.  
abjunctis crescit.TRACHELIVM, *sive Cervicaria. Vaularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchf. & Archangelica quorundam. Advers. pag. 139.*

## EPIMEDIUM.

Belgij hortis hodie inquilina facta stirps, vbi  
sæpissimè flores inter folia recondit, qui minus  
supra folia se exerunt, ut pictura docet; specio-  
si, quaternis foliolis, intercurrentibus lineis albis  
variati, quorum ora & aversa pars rubent: inter-  
na flavescit; medijs apiculi virent.

## TRACHELII varietates.

Passim istud etiam asperis, saxosis Angliæ  
& Gallobelgij syluosis fruticat: sed strigosius,  
hilarius minus & amœno aspectu: alioqui persimile  
& congener.

TRA-



## TRACHELIVM minus.

Radice fibrosa purpurarubentibus floribus stipatur, alioqui cæteris haud ita abfimile.

## TRACHELIVM maius Belgarum.

Priori facie assimilatur, & prorsus idem foret, nisi alterum caulium proceritate, foliorum longitudine & magnitudine duplo superaret. Flos cæruleus, Violæ Marianæ suppar.

## Anglicum Septentrionale maius TRACHELIVM candidum.

Semina venusta & rarissima plantæ hoc anno quum hæc meditarer, ad me misit D. Thomas Pennus Medicus Londinensis stirpium doctissimus, ex boreali Angliæ tractu delata, vbi copiosa & nusquam alibi, vel à quoquam observata. Tota facie Cernicaræ maioris iam descriptæ non abfimilis: sed folia ferè digitalis: Flores item Trachelij vel Violæ Marianæ candidissimi & maiores & longiores. Caulis binum & ternum cubitorum surrectus, Radix fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuaticatur. Semen Trachelij, sed maius.

Lactescens CAMPANVLA maior.  
Pyramidalis Luteiana.CAMPANVLA persicifolia nostras. Aduers. pag. 139.  
Phytocoma Martb.

Quod plus aliis cunctis lactis fundat, Lactescens hæc meritò dicta; cuius ima folia Solani hortensis & nigra Martiæ violæ media, leuia, atrouirétia. E radice fibrosa Violæ Marianæ, turgida lacteo succo, addè viuaci, vt vel tantillo frustillo insoffo, repullulet: caules emittit tenues ternum & quaternum cubitorum, à medio summo tenus foliis angustioribus, longioribus, copiosis, floribus amænis, cæruleis, campanulæ nostratis maioribus, nolas item exprimentibus, cinctos, in acutum Pyramidis ritu fastigiatos. vnde Pyramidalis dicta. Belgio hortensis, nullius vsus hæcenus comperti.

CAMPANY-  
LA minor  
rotundifo-  
lia.



RAPUN-  
TIVUM  
maius. Ad-  
uerf. pa. 143.



R.  
T.  
u.

L.

Lev.  
purp.  
& al.



CAMPANULA minor rotundifolia. Aduers. pag. 139. Cantabrica Plin. Anguil.

RAPUNTIVM paruum. Aduers. pag. 139. Ital. Rapunzolo.

Rapunculi è floris colore varietas. { Albis floribus secus Brugellerte Hannonia oppidulum variat.  
Lactis copiam augeri quadam nutrices elixa radice, ex pipere sumpta, exploratum habent.

LEVCOIA Diosc. Aduers. pag. 141.

Viola matronales Fuchs.

DIOSCOR. Lutea præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores seruesacti in defensionibus, valent contra vulnæ inflammationes, & menstrua expellunt. Sanant ori vlcera cum melle; cum cerato rimas sedunt. \* Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem expriment, & podagricos tuant. † Idē Hipp. Aegin. idem.

Agin. Viola alba frutex vniuersus extergit, & tenui essentia constat, plus tamen flores, atque inter hos siciores, idcirco menses proritant, fetum perimunt & eiciunt. Vescum si quis eius vehementiam aquæ admistione hebetauerit, ad inflammationes etiam conferet, præcipue vteri. Radices æqualis facultatis sunt, nisi quatenus crassiore, & magis terrestri substantia. Cum aceto inflammationibus schirrho induratis illitæ succurrunt. Adem Gal.

LEVCOIVM floribus luteis, KEIRI Arabum.

Belg. Grel biolieren. Angl. Wallt gilliofer, wal gelouert, and stock gelouers. Hisp. Alhelys.

LEVCOIVM marinum minus, flore purpurante.

Aduers. pag. 141.

Hesperis Theoph. quorundam.



KEIRI, siue LEVCOIVM marinum flore luteo.

Luteum marinum facie keiri vulgaris, siue mediterranei Leucoij lutei floris: folia item viridia, sed maiora, latiora & flauentia ex viridi.

Varietas.

Albi floris colore duntaxat variat, & folij exilitate hæc leucoij maritimi species, vtraque in Belgij hortos translata.

*Patauinum marinum* LEVCOIVM.  
*Eruca peregrina* Clusij.



*LEVCOIVM marinum alterum latifolium.*



Hanc alebat Melchiorus Guilandinus stirpium summus explorator, in celeberrima & antiquissima Patauina Academia simplicium medicamentorum professor, & Senatorij ibidem Venetorum horti praefectus. Folia illi Leucoij marini maioris & minoris media, concoloria, infernè angusta, qua radice ceruici innituntur. Cauliculi sesquicubitales, in quorum summo flosculi luteoli stellati: semen Leucoij simile & par, compressum in tereti folliculo Thlaspi maiore.

*LEVCOIVM marinum alterum latifolium.*

Alterum Leucoium marinum quod alunt horti quidam Belgij natiuis maritimis natalitiis, non ita diuersis est foliis, sed latioribus, rigidioribus, hirsutioribus: flores caeruleo-purpureos in palmaribus & sesquipalmatis coliculis. Semen in siliquis minoribus multo Leucoij lutei.



LYCHNIS coronaria. Aduers. pag. 142.  
Hisp. & Ital. Lychnide coronaria.

Dioscor. Semen cum vino potum, à scorpione  
ictu auxiliatur.  
Calidum secundo, & siccum quodammodo or-  
dine Gal°.

LYCHNIS syl. rubello flore: an Hesperis Theoph.?  
Aduers. pag. 142.



Dioscor. Semen duarum drachmarum pondere  
potum, biliosa per aluum ducit: & à scorpione ictu cūenit:  
aiunt etiam scorpiones torpescere, & ad ledendum in-  
efficaces reddi, hac herba ipsis apposita.

LYCHNIS sylvestris hirta.  
Lychnis syl. quinta Clusij.

Alia non est absimilis, quam à foliis hispida hirsuta  
dixerunt. E fibrosa & implexa radice complures rotundi,  
geniculati, hirti, villotique surculi, & folia Nigellastri mollia & incana. Flos iuxta alas  
suae rubens Lychnidis sylvestris: Semen in capitulis  
sive calycibus rubidum, Ocymastri. Arcis, fetibusque Gallo-  
prouinciæ & Norbonensis agri gaudet.

LYCHNIS *fyl. prima Clusij.*  
& *Beben album Salamantinum.*

LYCHNIS *fyl. altera incana cauliculis striatis.*  
*Papauei Spumeum quorundam.*



Lych. fyl. 2.  
Clusij inrer  
Caryophyl-  
los.

Rariorem multò, Belgio difficiliùs oriundam, mihi minimè animaduersam fateor; sed posteris scitè etiam à Carolo Clusio literis proditam; cuius idcirco indicium & descriptionem sequemur, vt gratiam nobiscum habeant, acceptamque referant herbarum studiosi illi cui debetur.

Civs. Geniculatos habet cauliculos, pluresque alas facientes, pedales aut maiores: folia in singulis geniculis bina, ternæque, interdum plura, angustiora quàm reliquorum, in virore candicantia, & quasi cæssa: flores in summis ramulis, ex quinis non pluribus foliis bisulcis congestos, interiore parte candidos, exteriore purpurascens aliquantum, & antequam omnino tabescant, sese contrahentes & circumuolutes: calyces duros admodum, breues & subrotundos: semen paruum, rotundum, Papaue-  
ris rhœadis sed cinereum continentes: radicem satiss crassam, candidam, multifidam, sed non perennem. Quibus facultatibus sit prædita, compertum non habeo, degustata verò subamaro sapore de-  
prehenditur.

LYCHNIS *fyl. altera incana cauliculis striatis.*

Dodrantalès hæc herbula Lychnidi marinæ facie proxima, nusquã, nisi in Gallo-prouinciæ & Italiæ campestribus & vinetis à me reperta: quinis & senis sesquipalmatis ramulis & foliorum gemino positu, effigie & ortu humile Nigellastrum, siue Pseudomelanthinum apprimè refert; sed quini striati confertim stipati semen claudentes florum calyculi, Lychnidis marinæ, vniuersa planta albicat, gustu præficcò nonnihil calido.

• LYCHNIS



*LYCHNIS fl. hirta minima.**Lychnis fl. 6<sup>a</sup>. minima Clusij.**LYCHNIS Chalcedonica minima.*

VARIETAS. Quæ aridis, saxosis collibus Narbonæ & Salamanticæ vicinis flores fert aliquando minores, odore sanguineo purpureo nitentes: nec alia sui parte dissimili, nisi quia tota delicatior pal-  
mum vix æquans: plantula hirta.

*LYCHNIS fl. 3<sup>a</sup>. Clusij, cauliculis striatis.*

Non diuersæ naturæ aut figuræ est Lychnis illa affabrè à Clusio posteritati exhibita, geniculato cauliculo, sed paucioribus ramis concauo, & binis foliis è geniculis singulis virentibus magis rigidioribusque: floribus item iuxta alas, dilute rubentibus & calyculis cinereis amplis, striatis, semen cinereum reliquis maius claudentibus.

*LYCHNIS Chalcedonica minima.**Aduers. pag. 143.**Flos Constantinopolitanus Dod.*

*LYCHNIS Chalcedonica lanas expurgat Saponaria ritii.*

OCIMOIDES

OCIMOIDES, siue OCIMASTRVM. *Aduersf. pag. 143.*  
*Lychnis sylvestris* Dod. *Polygonatum* Tragi.

SPVMEVM papauer vulgo. *Aduersf. pag. 143.*  
*Behen album* Monspel.  
*Polemonium* Dod.  
*an Melandryum* Plin.: lib. 26. cap. 7.

OCIMASTRVM *Valerianibon. Aduersf. pag. 144.*  
*Valeriana rubra* Dod.  
*Valeriana rubra & Behen rubrum* Belgarum.  
*Saponaria altera & Struthion Vlysis* Aldroandi.  
*an CONDVRDVM* Plin.: lib. 26. cap. 5.



Iecinori herba *Melandryum* medetur, nascens in segete ac pratis, flore albo, odorata. Eius cauliculus conteritur ex vino vetere. Item herba *chalcetum* è vineis contrita imponitur.


OCIMASTRVM *Valerianibon.*

Plin. Solstitialis herba flore rubro, quæ suspensa in collo comprimere dicitur strumas.

Lege in *Aduersf.* Radice odoratiore, *Valerianæ æmula*; cuius vires nonnihil referre videtur, sed imbecilliores; humido quippe excrementitio obtunditur in Belgio potissimum.

OCIMOIDES





LYSIMACHIA LY-  
TEA. Belg.  
geri turde-  
rick. Ital. &  
Hisp. Lysimachia. lege  
Gal. Cornic. Ad-  
ucti. 144.



LYSIMACHIA fili-  
quosa. Ger.  
Braun &  
Rot Weiden-  
reig. Delphi-  
um Diole.  
Dalec. flos  
& semen  
quadrant.  
Adueti. 145.

Lyfi.



CHAMAE-  
NERION  
G.neri.  
Delphi-  
nium buci-  
num Diosc.  
Aduers. 145.

Lysimachiae  
singuliflorae va-  
rietas.



GALERI-  
CVLATA.



LYSIMACHIA caerulea hortensis.  
Aduers. pag. 145.  
Veronica recta quorundam.



Diosc. Foliorum succus adstringentem sua vi, san-  
guinis reiectionem supprimit: dysenterici potui datur, aut  
infunditur. Menstruum abundantiam sistit, in pecto. Sangui-  
nis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur. Vulne-  
rum cruorem cohibet, acerrimum nidorem suffusa reddit;  
qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

LYSIMACHIA Galericulata caeruleo-purpurea.  
Aduers. pag. 144.

Riuulorum & fluminum ripas & depressos agro-  
rum margines Londinensis & Antuerpiani agri se-  
quitur haec, plures emittit quadratos sesquipedales  
& bicubitales geniculatos pediculos; in quibus  
folia Lysimachiae purpureae similia, scordei xmul-  
tatione atroviola, ex geniculis gemina, & quibus in-  
star galericuli flores ceruleo-punicantes. Radice va-  
ridi diuaticata repit: vt nullum hactenus descripta  
aut depicta, sic visu neglecta aut incognita.



*CONYZA media*. Hiff. yerua de las  
pulgas olorosa. Aduers. 143.

*CONYZA minima*, minimè omnium glutinosa:  
perperam *Conyza minor* Matthioli. *Pfytum*  
Cordi. Aduers. pag. 145.

After *Atticus luteus* Fuchf. & perperam *Calamintha tertia*.



Diosc. *Conyza* duo genera. quæ parva vocatur, odore præstantior est. maior verò frutice altior, & folijs la-  
tioribus, graui odore vtriusque folia oliua similia, hirsuta, pinguis. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attol-  
litur, in minore pedem æquat. flos fragilis, lutei aut fului coloris: qui in pappum abit. radices superuacua. Si ffitu  
substratūque frutex totus serpentes fugat. culices abigit: & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium pla-  
gis, & tuberculis, ac vulneribus. flores\* & folia cum vino ad menses partūque eijciendos bibuntur. item contra vrina  
stilleidia, arquatū morbum, & tormina. comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in defensionibus medetur \* idem Gal.  
vulua malis. Impositus succus abortum facit. ex oleo efficaciter horribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. & Paulus.

*Conyza media.*


Est Tertia Dioscoridis *Conyza* minimè pinguis, multò tamen grauioris odoris, & iniucundio-  
ris,\* sed inefficacior. folijs mediæ inter maiorem & minorem amplitudinis prouenit locis humentibus; \* Gal. idem &  
Belgio, Gallia, Italia, & Germaniæ familiaris. Paul.

Gal. & Paulo Maior & minor sunt tertij ordinis in calfaciendo & siccando: proinde oleum in quo  
elixæ fuerint, febrium rigores per circuitum remanentes sedant.

Maior digerit & siccit potenter decocto & fomento.



259 Aster  
 260 Aster  
 ASTER AT-  
 TICVS.



ASTER CO-  
 NYZOIDES  
 GENERI.



ASTER ATTICVS *superius* Clusij.





ἀσὴρ Ἀττικὸς ὁ βοῦβόλιος ASTER ATTICVS. Aduers. pag. 147.

Gal. Estoillee & aspergoutte menue. Hisp. Bobas.

Germ. Wegerkraut / buchkraut & sternkraut.

It Bubonium, id est, Inguinaria & Inguinalis, quod in inguinibus medetur.  
Oculus Christi, Monspel.

Diosc. Quae caulem ambiunt folia stella moderata, oblonga, hirsuta, feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, prociua sedi, ac inguinibus, illius auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginu, & pueris comitiale malum sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinere conuenit.

Aegin. Mixtam facultatem, discutientem & refrigerantem sortitus est.

Aegin. eadem.

lege per fami-  
liarem.  
lege Aster lu-  
teus frutico-  
sus. lin. 14.  
& lin. 16.  
Nemausium.  
lin. 49.  
lege montanus.

ASTER Italorum flore purpureo luteo. Aduers. 147.

Nonnusquam in Galloprovincia, Narbonensi Gallia & Longobardia occurrit hic Conyza facie: floribus non modò luteis; sed mixto luteo purpurascens, foliola radiantia stellarum æmulatione exerentibus: nec secus in pappis dehiscens situ & ortu Asteris Lunariae folij Narbonensis; maioribus tamen, cæteroquin omnia cum luteo eadem. Belgis hortensis est.

pag. 148.  
lege lin. 17.  
similia.

GLASTVM satium. ἰσάτις ἡσάπος. Gal. Guesde & pastelcultiue. Angl. Wode & wade. Germ. Wepdt. Belg. Wepdt. Hisp. Pastel. Ital. Guado domestico.  
Aduers. pag. 148.

ASTER CONYZOIDES.

CONYZOIDES GESNERI.

In Anglia, Belgio & agro Louanienfi iuxta academiam pomæria frequens hic oritur: facie, folijs & furculis dodrantalibus, interdum & maioribus Conyzae minimæ. flores asteris obsoleto luteo in pappis dehiscens.

ASTER ATTICVS supinus Clusij.

Virgultis exit crebris, hirtis; humi fusis, ab vna radice prodeuntibus: folia edit oblonga hirsuta Lychnidis aut Stellæ atticæ, numerosa & viridiora, flos luteus buphthalmi aut Chrysanthemi. spõ. tẽ oritur quibuldã Castellę locis Clusio auctore.

GLASTVM satium.

Diosc. Illa folia tumores omnes discutunt, cuncta vulnera glutinans. sanguinis profusum sistunt. ignem sacrum, phagedænam, putrescentia viscera, & qua serpunt, sanant.

Subdit Gal. Satium tumores œdematodes mirificè discutit, simul & reprimat, omnibûsq; vlceribus malignis mirabiliter resistit. etiã si putrescât, etiã si erodatur. Quod si quãdo laborantibus natura valdior appareat, folijs eius tritis aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, pro vincentẽ in vnoquoque affectu, miscere oportebit.



*isatis dyptis*  
 Isatis syl.  
 Ger. wild  
 we de Belg.  
 wild weede.  
 Angl. wild  
 ward &  
 modde. Gal.  
 l'ancie sauua-  
 ge. Hisp. pa-  
 stel saluage.  
 Ital. Guado  
 saluatico.  
 Aduers. 148.



*Isatis syl. Vaccaria diffusa: Thamecneimon Cordl.*  
*Glastrum primum Anguil. Aduers. 148.*



*LYTTEOLA*  
 Belg. wou-  
 we. Gallo-  
 belgis V Van  
 de. Germ.  
 Ackerspim-  
 men. Ance-  
 rhium  
 Tragl. Ad-  
 uers. 149.



Ses.  
 des p.  
 Club.



SYLVESTRE *Glaſtum*.

**Dioſc.** Eadem qua & ſupra dicta præſtat: potu & illiſt uienſis auxiliatur.

**Gal.** Sylveſtre potentiſſimè humidis putredinibus obſiſtit; ad cætera verò iam comprehenſa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate deſiccatur; talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienofiſ quoque vilis eſt, quum altera prodeſſe nondum poſſit.

SESAMOIDES paruum Salamanticum *Cluſij*.

His accerſenda videtur ea herbula, (nonnulla ducti ſimilitudine) quam icone & deſcriptione *Sesamoidis* minoris Salamantici nomine, poſteritati patefecit in hunc modum *C. Cluſius*. Ab vna perenni candida duriuſcula & craſſiuſcula radice, plures cauliculos emittente, lini folijs denſis, à medio ſummo tenus ſoſculis racematim, initio ex herbido purpurantes, deinde villis expallentes, è quorum medio veluti quatuor grana viridia conſpiciuntur, quæ decidente flore in ſiliquas excreſcunt, ſemine exili nigricante plenas. In colibus Salamaticæ proximis prouenit lapidoſo ſolo, vbi Maio floret, & ſubinde ſemen profert.

**E PHEMERON** *Matthioli*, vel potius *Ephemerium*  
*ſpurium*. *Giglio matto*. i. *Iris fatua* *Matth.*  
*Ananiſibus*.

**TITHYMALVS** *Paralius*, *Germ.* *See wolfs milch*.  
*Hiſp.* *Leche trezna*, *Lleutera marina*. *Ital.* *Tithymalo marino*. *Aduerſ. pag.* 150.



*Characæ & Myſimiti ſimile ad vſus reconditur Dioſc.*

*Herbariorum* ſedulitate *Belgiæ* hortis indigenum factum eſt; quod *Glaſto* vel *Lyſimachijs* annectendum videtur ſoliorum quadam & plantæ de facie affinitate: folia quippe *Lyſimachiæ*, *Glaſti* aut *Luceolæ* media, in æſquicubitalibus cauliculis denſis, mulſisque alis concavis; ſoſculi candicantes *Verbaſci* nigri, quinario ſoliorum numero. *Seimen* puſillum in rotundis lini pericarpijs occluſum, radix multum fibrata. *Iſtæ* ſedis.

MYR-

MYRSINI-  
TES Myrhi-  
felus, Myr-  
aria Gaza.  
Ital. Tity-  
malo Musi-  
nita.

Symacro-  
kata.



TITHY-  
MALUS cy-  
parifolia.  
Dioic. Eadē  
vis quā su-  
perioribus.  
Aduers. 151.

lege Cypres-  
sinus.

Perpetam  
Etulaminoe  
Ital.



MYR-



MYRSINITES, *Myrthifolius*. *Aduers.* 150.

**Diosc.** Simi is fuspte natura daphnoidi, mordaci gustu. Succus, radix, semen, folia, consimilem Characia sortitur facultatem, sed ad citandos vomitiones inualidior hac est.

TITHYMALVS annuus *Pityusæ* facie.

*Pityusæ* simillimus hic *Tithymalus*, sed varietas cernitur in radice lignosa, quæ non serpit, & floribus, qui in umbellulis pluribus à medio, summo tenui, caule cubitali, exeunt. Hunc Mutoni nostri hortus & plures alij sponte nascentem habent.

ESVLA EXIGVA *Tragi*.

Omnium *Tithymalorum* minima est *Esula* exigua Hieronymo Trago memorata. In nostris segetibus Gallobelgij & Angliæ sæpe æstivo tempore reperitur cauliculo palmum & sesquipalmum longo, paucis folijs *Tithymali* cyparissæ brevioribus & minoribus multo: flosculis item luteolis & herbaceis, summis pediculis, & iuxta alas, & semen exile tricocon edentibus. æstiva planta.

ESVLA DVLCIS in Ermo. *Aduers.* 216.

Dulcis quia cæteris minus acris, vultu Pepli siue Rotundæ *Esulæ*: caulis sequepedalis flos: & semen ut peplus; sed folia paulo longiora.

**MESVE**, Maior viscera ulcerat, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim cortice radicis tenui, leui, fragili. subrubro cassiæ modo, ante

**PITYVSA** siue *ESVLA* minor altera floribus rubris.



sex menses collecto. Nam recens quo mente collecta mala est, vi & niger, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio: Lac autem quod calidius, acrius, ac valentius fine Veris. Calida sicca principio tertij gradus, substantia constat tenui, igne acris, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiète: & terrea styptica etiã siccante materias altius immerfas, purgat valèter pituita, aquas, atram bilem etiam à iuncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, sed nocet cordi, stomacho, hepati, viscera excoriat, venarum ora dirumpit, corpus immodicè siccatur, semen absomit, febres inflammando excitat, lacte suo maxime. Ob id miscendae sunt cardiaca, stomachica, hepatica, adhuc glutinosa, cogentia, & adstringentia: glutinantia ut gummi, tragacanthum, bdellium, mucago psyllii, succus portulacæ. Postremò refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Infundatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata aut decocta, & succum intybi, vel sonchi, vel portulacæ, vel solani: additis autem myrobalanis, absinthio, aloë, præstantior euadit. Iudæus infundendo in acetum, aut lac sæpe mutando, & siccando corripit. Si te autem immodicè purgat, sede in aqua frigida ex Ruffi consilio. Frigus enim ambiens & medicamenti virtutem in vnum cogit, ipsumque roborat, & per accidens iuuat, protrusis à se materiis ad meatus per quos sunt vacuanda, succurrendumque est, ut in canonibus diximus.

## PITYVSA.

**Diosc.** Detrahiti per aluum radix drachmis duabus data in aqua mulsæ; item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus fortiorum drachma tres.

*Pityusæ* speciem alunt Belgæ stirpium peritiores spithameum & pedem altam, foliolis *Esulæ* parue. Flosculis rubris & semine Pepli, pyxidata pelta tunc foliola transmittentibus, *Tithymalotum* titu,

ESULA maior Germanica, Turbith nigrum & adulterinum, Gal. Turbith noir.

Hisp. Esul. mayor. Ital. Esula maggiore. Aduers. 152.

Radix aceto maceratur, eadem ratione quam miscebant salem & acetum Elleboro antiqui, quod celerius exigeretur Helleborus, uti suo loco non uimus. Inflammationem enim aut caloris improprietatem quam fieri solet à medicamento cunctatione, auerit.

Radixem Esulae maioris aceto & lacte præparatam in puluerem redactam à granis 12, ad grana 6, enemate infundere solemus, & in medicamento cholagogo grana 6, vel 8, sine molestia: pituitosis uero ad tempus tantillum submolestum, quia ægrius pituita expellitur. Angliæ frequentissima in sylua D. Ioannis Colkes, prope Bathoniam.

DENDROIDES. Ital. Titymalo arboreo.

Aduers. pag. 152.

CHARACIAS Montpellierensium, Clusij, &

Matth. Aduers. pag. 152.

lege Myrtili  
specie: & paulo  
post lege  
frutice.



Diosc. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

CHARACIAS Montpellierensium.

Quem nostra ætate scriptores & Montpellierenses Characiam genuinum statuerunt, Platyphyllon (ut fieri solet, ignoratione & penuria meliorum) opinati & tutati sumus, quod huic præ cæteris folia inessentialiora, ut Plinio etiam visum, ad violæ albæ & minimi sylvestris verbasci accedentia, similitudine, ortu & paritate, latifolium hunc dici oportere. Sed cum alium insuper nactus sit C. Clusius omnibus notis melius quadrare, de quo mox dicemus, ei libens assentimur. Malumus uerò procedere & sententiam mutare (non enim adeo nobis placemus) quam, Senensis exempli, maximo detrimento non modò irronum, sed & doctiorum quam plurimorum, ad nostram gloriam effigies cōcinare & detorquere, aut apris syluis appingere. Est enim Characias hic ut plurimum vnicaulis, interdum plures caules emittens cubitales, & bicubitales, cæterorum thymalorum ritu inferiore parte glabros: folijs lationibus, longioribus, & rigidioribus prægrandis Pityusæ siue Esulæ maioris. Flores Maio & Iunio, non lutei, sed nigri, & semen trilaterum circinata foliola traiciunt. Radix digitum crassitie æquat. In Narbonæ, Gallie prouinciæ, alijsque quam plurimis Gallie locis saxosis, collibus & fluentum ripis, nihil fere quentius, etiam quæ ad Lani crepidines, & pontem Castris noui.

CHARACIAS.

Diosc. Succus alui purgat, trahit pituitam bilēque, binis oboli in posca sumptis, & cū aqua mulsā, vomitiones mouet. Appetente vindemiarum tempore, succus congestus ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Alij



liqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasque guttas instillant, vt cum his inarescant: quas ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quod ventus affirer, stare quengquam, neque manus oculis ad-movere conuenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collum, scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat. quae propter catapotia cera aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo da-ri. binas tamen ternasque ficos, purgationis gratia sumpsisse satis est. Recens Lac ex oleo, perunctos in sole capillos euel-ly, renascentesque fluos & exiles efficit: denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam vitiet, tolli illi uim impetiginis, formicantes verrucas, pensiles, & quae thymi florem representant. valet aduersus pterygia, † carbunculos, phagedenas vicerum, gangranas, fistu-lasque. Legitur semen autumnis, & siccatum sole leuiter trunditur, seruesactumque loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia laesae succi effectum praebeant, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admissio cui lacte lepidio, & caseo contruso. Radix drachma pondere in hydromelie pota, per inferna trahit. decocta cum aceto, den-tium dolori auxiliatur, colluto ore.

† Gal. quia valenter tum exalfaciunt, tum extergunt, si in tempore & moderatè vtare, iuuare ali-quando poterunt. Verumenimvero & fistularum callos eximunt eadem facultate.

Gal. Tithymali omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem: inest verò & amaritas. Validissimus est itaque eorum liquor. secundum locum tenet semen, & folia: sed & radix dictarum facultatum particeps est, sed non ex aequo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maxi-mè qui illis erosis proueniunt. At liquores vt qui valentorem vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur: cæterum si aliam corporis partem contigerint, continuò adurunt, vlcérantque: proinde foris illis cera circumlinitur: quippe cum ex quarto sint exalfacientium ordine, quem esse adurentium posuimus. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porro cum vehementior sit, oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adusta extirpantur, corpusque depile reddetur. Eadem facultate verrucas, quae acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia siue o-culorum vngues & thymos auferunt, detergentque; lichenas & psoras, quia scilicet & abstergerendi facul-tas inest propter amaritudinem. Porro cum septè sint eorum genera, valentissimus est què Characià nominant; què vtiq; etiam quidam marè cognominant, & femina nuncupata Myrsinites, & qui in petris nascitur, ad modum arboris; deinceps qui verbasco adsimilis est, & Cyparissias: deinde paralius siue ma-rinus; deniq; helioscopius. Proportionem verò cõprehendit illorù facultatis & cinis, & ex ipso lixiuū erit. Cæterum hæc omni genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt.

MES V. Tithymali omnes cordi, iocinori & vetriculo maximè officiant; vasa disrumpunt; intestina abradunt; vniuersum exalfaciunt corpus, adeo vt inde febris facillè cõcitetur. Tollitur prima Tithymali noxa ijs admistis quæ cor, hepar & ventriculū roborant. Secunda verò & tertia ijs, quæ agglutina-toria facultate pollent; cuiusmodi sunt Tragacantha lacryma, gummi, Bdelliū, Psyllij feminis spissamen-tum, & Portulacæ succus. Tollitur & quarta admistis frigidis & humidis. Proinde aut Sonchi succo aut Intybi, aut Portulacæ, aut horrèis foliis, aut aceto cum cydoniorum seminibus diutius rudicula agitato commiscant. Vulgaris vsus Tithy-malis pituitam vehementer deijcit, & atrum què vocant succum patiterque; pituitas ad articulos de-curreret. Aquam inter cutem validissimè extrahit: nihilo secius exsiccat vniuersum corpus, & geni-turam extinguit. vnde Rusticorum medicamenti nomen sibi meritò asciuit.

#### Monspel. AMYGDALOIDES.

Characias primus Dod.

Monspelliensis agri ad crepidines Lani cis pòtem Castrì noui; item Lugduni ad pomæria peninsulæ Gallicæ Aynéz, (quali fluminum inguina dixeris) Aureliæ, Biturigibus & alibi Galliæ plurima. folio Characiæ Anglicæ, sed longiore, molliore, & long-e maiore, latiore, magisq; sparsa fatura peltata co-ma: radix fibrosa. Semen in Belgium deferendum Monspelij tradidi.

APVL. Ad verrucas tollendas. Tithymali la-cem mixtum cum battrachij herbe succo si in ver-rucas impoſueris, tertio die sanabit. Ad fistulas. Tithymali succum cum vino mixtum superexpri-mito, deinde cæteris fomentis obligato. Ad le-pram. Tithymali florem cum resina decoque, & leprosum illine, non sinet crescere.



CHARACIÆ VARIETAS.

Varietates.

MYRSINITES altera, & Turbith Alexandrinum  
quorundam, Characias quarta Dod. &  
Belgarum.

PLATYPHYLLUM Hispanicum.



Cognatiorem multò Characiæ quàm Myrsiniti Tithymalo putarunt Belgæ, quamvis priusquam umbellas pandat, suprema folia proferat oclusa, quæ veluti nucem Amygdali adumbrare videantur: folijs tamen pallidè virentibus characiæ æmulis, sed minoribus angustioribusque: fructus & flores luteos herbaceos cæterorum Tithymalorum ritu gestat: radice crassâ altè depacta. E Narbonensi agro & Galloprovincia in hortis Belgicis alitur.

PLATYPHYLLUM Hispanicum.

Platyphyllum legitimum eruditissimi Clusij nostri sedulitate & opera innotuit, qui hoc in Valentino agro inter Biar & Huentinente via salebrofa inter medios fructices reperit. Folia quàm Amygdaloidis aut Characiæ latiora, rotundiora, statidis nouellæ figura proxima viridia densaque. Caulis sesquidodrantalis: Flosculi purpurantes ex luteo, itidem umbilicata folia trajicientes: radice crassâ & candida.

Diosc. Platyphyllos Verbasco similis. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tu-  
sus & aquæ inspersus. Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

Eadem Gal. celerrimè namque in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur.



πῆλα PEPLYS sive Rotunda ESULA. Gal.  
 Recueille matin des vignes. i. enigilum matu-  
 num vinearum. Germ. Teuffels milch. Diabolium  
 lac. Hist. Pèplo. Aduers. pag. 153.



πῆλα PEPLIS. Hist. Peplide.  
 Aduers. 153.



LATHYRIS sive CATAPUTIA minor.  
 λαθύρις. Germ. Spyingkraut & Spinkraut. Te-  
 riebhocrner. Belg. Spinkkraut est Spurge Ital.  
 Cataputia minore. Hist. Tartago. Gal. Espurge.  
 Aduers. pag. 153.

Diosc. Grana gustu dulcia. Nulla radici usus.  
 totus frutex lacteo succo turgens, vii Tithymalus. Grana  
 sex aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis  
 deuorata, aluum purgant, sed aqua frigida postea sor- Idem Gal.  
 benda. trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Suc-  
 cus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præ-  
 bet. Cum galinaceo aut oleibus solia decoquantur  
 ad eisdem effectus.

## PEPLYS.

Tithymalis  
 vis similis.  
 Gal.

Diosc. Fructus tufus & seruesactus rerondi-  
 tur. Bili ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hy-  
 dromelitis cyatho poto. obscuris iussu per se conturbat al-  
 num. muria conditur.

## πῆλα PEPLIS.

Diosc. Colligi, reponi, ac dari, vii peplos, &  
 sale condiri solet. Easdem habet vires.

Sale conditur ad accelerandam operatio-  
 nem. Tithymallorum modo expurgat Aegin.



## CHAMÆSYCE Aduers. pag. 154.

Diosc. Rami ex vino triti vulua dolores sedant, in pecto apposti, tollunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest: Illius contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum vitilis, & hebetudines; incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle immixtus.

Gal. Abstergendi simul & acrem vim possidet. Hebetudinem visus à crassitie natam adiuuat: cum melle & oculorum crassas cicatrices deterget.

APIOS. Aduers. pag. 204.

Tubymalus tuberosus Dod.

NERION. Hist. Adelfa & Eloendro.

Ital. Oleandro. Aduers. 154.

lege flosculos  
ex luteo pal-  
lidis.



Diosc. Radicis superior pars vomitione bilem pituita & aqua extrahit: inferior per aluum. Tota viri & purgationes moriet. Succum si l. et eximere, tusa radix in fictili mergitur & agitata aqua, quod supernatat prima selectum, exiccatur. Purgat vtriusque parte in succo, sesquibolo potus.

NERION.

Diosc. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus vero contra serpentium morsus praesidia, è vino pota; eo magis vna addita. imbecilla etiam animantes vt pecus & capra, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Gal. & Aegin. foris illitum dissipat: intra vero corpus sumi lethale est.



Alpigena  
CHAMAE-  
RHODO-  
DENDROS  
odora.  
Aduers. 145

Balsamum I-  
talicum vul-  
gar e, siue  
Rhododa-  
phne parua  
rustica, Te-  
rionarcha  
Pinniputa-  
tur Guilfan-  
dino.

lege minora,  
breuiora.  
155. lin. 1.

MESEREVM  
Germanicu,  
an Chamae-  
daphne  
Diof.?  
Chamaea  
Germanica  
Dod & Tra-  
gt: Perperam  
Daphnoides  
Fuchf.  
Germ. Leuf.  
kraut & kel-  
terhals, ze-  
delbaff, Re-  
land. Belg.  
Zetibaff &  
fiter: con.  
Aduert. 155.

lege Lymnaea-  
dis apocyn.  
lin. 11. pag.  
156.

lege Augu-  
sto. pag. 156.

Alpigena

*Alpigena* CHAMÆRHODODENDRI odore varietas. BALSAMVM Alpium Gesneri  
& Rosa Alpina, vera Eonymos Theoph. Dalescam. & Herbariorum.

Huius affinem & persimilem speciem Balsamum Alpinum fecerat Gesnerus. Surculi paulò  
crassiores, folia simillima: cuius ora tantilla hirsutis pubent, auersa parte xerampelina. Flosculi  
Rhododendro minores, & confertim stipati. Heluctijs & Allobrogis montana est.

## CHAMÆDAPHNE.

Mutonus.

An Sigillum Salomonis angustifolium sit Chamedaphne Diosc.?

Diosc. Illinuntur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormina in vino bibun-  
tur. Potus cum vino succus menses & vrinam ciet. Idem facit pesto appositus.

DAPHNOIDES siue Laureola cum flore.  
Advers. 156.

LAVREOLA cum fructu. Germ. item Zeitand.  
Gal. Laureole. Ital. Oliuella,  
perperam Thymelae Tragi.

Demein  
margine  
Laureola pin-  
genda.



## DAPHNOIDES.

Diosc. Folia Lauri, quorum gustatu, os & fauces incenduntur. Pituitas extrahunt recentia, vel arida in  
potu. Menses ciet & vomitus, caput inaniter commouetur. Sternutamenta mouet. Bacca quindecim pote alium  
resoluunt.



Granum GNIDIVM, Thymelae fructus. Aduers. pag. 156. 157.

DIOSCOR. Per inferna bilem, pituitam, aquasq., detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur. Verum san-  
ces adurit. itaq. cum farina aut polenta, aut in vine acino dari debet, aut melle cocto obduclum deuorari. qui agere desu-  
dant, triuo semine cum nitro & aceto, iunguntur. Folia, quae peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, Folia Thy-  
& siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit. illium acetabuli modo cum melae.  
diluta vini potione, aquam extrahit, mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelae farina vna  
acerba succo excipitur, & in pastillos diuiditur. herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasitur in montibus &  
asperis. Hallucinantur, qui coccon gnidium fructum esse chamelae existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

CHAMELAEA & Thymelae Diosc. est Cneorum Guilandino. Aduers. pag. 157.

DIOSCOR. Folia gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahunt pituitam bilemq., foliis preser-  
tim in catapotio sumptis. namq. duae Absinthij partes, adiecta chamelae rina, hydromelite excipiuntur, & in catapotia  
coguntur. Ea autem in ventre non liquefunt: siquidem quotquot suere deuorata, reperiuntur. Foliis cum melle tritis,  
sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Gal. Vincentem habet qualitatem amarum; quamobrem sordida vlcera, & quae maximas habent  
crustas, cum melle purgare potest.

CHAMELAEA incana Bononiensum.

Maritimis Bononienfis agri, facie & vultu Dorycnij Monspelliaci incanam Chamelae cubitalibus  
virgultis reperit eruditissimus D. Hermes le Clerc, Medicus Neruiensis, qui plantam aridam mihi  
impertiuit.

ESVLA rara è Lio Venetorum insula, floribus pur-  
pureiscentibus, an Pityusa Diosc. Aduers. 160.

ALYDVM montis Ceri. Aduers. pag. 158.

Est Parmica & Conyza 3<sup>a</sup>. quorundam.

Hippoglossum Valentinum C. Clusij.

An Calcifraga Diosc.?

TYRBITH, sive TYRPETVM.

Aduers. pag. 159. 160.

Pituitam crassam, pulmonum fardus & articu-  
lorum, remotiora abditissimaque excrementa pi-  
tuitosa educit. Decocto quam infuso efficacius <sup>Leges lin. 27.</sup>  
vires exerit & exuit; vt appositè annotauit D. <sup>visa, & paulo</sup>  
Petrus Brugelius almæ vniuersitatis Louanienfis <sup>post, eam quis-</sup>  
Regius professor celeberrimus, qui suis decoctis <sup>que attripuit.</sup>  
vna cū polypodio inferi iubet. Magni vsus & com-  
modi ad omnia de Mesuei Turbith prodita, de quo  
fuo loco dicemus. <sup>Turbith Me-  
suei suo loco.</sup>

TARTONRAIRE Gallo-prouincia Massiliensium.  
Sesamoides maius Scalligeri.

c

AEIZOON





AEIZOON, *Sempervivum maius*. Aduers. pag. 161.

Hisp. Siempre viva maior, yerua puntera.

Gal. etiam triquemadame.

DIOSCOR. Eius vis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, vlcibus qua serpunt, oculorum inflammationibus, ambustus igni, podagris, per se, & cum potentilla illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum potentilla aut rosaceo perfunditur. datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profusum. teretes tineas potus in vino excutit. subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit. succus oculorum lippitudinibus sanguinis vitio conceptis inungitur.

Gal. Vtrumque, tum maius tum minus, desiccatur leuiter, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers; quare in eo plus ceteris abundat essentia aquea: ceterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata & herpes & phlegmonas a fluxione natas accommodatur.

ALOE. Aduers. pag. 161. *Sempervivum maritimum*.

Sedum amarum Columella Dod.

Hisp. Azeuar & herba Baucfa.



ALOE folio mucronato. Aloe America Clus. Aduers. pa. 161. Valerianis fil y agulla. i. filum & acus dicitur. Clusio auctore, quod folio, i. extrem; spinosus, acus, & fibris interioribus filis vicem praestent.



DIOSCOR. Ad glutinanda vulnera sanè quam virilis Arabica. Natura eius est spissare, exsiccare, somnum allicere, & corpora densare, alui resoluer. Stomachū repurgat. binum cochleariū mensura, in aqua frigida aut egelida



pot. sanguinis reiectiones sistit. regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachma pondere in potu. deuorata cum resina, aut cum aqua vel melle cocto sumpta, aluum soluit. purgationis perfecta causa, tribus drachmis sumitur. aliis purgatoris medicaminibus admixta, praestat vt minus stomachum infestent. sicca glutinandis & vulneribus inspargitur. vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. disrupta puerorum praepurgia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. hemorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. pterygia ad cicatricem ducit. linores & insignita, ex melle tollit. priuam scabras lippitudines, pruriginisq; angularum, permulcet. dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & rosaceo. capillum fluentem continet, cum vino. tonsillis, gingiuis & omnibus oris vlcibus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torreatur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit equaliter torrer. Lanatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

*Agin.* Primi excalcificationum ordinis est, exiccatum vero tertij.

*Gal.* Est autem non simplicis naturae, sed vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & ventem, vtputa ex numero medicamentorum quæ Græci ab excernendo stercore vocant *ἐκκροτική*. verum & ipsius facultates mixturam attestantur particularia eius opera; nam & gratum stomacho est medicamen, vt si quid aliud, & sinus & glutinat. *Eadem Plin.*

\* *Eadem Gal. qua & Diosc.*

*Gal.* In summa repellere & discutere simul potest, cum hoc vt paulum extergeat quantum videlicet vlcibus puris non sit molestum.

*MESSE.* Aloë medicamentorum purgantium præstantissima, & ob suam quandam prærogatiuam excellentissima. Cum enim cætera purgantia partes nostras principes, & ex his, seu fontibus profectas facultates nostrum corpus dispensantes, vel actionis vehementia lædant (vel nihil iuuent) Aloë sola eas partes imbecillas roborat, & ad functiones suas reducit, nulla omnino actione noxia: præterquam quod venarum ora tantum aperit, vt per hæc sanguis effluat. Ad has eius doteis accedit, quod cæteris purgantibus, & his præsertim quæ vacuando corpora dissoluunt, aloë mista hæc ipsa corrigit, & noxis eorum prohibitis meliora reddit. Nam sua crassiore substantia tenuem illorum, acremque naturam frangit, & noxam parium ab his promptam, celeremque proprietate quadam substantiæ inhibet: sua denique purgandi tarditate horum celeritatem temperat, purgationemque auget. His igitur ipsis nunquam non miscenda aloë. Calfacit ordine secundo, siccatur tertio, sed tamen sine morfu: ob id excrementa consumit, & à putredine vindicat, etiam cadauera, præsertim myrrhæ mista: sanguini vero draconis, & myrrhæ iuncta, sanat vlcera putrida & maligna, quia, vt dixi, sine morfu siccatur: ora tamen venarum aperit, præsertim hepatis. Quapropter hepar ab ea lædi quidam putauerunt, vtq; ipsum potius iuuaret, correctione effecerunt. Adhæc aloë lota, minus aluum subducit, stomachum magis roborat: non lota contrâ. Postremò melle excepta minus trahendo quidem purgat: magis autem partes quas permeat, tergendo. Bilem pituitamque purgat, ob id affectibus ventriculi, & cerebri, & reliquarum partium, inde nascitur, vt dolori, inflammationi, sic præcauet, vt eius creber vsus sensuum instrumenta & corpus reliquum nullo insanabili affectu tentari sinat: sed sensus acuat, cogitationem reddat meliorem. Hepati confert, icterum tollit, hemorrhoidibus & sedi nocet: ob id vitanda his, quibus istæ partes dolent, & aëre frigido, quia tunc sumpta excorticatis sanguinem educit. Vinum autem, vel aqua rosata, vel succus fœniculi quo aloë fuit macerata, oculos lotionem terget, visionem acuit, delachrymationem sistit. Datur ab aureo vno ad drachmas duas. Infusa autem ab aureo vno ad drachmas tres. Veruntamen cum & tardius purget aloë, ob id diu ante cibum sumenda, & tam imbecilliter, vt eius facultas purgatrix hepar vix transeat, nisi largior sumatur: cum denique adeò venarum ora patefaciat, vt inde sanguis emanet, his eius incommodis hac ratione occurrimus. Imprimis tarditatem purgandi aloë ipsi celeramus, si cum aromatibus essentia tenuioris & acribus, vt mace, nuce moschata, cinnamomo, spica nardi, calamo aromatico, cubebis, schœnantho, asaro, mastiche, caryophyllis, portione pari: croco autem portione dimidia, in aquæ sextuplo igni lento, ad aquæ eius tertiam, coquantur: aloës vnciæ sex, in libras aquæ singulas: post siccantur in umbra primum, deinde in sole. Idem alij similiter efficiunt per atomata sex, quibus cum aloë mistis Galenus hiëram picram componit. Eius enim actionem talia citatorem reddunt, & præterea hyssopum, cinnamomum, casia, & alia plurima. Sunt qui celeritatem purgandi aloë acquirant, macerantes aqua illa, cui incocta sunt aromata, deinde expressum potui dantes. A partibus autem remotis, trahendi potestatem aloë conciliamus, aliis purgantibus valenter (qualia sunt colocynthis, turbit, & similia) mistis: vel in decocto illo aromatico, vel in sero lactis, vel in trochiscis, vel catapotis, vel in alia medicamenti forma. Postremò venas aperire desinit aloë, bdellio, aut tragacantho, aut mastiche, aut simili permixta. Hæc autem tria eius incommoda non modò maiora habet aloë, dictas bonitatis notas egressa: sed præterea ventrem totum torminibus dolorificis conturbat, ventriculum, & hepar, & viscera alia lædit molesta adeò vacuatione, vt sua virtute illis hærente, interdum sanguinem quoque vacuet. Hemorrhoidibus & sedi eadem maxime nocet. Lotione igitur

partes huius impuræ separentur, & quod purius est, aromatum decocto maceretur, & his misceantur quæ ipsam promptè lubricando per intestina deturbent: qualia sunt aqua hordei, cum oleo nucum, aut vuarum passiarum decoctum, aut aqua tepida cum melle. Bdellium autè & Tragacanthum, præter cætera, omnem aloë castigant, & emendant.


Ægyn. Abstergerendi, distrahendi, & aluum subducendi vires continet: elota imbecilliorum exterédi vim possidet: atqui magis amica ventriculo est, & inflammatione leuat. Calfacit primo, siccat in tertio ordine. Dysenteria infunditur Plinio. Et si difficilius concoquantur cibi, bibitur à cana modico intervallo. Digitorum pterygia tollit, potenter exsiccat.

STRATIOTES, sive MILITARIS Aizoides. fol. 334.

Sedum aquaticum Dod. sive Stratiotes potamos.

Flos tribus foliis constat lacteis minima Nympha alba, in pediculo emicans.

SEDVM minimum tertium.



DIOSCOR. Herba Semperuiuo similis ni maiora haberet folia que refrigerant; sanguinem qui defluit à renibus pota sistit. Vulnera que inflammationem minantur; imumescere non sinunt: Ignibus sacris & tumoribus ex aceto allinuntur.

Gal. Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est.

SEDVM minus, facie & foliis Sedi maioris.

Alterum Sedi facie, foliis angustioribus multo magisque acutis & mucronatis, munere C. Clusij colitur in vitæto generosi viri & stirpium parentis benemeriti Ioannis Brancionis Mechliniensis, apud quem nondum floruit.

SEDVM minimum tertium.

Omnium longè minimo ex Syria asportato, folia quàm superioris, & petræi montani Sedi minora: cauliculi sesquiunciam æquant, in quibus luteoli flores maiores pro plantæ exilitate, Saxifragia albæ aut Sedi petræi montani. Radix implicata fibrata.

Leg. pa. 163.  
lin. 7. su. ulm.  
83.

Vermicularis.



SEMPERVIVUM parvum. Aduers. pag. 162.



SEMPERVIVUM minus asinum.



Vermicularis, siue ILLECEBRA maior.

Aduers. pag. 162.


Angl. etiam Mous taple.



SEMPERVIVUM minimum, siue ILLECEBRA.

Gramen 3<sup>m</sup>. Plinianum Anguil. Aduers. pag. 162.

Germ. Mauerfester. Ital. granellosa, & grafella.



DIOSCOR. Vis ei excaesatoria, acris, exulcerans.  
Illi cum axungia strumas discutit.

c 3

SEDVM

*SEMPERVIVVM parvum. Aduers. pag. 162.*

*DIOSCOR. Folia eisdem cum maiore viribus praedita sunt.*

*SEMPERVIVVM minus asinum.*

Palmaris fruticosa planta; folio exiguo Sedi minoris, rotundiore. Flos luteus, radix inutilis, gustanti frigida. Belgis hortensis est.

*SEDVM arborescens maius, flosculis candidis.*  
*Aduers. pag. 162.*

*SEDVM minimum arborescens vermiculatum.*



Iisdem Syriae nataliis natura munifico lusu & luxu plantulam penes me habeo, fruticosam & densè geniculatam, confertisque foliis & ramulis. Flores luteoli vermicularis acris, vti tota facies. Vtranque in Italia oriri quoque opinor.

VERMICULATA



VERMICULATÆ fruticis varietas maior.  
An CHAMÆPITYS altera vermiculata Diosc.?

Lege AIVGA vel Chamapitys mas Diosc. & tertia.  
Iua arthritica offic. Chamapitys 1<sup>a</sup>. Dod. & Matib.  
Peristerona Crataea Angullara. Advers. pag. 164.  
Gal. Iua artetique. Angl. Grounde pyne. Belg.  
Welt eyppea. vulgus Ger. perperam pe lenger pe  
lieber. Hiff penilho, & yua arthetica. Ital. Iua.



VERMICULATÆ planta Sedi effigie varietates. Advers. pag. 163.

Vtrique densi confertique ramuli: sed quæ maior, foliis est albis densissimè conferta, denticulatis vermicularis acris, maioribus.

Exilior totaque minor altera, minus crebris foliis teretibus oblongis; & flosculis herbaceis Centinodij, ex vireto generosi viri Brancionis oriunda.

CHAMÆPITYS altera.

DIOSCOR. Alterum est genus Aivga cubitalibus ramis in anchora speciem incurvatis, pratenuibus, coma supradicta, flore candido: semine nigro. Hac etiam pinum redolet.

AIVGA vel Chamapitys mas.

DIOSCOR. Tertia mas nominatur, parvula, foliis exilibus, albis; scabris: caule aspero, candido: luteis floribus: semine iuxta alas. Resipit & hac pinum. Ha dua vim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem.

CHAMÆPITYS

CHAMÆPITYS prima Diosc. pinum redolens.

Aduers. pag. 164.

Altera Matz. tertia Dpd. lucoli floribus.



CHAMÆPITYS prima.

DIOSCOR. Folia septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. dantur peculiariter vrina difficultatibus, iocinoris, & reum vitiis. torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra acenitum videntur, bibentes decoctum. ad antedicta illinitur, cum potentilla ure decocti subacta. trita in farinam, & cum fico in pilulis \* sumpta, aluum emoluit. excepta melle, cum aris squamma & resina deicit. apposita ex melle vulnula vitia extrahit. mammarum duritias discutit. vulnera glutinat. vlcera qua serpunt, cum melle illita, cohibet.

Gal. Gustu amarum saporem acri validiorem obtinet. Effectu verò expurgat, abstergitq; viscera plusquam calfacit. proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposita cum melle.

Aduersus scorpionum ictus profunt Plin°. Sanguinem densatum pota extrahunt. sudores facit perunctis ea. \* Fiunt ex ea & † hydropicis pilulae, cum ficu aluum trahentes. Mortuos foetus ex aceto cocta, potaq; eiicere protinus dicitur.

ANTHYLLIS Chamæpityides minor. Aduers. pag. 164.

IVA MOSCHATA Monspel. scitè effigiata.



CHAMÆPITYS



CHAMÆDRYS laciniatis folijs, vel potius CHAMÆPITYS altera. Chamæpitys tertia Dod. Chamæcyparissus agrestis Tragi, & Chamæpitys altera. Aduers. 209.



COTYLEDON. Belg. *Maekhrup*. Hist. Scudettes & orejas de monje. Aduers. 169. Lusit. Cocihelos. Salamanticensib. Vasillos. i. acetabula vasculæ à cauo solo.



Aquatica COTYLEDON ACRISS Septentrionalium, in CALITRICHÆ Plinij. Aduers. 165



Fit & ex Calitriche sternutamentum. folia sunt Plin. lib. 5. Lenticulæ similia, caules iuncis tenuissimis: radi- cap. 11. ce minima. Nascitur in opacis & humidis: gustatu feruens.



CHAMÆPITYS *altissima*.

A foliorum cognatione cum Chamæpytide Pseudochamæpitys recentioribus etiamque Dodoneo & Clusio vocatur: Vulgaræ Iuxæ arthriticæ, folijs & furculis, sed habitioribus, & radice similis, nisi floribus candidis cucullatis galericulis & rictu hiantibus, inodoris, vti tota planta, foret. Semina succedunt quaterna Milij Solis modo, confertim stipata. Hanc cum multis alijs acceptam refero generoso viro D. Brancioni, qui Hispano semine plantam nactus est.

## COTYLEDON.

Diosc. Succus cum vino circumlitus, instillatusque, contra genitalia nudat. inflammationibus, sacri ignibus, strumis, perionibus, illitu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt. vrinam cient. hydropicis cum melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria.

Gal. Coryledon facultatis est mixtæ, nempe humidæ, subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ: vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat.

## ANDROSACES. Aduers. 165. 166.

Musci marini genus Guilandini qui frigidum & siccum arbitrat.

\*Idem Gal. Diosc. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis vrinam cient. Idem effectus est semini poto, & herba decocto, podagri vtiliter illui: ut.

Deficcat, discutit, humida & acris herba Gal.



## COTYLEDON minor Sedi folio Aduers. 165.

Aizoum ferratum Cordi. Onobletum Hippoc. Anguî.

Diosc. Gustu adstringens: & eadem facit qua Semperuiuum.

PORTULACA domestica. Germ. etiam Buerckelkrant,  
& Angl. Doxclapn. Gal. Porcellaine. Hisp. Verdolagas. Lusit. Bardroegas. Ital. Porcellana & portulaca. Aduers. 166.

PORTULACA siluestris.



Diosc.



## PORTULACA.

**Diosc.** Portulaca vis refrigerat capitū doloribus, inflammationibus oculorum, ceterisque, cum potentia imponitur. ardoribus stomachi, sacro igni, vesica doloribus, auxilio est. commandacata, dentium stupores †\* sedat. stomachi & intestinorum † astuationem, fluxionesque mulcet. venes & vesicam adiuuat, etiamsi erosionem sentiant. veneris impetus exoluit. succus epotus simili effectu prodest, in febris valens. contra teretes ventris tinea, cruentam excreationem, \* dysenteriam, hemorrhoidas, & profluvia sanguinis, percolta efficax est. item contra sepi morfus. ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur. interaneū fluxione laborantibus, atque vulvarum erosionibus, infunditur. contra dolores, quos aslus excitavit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. eruptiones papularum in capite, cum vino emendat. vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex potentia illinitur.

*Refrigerat.* ] ex tertia classe refrigerantium est: humectantium verd secunda, Aegin.

† Eadem Gal. tum ventris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in hecticis febribus.

\* idem Gal. & Plin. Leniens & repellens, ut pote cum viscosam habeat humiditatem.

Gal. Frigida & aquea temperamento est, paucæ cuiusdam austeritatis particeps.

Plin. subdit, cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest.

† \* Plin. dentium dolores sedat, & vlcera oris, tumoremque gingivarum. Dentes stabilis commandacata: sitim arceat. Ceruicis dolores cum Galla & Lini semine pari mensura sedat: mammarum vitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris est suspiriosis, semine cum melle hausto. Vomitiones sistit. Dysenteria & vomitis datur ex aceto, vel bibitur cum cymino. Tenasmi autem cocta & comitialibus cibo vel potu prodest. Podagris calidis, cum sale illita. Nervorum duritias emollit. venerem inhibet, venerisque somnia. Oculos hebetare putatur Plinio.

**APVL.** Herba Portulaca purgat, & in aceto sumpta mirè inflammationem stomacho tollit. Herba portulacam comedat, mirificè facit ad duritiam stomachi.



TELEPHIVM, *Scrophularia Tragi.*  
Aduers. pag. 167.

**Diosc.** Tempore verno folia senis horis illita, albam vitiliginem sanant. sed postea bordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

TELE-  
PHIVM sive  
Crassula  
maior Hi-  
spanica.



RHODIA  
RADIX.





TELEPHIVM *sive* *Crassula maior Hispanica.*

Quadruplo tota maior quæ in Belgij viretis ex Hispania delata colitur. cætera nõ dissimilia; & simili *Varietes.*  
dote prodest. flos albus, folio rotundiorẽ interdum & longiore vifitur, & flore rubro.

TELEPHIVM *minus repens semper virens.*

Folio est rotundiorẽ, flore rubro, radice fibrõsa, & cauliculis Cephæ crassioribus.

TELEPHIVM *glaucum verius.*

Telephium alterum vulgato par & simile, sed folio glauco cæruleõue, vt Theoph. annotat. hoc  
alit Muttonus noster.

RHODIA RADIX. *pod'ra pi'ca. Germ. Rosen wurtz. Belg. Rosen wortelen.*

*Hisp. Raiz Rodia. Aduers. 177.*

Diosc. Virilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Aegin. Calfacit ordine secundo, tenuium partium & dissipantis naturæ.

FOENICVLVM *marinum, sive EMPETRVM seu Cal-*  
*cifraga. Germ. Bacillen & merfenichen. Gal. Bacil-*  
*les & fenouil marin. Hisp. perexil de la mar. Ital.*  
*Finocchio marino & herba di San Piero. Aduers. 168*  
*Empetrum Rondellertj. Batia Plinij folio crasso in modum*  
*Portulacæ, flore albo, semine Libanotidis.*

PORTULACA *marina, an CRITHMV M* Diosc.  
*Aduers. 163.*



## CRITHMV M.

Diosc. Semen, ceutoris marini, odoratum, molle, rotundum; quod siccasum rumpitur. habet intus tritici mo-  
do nucleum. radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & incunds. Radix, semen, & folia incocta vi-  
no, poti vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur. menses cienti estur um cocti crudumue in olerẽ. seruatur etiam  
in muria.

Gal. Crithmū gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritudine; quamobrem vis eius est exiccatoria, & absterforia: vtraque tamen imbecillior in eo est, quā in amaris.

FOENICVLVM marinum, siue Empetrum.

Diosc. Nascitur in maritimis, falso gustu, sed quo propius terreno fuerit, amarus sentitur. Trahit bilem, pituitam & aquam, si bibatur in iure aliquo aut hydromelite.

Semen ceu roris marini.] propter semen Cachris, sunt quibus Empetrum pro Crithamo magis arri-deat, quia facultates suffragantur.

Κρηνα. CEPALA. Aduers. 167.

HALIMVS Aduers. 169.



Teretibus pedilibus & sesquipedalibus numerosis reptilibus furculis Semperviui minoris, stellatis. Rosculis albis confertis. Foliola minora, Portulacæ agrestis, angustiora & longiora, tenera, carnosā, succo prægnantia. Radix exilis. in Belgij viretis luxuriat, Patauio delata.

Diosc. Folia in vino pota vrina stillicidio & vesica scabie laborantibus opitulatur. maxime id præstat, si cum decocto radicū Asparagieius, quem Myacanthon, hoc est, Corrudam vocant, bibatur.

Eadem Aegin.

HALIMVS.

Belgij hortis semen racemosum Atriplicis, aut Portulacæ marinæ edit, sed habitus.

KALI magnum. Ital. Soda. Aduers. 167.  
hæc videntur. Empetti modo acetarijs quibusdam apta. vrinæ cist.

LIFE.





PERFO-  
LIVUM vulga-  
tius flore lu-  
teo, folio  
umbilicato.  
Germ. Dür-  
chwech.  
Ital. Perfo-  
gliata. Ad-  
u. c. 171.

lege qui folia.  
lin. 40. § 10.  
GALLA.  
lin. 45. elegā-  
uonibus.



CERINTHE  
major.  
Aduers. 171.



*Cerinthus maioris* { Luteo,  
 & floris colore tres } Purpureo luteo, fundo. } Flore sese  
 differentia; } Purpureo, & folio fu- } panden-  
 } sco glauco. } te.

*Qua minor*, folia longiora edit, florem oclusum,  
 luteum: sed omnia minora.

**HYPERICVM.** Angl. etiam *Johns grass*.  
 lege *Hisp.* *Coraçoncillo.* *Aduers.* 172.



**HYPERICVM.**

**Diosc.** *Vrinam cit. menstrua pellit*\* appositum: *ser-*  
*tianis, quartanisq;* cum vino potum liberat. Semen qua-  
*draginta diebus haustum, hēbiadicis medetur.* Folia cum  
*semine illita, † ambusta sanant.*

† Subdit Gal. & alia ad cicatricem ducit.

\* Gal. sed ad hæc totus sumendus est fructus, non  
 tantum semen.

Plin. eadē. Aluumq; sistit: natura semini spissādi.  
 Excalfacit, desiccāt, tenuisq; substantia est, aded  
 vt & menses & vrinas prouocet. Gal.

**SYRIACVM, & Alexandrinum.**

Folia quadruplo minora quā nostrī Europæi,  
 quæ summis cubitalibus virgultis confertim tan-  
 quam in verticellis exeunt. Flores lutei nostrati  
 persimiles.

**ASCYRON.**

**Diosc.** *Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydro-*  
*melicis sextario, biliosa recrēmenta amplissimē detrahāt. sed*  
*assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. illinitur*  
*& ambustis efficaciter.*

**ANDRO-**







ANDROSÆMON.

Dioscor. Semen tritum drachmīs duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. Ischiadicis maximè medetur: Sedi à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Ægin. Ascyti & Androsæmi semen expurgandi vim continet, sed folia potentiùs desiccant.

HYPERICVM minimum supinum Septentrionale. an CORIS Diosc.?



Non ita dissimilis hæc herbula, ex ericetis, sabuletis & strigoso solo Brabantia, & Flandriæ oriunda, ramulis & cauliculis palmaribus, & duas uncias altis. Folia pusilla Thymi nostratis paulo maiora: flosculi luteo pallentes; & semina pingvia Hyperici vulgaris longè minora. Vfus non disparis.

Hæc Hyperici supini figura non est diversa ab altera tomentosa effigie mox subdenda: Sed quia pictor ipsa folia hirsuta in ora reddidit, & neququam incanum tomentum expressit, appositè minimi supini Brabantiorum Hyperici supini plere potest.

HYPERICVM tomentosum. Aduers. pag. 172.  
Hypericum supinum Clusij.



Κενταύριον μικρόν, CENTAVRIUM paruum.

Luteum autem est Mesuei. Aduers. pag. 173.

Febrisfuga. Panax leptophyllum Plin. Dodonae.

Gal. petite Centoïre. Angl. Centoïp. Belg. Santoype, cleyne Santoype. Germ. thausentguldenkraut, fieberkraut. Hiff. Cintoria, & fel de tierra. Ital. biondella.

Varietas. Floribus albis in monte Trinitatis Nervicorum conspici.



DIOSCOR. Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat. vetera ulcera purgat, & cicatrice obducit. bilem crassumque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. ius decocti ischiadici conuenientissime infunditur. trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. succus oculorum medicamentis perquam vtilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. in velle appositus, menses & partus extrahit. epotus peculiariter nervorum vitis succurrit. Succum extrahendi ratio: Legitur herba semine pregnas, & diebus quinque manducata, decoquitur donec super eminent aqua. mox ubi refrigit, linteolo exprimitur. & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidamque contundunt, atque succum scitili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, missant. quod si quid concretum faucibus vasis adhæreat, deradunt, reliquosque humori permiscunt. noctu diligenter operiunt. namque ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quae autem sicci radices aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut in gentiana mentione retulimus, preparantur. sed quae ex corticibus humidis, aut confusis herbis assuntur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisque similibus succus, sic ex acerbis viti melligo elucitur. Lycium tamen & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

\*Eadem Gal. \*Idem Gal. ceu biliosa ac crassa ducens: nam & talia purgat: quanquam cum adeo vehementer operabitur, ut cruenta euacuet, tunc magis proderit. \*Eadem Gal. \*Gal. idem.

Gal.



Gal. Herba arefacta glutinatoriis, & desiccatoriis miscetur facultatibus, his videlicet, quæ sinus & fistulas sanare sunt natæ, & veteres durities emollire, tum ulcerum maligna sanare. Miscetur etiam iis, quæ rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta optima sunt, quæ vehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem.

Succus eius cum adsimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriæ & absterforiæ, & reliqua iam dicta pulchre efficere potest.

Optimum est medicamentum ad obstructions iecoris soluendas. Bonum quoque lieni indurato foris impositum; & nihilo fecius, si quis bibere sustinuerit.

Cum exiguo salis & aceti succo bilem detrahit Plinio.

Insigni amarore abstergit, incidit, aperit, ideo febribus pituitosis non secus ac Gratiola, & regio morbo auxiliatur.

APVI. Ad viperæ morsum: herbæ Centauriæ minoris puluer in vino exhibitus, aut ipsa pisata in vino veteri & potui data, validissimè proficit.

Ad auriginem: herbam Centauriam minorem decoque in aqua ad tertias, & ex ea dabis bibere quantum poterit, sinabitur.

Ad lumbricos & tineas: herbæ Centauriæ minoris succum dabis ut supra, miraberis bonum esse cū.

Qui venenum sumpserit: herbam Centauriam minorem ex aceto citram da bibat, mox discuit venenum. Item Centauriæ radices pondere denarij vnus in tribus cyathis vini bibantur.

Radicem superuacuum dixit Dioscorides.

CENTAVRIVM floribus luteis siue citreis  
pallidis Mesuei. Aduers. pag. 137. -  
Efficacius purgationes molitur.



Easdem ferè quas Diosc. facultates Centauryo flore puniceo, illi tribuit Mesueus his verbis. Ad omnia Centaurium minus est præstantius, idque suis floribus pallidis, & citreis, ac semine. Calfacit, siccatur ordine secundo, vel cum Rufo tertij initio: constans terrea substantia ob vitionem valde amara: & alia terrea non adusta, aquosæ mista, quæ modicè adstringit, & aërea parum dulci, & ignea subacri sine morsu. Ob hæc, ulcera & vulnera efficacissimè curat & glutinat. Terget enim, siccatur, excrementa consumit, aluum soluit aliquando tam violenter, ut aperiat ora venarum, quibus sanguis emanet. Quæ de re dubitauit Hermes, præsertim cum vulnera conglutinet & sanat, & Alkindi sententia, sanguinis sputo conferat, ipsum sistendo & apertam vasis partem glutinando. Sed ambiguitatem hanc soluit substantiarum in eo præcipuarum contrarietas, amaræ scilicet, & hac largioris stypticæ, quæ prima cogendo agit, quod à dominante substantia hæc facultas sit ad agendum promptior. Post longam autem eius actionem calor mordax ex acri substantia excitatus, corpus agit, & noxas prædictas affert, non semper tamen, sed quando immodicè purgat. Purgat autem Centaurium præsertim minus, pituitam crudam, & bilem flauam, & materias alias etiam à nervis & iuncturis, & hæc tardè. Ob id harum partium affectibus confert, ut etiam ischiadi, clystere iniectum, vel cataplasmate impositum. Musculis item attritis, sed cum panis mica, sale paucò, & melle, vel oleo.

Obstructionem hepatis & lienis sanat, colico dolori & ventris prodest, lumbricos necat, & vacuat, menses mouet, vteri dolorem sanat. fortum educit. Styptica verò substantia sputum sanguinis sistit, vulnera glutinat, ulcera etiam dysepulotica glutinat, præsertim puluere per se vel in vnguentum coacto, ac etiam potu decocti ipsius fistulas & ulcera cacoëthe sanat.

Ambrosiæ autem quidam ab eo carnibus diuisis incocto eas glutinari aiunt. Cum mulla, vel oxymelile, & sale paucò, vel decocto ameos mellito & sale gemmæ habenti promptius purgat & clementius. Mastiche autem addita, venas ab eo aperiri prohibet.

CORIS Monspellensium. Aduers. pag. 174.

CORIS Matthioli. Aduers. pag. 174.



DIOSCOR. Potum semen menses trahit & vrinas, contra phalangiorum morsus ischiadicos, & opisthotonicos, ex vino potum auxilio est. horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino decocta potaq, defectis opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandum quamoptime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Matthioli Cori flores stellati Ornithogali minores ex rubore candicantes, quorum apiculi flauent. E lignosa radice plures spithameos cauliculos & foliola kali aut Spergulæ stellatim è geniculis profert. Gaudet pratis in afflatu maritimo.

CAMPHORATA Monspellensium. Aduers. pag. 174.

Vis illi Stratiotis militaris, ad vulnera perefficax: cogit, glutinat & siccatur. Chamæpeuce Plinio li. 24. cap. 15. lumborum doloribus & spinæ propria est.

ANTHYLLIS.



*ANTHYLLIS altera Italorum.*

*ANTIRRHINVM. Aduers. pag. 175.*  
*Cynocephalis Apulei. Hisp. Vescera yerua,*  
*& Cabeza de ternera. Ital. Antirino.*



Camphoratæ congenerem stirpem tenuifoliam, humilem pinum exprimentem, Dioscoridis alteram Anthyllidem Aigiæ foliis & ramulis rebantur Itali non indocti. sed cum minus olida sit, Monspelliensium Iuam Moscatam retinere maluimus. Surculis, foliis, ortu & facie Chamæpeuceen siue Monspelliensium Camphoratam adumbrat: sed exilior tota; & summis virgultis, tomentosis, mulcotis flosculis luteopallentibus, gustanti præficis.

*ANTIRRHINVM.*

*Dioscor.* Appensum veneficiis aduersatur; gratiam conciliat, si quis eo perunctus cum lilisco aut cyprino sit.  
*Gal.* Semen inutile: herba ipsa adfismilis cum bubonio facultatis, sed multò minoris.

*Apvl.* Ad epiphoras oculorum: Herbae canis cerebri radicem cum aqua decoquit; & de eadem aqua subinde oculos fouet, & celeriter lenit.

ANTIRRHINUM  
NVM. mini-  
mū. Aduerf.  
175. Phytou.  
ma Dod the  
Antirrhinū  
fyl.

Legge Anti-rhi-  
num esse aduen-  
tū.

Caput Mau-  
rohebræ. aut  
Simæ que-  
rundam.

LINARIA  
purpurea o-  
dorata. Ad-  
uerf. pa. 176.



OS  
LIN

LINA  
purpu  
vanc



## ANTHIRRHINI minimi varietas.

Minimum Anthirrhini genus proferunt Trinitatis colles Neruiensis agri, vulgatori nostro ortu & vultu nō ita ab simile: sed floribus differt, qui Lychnidis aut Leucoij sunt (quales Diosc. suo Anthirrhino tribuit): neque semen clauditur inuolucro nares & hiatum oris vituli exprimente.

OSYRIS, aut LINARIA. *Aduersf. pag. 175. Chrysoscome Gesneri Dalef.*

DIOSCOR. *Decoctum eius potum, inuat arquatos.*

Gal. Amara inest qualitas, & obstructions referendi facultas.

*Varietates.* { Floribus albis aliquando inuenitur in Belgij hortis.  
Linaria pumila Clusij tota minor, sed non ab similibus, aridioribus locis apud Salamanticenses oritur.

## LINARIÆ purpureæ varietates.

Quandam etiam videre meminimus furculosis gracilioribus multò ramulis, & foliis angustioribus; flosculis purpuronolaceis, albis & cæruleis.

Tertia folio, viticulis, & floribus purpureæ Narbonicæ par, sed inodora.

Quarta, Narbonensis angustifolia, odorata, Monspelliciacis vineis gaudens.

SCOPARIA, *Beluider Italarum. Osyris Græcorum Dod. Osyris Anguillara. Aduersf. pag. 176.*

LINARIA Valentina Clusij.

LINOSYRIS nuperorum, an Tripolij; species? num Linaria tertium genus Tragi?



Huic folia Hyperici aut Cytisi in ramulis & cauliculis furculosis pedem altis; terna. Agro Valentino lecta manu seduli & peritissimi vestigatoris C. Clusij. Flores item secundum summos caules lutei Linariæ vulgaris, rictu lanuginoso, corniculis aut caudicellis purpurantibus donantur. Martio floret Valentinis pratis.


## LINOSYRIS nuperorum.

Hanc ob ipsam cū vulgaris Linariis & Scopariis similitudinē, Linosyridē dixit recētiōr ætas. Est quippe virgis rigidis & foliis Scopariæ aut Osyridis vulgaris: sed flores in summitatibus luteo fuluo languēt, Asteris mōiani angustifolij, vel Crithmi Chrysanthemi, situ & positu; paritate & effigie Conyzæ maioris aut minoris. Cauliculi pedem & cubitū æquant. Hanc in collibus Narbonensis Galliæ nō procul à mari erutā memini; quā ad Balnea prope Frontignanū itur, & acris gustati, glutinosa, amaricans, Senæ æmulo sapore, ad Thymelæam accedentē.

LINARIA

*LINARIA aurea* Tragi.  
*Hyssopus umbellifera* Diosc. Guilandina.

*PASSERINA Linaria folio.*  
*Chrysocome altera* Mutoni.



Prorsus genere eadem Linosyridi videtur : facie siquidem , iisdem foliis & cubitalibus summis alis multifidis cauliculis nequiquam diuersa : sed extrema florum bullata capitula copiosis aureis villis referta fulgent, radix enim lignosa, fibrosa, semen exiguum . Vires exploratas non habeo. In vireto clarissimi viri D. Petri Brughelij in schola Louanensi professoris regij elapsa ætate latè florentem vidimus; nec non apud nostrum Petrum Coudenbergium & Iacobum Plateau.

*PASSERINA Linaria folio.*

Linariis & hæc ob effigiatum reddenda : folia quippe Linariæ similia . sed acervatim in capitulis coriandrinis seminibus paribus summis Chrysocomes similibus, pallidioribus , furculosis pediculis Lini. flosculi pallentes. ex agro MonsPELLIensi oriunda , hanc Turnaci etiam Mutonus alit in horto suo.



LINUM Adversf. 176.

LINUM maritimum luteum Narbonense.  
Syl. Linum Dod. Adversf. 177.

**Diosc.** Linum vulgo notum est. cuius semen easdem quas foenum graecum vires habet. discutit & emollit omnem intus forisque inflammationē, cū melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut \*melle colto exceptum. vitia cutis in facie variosaque crudum tollit. illud cū nigro & ficulneo cinere, parotidas duritiāsque discutit. ulcera quae serpunt, fauosaque cum vino decoctum expurgat. vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis, vitia pectoris extrahit, si ex melle eclegmatis vice substituat. rufim lenit. venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vulnūque erosionibus immittitur. alii excrementa euocat. ad vulvae inflammationes in defecationibus perquam utile.

\*Idem Gal.

+Idem Plin.

Plin.

Pun.

Oleum seminis Lini emollit, nervos contractos laxat, & lenit. Recens potum, calculo auxiliatur: coeliacos & lateris dolores leniendo finit.

**Aegin.** Lini semen, caliditatis primum sortitum est ordinem, humiditatis & siccitatis medium. coactum flatus generat, etiam si frigatur in sartagine, adeo sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus tamen quae circa hypochondria sunt, ut si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar obsonij, non fecus ac factitio sale cum garro vtuntur. Inferunt nonnulli panibus quoque; stomacho & concoctioni repugnat. tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec vituperandum: perexiguam tamen vim mouendae vrinae tenet, quae in tosto efficacior est. Ideo quoque aluum magis listit.

Idem Gal.

**Plin.** Semen anginas in aqua & oleo decoctum & cum aniso illitum iuuat. Coeliacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecoris dolores estur cū vua passa & ad phthisim vtilissimè. Semine fruct & eclegmata. Cum radice verò cucumeris syluestris extrahit quaecumque corpori inhaerent, sic & fracta ossa.

LINUM *syl. floribus albis. an Linum syl. tertium*  
Clusij?

LINUM *syl. tenuifolium.*



Via quâ Monspellio Frontignanam itur, Linguagottiz agrorum strigosis marginibus & cautibus nonnunquam obuium; teretibus, nitidis, summis dodrantalibus virgultis. flores albi Lini lutei maritimi maiores: foliola Scopariae longè angustiora, exilitate Asparagi aut Feniculi caules ambientia.

LINUM *tenuifolium densè fruticans.*

Lini sylvest.  
varietates.

Non modò florum effigiatura, sed etiam foliorum, in Belgicis viretis multiplicem sortitus varietatem sylvestre Linum, cuius nostris Vienna Austriae hoc anno 1575. seminaria misit C. Clusius. Aliud tenuifolium densè fruticans; aliud verò latifolium, cuius quidem flores nondum videre contingit in Belgio.

Angustifolium satiuo ferè idem, nisi quia totum gracilius multò, flosculi quinque foliolis cæruleis fugacibus & caducis, satiuo pares. copiosis pedalis & cubitalibus virgultis, exilioribusque Lini aut Linariae purpureae foliolis, è longiuscula, perenni (ut puto) radice. cuiusmodi hic appicta damus.

Latifolium folijs exit hirsutis, Tithymali helioscopij paribus. num. eadem sit planta cum Latifolio Clusij syl. Lino Ascyrifolio, equidem affirmare non ausim.



CHAMÆLINUM, sine fyl. Linum perpusillum.

GLAUX exigua maritima. an Glaux Diosc. ? Germ. &amp; Belg. Melck scrup &amp; Melckkraut. Aduers. 178.



POLYGALA repens nuperorum.



Chamælinum, sine fyl. Linum.

Aliud sylvestre Linum vix palmū æquat: foliola, flosculi luteo pallentes, Lini cauliculi, cæteraq; cūcta quadruplō minora, in glareosis Gallobelgij, & ipsis Louanienſibus pomærijs oritur.



CAMPANULA lutealinifolia Montis Lupi.

Aduers. 177.

Videtur Viola Calathiana Plin. flore luteo.

GLAUX exigua maritima.

Diosc. Coquitur cum hordeacea farina sale & oleo in sorbitione ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Aegin. temperaturæ calidæ est atque humidæ, proinde nutritibus lactis vbertatem generat.

POLYGALA, Aduers. 178. 179.

Diosc. Gustu adstricto; qua pota, lactis abundantiam facit.

Aegin. modicè austera habet folia: potum lac procreare videtur. Temperamentum itaque in eo imperat calidum & humidum.

POLYGALA repens.

Quamuis multæ consimiles plantæ quæ folijs Polygalam adumbrent magis, quàm pressè deli-

nient, aut expleant; inter eas tamen id nominis apud nonnullos herbarum petitos est etiam assa-quota plātula hæc multis & dēssimis, palmaribus, reptātibz fūrculis & foliolis Herniariæ ex interuallis distinctis; quibus florum veluti candicantes globuli verticillatim oriuntur. In scrobibus sabulosis, fossarum & agrorum marginibus Antuerpiæ, & Gandauo conterminis luxuriat.

Πολύγαλον.  
POLYGALA  
Recentio-  
rum.



POLYGO-  
NVM.



ONOBRYCHIS altera Belgunum & Dod.  
Belg. Broutwe Spigel.



POLYGALÆ recentiorum è florum colore  
varietates. \*

Angl. Milk lentil. Adurf. 179.

\* { Purpurei sanguineæ diluti puniceæ.  
Albi.  
Violacei.  
Albi rubore confusi. }

Recentiorum Polygala est Onobrychis vera  
Diosc. folijs lentis, longioribus; caule dodrantali;  
flore puniceo; radice parua. Nascitur in vliginosis  
& incultis. Quæ omnia bellè quadrant.

Diosc. Herba suapte vi. si trita illinatur, tubercu-  
la dissipat: cum vino pota, stranguarias sanat; illis ex oleo  
sudores mouet.

Num facultates respondeant, nondum explo-  
ratum habeo.

ONOBRYCHIS altera Belgarum.

Aequè nos habet anxios conquisitio faculta-  
tum plantæ consimili nomine vocatæ & dona-  
tæ: quarum si certiores essemus, hæsitatiōi locus  
nec



nec dum iam foret. Similis ortu est Delphinij aut minimi Rapunculi: ramulis spithameis, quos ambiunt foliola, lentis, sed leuiter ferratis ad Cicēris accedentia: summis, & iuxta cauliculos multis alis diuifos, florum cęruleo purpurantium peramæna fætura Rapunculi aut Lini, sese pandit & contrahit conuoluulorū ritu. Segetibus & pingui veruæcto Belgij, Germaniæ, Angliæ, Galliæ & Italiæ gaudet.

POLYGONVM. Ital. Corregiola, & lingua passerina. Hisp. Corrihucla.  
Lusit. Correiola. Aduers. 179.

Diosc. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio. vrinam apertè ciet. cum vino potus, contra serpentii morsus auxiliatur. datur in febris per horam ante significationes. fœminarum profluuiâ impositu sistit. idem succus purulenti auribus \* infillatur. facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino, adiecto melle, decoctus. Stomachi seruari, † sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur.

\* Idem Apuleius.

lego polygonum montanum, deme altum. lin 30

Aegin. habet quiddam adstringens, sed vincit in eo aquea frigiditas in excessu secundo.

† eadem Gal. & Aegin. qui subdit. antecellit autem in omnibus fœminam mas efficacia.

Gal. Porro tale cum sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione videtur exiccatoriū esse. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium.

Onobrychis Diosc.

Plin. Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem.

Plin. datur cholericis, dyfentericis, & in solutione stomachi. Semen aluum largiùs sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatismos cohibet.

APVL. Huius herbæ Proserpinacæ succo cum oleo rosaceo sæpius perunges, dolorem lateris tollit.

Herba Proserpinacæ tusa cum butyro subacta, & mamillis imposita quæ dolorem & tumorem habent, dolorem & tumorem perfectissimè tollit, ita tamen vt vsque in tertium diem medicamentum ponas. Ad quartanas: herbæ Proserpinacæ succum cum piperis granis septem aut nouem sub accessione dabis bibere. Lege eam die Iouis, Luna decrefcente.

Vermes necat.

POLYGONVM montanum niueum minimum. Aduers. 179.  
Paronychia Hispanica Clusij.



Hæc effigies eadem est cum minimo niueo Polygonato, sed plantæ satæ & enatæ cælo & solo humidiore, hortis videlicet ubi neutiquam lucentes niues candoris glomerulos edidit.



Consimili facie cū Herniaria & Chamæsyce, in vineis & oliuetis Monspellio finitimis Boutonet  
versus & Castrum nouū fuscū humi spargitur cauliculis palmaribus & dodrantalibus. Flosculi purpu-  
rascunt ex albo, quatuor foliolis constat. Hanc olim Chamæsyce alteram cum Lugdunensibus di-  
ximus, sed non lactescit, falso gustu præfisco.

HERBA TVRCA, siue HERNIARIA. est Epipactis Angul. Millegrana Cordi,  
& Empetrum Tragi: Polygonum minus Math. Ital. Centograna.

SERPILLVM. Saxifraga Dod. qui Thymi, non  
Epithymi similem legi. Hisp. Serpol & ser-  
pillo. Aduers. 180. & 181.

Narbonense SERPILLVM folijs & facie perpusilli  
angustifolij Thymi nostratib.  
Aduers. 181.



Eadem Gal.  
& Plin.

Diosc. Menfes trahit. vrinam potu ciet. tormini-  
bus, ruptis, vulsis & iocineris inflammationibus, auxilia-  
tur. & aduersus serpentes potu illitue. capitis dolores mul-  
cet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Ma-  
ximè verò phreneticis & lethargicis conuenit. Cruentos  
vomitus sedat succus drachmæ\* quatuor ex aceto potus.

†Actius. Madefactum autè aceto ac decoctum  
admixto rosaceo, lethargicis & diuturnam phre-  
nitum patientibus, summiopere congruit.

\*drachmæ vnius Galeno.

Plin. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex  
aceto.



## Narbonense Serpillum.

In ericetis Egidij pagi, vulgò S. Gilles, agri Monspeliensis, Thymi angustifolij facie rarior hæc Serpilli species, lignosis & durioribus furculis repit, cuius radix & flores similes nostrati. Huius ramulos nobiscum communicavit Frânciscus Penninus Antuerpianus pharmacopœus fidè dignus, stirpium materiæque medicæ gnatus, vt siquis alius.

THYMVM. Hisp. Tomillo falso. Lusit. Oregaon de matto. Aduers. 181.

EPITHYMVM. Græcorum & Arabum. Aduers. 181.



Diosc. Vinum habet hanc, vt cum sale & aceto potum; pituitam per aluum detrahât. decocti ius prodest† or-  
thopnoicis, & anhelatoribus. tinea ventris exigit. menses, partus, & secundas pellit. vrinæ ciet. cum melle in ecleg-  
mate faciles facit \* excreationes. recentes tumores discuit, cum aceto illitum. concretum sanguinem dissolvit. verru-  
cas thymi colorem reddentes, pensilesque tollit. ischiadicis cū vino & polenta impositum subuenit. hebetibus oculis in ci-  
bo prodest. perquam vtile pro condimento, duntaxat ad vsus eorum qui rectè valent.

\* Idem Plin.

† Gal. quia incidit & calfacit, manifestè obid vrinam & menses prouocat, fetum enellit. Eadem Plin.

Aegin. calfacit, exsiccat in tertio à temperatis excessu: tenaces & viscosos humores incidit.

Aetius. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum Oxymelitis cyathis: bilem enim reliquosque humores atque acre semen euacuat. Ventre inflatis, vbi intumescere ceperint, 3 j. dato ieiuno, cum cochleari aquæ mulsæ, dato ieiunis & ante canam aduersus lippitudinem & vehementem oculorum dolorem. Postremò ad tumefactos† testes ieiunis trium drachmarum pondere exhibeatur.

† Eadem Plin.

Plin. Oculorum claritati multum conferre existimatur & in cibo, & in medicamentis. Coxendicis imponitur cum vino. In fastidio. tritum cum sale.

## EPITHYMV M Græcorum &amp; Arabum.

Diosc. Epithymon, flos est ethymo duriore, Satyria simili. capitula habet tenuia, & leuia, & in eis candidulas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahut. pituitam bilēque atram, per inferna. Prunatum prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad quatuor tertias cum melle, sale, & aceti exiguo.

Aegin. & Gal. Thymo efficacius ex tertio calfacientium & arefacientium ordine.

Potentius in extergendo aperiendoque Cassitha; idē melancholico humori terreo, lieni, indidem ortis omnibus morbis, doloribus capitis diuturnis, lepræ, melancholiæ morbo & hypochondriaco: item quartanarijs & consimilibus accommodatur, eo quod splenetica hepaticis potiora.

SATYRIA Aduers. 182.

SATYRIA hortensis. Hisp. Axedrea. Angl. etiam sauerp. Aduers. 182.



Diosc. Eadem potest que thymum, si modo consimili sumptinetur. Aptus sani vsus. Est etiamnum quādam satia, sylvestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Aegin. eadem. calida & sicca excessu tertio.



## EPITHYMBRA, EPITHYMVUM, &amp;

CASSITHA Plin. Aduers. pag. 182.


Androsaces Tragi. Gal. Tigne de Lin. Angl. Dober.

Belg. byanghe, &amp; scocite i. tinea. Germ. todtern,

fittjhraut, fläschleypden. Hisp. &amp; Ital. Calscuta.

## SAXIFRAGA magna Matthioli &amp; Italarum.

Ital. Sallifragia maggiore.



Cui innascitur plātæ vires quadamtenus refert. Cassitha è lino practicis & officinis præfertur, quod citra calorem minus adstringit; magis emollit, lenit, extergit, & ad educationem & discussionem præparat. Iecinoris & lienis infarctus biliosos & pituitosos leniendo referat; vrinam ciet, idèd morbo regio medetur. Febres tertianas, quartanas & pituitosas curat, vt Mesueus auctor est; flauamque bilem per aluum educit, sed efficacius addito Absinthio.

## EPIVRTICA.

In vrtica nata maxima se mihi copia obtulit in agro Sommerfeti Angliæ: quæ vrinis potentiùs eliciendis, & obstructionibus soluendis efficacior. In Rubo aut Genista hætenus mihi non perspecta, quæ tamen nonnusquam occurrere potest.

## SAXIFRAGA magna Matthioli &amp; Italarum.

Spontè fruticat hæc in ipso calle & præruptis ad angustias saxorù montis Baldi Veronensis secus fanù Virgini sacrù, virgultis exilibus numerosis, durioribus & lignosioribus, sed ad imum digitum crassitudine æquantibus. Folia Thymbre similia, exortu inæquali prodeuntia. Flosculi candicant è calyculis Ocymoidis; quibus semen succedit rubrum, perpusillum, vt scitè annotauit Matthiolus. Radix saxorù interueniis & commissuris adeò depacta, vt vix diuelli possit. Maximæ & primæ nobilitatis apud Italos ad extendendos & propellendos calculos.

## SAXIFRAGA. Aduers. pag. 183.


DIOSCOR. Frutex est surculosus Epithymo similis. Coctus in vino, innox potus febricitantibus opitulatur. Stranguria prodest, singultum sedat, calculos vesicae frangit, & vrinam ciet.

Anglica Saxifraga est Alfinis minimum genus.





STOECHAS.



ROSMARINVM coronarium. *Aduers. pag. 183. 184.*  
*Libanotis coronaria Galeni. Lusit. Aletrin.*

Dioscor. Excalcatoria vi pradium est. Regum sanat \* morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur. Et ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. acopi, glema in q. vnguento admisceri solet.

\* Gal. eadem. Omnes enim libanotides abstergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Cephalicum, stomachicum; nervis & cordi peramicum, memoriam roborat; cerebrum exicat; resolutionibus medetur. Coryzam à causa frigida iuvat Serapioni, exsiccando. Calido & sicco temperamento.

Cinis dentificiis miscetur ad dentes firmandos.


STOECHAS. *Aduers. pag. 184.*

*Ger. stichas kraut. Hisp. Cantuello, & cantuello.*

*Lusit. Rosmarinho. Ital. stechade.*

Summi cauliculi vt plurimum foliis stipantur in Gallia Narbonensi: interdum nudi conspiciuntur.

STOECHAS nudis cauliculis summis.



Diosc. Subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum Hyssopi modo ad pectoris vicia efficax est. Antidotis miscetur. \* Viscera omnia & vniuersam animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & fartu liberat.

\* Gal. Gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subastringens. Ceterum temperies composita, nempe terrena essentia frigida, vnde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore; à qua utique amara est. Ob utrorumque verò

conue-



conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tum viscera omnia, tum totius corporis habitum est nata.

MESVE. Deicit tum pituitam, tum atram bilem; cerebrum, nervos ac sensuum omnium organa mundat, ac roborat. Prodest contra frigidos morbos qualescunque sint, ideoque comitialibus conueniens remedium habetur, addita Scilla aut eius aceto. Balnea, fomenta ac laconica, quæ ex ipsius tum decocto tum vapore fiunt, oculos narium meatus aperiunt: nervorum & compaginum cruciatus mitigant: ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinentum tamen ab ea biliosis est, præsertim si eorum ventriculus sit bile refertus: nam eos maximè turbat, nauseam commouet, sitim accendit, & calore quodam molestissimo vniuersum afficit corpus.

STOECHAS foliis serratis & crispis Clusij, admodum rara. Lajit. Alichrin francez.

SPICA Recentiorum, sive Nardus Italica. Pseudonardus Fuchf. & Matth. & Gallarum Aspic. Anglorum fressche spick narde, & Spigo Italarum; est STOECHAS Arabica Mes. spica filiginis Mutona. Aduers. pag. 184.



A superiori denticulatis vel serratis foliis virentibus, sed auersa parte candidis dissidet. è capitulis squamosis purpurouioleis in cacumine Thymi, aut Stœchadis longioribus Erythrodani marini ritu flosculi purpurei exeruntur. Semen, radix & cauliculi incani, gustus amarus, aromaticus, superiori similia. Spontè nascentem, non nisi in summa Calpe, floribus onustam Februatio inuenit Clusius: Scintæ in regie arcis hortulo, quatuor supra Vlyssiponem leucis primum àniba duseram.

SPICA Recentiorum.

Inflationes & dolores ventriculi, vteri, & lienis durities discutit, lecoris obstructions reserat. Stranguriæ & vrinæ difficultati medetur. Simili qua Spica Celtica effectu prodesse nuperi asserunt, eiusque vsum commendant ad frigidos & humidos cerebri & nervorum affectus, apoplexias, paralyfes, melancholiam naturalem, & eiusmodi. Calida & sicca ordine secundo.

*Puluu ad facilitandum partum, eiusq. dolores arcanum e semine Lauendulae*

*Rondelerij præstantissimum, minimè fallax.*

℞. Seminis Lauendulae ʒ. f. seminis Plantaginis & Endiuia añ. ʒ. ij. piperis ʒ. j. fiat pul. capiat cum aquis sequentibus. ℞. Aquarum Caprifolij & Endiuia añ. ʒ. iij.

*Alius efficacior puluis.*

Ouracum cum duobus vasis coniunctis abluitur vino albo, in fistili nouo vritur clibano: denuò aqua Endiuia & vino abluitur, feruetur vsui. ℞. cineris Ouraci ʒ. ij. cinnamomi ʒ. f. piperis longi, & galangae añ. ʒ. j. seminis Plantaginis & Endiuia añ. ʒ. j. f. Seminis Lauendulae ʒ. iij\*. fiat pul. cap. cum aquis prædictis & vino albo si febris desit.

*Fortissimus ad secundinas & sætus mortuos.*

℞. Confect. alkermes & pulueris præscripti añ. ʒ. ij. Borracis, Trochisc. è myrrha añ. ʒ. j. f. Castorei ʒ. j. cum aqua Buglossi, Arthemisiae, vino albo.

*Spica LAVENDVLA. Aduers. pag. 184.*

*Stachys Anguillare. Pseudonardus scemina Matth.*

*Gal. Lauendel. Angl. Belg. & Germ. Lauen-*

*del. Ital. Spigo genule.*

*LAVENDVLA multifida folio Clusij.\**



\*Raritate, elegancia, & foliorum diuisura multifidam appositè dixit Clusius noster. Multifidis quoque caulium furculis pedalis, quadrangulis & hirsutis, quos altè laciniata, veluti è geniculis folia cinerea coriandrina aut Melanthij cingunt. In Belgio, Germania, Anglia, Gallia & Italia nusquam me vidisse memini. Hispaniè sola inquilina. Spica Lauendulae aliquantum flexuosa, & veluti in quatuor versus aut ordines vallata: alia interdum ex alia nascens, floribus cæruleis odoratis. Malacæ vicino colle quodam, Februario florentem, & circa Murciam Martio, inuenit Clusius. alibi nusquam. Reliquis mitior censetur.



*HYSSOPUS Arabum, Mesue & officinarum.*  
*Aduers. pag. 185. Gal. hisope. Belg. & Angl.*  
*Ysoppe, & Yssoppe. Hisp. Ysopo.*

*HYSSOPUS Arabum flos rubro.*



*HYSSOPUS Arabum è floribus coloribus varietates.*

Flore albam Hyssopum cultiora vireta Belgica interdum & rubram dant, sed floribus, ut plurimum, unico tantum ordine digestis.

**M E S V E.** Hyssopum hortense pituitam facile delicit, quamvis dixerint aliqui, quod & atram bilem educit addito fossili sale, aut Indo. At ipsi sunt pituitam purgare manifesto experimento constat, præsertim quæ in pectore ac pulmone continetur. Facit hyssopum ad pituitosos tum cerebri, tum neruorum affectus: quod non modo mundet, sed quod etiam roboret. Quin & pectus, & pulmonem detergit, præsertim senibus, quorum pectus lenta crassaque pituita repletum est: quo fit, ut asthmaticis, & tussientibus opiuuletur. Discutit hyssopi vsus contumaces inflammationes, cibi appetentiam inuitat, menses & vrinam ciet, & febrium horrores excutit; visum acuit. Melle commissum, interaneorum tineas necat, nitri addito momento. Oleum, quod tum foliis, tum floribus paratur, neruos algore affectos inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & montanum, atque etiam hæc omnia efficacius præstare.

GRATIOIA, & Gratia Dei. Aduers. pag. 185.

Limnæsum Cordi sue Centaurides.

Papauer Spumeum Diosc. Anguillare.

Ital. Stanca cauallo, Centaurida.

HELIANTHOS, sue flos Solis. Aduers. pag. 185.

Cisti species Monspeliensium. an Helianthe Plin.?

Helianthemum Cordi & Tragi.

Helianthos Anguill. & Fuchsf.

Belg. & Germ. Hepden plop. Gal. Hysöpe des garigues, quæ ericetis gaudet.



Centaurium minus, amarore, absterforia & vi deiectoria longè superat. Nec secus ac Pityusa aceto, & lacte maceratur, vt noxium virus & aliquam acrimoniam exuat. Bilem vtranque, aquas & pituitam crassam detrahit sesquidrachmæ vel drachmarum duarum infusum.

Gratiola: an PAPAVER Spumeum Diosc.?

Eadem  
Theoph.

DIOSCOR. Herbula est alba & spumea tota, radice in summo cespite. Legitur æstate semen cum integrè adoleuit, deciditq; exiccatum. Datur acetabuli mensura in aqua mulsâ: vomitione expurgat. Primatini huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

Semen pituitam expurgat Gal.

HELIANTHOS, sue flos Solis.

Plin. lib. 21. cap. 10. frutex est humi se spargens dodrantalibus ramulis: folia similia serpillio. \* Radix eius candida & dulcis.

\* 21. cap.

PSYLLIVM





PSYLIUM. Aduers. pag. 186.  
 Angl. Fleesebede etiam dicitur.  
 Dioscor. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum,  
 & molliendum conueniens. Articulorum morbe, parotidi- Eadem Plin.  
 bus, tuberculis, tumoribus, luxatis illitum auxiliatur. Im-  
 ponitur in dolore capitis cum rosaceo, aqua, aut aceto. En-  
 terocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex ace-  
 to medetur. Teritur acetabuli mensura; & in aquae sexta-  
 rio madefactum, vbi concreuerit aqua, illinitur: Siquidem  
 vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum  
 calorem reprimis. Contra ignes sacros efficax est. Fama est  
 si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni.  
 Cum adipe tustum, sordida vlcera & quae cacoethe vocan-  
 tur, expurgat. Succus vermiculosus auribus, aut fluxione la-  
 borantibus ex melle prodest.

Gal. Semen ex secundo refrigerantium est or-  
 dine, in desiccando verò & humectando mediū  
 quodammodo & symmetrum.

PSYLIUM Plinianum fortè, radice perenni supinum.  
 Aduers. pag. 186.



CORONOPVS. Aduers. pag. 186.  
 Angl. etiam Crowsfoote. Hisp. yerua estrella.  
 Lusit. Guiabelha. Ital. Stella herba.

Dioscor. Herbs decocta estur oleum modo. Ra-  
 dicem habet in cibo astringentem, quae catiactis conducit.

CORONOPVS repens.  
 an Pes milium Columella, Ruellio?

CORONOPVS



*CORONOPUS repens*, Aduersf. pag. 187.



Legit et enim  
folius.

SERPENTINA. Aduersf. pag. 187.  
*Coronopus syl.* seu *Serpentina Martioli*.  
Ital. Stella herba saluatica.

SERPENTINA omnium minima.





Minima nullatenus distat à superioribus, præterquam exilitate; coliculis enim vix vnciam & sesquiunciam æquat. In celsis montium iugis sterilis Sauez in Gallia Narbonensi copiosè prouenit.

CAYDA



CAVEA MVRIS. *Advers. pag. 187.*

CARYOPHYLLVS. *Advers. pag. 188.*  
*Angl. etiam Gelpflours, & Gelpouers. Ital.*  
*Garofoli, & Garofoni.*  
*Cantabrica Turnerii Angli.*  
*Veronica altera Fuchf. Dod.*

ARMERIA, *sive* CARYOPHYLLVS minor *fol.*Legelin. *30.*  
*najens.*

Ad cordis palpitationem, vertiginem, epilepsias,  
 paralytes, & convulsiones commendatur.

ARMERIA, *sive* minor CARYOPHYLLVS *fol.*  
*foliis latioribus. Advers. pag. 188.*  
*Armerius flos primus Dod. Germ. Steppnegle.*  
*Cuyderelles Gallobelgarum.*

## ARMERII floris varietates.


In vireto D. Matthæi Lobellij canonici Insulani,  
 viri non minùs probi quàm periti, stirpiùm quæ a-  
 mantissimi, Veronicæ sylvestris speciem primùm me  
 videre memini; deinde Mechliniæ, & apud Ner-  
 uios, flore simpliciore, sed speciosiore, candicante,  
 media veluti peramœna striata corona concolori  
 cincto: cubitalibus gracilioribus viticulis & foliis,  
 Caryophylli sylvestris.

Vienna Austriæ floribus albis sylvestrem alte-  
 ram Armeriam aspectu hilarem & peruentam  
 hoc anno in Belgium transmisit Carolus Clusius.

SVPERBA Fuchfij & Recentiorum. *Advers. pag. 189.*  
*Diosanthos Theophr. Arguillara.*  
*Ital. Fior d'Amore, & Balsamin.*

h CARYO-

CARYO-  
PHYLLVS  
maritimus.  
Aduers. 189.  
Gramen ma-  
ritimum Dod,



MYSCIPV-  
LA, siue  
Armoraria  
altera.



CARYOPHYLLVS montanus alter, Aduers. 189.  
Perperam Cantabrica Plin.  
num sit potius STATICE eiusdem?



Louanij, flore albo variat in horto stirpium di-  
tissimo D. Ioannis Limoges, alias Nonnij.

MYSCIPVLA, siue VISCARIA.

Aduers. pag. 189.

est Lychnis syl. quarta Clusij.

Silene Theoph. Aldroando.

MYSCIPVLA altera flore muscoso. Aduers. pag. 190.

Papauer spumeum quorundam.

Sesamoides magnum Salamanticum Clusij.

MYSCIPVLA, siue ARMORACIA altera.

Armerius flos tertius Dod.

sum flos Constantinopolitanus alter minor Gesneri?

Lychnis syl. altera, & Behen rub. Salamanticum Clusij.

Isdem natalitiis delata hortis Lusitaniae, Angli-  
cis, & Belgicis oritur: cauliculis, foliis & congestis  
rubris cauliculis floribus, & femine Polemonij  
herbae vulgi, vel Centaurij minoris. Viscido item  
glutine tenaci circumlita rota,

DRACO



DRACO, aut potius TARCHON Simeoni Sethi.  
Aduers. pag. 190.

Gal. Targon. Angl. Dragon. Ital. Dragoncello,  
& Dragone.


Acetariis Erucae vicem supplet. Ad pestis con-  
tagia maximæ & primæ laudis eius stillatitia apud  
Anglos. Sudores cit, & crassam pituitam con-  
coquit.

Πταρμική. PTARMICA folio Taraconis, sed  
crenato, flosculo umbellato, candido.

Aduers. pag. 190.

STERNUTAMENTORIA. Pyrethrum  
sylvest. quorundam.

Tanacetum acutum album Tragi.



DIOSCOR. Folia cum floribus illita, singillationes  
rapiunt, flores sternutamentum efficacissime mouent.


Λεγε Βόπλευρον. BUPLEVRVM.

Aduers. pag. 192.

Bupleurum Dod. & herbariorum.



Leg. Plinio li-  
quet.



LITHO-  
SPERMON.  
minus. Hisp.  
& Catalanis  
Millbarr.



*Asterum Bupleuron latifolium*  
Aduersf. pag. 192.

*Bupleurum* Dod. & herbariorum,  
*Isophyllon cordi*. Germ. Wundkraut.

Herba vulneraria & *Panax Chironium* Tragi,  
qui illi vires similes facit.

*Scorpioides repens* Bupleuri folio.  
Belg. Hasen ooren, & *Scorpiione* erupt.



LITHOSPERMON. Aduersf. pag. 192.

*Dioscor.* & *Ægin.* Semen cum vino albo po-  
sum, calculos conterit, & vrinas pellit.

Plin. & stranguriam discutit.

Temperamento calido & sicco, vti Gal. docet Fuc-  
s. simplic. medicamentorum, de cicutibus vrinas.


LITHOSPER-




LITHOSPERMUM maius.



ALSINE. Aduersf. pag. 193.  
Ital. etiam Gallineila, & Centocchi.



LITHOSPER-  
MON Anchu  
iz facie.



MYOSOTIS  
hirsuta rep-  
tis Aduersf.  
pag. 193.  
an Elatine  
Dioic. qui-  
buidat: tunc  
Helxines mi-  
nore hirsuto.

h 3

ALSINE

STIRPIVM

LITHOSPERMON *Anchusæ facie.*

Decliuibus saxosis vallis Ostenfis Pedemontium occurrit, fruticosis pedalibus ramulis hirtis: foliis Lithospermi; & floribus Anchusæ aut Echij aut Buglossi facie purpurantibus: radix lignosa.

ALSINE.

Dioscor. Vin refrigerandi \* adstringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur, quin & emendat omnia quæ Helxine.


\* Ideo Gal. Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

Eadem ferè Plin. Epiphoris peculiariter imponitur.

Refrigerare omnes creduntur. Inflammationibus, stomachi ardoribus, ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, & erysipelatibus auxiliantur.

ALSINE corniculata Clusij.  
an Nigellastri genus?

ALSINE minima. Aduers. pag. 193.  
Alpine minor Fuchf. Germ. kleyn vogelkraut, & fies  
berkraut, quia refrigerando febrilis astus mitigat.



Folia Nigellastri nostratis breuiora, Alfine longiora, gemino situ, exili radice, Maio flosculis candidibus, & pusillo atro semine membranis corniculis transparentibus clauso. Cauliculus palmaris hirsutus, alis diuisus, segetibus, vti Nigellastrum, agri Salamanticensis gaudet.

TRAGOPA *purpureum Alpinum.*

Hoc nomine plantam aridam sesquiunciam spectandam mihi dedit ex suo herbario chartaceo cõ- milito eruditissimus medicus in hac medicinæ parte exercitissimus Hermes Clericus; foliis superioribus Myosotidis angustis, inferioribus, breuioribus multò & latioribus: radice digitum crassa, flore luteolo Melampyri lutei nostri Narbonensis.



MORSVS Gallinaefolio hederula. Aduers. pag. 194.

Alpine media Fuchs. Elatine Dod.

Angl. Gunning, buckwheat.

an LAPPAGO Plin. lib. 26. cap. 10. apud Anguillaram?

ANAGALLIS Phœnicea mas. Aduers. pag. 194.

Corcorus Plin. Anguil. & Molochia Serapionis

Valerandi. Hisp. Mortiaom.



Plin. Est & Lappago similis Anagallidi, nisi esset ramosior ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, grauis odoris: quæ talis est, Mollugo vocatur, &c.

#### ANAGALLIDES.

Dioscor. Vtraque mitigandi vim habet; inflammationem arceat, adactos corpori aculeos<sup>a</sup> extrahit. nomas<sup>a</sup> cohibet. succus gargarizatu caput purgat, & naribus infusus: dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum melle Attico<sup>c</sup> emendat. Retusa oculorum aciei auxiliatur. Contra viperarum morsus, iecinoris<sup>c</sup> & renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ caruleum edis florem, prociduum sedem reprimere; quæ verò phœniceum,<sup>d</sup> illius euocate.

Gal. Anagallis vtraque calidam & siccam facultatem obtinet: exterguntque admodum.

Gal.<sup>a</sup> Quendam calorem attractorium possident; eoque succus earum ex naribus purgat. & vt summatim dicatur, exiccatoriam citra mordicationem facultatem habent, quamobrem vulnera glutinant, & putrida adiuuant.

<sup>c</sup> Plin. eadem & ex ictu cruorem, & argema rubens, magis cum Attico melle inunctus succus. Bibitur & contra angues succi drachma in vino. Mirum quod fœminam pecora vitant, Vrinam cient Anagallides: Iecinori mirè profunt; cohibent quas nomas vocant. Viles & recentibus plagis, præcipuè fenum corpori: Ad recentia quoque vulnera tanta traditur vis, vt faniem ossibus extrahant.

<sup>d</sup> eadem Plin.

#### ANAGALLIS

ANAGALLIS carulis, & femina. Aduers. pag. 194.



ANAGALLIS lutea. Aduers. pag. 194.



ANAGALLIS aquatica.



ANAGALLIS aquatica. Aduers. pag. 195.  
 Sion, siue Lauer & Anagallis aquatica Fuchs.  
 Sion non odoratum Tragi.

Trag. Apud veterinariorum magno est in vsu, vt discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, alijsq; id genus affectibus. acetariis commanducata, calculos rumpit, vrinas cit; fetus mortuos pel-  
 lit & menses. Cum aceto & butyro tosta & imposita, ac subinde renouata, tumoribus quibusuis & ignibus sacris prodest.

ANAGALLIS



*ANAGALLIS aquatica altera, fortè Sion non  
odoratum alterum Tragi folio Pulegij regalis. \**

*PARONYCHIA Alfinefolia. Aduers. 196.*



*PARONYCHIA altera Rutaceo folio.  
Aduers. 196.*

\* Vdorum, fœ-  
tiū, fluentorum-  
que amantior  
hec, sed rarior;  
cui<sup>9</sup> folia Vale-  
rianæ minimæ  
æmula & con-  
coloria sūt: cau-  
liculus spitha-  
meus sumo di-  
uisus è pusilla fi-  
lamētis compa-  
cta radice. Flo-  
culis albis & pe-  
ricarpijs Anagal-  
lidis, sed exilio-  
ribus multò, per  
maturitatem fer-  
rugineis. Secus  
ripas & margi-  
nes riuiulorum  
Austruyel paguli  
altero ab vrbe  
Antuerpiana la-  
pide occurrit.



*lege pag. 196.  
quasi Calli-  
trichi.*

*PARONYCHIA.*

*Diosc. Illita paronychijs atque duritijs remedio est.*

*ELATINE Diosc. Aduers. 197.*

*Veronica semina Eufsch. & Math.*

Immetitò hñc notatur Matthiælus, quòd huic  
perquam affinis & persimilis plàra in Gallobelgij,  
etiàmque Angliæ agrorū marginibus folia sinuata,  
aliquantùmue pinnata ostentaret. Cætèra cuncta  
similia, aut eadem.

*Elatines 12-  
rietas.*

*Diosc. Elatine oculorum fluxionibus & inflam-  
mationibus auxiliatur, folijs cum potentilla tritis & imposi-  
tis. Eadem coctà sorbitionis vsu dysenteriam sistit.*

*ELATINE RECTA.*

Pedis altitudinè assequuntur coliculi surrecti,  
folio & facie nostratis, sed flore maiore, concolore,  
exili tæcillum fibrata radice, & folijs cauliculis in-  
cumbentibus.



VERONICA maior Septentrionalium. Mas  
Fuchs & Dod. Aduers. pag. 157.

VERONICA Recta. Mas Matthioli.



VERONICA  
recta mini-  
ma.



Min  
pilli  
ron  
ibide  
mina  
Eade  
l'cer  
ineff  
Dod.



*VERONICA maior Septentrionalium.*

Vlcera, vulneraq. omnia ad cicatricem perducit. pora, & imposita ad hernias efficax. vncias duas succi herbæ eporæ, cum vini albi vncia, urinas potenter ducere asserunt quidam non indocti. decoctum autem obstructionibus iocinoris & lienis referendis, medêdisque, abstergendo pulmonum vlcibus, perutilem asserunt.

*VERONICA recta. Mai Mart.*

In hortis Belgij, Coldenbergij & aliorum, hanc vidimus folijs & flore in surrectis pedibus cauliculis, alijs non dissimilibus, sed maioribus, amarioribusque.

Ad febres, contagiososque morbos pul. trium drachmarum pondere epotus commêdatur Matthiolo: etiamque ad vteri, renû & vesicæ illuiem propellendam, obstructionesq; viscerum referandas, vulgatæ nostræ Veronicæ modo.

*VERONICA Recta minima.*

Longè minor hæc vix vnciam & sesquiunciam æquans: folijs Veronicæ nostratis aliquanto minoribus. Flosculi non dissimiles, sed dêiores, compositioresque, spicati, corniculis crebris succedentibus.

*VERONICA Recta Herbæ vivorum.*

Folia Teucrij similia præfert, aut Lysimachiaæ caruleæ, cui congener cum folio, tum flore.

*SYMPHYTUM petraum.*

NUMMULARIA. Ital.  
Dineraria.  
Aduerf. 198.



BRUNELLA, SYMPHYTUM  
petraum.

## SYMPHYTVM petraeum. Aduers. 198.

Diosc. Gustu dulco saluam ciens. Decoctum in aqua mulsâ & potum pulmonis vtilia purgat. sanguinem reijicientibus, & renum malis, ex aqua datur. \* ad dysenteriam rubrâque seminarum profusum, in vino decoctum: ad conuulsâ verò & ruptâ, ex aceto mulso bibitur. quin & commandacatum firm sedat. faucibus asperis subuenit. vulnera recentia enterocelâsque conglutinat, & illitu cohibet. carnes autem cum symphyto decocta coalescunt.

Gal. Potest Petraeum Symphytum, collectum in thorace pulmonûque pus expurgare. Habet etiam contrahendi vim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocelis imponitur, & ad conuulsâ & ruptâ cum oxymelite bibitur.

## BRVNELLA, SYMPHYTVM petraeum. Aduers. pag. 199. Consolida minor Math.

Iisdem viribus, quibus Bugula & Cochlearia, pollet; sed efficacius siccatur, adstringit, cohibet & reprimat.

## BUGULA, quibusdam BRVNELLA.

Consolida media Fuchf. & Matth. Herba sacra Cordi. Arthretica Pandectarj Angul. Aduers. 199.

## BELLIS maior.

Aduers. 199.



## Varietas.

In horto Mutoni BUGULA annua alitur, flore non dissimili, & dodrantali erecto caule, sed vegetioribus: folijs rotundioribus, latioribus, hirsutioribus, asperis & rigidis.

Vulnera glutinat, sanguinis grumos dissoluit: Regio morbo & Ictero nigro, vesica fellea, hepate & liene ab obstructionibus liberis, medetur. Depascentia oris & pudendorum vlcera commodè abluuntur. Interna vulnera & enterocelas ferruminat. Vtinas ciat.

BEL-



*BELLIDES* *sive* *CONSOLIDÆ* *minores & media,*  
*Primula veris* Tragi. Ital. Margarite & fiori di pri-  
 ma Verigenti. Germ. *Aufstieben/ ober zeit-*  
*loosen.*

*BELLIS, cerulea nostra.* *Aduers. pag. 200.*  
*est Aphyllantes & frondiflora Anguillara. Men-*  
*spellienfis. Globularia, & Ital. Bottonaria.*

*BELLIS maior sive Consolida media vulnerariorum.*  
*Aduers. pag. 200.*

*BELLIS Hortensis multiplici flore.*



Succus, decoctum, stillatiōe ad rupta & vulnera feliciter bibitur. Vnguentis & ceratis quoquo modo exceptus, imponitur, vel optimis practicis, Rondeletio, alijsque: unde liquidò constat, tem-  
 peratè frigida & sicca, potius quàm humida, vt quidā volūt, naturæ esse, nonnulla adstrictione mi-  
 xta. Caterùm cùm articulorum sauos dolores lenire imposita prodatur, addita interdum malua &  
 butyro, humorum illuc incitum impetum reprimendo, & deriuando, inflammationibusque intesti-  
 norum & feбри ardenti ænemate conferat: eosdem præbet effectus Plantago, calorem mulcendo, re-  
 primendo, & nonnihil roboris partì relinquendo, ad expulsiōem.  
 Ventrem lenire aut facilitare, suspectum, vt Matthiolus & neoterici volunt.

*BELLIS maior.*

*Consolida media vulnerariorum.*

Hernijs potu & cataplasmate medetur: & eadem præstare quæ Bellis minor, fertur.

Holostium  
quorundam  
Lacuna.

**PILOSELLA.** Gallobelgia Peluette & veluette.  
Germ. Ragelzaut & meufzooz. Gal. piloselle. &  
oreille de rat ou fouris. Bel. Ragelkrup, mupfoz-  
zen & piloselle. Ital. Pelosina. Aduers. pag. 200.

**PILOSELLA maxima Syriaca.**



Potentissimè siccatur & adstringit: gargarizatu vulnè, fauciumq; relaxationes reprimat potu dysen-  
tericis, enterocelis & vteri profluuijs medetur. Vulnè glutinat, laxosque lienis tumores & cruentas  
deiectiones cohibet. pota & imposita, vulnè & vlcerà quæ serpunt, ferruminat. Gallobelge & Ner-  
uij syrupum è succo paratur ad tussim, tabem, & phthisim.

**PILOSELLA maxima Syriaca.**

Et aliam habemus Syria missim, folijs maioribus, carnosiss, densè ab imo stipatis: candore & lanu-  
gine sericeæ vellere, holoserici attritu, hilari & specioso aspectu, incanis. Caules ternos, qua-  
ternosue, quadrangulos, geniculatos, pedales emittit. Flores videre non contigit: radix durior, li-  
gnosa, fibris donata.

**GNAPHALIVM.** Aduers. pag. 200.

**DIOSC.** Folijs pro vomento vtiuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero ad dysenteriam.

GNA-



GNAPHALIUM vulgare, Centunculus.

LEONTOPODIUM sine pes Leoninus.

Germ. Querkraut. Belg. Querkruyt &amp; root

Aduersf. pag. 202.

mellisocrupt. videtur Impia Plin.

Angl. Cotton weeds. Aduersf. 201.



Herba cōtufa, oleo macerata & cocta, occidit Angliæ plebs ad liuores, concussionēs, cēsa & verbera vitur feliciter. menses supprimit.

Plin. lib. 24. cap. 19. Herba impia vocatur, incana, Rorismarini aspectu, thyrsi modo vestita atque capitata. Inde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes; ob id Impiam appellauere, quoniam liberi super patrem excellant. Alij potius ita appellatam, quod nullum animale eum attingat, existimauere. Hæc inter duos lapides trita feruet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admixto, mirumq; traditur: nunquam ab eo morbo tentari qui gustauerint. Itaque & suis dari: quæque id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire.

lege candore,  
speciosoque  
lin. 28. pag.  
201.

In Anglico  
Gnaphalio.  
pag. 202.

lege pediculis  
& paulo post  
radiceque  
capillacea.  
item lin. 10.  
verticilla-  
tim.

GNAPHALIUM montanum. Aduersf. pag. 202.

Lagopus &amp; pilosella Tragi.

Germ. Meus, zollin &amp; Galenphatlin.

HOSTEOCOLON Bononiensium.

Tomentosa herba Gnaphalio congener: binis foliorum ordinibus, maioribus, tomento incanis. surculis exilibus, flosculi lutei. Hanc aridam vidi in sportulis Hermetis Clerici D. Medici doctissimi ornacensis, cui acceptam refero.

lege singula-  
ris globulus.

LEON-

## LEONTOPODIUM pARNUM.



CHRYSOCOME aureaue coma. *Amaranthus luteus* Eufch. & Tragi: & perperam *Heliochryfos*. *Linaria aurea*. *Tinearca*. Germ. *Steinbiumen*, quod in regionibus Rheno conterminis potissimum eriauit. *Ital.* *Amarantho giallo*.



Altera Dioscoridi & neotericis præterita huic effigie habituque toto conuenit, singulari dodrantali cauliculo, & folio Gnaphalij montani densa lanugine incanis: flosculis summo caule luteo pallentibus Gnaphalij montani, exili ligneaque radice.

## CHRYSOCOME.

Diosc. Radix calfacit & adstringit: hepaticis & peripneumonicijs utilis. Sumitur cum hydromelite decocta ad vteri purgationes.

Flores vino incocti aut infusi lumbricos nuperorum experimento; ex lixiuio autem pediculos, expellunt, enecant. Farctus pulmonum, hepatis & viscerum referareasseruntur.

CHRYSOCOME Germanica. *Pseudoleontopodium* Matth.

& *Heliochryfos* syl. Tragi.

## Varietas.

Tomentoso Gnaphalij vulgaris æmulo folio, flosculis pallidis & semipe iuxta alas, in Germania & Brabantino agro, ipsisque Antuerpianis pomærijs cis ædes Domini de Berchem, sabuloso solo variat.



*POLIVM montanum. Aduers. 206. & 207.*

*POLIVM luteum capitulis quàm Polij montani aut  
marini longioribus ex luteo viridantibus. Aduers. 207.*



*POLIVM montanum purpureum.  
Polium repens supinum Clusij.*



Reptat Polij marini aut Serpilli modo numerosis furculis è radice lignosa: folijs cauliculos vestientibus, leuiusculis ambitu extantibus denticellis, visu vix discernendis, tomento crasso adedè incanis, Polio marino minoribus. Capitula item non diuersa, sed minora, flosculis purpureis ornantur. Oritur sponte arenoso solo Murciani regni inter Lorca & Velez vnà cum socio congenere & simillimo Polio, mox hic subdendo, sed teneriore.

Polium quintum Clusij, superiori purpureo congener. Martio flosculis albis stipat cineritia aut candida lanugo densissima vtrumque: & odoris suauitate reliqua genera superant, vt auctor fidus est C. Clusius, cui hæc duo Polij genera debentur.

POLIVM. Ital. & Hisp. Polio. Angl. etiam Polp.  
Aduers. pag. 207.

Diosc. Potum feruesfacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. substratum suffutimue serpentes abigit. Illitum \* vulnere † conglutinat. Siccum cacoethe siue praua vulnere sanat.

POLIVM MONTANVM supinum minimum.\*

POLIVM LAVENDYLÆ folio, femina recentiorum. Aduers. pag. 207.



\*Montano vulgato Polio per omnia simile, sed quadruplo minus. Allobrogum collibus & Delphinatis Gallie provenit.

AGERA-



AGERATVM  
floribus can-  
didis.

AGERATVM Septentrionalium  
Aduers. 208. Costus minor hortens-  
is Gesneri & Dod. Mentha co-  
rymbifera minor Cordi.



AGERATVM floribus candidis.  
Aduers. pag. 208.

DIOSC. Vis decocti feruens: Huius vsta nidor vri-  
nam cit, & vulvae durities emollit.

TEVCRIVM pratense officinarum. Hierobotane mas  
Dod. & quorundam perperam Chamædrys Euchsij,  
Germanorum & Officinarum. Aduers. 209.

TEVCRIVM. Aduers. pag. 208.

DIOSC. Recens cum posca, aut arida seruesacta ius,  
potu\* lienem potenter absorbit: lienosis cum aceto & ficis  
illinitur. item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

\* Gal. quia incidendi & tenuium partium facul-  
tatis est: ponatq; ipsum quispiam in tertio exsicca-  
tium, secundo verò calfacientium ordine.

TEVCRIVM pratense alterum: Sacra herba, siue  
Verbenaca supina semina Dod.

Aliud à supradicto non est, nisi quia foliorum Varietas.  
magnitudine vincitur. Hoc tamen pluribus folio-  
lis & cauliculis donatur, umbrosis: itidem mar-  
ginibus syluosisq; gaudens.

k 2 TEV-



## TEUCRIVM paruum supinum.

E Teuctrij familia esse docent flores cærulei spicatum prodeuntes, & foliola; sed angustiora, longiora minusq; ferrata; Polio montano paria, atrouirentia, in cauliculis dodrantalibus humi fufis. ori-  
tur in Frisia iuxta Deuentriam & Oueriffel.

CHAMAEDRYS Hisp. Chamedreos.  
Aduers pag. 109.

CHAMAEDRYS montana durior. Aduers. 209.  
Ceruitaria Gesneri quorundam. Ital. Chioma di  
Ioue. Sic dicta à floris similitudine; qui è foliis seri-  
ceo vellere in latam cesariem tortilibus crinibus expli-  
eatur.



Chamædrys varie- { vulgatiior minor. [ Folio obtusiore & mucronato.  
tates. { Maior [ Hirsutior & minus hirta.

Diosc. Recens viridis in aqua decocta & pota, conuulsis, tussientibus, lienî indurato, vrinae difficultatibus, Fades  
hydropicis inter initia auxiliatur. Cit menses† partuq; extrahit Lienem ex aceto pota minuit. Aduersus venenata, Theo  
cum vino pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur: cum melle vetera vlcera purgat. Cum Plin.  
oleo trita inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.

† ob id hydropicis incipientibus efficax manualibus scopis eius decoctis in aqua vsque ad tertias,  
in tribus heminis aquæ.

Gal. Ex tertio ordine calfacientium & siccantium, vincentem amaram qualitatem habet, & est  
quodammodo acris: quocirca meritò lienem colliquat. vrinam & menses mouet, crassitudinem hu-  
morum incidit, & viscerum obstructions expurgat.

Pli. subdit. Item stomacho, tussi vetusta, pituita in gula coharefcenti, ruptis, cõuulsis, lateris do-  
loribus. Fit & vinum ex ea pectoris vitijis.

APVL. Ad ruptos: herba Chamædrys contusa de ligno in lignum, adiecto vino & potui data, cum  
mira celeritate sanat. Ad ischiam: herba Trixago seruefacta, ac triduo potui data, ischiaticum  
mirificè sanat. Ad podagram: herba Chamædrys si in puluerem mollissimum redacta est, cum  
aqua calida potui data, mirificè paregoriam præstat.



EUPHRASIA. Aduers. 210.

EUPHRASIA 2<sup>a</sup> Dod. siue Cratagonum alterum quorundam descriptū superius Observationum pag. 22.

SCORDEV. Hist. Camedreos de arroyos Aduers. pag. 210.



## SCORDION.

Diosc. Herba vim excafactoriam habet. urinam cit. colla recens arida cum vino, aduersus venenosos serpentium morsus bibitur. ad stomachi quoque roisiones, dysenteriam, & vrinae difficultatem, binis drachmis cum hydromeli: cretamen parulentum pectore expellit. facit arida farina ad vterum tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat. cum aceto acri aut aqua, podagris conuenienter illinitur. menses timposita mouet. vulnera conglutinat. vetera vltima purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. sicca excrecentias in carne cobibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima effica: Pœniticum natione, Creticumque.

Aegin. & Gal. Scordium varium existit, vt quod amarum, acerbum & acre sit, purgat igitur simul & calfacit viscera. † vrinas & menstrua cit. refrigerata omnia rec. ilfacit: aridum illitum cicatricem inducit.

SCOR-

## SCORDION alterum Plinij.

Aduers. pag. 210.

Scorodiana Cordi. Sphacelus Theoph. Dodonzo.

## ORIGANVM Heracleoticum.

Aduers. pag. 211.



Scordio viribus proximum; fetus mortuos, menses & secundas pellit. facultates & dotes rubie <sup>lege a</sup> habet ad sanguinis grumos dissipandum, per vrinas materiam deriuando. Collectionibus, tumoribus, <sup>reute</sup> percussis, liuoribus, ruptis & internis vulneribus fauciatiss ferrumini est. Sunt qui Bieris inserant, Hormini modo.

## ORIGANVM Heracleoticum.

Diosc. Excalfacit. vnde decoctum cum vino potum, demorsis à serpente conuenit. si cicuram aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. ruptis, consulsis, hydropicis, cum fico esui datur. aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit. menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus virentis tonsillas, vuam, & oris vlcera sanat. & per nares, ex oleo iurino infusum, trahit. aurium dolores cum lacte mulcet. conficitur ex eo, & cepis, & rhois frutice quo ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies bis vicenos insolat, dum canicula sydus flagrat. herba autem substratu serpentes fugantur.

Gal. & Aegin. calfaciunt & exsiccant ordine tertio.



AGRIORIGANVM, siue ONITIS maior.  
Aduers. pag. 211.

TRAGORIGANVM alterum. Marum Cortusi  
& Matth. Aduers. pag. 211.



Diosc. Qua Onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet.  
Vt ei Origanum Heraclei, sed multo inefficacior.

Sylvestre ORIGANVM. Hyssopum Dioscor. Cilicium Anguil. Ital. Oregano bianco.  
Aduers. pag. 211.

Diosc. Sylvestre Origanum, aliqui Panaces Heraclei, alij Cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. folijs est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellae anethi insunt. flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussus à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliantur.

Sylvestre  
vicumque  
valentius  
Galeno.

#### TRAGORIGANVM.

Diosc. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrnaeum, & in Chio Cooq<sup>2</sup> proueniens. Omnia excalescunt, urinam cient, aluo accommodantur. decocto potu bilem deiciunt. lientis ex aceto bibere prodest. contra pota ixia venena in vino bibuntur. menses trahunt. peripneumonici, tuſſentibus, ex melle in eclegmate dantur. gratia ac mitis eorum potio est, quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ructanti, imbecilloq<sup>2</sup> traditur: item si à mariima iactatione nausea, & astus praecordiorum excitetur. tumores verò cum polenta illita discutiunt.

TRA-

TRAGORIGANVM flore albo Clusij.

Genuina Græcorum HYSOPIVS folio Origani ymbel-  
lato flore. Aduers. 212.



Non diuersa huius figura, sed duntaxat tota minor, folijs longioribus tenuioribus, & odore minus iucundis, per verticillos flores galericulati, sed albi. solo Valentino agro Clusio obseruata.

Genuina Græcorum HYSOPIVS.

Diosc. Vim habet extenuandi & calfaciendi. decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonici, diuturni tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoici auxiliatur. tinea enecat. idem facit, si cum melle delingatur. crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis manditur. vehementius, addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit. colorem in corpore fouet. leni, & aqua inter cutem, cum fico nitroque: inflammationibus quoque ex vino illinitur. cum feruente aqua impositum, fugillata discutit. cū decocto fisorum, \* optimè anginis gargarizatur. decoctum cum aceto, dentium dolorem in collatione sedat. inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Gal. deficcet & exalfacit ordine tertio, sed & tenuium est partium.

\* Hyssopo Arabum ad eadem hodie vtuntur medici.



SAMPSVCHVS, *sive Maiorana.*  
Aduers. pag. 213.



AMARACVS  
TENVIOR.  
Maiorana  
tenuifolia,  
delicataior.  
Aduers. 213.



MAXVM SY-  
RIACVM,  
gracilioribus  
famentis,  
minoribus  
capitulis &  
folijs. Aduers.  
pag. 213.

SAMPsvCHVS. *Aduers.* pag. 213.

**Diosc.** Vñ eius exalfaciens: succus decocti potus conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos vrina difficultas, aut tormina ex cruciant. illa ex melle arida folia, sugillata tollunt. menses subditi in pecto trahunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusque, cerato excepta imponuntur. aduersus oculorum inflammationes, tumoresque cum polline polenta illini prodest. acopis malagmatisque, calfaciendi grata, commiscetur.

**MAIORANA** capiti, cerebro, cordi, ventriculo peramica. Succus erethinis additus, caput à frigidis humoribus purgat: menses vñ Sampfuchus euocat.

MARVM.

**Diosc.** Vinum habet Sisymbrio consimilem. substringit enim & modicè calfacit: qua de causa illitu serpentia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur.

*Varietates.* [ Hispania folio longè minore luteo virente nobis largitur.

MARVM *supinum.*

Aliud non absimile in hortis nostris alitur, sed cauliculis repit.

Pvlegium *Regium vulgatum.**Aduers.* pag. 214.

**Diosc.** Extenuat, calfacit, & concoquit. Porum menses, secundus & partus trahit cum melle, & aloë potum: ea qua circa pulmonem sunt, educit, & conuulsis auxiliatur. Nauseas stomachicis, morsus cum postea potum lenit. Atram bilem per alium educit. Cum vino potum venenatorum morsibus succurrit. Defectos animo, cum acetum naribus obiectum recreat. Siccatum in puluerem tritum crematumque, gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat. Podagrum per se subuenit, impositum vsque dum rubescat locus. cum cerato varros extinguit. lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius ablutus pruriginis mitigat. Conuersas vulvas corrigit. Contra inflationes duritiaque vulua in defensiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona, quoniam dum flores, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Gal. eadem: Pulegium calfacere abundè magnum est testimonium, quòd illitum rubrificat, & quòd si quis diutius tolleretur, exulceret. Extenuare verò satis indicat, quum humida crassa & lenta è thorace & pulmone excreatu facilia faciat, mensesque moueat.

Plin. Magna societas cum Mentha ad recreandos defectos animo. Qua de causa dignior è Pulegio corona vertigini quam è rosis, cubiculis nostris pronunciata est; nam & capitis dolores imposita dicitur lenare. Quin & olfactu capia ueteri contra frigorum æstusque iniuriam, &c.

DICTA-



*Antiquo & DICTAMNVM. Germ. Diptam.*

*Ital. Dittamo. Hifp. Diptamo.*

*Aduerf. pag. 214.*

*PSEVDODICTAMNVM floribus verticillatis.*

*Aduerf. pag. 215.*

Angli French diptammer, id est Gallicum aut Francum, non secus ac Germani Welscher exoticas & rare inuentionis plantas vocitant.



In Vireto D. Brancionis & D. Ioannis Boifor hoc anno floruit.

**Diosc.** Praestat omnia quae satiuū Pulegium, sed efficacius multo, non potum modo sed appesum quoque ante suffitum, defunctos partus eicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbae pastu, eas excutere. purgandi vim habet succus illius, ut cum polenta tritus. herba in tactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitus resigit. ad lienis dolorem efficax habetur. siquidem ipsum imminuit. Merunt aestate & autumno. Radix eius gustu calfacit. parus accelerat. succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidio est. tanta herbae facultas est, ut ossa abigat bestias, qua venenato ictu sentiunt, appensaq; contactu exanimet. vulneribus ferro illatus, & venenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

Gal. tenuiore essentia constat quam Pulegium: cetera illi simile.

**PSEVDODICTAMNVM.**

**Diosc.** Quod Pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quam illud acre.


Gal. Eodem effectus praebet. \* sed inefficacius multo.

**DICTAMNVM** alterum Creticum Dioscoridis.

Desertur à Creta alterum Dictamni genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus. in quibus flores sylvestris\* Origan, nigri, molles. odor foliorum inter sisymbrium & saluam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. misceatur emplastris & medicaminibus quae aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca vocant.

OCIMUM medium vulgare.  
Aduers. pag. 215.

OCIMUM maximum Caryophyllatum ac Citreatum.  
Aduers. pag. 215.



Diosc. Copiosiore cibo oculorum aciem hebetat. alium molis. spiritum mouet. urinam<sup>a</sup> pellit. lac euocat. <sup>a</sup> idem  
aggrè tamen conficitur. illud cum polline polenta, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. draco-  
nis marini & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem<sup>b</sup> abster- <sup>b</sup> idem  
gu. distillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, instatq; naribus haustum  
subinde mouet<sup>c</sup> sternutamenta, quod idem herba efficit. sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. <sup>c</sup> Eade  
Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos<sup>d</sup> creat. Apbri Plu.  
autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conficiunt dolore. <sup>d</sup> infici

Gal. Ocimum excrementitiam humiditatem habet, proinde nec commodum est quod in corpus  
sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum vile est. Plerique hoc etiam ut  
obsonio vtuntur, ex oleo & garro offerentes: vitiosioris autem succi est, stomacho inimicum, & con-  
coctu pertinax olus. <sup>Gal.</sup>

Plin. Ocimum Chrysippus grauiter increpuit, inutile esse dicens stomacho, urinae, oculorum quo-  
que claritati: præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia, ideoque capras id aspernari:  
hominibus quoque fugiendum censet. Afri verò si eo die feriantur quispiam à scorpione, quo ede-  
rit ocimum, sanari non posse, &c. Secuta ætas acriter defendit, nam id esse capras. nec minus quàm  
Menthā & Rutam scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi cum vino, ad-  
dito aceto exiguo. Vñ quoque compertum deficientibus ex aceto odoratum, salutare esse.

Semen potum. ] cardiacis affectibus succurrit Simeoni Sethi; animiq; mærorem ex atra bile ortam, in-  
hilaritatem mutat.



OCIMUM minimum Amara figura Caryo-  
phyllatum. Aduers. pag. 215.

ACINOS Aduers. pag. 215. 216.

Betonica Pauli quorundam. an Clinopodium Lacunæ?  
Germ. Wild basilie. Belg. Wilde basilicon. Gal.  
Basilic sauvage. Angl. Wild basil. Hisp. Alba-  
haca saluage.\*



lege quemad-  
modum 216



\*Diosc. Ocimo similis, odorata, sed bifurior. Men-  
ses & aluum pota sistit. Illi panos ignemque sacrum sa-  
nat.

ERINVS. Hisp. Albahaca de arroyos. ocimum  
aquaticum. Aduers. pag. 216.

Diosc. Semen drachinis duabus in quatuor mellis  
cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus <sup>lege quorum</sup>  
cum sulphure & nitro instillatus aurium dolores sedat. <sup>caret.</sup>

#### CORCOROS Plinij.

Folij est Ocimi in sesquipalmaribus & dodran-  
talibus cauliculis. Flosculi iuxta pediculos lutei.  
Semen in longis corniculis Asclepiadis gracilio-  
ribus. Hispano semine in pensilibus Adonidisque  
hortis alebat illustris vir Ioannes Brancionus, &  
Corcorum Plinianum faciebat.

Lxx

*CALAMINTHA aquatica* Belgarum fit *POLY-  
CNEMVM*, quasi multitudine aut multicaulis.  
*Pulegium agreste* Officinarum, *Nepeta agrestis* Tragi.  
Germ. *Widernuht*. *Aduers*. 217.

*CLINOPODIUM vulgare* odore *Pulegia incana* *diarr.*  
Germ. *Widernuht* *Trag.* *Aduers*. 217.  
*Ocimum* *hyl.* siue *Acinus* *Dod.* perperam *Calamintha mon-  
tana* *Tragi*.




**Diosc.** Folijs origani: caule ut pulegij geniculis multis intersepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine co-  
rymba, boni odori & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur, sed quinto  
die solui debet: ad vrinae stillicidium, ruptaq, cum vino bibitur.

## CLINOPODIUM.

**Diosc.** Bibitur herba & succi eius decoctum ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses &  
partus pellit, & peniles verrucas, quas acrochordonas vocant, eicit aliquot diebus potum. Alium sistit decoctum  
ad serrias, potumq, si febrim sentiunt, ex aqua: alioquin ex vino.

MEN-





MENTHA  
rotundifolia  
altera, flore  
spicato: siue  
CRUCIA-  
TA MEN-  
THA. Men-  
tha secunda  
Dod. Germ.  
Kraus; dey-  
m; kraus;  
munt; &  
krausbal-  
sam. Gal-  
baume cre-  
spu.



Romana an-  
gustifolia si-  
ue Cardiaci  
MENTHA.  
quarta Dod.  
secunda Mart.  
P. 12. h. m.  
ment.



*Mentha spicata* varietates.  
quinque.

Romana longifolia angustifoliae descripta Aduers. 213.  
Altera perfoliata folio nigriore, & rigidiore.  
Tertia latiore folio.  
Quarta rotundo crispo folio.  
Quinta folio minus acuto.

SISYMBRIA MENTHA *agrestis sativa* Cru-  
ciata *Mentha* congener aut eadem. Ital. etiam  
Balsamita, seu *Mentha* Crespa.  
*Sisymbrium sativum* Matth.

σισυμβριον. AQUATICA siue SISYMBRIA Men-  
tha, rubro folio, & flore nigra *Mentha*. Balsamine Of-  
ficinarū. Ger. Wasser muntz. Gal. *Mente* aquatique.  
Belg. Root water munte. Ital. Balsamita.



Diosc. Calfaciendi, adstringendi, atq; exsiccandi vim habet. proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto po-  
tus. Lumbricos rotundos enecat. Venerem concitat. Singultus, vomitiones, choleraeque sedant duo aut terni surculi  
cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet.  
Mammæ si tendantur, aut lacte turgeant, compefcit. Cum sale canum moribus illinitur. aurium doloribus cum aqua  
mulsa subuenit. vulua ante coitum admota, conceptioni resistit. Lingua scabritiem conficit leuigat. Coire lac,  
densarig, in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa stomacho vilis est, & in condimen-  
tis peculiarem gratiam habet.

Menthastrum minus ad sanorum vsus expetitur.

Gal. *Mentha* sativa ad venerem mediocriter excitat. Id quod omnibus commune est quæ humidi-  
tate semicocta & flatuosa participant. Ob talem ipsius herbae temperaturam in abscessibus aliqui eam  
cum polenta mista vtuntur. Habet etiam quiddam amarum in se & acerbum; illo quidem lumbricos  
interficat: acerbitate verò, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substan-  
tia est, vt si qua alia herba, tenuium partium.

Aetius addit, potum eius decoctum tribus seriatim diebus, cholicos omnino sanare.

Plin.



Plin. Menthae hortensis odor animum excitat, & sapor aviditatem in cibis iedem in mammarum mixtura familiares ipsa accessere, ut coire densarique lac non patiantur. quare lactis potionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem vi resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia densari.

MENTASTRUM. Aduers. pag. 219.

Gal. Mente sauvage. Angl. eriam wilde steente.

Germ. wild duntz. Hiss. Mastrantos. Lusit.


Mestrantos. Ital. Menta saluatica.

MENTASTRI varietates.

Per simile Mentastro descripto pag. 218 sed folia nigriora, longiora, minusque incana & hispida, flos item spicatus. In agro Frisio secus Campé & Zvo-len oritur.

MENTASTRUM niueum Anglicum.

Aduers. pag. 219.



MENTASTRUM minus spicatum.

Odore initius minusq; graue; folio Heliotropij tricocci.

Mentastri folia aquatica hirsuta CALAMINTHA  
tertia Diosc. Aduers. pag. 219.

Tertia Diosc. Calamintha Mentastro cognata, cum primum erumpit, folio exit Cataria; Menthae longiore & rubente Mentastri situ & positu: caule Mentastro maiore proceriore, multis alis diuiso, in quibus flores spicati caerulei Cataria; modo digesti.






*Καλαμίνθη*, *CALAMINTHA montana* præstantior.

*Aduers.* pag. 219.

*Gal.* Calament. *Hisp. & Ital.* Calamento.

*CALAMINTHA montana vulgaris.* \*

Floribus quauis Calamintha maioribus; aspectuque hilarioribus.



\* Media odoris suauitate & magnitudine inter suauiores Calamintham & Nepetam hæc. Quadrato quippe cubitali & ampliore alarum multis ramulis coneano caule scruicatus; foliis rotundioribus, nigrioribus Nepetæ similibus, sed maioribus, hirtis, nitidioribus, & iucundioris odoris fragrantia. Hæc ut plurimum alitur ad vsus medicos.

*CALAMINTHA montana.*

*Dioscor.* Omnium folia admodum seruentia<sup>1</sup> & acris. Radix inuulsi. Pota aut illita demorsis à serpente opitulatur. Decoctum eius potum urinas & menses expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnæa torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Presumpta in vino venenis resistit. tinea; cateraq; inter, in eorum animalia, cum sale & melle pota, enecat. nec secus cocta cruæne, si teratur. elephanticos esitatus adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia dentata si in vellere subiciantur, menses<sup>2</sup> extrahunt, & partus enecant. accensa aut substrata serpentes fugant. nigri cicatrilibus candorem reddunt, in vino cocta & illita, fugillata tollunt. *Calamintha*<sup>3</sup> isti hiadici imponitur, ut ex aleo humores euocet, summam cutem exurens. vermes necat succus auribus insillatus.

<sup>1</sup> Gal. Calfacit & sudorem ciuit, omneque corpus tum digerit, tum exsiccat: ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt.

Discutit frigora in aqua decocta Plin. <sup>2</sup> eadem Gal. <sup>3</sup> eadem Gal

<sup>4</sup> eadem Gal. subditque: Potum etiam elephantiorum remedium, non eo tantum quod strenue tenues humores digerat, verum etiam quia extenuet & incidat valenter crassos quales sunt qui hunc morbum procreant. sic & cicatrilibus atris candorem reddit, & fugillata digerit. Sed ad talia recentem magis quam atentem adhibere præstat, quippe arefacta vehementior redditur & ad vrendum promptior.

Potro.



Potè talis cum sit, ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria, & quæcunque medicamenta calida sunt, & acria, tenuiumq; partiū, quæq; facillè ex alto ad se circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere.


*Vermes necat.* ] Gal. Cæterum quæ illi inest amaritudo planè exigua est; verum ad quædam ita efficaciter agit, vt quæ valentissima est, nimirum cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia; quare & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat: Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in parte corporis sinuola aut implicata quæ putredine tenetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptum seu pota, seu admota interimit & eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergendi verò propter vnicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ad omnia antedicta prodest. Ictericis verò potissimum ob amaritudinē, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia & expurgantia in iecinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

Ictericis  
prodest om-  
nia amara.

Plin. Tusa ægilopis imponitur & capitis doloribus recēs cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius instillatus naribus supinis profluuiū sanguinis sistit. Item radix cum myrthi semine in passo tepido gargarizata, angiais medetur.

*CALAMINTHA altera odore graui Pulegij,  
foliis maculosis. Aduers. pag. 219. Nepeta Diosc.  
Angl. Calamint. Ital. Nepotella montana.*

*CALAMINTHA secunda incana.\**



\* Huius alterā speciem ex Italia collibus attuli, gustu Pulegij, foliis Maioranae duplo minoribus, canalicatis, vt tota planta, in cubitalibus & pedalis furculis. exiliores flosculi Calaminthæ siue Dioscoridis Nepetæ odoris grauis Pulegij. Cautibus Linguagotticis calidarumque regionum oriunda.

Varietas.  
Aquatica  
CALAMIN-  
THA Belga-  
rū vide Po-  
lycnomen.  
Aduers 217.

*Varietas.* Floribus albis ex collibus Picardiæ & Gallobelgij transmisit ad nos Calamintham secundam D. Carolus de Houchin literatissimus, & harum si quis alius strenuus & peritissimus indagator.

MENTHA  
Catania.MENTHA  
angustifolia.MENTHA CATARIA. *Nepeta* Tragi.  
*Advers.* pag. 220.  
*Hisp.* yerua Gatera.*Mentha* CATARIA duplex peregrina, latifolia  
& angustifolia.

Huius duas species primùm videndi copia fuit in horto amœnissimo stirpiumq; citillimo Ioannis Moutoni Neruiensis myropolæ in hac palestra bene versati. Folia angustiora Cretici Marrubij proxima, incana; Flores candidi, copiosi, Catariæ vulgaris verticillatim prodeant; caulem itidem quadratum ambiētes, multis concavum alis, eiusque summum decorantes. Magisq; intensus odor, gravior, vires etiam acriores quàm Catariæ.

Altera duntaxat angustioribus, minoribusque foliis variat; cæteroquin reapse vna, vitæque Hispano semine fata.



## APIASTRYM siue MELISSOPHYLLON

Gal. etiam poncyrade. Germ. honigbluem. Hiss.  
Torongil. Lusit. yerba Cidreira. Ital. Melissa,  
Cedronella, & Aranciata. Allegracuore.

## MELISSOPHYLLON Fuchs. Cordi, &amp; Tragi.

Herba sacra Agrippa, & Lamium  
Plin. quibusdam.



Varietas. Latiore folio & hirsuto, odore suauiori, in Belgio variat.

Dioscor. Folia cum vino pota aut illita, contra scorpionum, phalangiorum, canumq; morsus prosunt. Decoctum eorumdē, si eo persundatur, idem potest. In infectionibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodē in dolore colluuntur. Dysentericis interitum prodest. Fungorum stragulationibus, folia cum nitro pota succurrunt. Terminibus auxiliantur. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas disciunt. Ulcera purgant. Articulorum dolores mitigant.

Plin. eadem. Plin. Vulvarum habet. Idem Plin. Idem Plin. Plin. eadem.

Gal. Marrubio facultate simile est, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec vitur illo quispian. Superuacaneum siquidem foret praesente Marrubio (cuius tantus est vbique terrarum prouentus) velle vti Melissophyllo. Plin. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur.

Sethus. Ad stomachi morsus ex frigidityte, & à nigra bile tristitia & tumores qui sine ratione ex illa sunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicum ac pituitosum humorem prodest. fertur quodd industriam afferat, & quodd ante somnum sumptum, bona somnia faciat, contraria ratione cum brastica, quae mala insomnia affert. Bubones laedit.

Suffocationi matricis auxiliatur Dodonaeo. Recentia vulnera imposita glutinare potis est.

## Extractum Melisse Chymicum.

Melissa minutim inciditur, inditurque ampullae vitreae; & vino stillatio, quod duos digitos supereminet, perfunditur: deinde illa caeco operculo oclusa, maceratur in balneo, vel in sole, vel iuxta fornam diebus aliquot; postea eximitur & sub praelo validè exprimitur; facibusque reiectis, recens Andernac. herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturque vt prius: si que labor ter quaterq; repetitur, prout extractum efficax desiderauerimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, vel vini spiritu enocato aquosum effluat.

## MELISSOPHYLLON Fuchsij, &amp;c.

Folio Melissophylli longiore, aut Menthae atroirente, in cauliculo quadrato pedali: flos rubellus dilute purpurascēs oblongior, aeneus Lamij lutei. In vallibus Germaniae & Narbonensis Galliae oriunda.



CARDIACA



MARRV-  
BIVM albu.



MARRV-  
BIVM albu.  
didum  
rum  
nicum



CARDIACA. Aduers. pag. 221. Gal. etiam Creneuse à crenatis foliis.

Leg. pa. 211.  
decore.Decoctis cordi amictis sepe miscet doctissimus & experientissimus D. Zigerus Cobelgiets Antuer-  
piani medicus inposita vulnera ferruminat.

CARDIACA Melica. Aduers. pag. 221. Molucca minus aspera. Maseluc Turcarum est Molucca aspera.

MARRUBIUM album. Hisp. Marruio blanco. Ital. Marrubio bianco.

MARRUBII candidi varietates.

Foliis longioribus magisque carnosis, hirtis, albis & suavius redolentibus in Belgij hortis variat Hi-  
spano semine.

MARRUBIUM Aduers. pag. 222.

DIOSCOR. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspensio, tus-  
sientibus, & ad habitudinem redactis, crassam è pectore pituitam, cum seca tri euicit, mulieribus à partu non purgatis da-  
tur, ut menstrua & secundas extrahat, item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi  
sunt, vesicam renescit, ladic. Folia cum melle illinuntur sordidis vlcibus purgandis, pterygia nomasq; sistunt, laterum  
dolores mitigant. Succus foliis contusis expressus, & sole coactus ad eadem pollet, cum vino & melle illitus, \* oculorum  
claritatem adiuuat, naribus regium morbum expurgat, aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.  
\* eadē Gal.  
† idem Gal.Gal. Prassium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur, conuenientem huic saporis actionem habet, ie-  
cur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed  
& illitum detergit ac digerit. Eadem ferè Plin.

BALLOTE, sive MARRUBIUM nigrum. Aduers. pag. 222.

MARRUBIUM Hispanicum odore Stæchadis:

Fortè Ocymastrum Valentinum Clusij.\*

Germ. Zwartz andorn. Gal. Marrubin noir.

Hisp. Marruio bastardo. Lusit. Marruio  
negro. Ital. Marrubio bastardo.DIOSCOR. Ballotes vis effacax aduersus canis morsus, foliis ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, vt  
condylomata reprimant, purgant & sordida vlcera cum melle.\* Emulo sed oblongiore Marrubij nigri folio, pseudodictamnno propiore & cœncolori: flos item se-  
cundum ramulos, pulegijs ritis, purpurascens. Hispano semine natum studiosè alitur à Ioanne Matono  
Neruenti Myropola doctissimo in fistilibus. Videtur sanè idem aut congener cum Ocymastro Va-  
lentino Clusij, icone & his verbis expresso. Pedali est altitudine, ramis quadrangulis hirsutis; foliis  
per singula genicula ex aduerso sitis, ocymi magnitudine & forma, gustu adstringentibus: circa summos  
ramos flores proeniunt orbiculatim compositi Marrubij modo, candidi, ocymi floribus similes in va-  
sculis pungentibus; semine Marrubij nigro: radix Vrticæ aut Lamij amula. Prouenit copiosè circa ri-  
uos ex lumine ductos ad urbem Valentiam in Hispaniis: vbi Aprilis initio floret & semine pragnat.

GALIOPSIS,



**GALEOPSIS, sue Vrtica non mordax.**Aduers. pag. 222. *Lamium Anguil.*

Purpurea Galeopsis Heraclea Plin. Tragi.

Germ. Waldmeister.

**LAMIVM, sue Archangelica flore albo.**

Aduers. pag. 223.

Perperam Galeopsis herbariorum Matth. Lacuna.

Hisp. hortiga muerte. Ital. ortica morte.



**Dioscor.** Folia, caules, semen, succusq<sup>3</sup>, duritias & carcinomata dissipant. strumas, panos & parotidas discutunt. oportet bis die repidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. ad putrescentia, gangranas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

**LAMIVM.**

Abscessus & duros tumores digerendo absunt.

**VRTICÆ.**

**Dioscor.** Duo vrticæ genera, sylvestris, asperior, latioribus, nigrioribusq<sup>3</sup>, foliis: semine lini, sed minore. altera non aquè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illita, canis moribus, addito sale, medentur. gangranas, \*carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq<sup>3</sup> sanant. lienosis cum cerato imponuntur. faciunt ad profusum narium, cum succo trita, & naribus indita. menses ciunt. eadem detrita cum myrrha, & imposita, procidentes vulvas, recentia contactu resflere cogunt. semen potum ex passo, venerem stimulat. vulua ora parescit. cum melle delinclum, orthopnoea, lateris & pulmonum inflammationibus, prodest. thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. vrinæ morient. inflationes discutunt. decocta cum ptisana, viria pectoris extrahunt. mulierum menses euocant, cum myrrhe modico pota. Inflammatione turgentem vnam, gargarizatus succus reprimat.

\*eadem Gal.  
& Pna.



*VERTICA sylvestris asperior. Ital. Ortica  
volgate. Hisp. Hörtiga.  
Aduers. pag. 223.*

*VERTICA Romana. Germ. Welschnessel. Belg.  
Koomsche netelen. Gal. Ortie Romaine.  
Aduers. pag. 223.*



Gal. Herba semen & folia, nam hæc potissimum in vsum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo vt tubercula & parouidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obuiunt. quo & venetem \* extimulant. Porro quod non vehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur Eadem Gal. & Plin. crassorum viscosorumque humorum ex thorace & pulmone eductio, tum quod partes quas contigerit, pruriant. Cæterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur, non enim actu flatuosa est, sed potentia. Ventrem autem mediocriter subducit ipsa duntaxat absterfione, ac, veluti titillatione, non purgatione.

GAL. *Gangrenas.* ] Gangranosa & cancrofa, & in torum quæ exiccati citra mordacitatem postulant, ea conuenienter sanant.

Plin. Articularibus \* morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere aut folia cum vrsino adipe trita imponunt. Et ad eadem radix trita cum aceto non minus vtilis. Eadem pilothrum exiccat.

\* Et ischiapigis hodie expetitur.

VERTICA minor acrior. Germ. Streunessel &  
haberessel. Belg. Heeten netelen. *Meraclea*

TETRAHIT Aduers. pag. 224.

*Meraclea sideritis* Dioscoridis Cordo, Clusio, & alijs. \*

lege quidam.



TETRAHIT herbariorum varietates.

\*Segetibus nostris æstiuum est floribus ex luteo purpurantibus. caule pedali & maiore.  
Aliud longè minus in segetibus item nascitur floribus albis aut rubentibus.

Diosc. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.


Gal. Sideritis habet quippiam etiam abstergerendi quandam facultatem; sed plurima eius pars, humida est & mediocriter frigida; paucula verò inest adstrictio: quare phlegmonem, sedat & glutinat.

TETRAHIT quorundam.

Flos Natticis Plinianæ dictæ, vel Ononidis; foliola oleæ, Phylli theligoni in palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis. In Italiæ syluosis Bononienis agri lecta sedula manu & industria D. Davidis van Mauden.



ALYSSON Galeni Clusio &amp; Herbarijs.

MARRUBIUM aquaticum vulgi. Syderitis secunda  
Math. Aduers. pag. 224.

## ALYSSON.

Propter vultum, ortum, flores & pungentes verticillos haud ita dispares Syderitidi siue Tetrahit subdendum fuit Alysson Galeni dictum. Folia tamen latiora, in pedibus quadratis cauliculis rotundiora, diuisuris & effigie Bugulae, carnosa, hirta & tomentosa, vti tota planta. Radix lignosa, fibrosa. flos è verticillis Marrubij caeruleo purpureis. Hanc stirpē mihi communicarunt praeclarus D. Ioannes Dilsius & Ioannes Mutonus, stirpium & naturæ miraculorum summi admiratores, qui hispano semine plantam nacti sunt.

Gal. Alysson lib. 11. de antidot. Marrubio persimilis herbula, sed asperior & magis spinosa circa orbiculos flore ad caeruleum vergente.

plura superius in Alyc-  
to Dioscori-  
deo.

SYDERITIS MonsPELLIACA Scordioides floribus luteis. Aduers. 225.  
Tragoriganum prassoides Francisci Pennini.

**CANNABIS.** Aduers. 226. Germ. Zamerhanf.  
Belg. Hemp. Ital. Canape. Hsp. Cañamo do-  
mestico. Gal. Châmbre. Ang. Hemp  
& Hemp.

**CANNABIS erratica paludosa** Syl. Ital. Canape  
saluatico. Hsp. Cañamo saluage.  
Aduers. pag. 227.



**Diosc.** Cannabis satina largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium\* dolori-  
ribus† instillatur. † ab obstructione, ut videtur Galeno.

Syl. **CANNABIS** Dioscoridis, est Alcea maior Mutono flore: Lychnidis  
subrubro, semine & radice Althea.

**Diosc.** Decocta radix illius inflammationes mulcet, tumores discutit, topicos articularum dissipat.

Gal. Semen flatus extinguit, adeoque desiccatur, ut si pluculum edatur, genituram exiccat. Semen  
etiam difficulter concoquitur. Stomacho & capiti aduersatur, prauosque humores creat. Admodum  
excalfacit, ideoque caput estuoso, ac medicamentoso halitu sursum misso tentat.

Idem somnum conciliat ut Iris, quo saepe abutuntur medicastris & clinicæ,

Plin. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta: item podagras & similes impetus. Ambustis  
cruda illinitur, sed saepius mutatur priusquam arescat.

Simeoni Setho Semen largius sumptum idem nocumentum quod Coriandrum adfert, deli-  
riumque facit: desiccatur semen genitale, ut Caphura.

**Cannabina Aquatica** planta **EUPATORIUM** dicta. Aduers. pag. 227. Officinis Gallia  
Eupatorium Cannabinum Auicenna. Pseudohepatorium mas Dod. editionis vernacula.

Offic. Belgij perperam Eupatorium Græcorum. Germ. Birsenklee,  
Wasserdoß, kunigunkraut. Belg. Voelkes crupt manneken.

**STACHYS.** STACHYS Dioscoridis, Scordotis Plin. lib. 25. cap. 6. Marrubium agreste Tragi.

Pseudo-stachys Matth. Germ. Feld Andorn. Aduers. 223.

**Diosc.** Vim habet excelsioriam & acrem: foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.





**CRISTA**  
GALLI her-  
bariorum.  
Aduers. 127.  
Germ. Gell  
Kadele.  
Belg. Kates-  
len & gecte  
Kadele &  
hane cam-  
mekens. i.  
Cristam gal-  
li à florū si-  
militudine;  
vultuq; non  
dispari, vt  
Plinius ha-  
bet.



**Stachys.**  
**STACHYS**  
Dioscoridis,  
Scordotis  
Plinij.



STACHYS  
spuria Flan-  
dorum. Ad-  
uers. 229.  
Sphacelus  
Guilandino.

Deme succo  
aqueo.



STACHYS Lusitanica quorundam.



BETONICA. Ital. & Hiff. Betonica.  
Aduers. pag. 229.

Herba venti  
Rondel. an  
OTHONNA?  
Aduers. 229.  
Lancetaria  
Cordi Mon.  
Syl. Syden-  
tis genus  
Dalech. Ital.  
Verbasc. Lyl.  
Species.





## STACHYS Lusitanica quorundam.

Reptitice Gnapthalij folijs & cauliculis sesquipalmaribus herbulam, candida lanugine stipatis & tomentosis verticillis concoloribus perexigujs sub foliolis cinctis visum effugientibus, suauè spirantibus, vti planta vniuersa, Stachyn dixere Herbariorum quidam non imperiti, nonnulla de facie & viribus similitudine ducti.

## OTHONNA.

Diosc. Extractus succus oculorum medicamentis adjicitur, vbi expurgare est opus; mordet enim & abstergit omnem caliginem qua oculis offunditur.

## BETONICA.

Diosc. Betonice radices ex hydromelite in potu, pituitosam vomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus vulua malo opportunis, & ad laxandos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelice: tres in vini sextario drachma, contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna vilitate illatis à serpente vulneribus illinitur: aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. præsumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocet. Eadē Gal. bit: vrinam ciet: aluum subducit: in edetor comitialibus & insanijs, pota ex aqua: & iocinoris lienisque virijs, drachma pondere in aceto mulso, concoctionem adiuvat, si quis eam faba magnitudine secundum canam cum melle cotto deuorarit: modo confimilis acida ructantibus propinatur. Stomachici eam manducare & succum deuorare proderit, si postea dilatum vinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis, cum diluti vini egelidi cyatho: trichidicis, venenæ & vesicæ doloribus, ex aqua: aquæ inter cutem bis drachmæ ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio morbo laborantes recreat, menses pellit, drachma pondere cum vino pota: aluum purgant drachma quatuor pota, in hydromelite decem cyathis. facit cum melle ad tabem & purulentam excretionem. Folia sicca tritaque siccili vase reconduntur. Eadem Gal. & Plin.

Plura subdit Antonius Musa.

Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficijs & periculis, & loca sancta & busta etiam à visibus metuendis tuetur & defendit, & omni rei sancta est. Ad capitis fracturam: herba Vetonica contusa, & super capitis ictum imposita, vulnus mira celeritate conglutinat & sanat. Eo quoque efficacius, si tertio die resectam, hoc est, recentiore frequenter impolueris donec sanescat. Eius potestas tantam fertur habere vilitatem, vt ossa quoque fracta vi sua extrahat. Ad dolores oculorum: Vetonica herbæ radices ex aqua ad tertias coquito, & ex ea aqua oculos foueto: ipsa autem folia eius trita supra frontem & oculos imposito. Ad dolores aurium: herbæ Vetonicæ recetis folia vel per se aut in aqua madefacta perterito, succumque eorum excipito, deinde adiecta rosa liquida reperficit, & in aures stillato, lanaque spissata, mirè proficere creditur. Ad caligines oculorum: Vetonica drachmā vnam, aquæ calidæ cyathos quatuor ieiunus bibat, deducit ad inferiorem partem cum sanguinem qui caliginem oculorum facit. Ad lachrymosos oculos: Vetonica manducata aciem oculorum clariorem facit. Ad sanguinem de naribus profluentem: herbæ Vetonicæ contrita paululum salis adijcto digitis duobus & pollice medio quantum tolli poterit, & subactū formato rotundulam quam si naribus inserueris, sanguinem sistet. herba Vetonica ex vino veteri aut aceto ad tertias decocta & gargarizata, dolorem dentium discutit. Ad vomicos & suspitiosos & thoracis dolorem: herbæ Vetonicæ drachmā vnam, & sumptis ex aqua tepida cyathis duobus, bibendum si dederis, iuuat. Idem spiritiosis prodesse creditur. Ad phthysicos & eos qui purulentum reijciunt: Vetonicæ drachmas tres in puluere redactas dato cum melle, & glutiat ieiunus cotidie, auxiliatur. Ad stomachi dolorem: Vetonica drachmas quatuor dato manducare per triduum, vel in aqua frigida cyathis quatuor dabis bibere, miraberis bonum effectum. Ad lateris dolorem: Vetonicæ drachmas tres ex vino veteri cyathis tribus, & pipetis grana viginis septē cōrita & calefacta ieiunus bibat, curabitur. Ad lumborū dolorē: Vetonicæ drachmas tres ex vino Amineo cyathis tribus, pipetis grana decem & septē contrita & calefacta ieiunus bibat. Ad ventris dolorem: herbæ Vetonicæ drachmam vnam in aqua calida cyathis duobus bibendum da. His autē duntaxat hæc apta erit cōpositio, quorū non ex cruditate intestina torquetur. Ad colum: Vetonica cū vino austero æque p̄ficat. Ad tussim: herbæ Vetonicæ vncias duas ex melle accipiat per dies nouē. Ad quotidianas: herbæ Vetonicæ drachmas duas, atroglossæ drachmā vnam, ex aqua calida cyathis quatuor dato, bibat sub accessione. Ad tertianas: Vetonicæ & Pulegij drachmas singulas, aquæ calidæ cyathos tres sub ipsa accessione dato bibere, sanabitur. Ad quartanas: herbæ Vetonicæ drachmas tres, mellis Artici vnciam vnam, aquæ calidæ cyathos tres in vnum miscebis, & ante accessionem da bibat, mirè sanabitur. Ad vesicæ dolorem: herbæ Vetonicæ drachmas quatuor, apij radices scrupulos tres. Decoque apij radices in sextario aquæ ad medias, quantum decocta fuerint, tum demum Veticam permiscebis, & dabis bibere, dolorem in perpetuum sanabit. Ad calculum: Vetonicæ drachmas tres ex aceto scyllitico, & mellis vnciam vnam, & aquæ calidæ cyathos nouem bibat, confert. Vetonicæ drachmas duas ex aquæ calidæ cyathis duobus, & vini austeri cyathis duobus sub accessione dato bibere. Ne fias ebrius: Vetonicā prius sumas. Ad carbunculū: Vetonicæ drachmā vnam, aquæ calidæ cyathos duos bibat. Qui perfrictionibus laborat: Vetonicæ vnciam ex vino cyathis quatuor bibat triduo. Lassus ex itinere: Vetonicæ drachmā vnam ex oxymelitos cyathis tribus potui dato. Ad eos qui cibū nō possunt continere: Vetonicæ drachmas tres, mellis vnciam vnam cōcoquito, donec indure scat, & pastillos ex his facito quatuor, & ex ipsis cum aquæ calidæ cyathis duobus vnum per singulos dies deglutat & bibat. His qui venenum sumperunt: Vetonicæ drachmas tres ex vini cyathis tribus statim dato bibat, & reijciet. Ad fistulas: Vetonica contusa & trita ex hac rotundulas facito, & pau-



& paululum salis inferito, & fistula obligato, expurgat & sanat. Ad podagram: Veronicae radices cum folijs decoctas ad tertias in aqua potui das, ipsamq; per se tritam & impositam, mirè dolorem lepore experti adfirmant.

Gal. Vim habet incidendi, vt gustus indicat. amariuscula enim est & subacris ipsa herba, id quod & particulatim edita ostendit actio: nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonem & thoracem & iecur expurgat abstergitque.

Plin. Faciles præstat vomitiones radix eius Ellebori modo quatuor drachmis eiusdem in passo aut mulso. Hyssopum tritum cum melle vtilius præsumpto Nasturtio aut Irione. Molemonium denarij pondere. Est & Psyllibus lacteus succus, qui densatus in Gummi sumitur cum melle supradicto pondere; præcipueque bilem trahit. Rursus sistunt vomitionem Cyminum sylvestre, Betonicæ farina ex aqua multa; plantago decocta caulium modo.

E floris colore { In Muttoni apud Neruios paradiso ditissimo, floribus candidis Betonicam legisse differentia. { memini; & in sylvis sæpius legit Carolus de Houchin D. de Longastre.

BETONICA aquatica Septentrionalium an CLY-  
MENUM Diosc. ? Galiopsis siue Scrophularia altera Dod.  
vernacula editionis. Clymenon Turneri. Sesamoides  
minus forte Solimano. Terpetaria D. I. Distij à Te-  
rebinthina dote simili. Ocimastum alterum Tragi:  
Belg. Bechscupm crupt. & S. Antuenis crupt.  
Aduers. 230.

SERRATVLA Aduers. 231.



Varietas. [ Huius quadruplo minorem speciem alebant Londini cruditissimus D. Thomas Pen-  
neus, & Muttonus Belga Turnaci.

Tragus. Semen tufum, melle mixtum, ac emplastri modo impositum fronti, fluxiones oculo-  
rum cohibet. Succus herbæ cum sulphure ac nitro temperatus, auribusque inditus, dolorem illa-  
rum finit.

Cly-



## CLYMENVUM.

Diosc. E fructe toto cum radice succus exprimitur: qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cæ- Eadem ferè  
 lacos rubros, saninarum profluvia refrigerando infrenat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Triasolia Plin.  
 aut siliqua recentibus vulneribus imposita, ea ad cicatricem perducunt.

SCROPHYLARIA maior. Aduers. 220.

Galiofis Fusch. Cordi & Dod. Germ. etiam sauwurtz  
 & gro; feigwart; enkraut. lege Belg. Spreen-  
 erupt & helmcrup, à galericulati flosculi. Ital.  
 Scrofolaria.

Нерисеадъ, нъпа Бордън, VERBENA Dioscor. Germ.  
 Eisenkraut, Eisenhart. Belg. Verbene, Isercrup,  
 & Iserbert. Gal. Verucine. Angl. Veruepne.  
 Ital. Verminacola, Berbera & Berbenaca.  
 Hisp. Verbena. Aduers. 231.



## VERBENA.

Diosc. Folia cum radice in vino pota, illitæ, aduersus serpentes pollut. eadem drachma pondere cum thuris  
 obolis tribus, in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. veteres tumo-  
 res & inflammationes mitigant. sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, consillarum crustas abrupit. oris no-  
 mas gargarizatu cohibet. Auiunt, si aqua spargatur trichmium, qua maduerit, latiores\* conuictus fieri. Datur po- \*Eadè Plin.  
 tandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus: quartani, quartum. Sacrum vo-  
 cant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendatur.

Gal. Vim habet adeò desiccantem, vt vulnera glutinet.  
 Aetius. Verbenaca recta ad capitis dolores summo præsidio esse testatur Archigenes, si ea coro-  
 netur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo, & illinatur, aut oleo decoquatur & foueatur caput.  
 Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque fluētes compefcit. Radicis decoctum calidum  
 ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisque vlceribus medetur. Ad colicos  
 radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato,  
 efficacissimum id esse experientia compertum est. facit & ad calculos atque ad inchoantem elephan-  
 tiasim si cū melle propinetur. vt re itidè ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaue febre laborātes.  
 Ad podagricos verò & coxendicū morbo affectos, vino decocta exhibetur.

Plin. lib. 26. cap. 7. Verbenaca verò omnibus visceribus medetur; lateribus, pulmonibus, ioci-  
 moribus; thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab ijs phthisis tentat.

Eadem Si-  
 meon Se-  
 thus.

Sacra

SACRA VERBENA Hispanica minor.  
an Diosc. Peristerion?  
Verbenaca supina Clusij.

SCABIOSA minor. Aduers. 232.



SACRA VERBENA minor.

Complures fundit caulículos, graciles, procumbentes, dodrantales & pedales in Belgij hortis. Ioannis Muloni, vbi à me primum visa; deinde Antuerpiæ P. Coldenbergij peritissimorum pharmacopæorum, stirpiumque exploratorum. vulgatæ Verbenæ facie haud ita dispari, sed altioribus laeinijs incisurifus; flosculis item similibus. cætera tota minor: multoque minora folia & flores. Hispano semine ex agro Salamanticensi Belgij inquilina facta C. Clusij opera. vbi quotannis rediuiuo semine iterum repullulat sponte in prædictis hortis.

APVL. Ad strumas: Verbenacæ radix in collo ligata, summè proficit. vlcera & parotidas Verbenaca tusa & imposita, mirificè sanat. Ad eos qui induratas venas habent, & cibos non recipiunt: herbæ Verbenacæ succum mixtum cum vino, melle & aqua; & postea coctum, des bibere, & statim sanat. Ad hepatis dolorem: herbæ Verbenacæ solutio lecta, & in puluerem redacta, & potui sumpta, mirè proficere creditur: robusto autem cochlearia quinque ex vino quàm optimo cyathis tribus, & cæteris pro cuiusque viribus sic dabis. Ad calculosos: radix contusa ex mullo optimo tepido data, incredibiliter calculosis succurrit: nec solum ipsis calculosis, sed & quicquid est quod vrinam impedit, celeriter educit. Herbæ verbenacæ corona facta & capiti imposita, dolorem capitis tollit. Ad morsum rabidi canis & hydrophobon: herbam Verbenacam in vulnus apponito, tritici quoque grana integra indito vulnere donec humore remollita expleant: iam tumida, proiecto illa gallinæ; si non appetit, simili modo alia grana proiecto; si sic esse cæperit, periculi sublato signum erit. Ad vulnera recentia: herbæ contrita cum butyro vulnere imponatur. Ad morsum serpentis: herbæ Verbenacæ ramuli ex vino decocti & contriti, si cæca erit plaga cum tumore, impositi adaperiunt primam, exulcerant deinde, postea crudi cum melle contriti & vlceri inserti donec ad sanitatem, quod celeriter fit, perducant, imponuntur. Ad ictericos: herbæ Verbenacæ drachma vna & nardi oboli tres, lac cæ crudæ foliorum expressus succus & paululum myrrhæ contritæ ex aqua cyathis tribus potui data, expellere morbum creditur.

SCABIOSA minor. Aduers. 232.

Tineam abluunt lixiuio in quo maduerit aut decocta fuerit Scabiosa. Succo vitur Tragus.



Montana SCABIOSA calidatum regionum.  
Aduers. pag. 233.



SCABIOSA maior satorum. Hisp. Scabiosa.  
Aduers. pag. 232.

Ad eadem quæ superior efficacissima; cordi,  
hepati & visceribus peramica; ut cuius succi epo-  
ti ternum & quaternum vnciarum pondere cum  
Methridatij, aut Theriacis ℥ ij. <sup>ss</sup> sudorem mouē-  
do febres exitiales & pestifera etiam abiguntur.  
Omnes cutis fæditates, illius, abstergit.

legeleniusq.

SCABIOSA media flore globularia.  
Aphyllantis genus quorundam.  
Albis floribus variat agro Leuanienfi.


legge flores al-  
bos non pur-  
pureos Sca-  
biosæ.



SCABIOXA  
maior Hi-  
panica.



IACCA ni-  
gra vulga-  
rior.





*SCABIOSA maior Hispanica floribus albis: Aduers. 223.*

Passim huius semen reperitur & aduehitur ex Hispania in Belgium vna cum vna passa Damasce-  
na. ibidem loci aestiua est. apud Salmanticenses vinetis, & marginibus agrorum familiaris.

*SCABIOSA PEREGRINA.*

Neutiquam posthabenda & hæc raræ & peregrinæ elegantia Scabiosa, nullidum hætenus literis  
prodita: infrequens enim est, nec nisi horti longè amantissimi rarissq; stirpibus ditissimi claris, & do-  
ctiss. viri D. Ioannis Boisor inquilinam factam vidimus, cuius beneuolentia eam florentem cum sur-  
culis legimus, quos iam enatos habemus in horto Guil. Driesch peritissimi & fidissimi pharmacopœi  
Antuerpiani; facie & virgultis Valerianæ Rubræ vocatæ; sed floribus & semine Scabiosæ Hispanicæ.

*SCABIOSA aestiua minor.*

Folio laciniato Scabiosæ aut Erucæ; flore cæruleo vulgaris Scabiosæ, spirillis longiusculis virentibus  
sequiuncialibus, rosarum gratia stellæ modo radiato. Semē membranis inuolutis argutis implicatur  
Scabiosæ maioris Hispanicæ ritu. Vnde hæc apud nos oritur rediituo singulis annis semine. Muto-  
nus noster primus hanc necum communicauit.

*LACEA nigra vulgaris. Hyofiris Plin. Anguillara. Aduers. 234.*

*Mediam Diosc. Muto. folio Seridis sylvestris, flore purpureo rotundo, semine cnicī  
minuto; radice dodrantali, crassitudine baculi, gustu acerbo.*

Gargarizata oris, faucium, laryngum vlcera, & quæuis vitia emendar: apostematibus & vulneribus  
luciat medetur.

*LACEAE maioris folio multum laciniatosi varietas. Aduers. 234.*

Num Cynoides flos Dod. eadem? an non potius congener?

Nonnunquam Mechliniz in hortis floribus albis & capitulis spinosis visitur.

*LACEA MONTANA Narbonensis.*

*STORBE Salamantica maior Brancionis. Storbe Salaman-  
tica prior Clusij, vulgò Cabecuela, i. capitulum.*



## IACEA MONTANA Narbonensis.

Hanc nouam subdere visum fuit, propter nonnullam inter se similitudinem. Cautibus & collibus Castri noui conterminis MonsPELLIENSIS agri nonnullquam à me reperta. Cauliculo riget dodrantali & pedem alto, rotundo, folia laceæ luræ & Chamæleonis læuis Theoph. media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta. flores laceæ aut Cirsij, sed minores. radix sesquipalmaris, gracilis, minutique fibrata, gustu cyaneo amaricat.

## STOEBE Salamantica maior.

Ima folia Scabiosæ Hispanicæ & Sequanorum Cirsij media habet. Radix oblôga nonnihil fibrosa. E cubitalibus & duorum pedum caulibus in longioribus petiolis & squammoso capitulo flos Cyani purpureus. Semen Cnici sed minus. vniuersa planta gustanti peramara, præficcâ, adstringens.

## STOEBE argentea SALAMANTICA minor.

Stoebe Salamantica altera Clusij.

## Pusilla incana IACEA, altera folio Olea.

PTARMICAE species.



Folio minutius diuiso Cyani minimi sparteis viticulis MonsPELLIACI descripti æmula, Hispano semine in D. Brancionis vireto inquilina facta; vbi tamen strigosior tota. Flos purpureus & semen Cyaneo non absimilia in confertis argenteis squamosis Ocimoidis paræ capitulis. Caulis cubitalis & sesquicubitalis, multis alis diuisus. Salamanticensis agri marginibus gaudent.

Huius generis secunda Stœbe Clusij est Cyanus noster minimus, viticulis sparteis, perpusillis colliculis; qui humenti solo Belgico longè maior conspicitur.

## STOEBE ARGENTEA incana Aldroandi.

Varietas.

Et aliam vidimus Stœben opera D. Hermetis le Clerc medici Neruiensis doctissimi, etiam folijs & caule argenteæ Stœbes, sed delicatioribus virgultis, & folijs tomento crasso incanis.

## STOEBE Aduers. pag. 41.

Diosc. Stœbe vulgaris notitia, cuius semen & folia † stringunt: propter decoctum dysentericis infunditur. \* dyte  
†\* sine acri- auribus quoque purulentis instillatur. illa folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erupentis sanguinis imperis cohibet. cis. G.  
monia Gal. Aegin. Stœbes semen & folia adstrictoria facultate donata desiccant in tertio excessu. Qua ratione si illa  
Eadem ferè vulnera peringentia conglutinant, eorumque decoctum \* intestinorum torminibus, sanguinis vium h  
Gal. † eruptionibus & auribus purulentis auxiliatur. oculis ex ictu sanguinis suffusos illa iuuant. erum  
Pusilla suppe



*Puffillaincana IACEA altera folio Olea.*

Huius per omnia similis capitulis & floribus exotica Syriaca plantula: sed cauliculus minus diuifus Incana Iacea altera Aduerf. 235. est Prarmica vulgaris Herbariorum. palmaris & fefquipalmaris: folia maiora, olea, magifq; incana, minimè ferrata. capitula item, habitio- ra, nitidis argenteis squamis, guftu infipido, minimè amaro.

PTARMICA AVSTRIACA.

*Prarmica Matth.*



MORSVS Diaboli.

*Aduerf. 235.*



Ptarmicæ vulgaris cognata est illa peregrinæ venustatis Austriacæ Ptarmica Herbarijs nostris vocata, qui eam in hortis alunt propter elegantis effigiatæ floris gratiam, similinæ & concoloris Sesamoïdi parua, sed aspectu hilarioris, è capitulis squamulis lucidis argenteis compactis, sibi imbricatis, incumbentibus. Folia Olea incana; coliculi fefquipedales. radix, & cætera non abfimilia. Huius femè in Belgijum Vienna Austriæ hoc anno ad amicos misit Clufius nofter, vnde miræ venustatis planta feliciter adoleuit.

MORSVS Diaboli.

Omnes easdem dotes quas Scabiofis referunt. Sanguinem ictu concretum diffoluit Dod.

CYANVS vulgaris Aduerf. 236.

*Baptisfeyula Tragi.*

Vulgo Baptisofere pro Blatisofere, id est Segetum Seris: nunc fci Condriille species aut. Cyanus? Blatum enim sine Bladum barbaris idem est cum Gallorum bled, id est, tritico.

Condriillis & Scabiofis congenerem, affinesq; facultates & temperiem Cyano inesse crediderunt atani nostri; eoque non tanta infelicitate Syrupus è Cichori, Guilielmi Placentini ad æstus viscerum & iecoris immiscere soliti: qua vi refrigerandi, nonnihil; repellendi inflammationibus oculorum prodest. Afringendo, siccandoq; plantaginis ritu refrigerant. Contagiosis febribus, ruptis, vulfisq; auxiliatur.

CYANVS

CYANVS  
vulgans. Ad-  
uerf. 236.



CYANVS  
pe' amarus.  
fup'ius capi-  
tuli squaro-  
fis Sesamoi-  
dis parui.  
pag. 236.



C  
ma  
uer  
Ver  
Tra

CYAN  
repen

Super  
non a  
lis ted  
ribus  
foliol  
candic  
bus ca  
argen  
toris.



SESAMOIDES parva Diosc. Aduers. 2. 7. Condrilla species Dodonao, cuius tamen semen in capitulis  
Sesamo & Phalaridi propius est, ut vult Diosc.

DIOSC. Semen Sesame, solum, amarum. Detrahit bilem pituitasq; ex aqua mulsa potum dianidio acetabu-  
lo. Illud ex aqua, tumores ac tubercula discutit.

TRAGOPOGON. Germ. Worbart. Belg. Worbart  
& Josephs blommen. Hisp. Barba cabruna & Bar-  
ba de cabron. Gal. Barbe de bouc. Angl.  
Buckes beard.

TRAGOPOGON luteum.



Quod flores in pappos barbulas imitantes abeant, Barba hirci vocata; quo etiam nomine hodie of-  
ficinis notissima. Cyanis, Condrillis aut sesamoidis minori reddenda, quibus figura & facultatibus  
haud ita absimilis. Folia phalangij, Sesamoidis parvæ longiora habet ab vna radice Dentis Leonis. Æ-  
statis initio flores lutei, alias obsoletè purpurascens Dentis Leonis aut Sesamoidis parvæ summo cu-  
bitali & sesquicubitali caule in papposam cæsariam dehiscens. Calidarum & frigidarum regionum  
pratis gaudet. In hortos translata speciosa floris sætura variat. Lacteo succo turget, quem dum vul-  
neratur fundit.

DIOSC. Edendo est & cruda & cocta. ] tenella à nostris holitoribus acetarijs miscetur.

Facultatibus Condrillis adstipulatur. lancinationibus æstuantibus, iccori, stomacho, renibus & tho-  
raci auxilio est.

TRAGOPOGON paruum flore Condrilla purpureo carulea.

Spithamea pusilla planta nulla sui parte à Tragopogis diffidet. Flos Condrillæ ex luteo tantillū pur-  
purascit, folia graminea palmum longa. In Heurura & agro Romano obuia.

p

SCOR-

SCORSONERA, *Viperaria*.  
Hisp. Scorfonero.

Tragopogis congeneres plantas Itali & Hispani Scorfoneram vocant, quarum alteram mihi primus ostendit præceptor Affatus Monspeliensis cis lacum è regione môtis Ceti Frontignanæ inter maritimas syl. Irides, folijs Tragopogi latoribus, rigidis, carnosiss. Caulis pedem & sesquipedem altus. semine & flore luteolo: cuiusmodi Tragopogis crassiore radice. Gallis, Belgis & Anglis Hispano semine propagatur.

*Varietas.* Bohemicam ab hac variam facit Matthiolum.

Scorzonera humilis nuperrimè semen misit Vienna Clusius; cuius flos rubet aut purpurascit ni labat memoria.

Alia angustioribus folijs alitur in hortis nostris.

Pota fertur viperarum moribus mederi, venenis & pesti præstantissimū antipharicum. Cardialgias, epilepsias, vertiginem, & melancholiā, radix assumpta iuvat. Succus lacteus Glaucij, vel Dentis leonis modo, oculorum medicamentis commodè miscetur.

CHRYSANTHEMVM. CALTHA *Poetarum*.  
fortè Gröphena Plin. Gallis Souly, Gallobelgis Goudé, detorto vocabulo Flandria Goudt. i. aurum & aureum à colore. Aduers. 237.



CHRYSANTHEMVM  
segetum.





CHRYSANthemVM segetum folio multifido. Germ. Gensblum. Belg. Geel gansse bloemen & bokelaer. Aduers. pag. 237.

perperam quorundam Bellis lutea.

Varietas. ] In segetibus Gallobelgij folijs minus laciniatis conspicitur.

CALTHA Poetarum sive Chrysanthemum Dioscoridis.

Diosc. Caudex o'eri modo eduntur, flores cum cerato triti, steatomata discutere dicuntur. Ipsa herba posita in balneis post exitum de folio, regio morbo correptis, breui bonum colorem inducit.

Suillatius liquor, non secus ac Cardui benedicti & Scabiosæ ad pestiferos morbos bibitur. Cordi-  
amica. lege Buphtalum. 243. & 345. lege multifido, & Bellidis.

SALVIA maior. Aduers. pag. 239.

SALVIA minor pinnata. Aduers. 240.



Varietas. Luteolis folijs in Belgarum hortis variat.

res. Nonnūquā & Spicæ lauedulæ folijs vifitur cōcoloribus, fed latioribus, & grauioris odoris.

Diosc. Foliorum ramorumque decoctum potum vrinam cit, menses fatisque extrahit. Pastinaca marina iſti-  
bus auxiliatur. capillos denigrat. vulneribus † herba vtilis eſt, ſanguinemq; compoſcit. Ferina tetrag, vlcera purgat.

Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum, cum vino, ſi eo abluantur, ſedat. Caſſacit, \* adſtringit, ſiccit.

Eadem ferè Plin. † vulnera glutinat ſiccando. \* Eadem Gal.



HORMINVM. Aduers pag. 240.

Diosc. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. purgat cum melle argemas albuginisq. illitum ex aqua tumores discutit. eo etiam extrahuntur aculei ex corpore, idem effectus est illita herba. Sylvestre magis viribus pollet, quare vnguentu, praesertim gleucino, permiscetur.

SCARLEA; an Alethero'ophos Plin.?  
Herba S. Ioannis vulgi.  
Aduers. 240.

Sylvestre  
HORMI-  
NVM.  
Aduers. 240.







VERBASCUM  
Sylvestre,  
folijs Salviae  
tenuifoliae.



Phloxes;  
Lychnis.



[Huius effigie in descriptione præced. male in loci Phlomis lychnitis irrepsit, & e contra: quas respondet.]

VERBASCUM Stylis: Tre folijs Salvia tenuifolia cum flore, an PHLOMOS. Dioscoridis? Hisp. Candulera.

Flores Aduers. pag. 241. quia emarcuerant pictor minus animaduertit & omisit. Non modo Norbonensis planta, sed Hispania, Syria, & Ilyria indigena.

PHLOMOS Lychnitis altera Syriaca.

Etiam hanc nouam plantam nec minus speciosam hisce interficere visum fuit. à superiore dissidet florum ortu & modo: sunt enim Lychnidis syl. vel Chalcedonica, coloris flauo, folijs item angustis & virgulis quadratis tomento crasso incanis, & radice lignea.

VERBASCUM syl. Saluifolium exoticum.\*

VERBASCUM Saluifolium fruticosum luteo flore. Verbasum 4<sup>m</sup>. Matth. Aduers. 241.



\*Hæc folijs rotundioribus, candidioribus, densioribusq; minus tamen lanugine canis, sed Salviae æmula concretionem; alioquin lignosa fibrataq; radice, caule & facie non ita dissimilis: iisdem gaudet Syriæ natalijs, quibus superior. flores videre non contigit, quia marcidi.

VERBASCUM Saluifolium fruticosum.

Varietas. Quod Syria mittit, folio est carnosiore, rigidior, latiore & hirsutior.

VERBASCUM nigrum Saluifolium. Salvia syl. Tragi adulterina. Aduers. 241.

VERBASCUM nigrum Saluifolium purpureo flore. 3<sup>m</sup>. Matthioli. Aduers. pag. 241.

VERBASCUM syl. Saluiflorum laciniatum. Verbasum aliud Matth. Aduers. 242.

VER-



*Aduersf. pag. 242. lin. 1<sup>a</sup>. inscribe*

VERBASCUM purpureum Erucifolium; & deme Sylvestre Saluifolium fruticosum, lignosum.

VERBASCUM Mas & Candela regia.

*Hisp. Gordolobo. Anglietiam Moller &*

*mullen. Aduersf. 242.*

*Ital. Tasso barbasso.*

VERBASCUM Femina.

*Aduersf. 242.*



Diosc. Radix priorum ducum adstringit, quare quod magnitudine ludicrum talum aequet, in alui profluvio, *lege phlegma.* conuenienter ex vino datur. decoctum rupis, conuulsis, fractis, antiqua tussi, auxiliatur. Dentium dolorem \* collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit. & quocunque abijciatur, blattas \* in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur. cum aceto quocunque vulneribus medentur. contra † scorpionum ictus, sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aunt in folijs eius, quam saminam dicimus, aridos ficos omnino non putrescere.

\* Gal. eadem. folia tamen digerendi vim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius quæ aureos flores obtinet.

† idem Plin. cum Ruta radix bibitur.

\*\* BLATTARIA. { VERBASCUM femina floribus albis, & caule summo alis multifido, nū sit Blattaria Pliniana? Hoc enim mirè capiuntur & in eo videntur Blattariae. *Mutonius.*

*Varieras.* Floribus luteis duntaxat ab hoc diuersum visitur.

Radix eius perennat in Brabantia, vbi Blattaria vulgaris.

Oleum è florum Verbasci multiplici infusione efficacissimum est ad sedandos arthritidis hæmorrhoidarumque sæuos cruciatus.

*Adstringit.*

*Adstringis.* ] Gal. radix acerba est, & fluxionis affectibus prodest.

*Dentium dolorem.* ] Plin. tonsillis ex aqua potum medetur.

*Antiqua tussis.* ] Plin. contra pectoris vitia & purulenta excreantibus tanta huic vis est, ut iumentis etiam non tussientibus modò, sed ilia trahentibus auxilietur potus. Panos sanat cum sua radice tussum, vino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen in vino decoctum & contritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollens. Radicis medulla collyrij tenuitate in fistulam additur. Contusis, eversis, & si febris sit, potatur in aqua verbasum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in struma. Semine ac folijs decoctis in vino ac tritis omnia corpori infixâ\*extrahuntur.

*Infixa.* ] eoque equorum ungulis ex clauo inter calceandum profundius ac par erat adactò vulneratis, recenti oribus & Matthiolo commendatur.

**ÆTHIOPIS.** *Aduers.* pag. 242.

**BLATTARIA.** *Aduers.* pag. 243. *Verbasum leptophyllum* Cordi. Germ. *Goltknopfflin.* vulgaris *Blattaria* annua planta est, folio quercus instar laciniata. Cærulea perennat, folio nigriore minusque serrato, quemadmodum & *Phanicea*.



**ÆTHIOPIS.**


**Diosc.** Auxiliatur purulentis excretionibus, ischiadici, pleuritici, arteria scabruis, decocta radix & pota. quin & cum melle, eclegmatis vicem prabet.

*Varietas.* Latiore folio in hortis Belgij conspicua differentia cernitur.



## PRIMVLÆ Verifloræ, an antiquorum PHLOMIDES?

PRIMVLÆ  
pratensis.  
Aduers. pag. 243.  
copiosis umbella-  
tis floribus odora-  
tis.  
Angl. Primroa-  
sen.



PRIMVLÆ  
hortensis Ang-  
lica omnium  
maxima, &  
fecunda flo-  
ribus plenis.  
Aduers. 244.



Sylvarum  
PRIMVLÆ.  
Aduers. 244.  
Angl. Cotie-  
Oppe.

*Sylvaticum PRIMVLA floribus obscure  
virentibus fimbriatis.  
Aduers. 244.*

*Paralytica Alpina SANICVLA sine AVRICVLA  
VRSI lutea. Aduers. 244.  
Lunaria Arthritica Gesneri; Britannica Anguillara.*



**PRIMVLE varii: VERBASCVLA Fuchsis.**

Radicis decocto vesicæ renumque obstructions solvuntur Fuchsis. Ius herbæ propinatur & illinitur aduersus rupra, luxata & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt, si gustaueris; amara & modicè acrisunt: vt hoc nomine desiccandi, & detergendi facultatem habere, nemo dubitare debeat. Et mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quòd maculas, rugasque & alia eiusdem vitia mirificè detergeant.

*Paralytica Alpina.*

Ad enterocelas, thoracisque vulnera commendatur Matthiolo.



*Alpina SANICVLÆ*  
*lutea* sive *Primula va-*  
*rietates.*

Quemadmodū *Primula* veris occasione loci & soli in Anglia folia & flores coloratiores, maiores & minores, sic in montibus arduis calidarum regionum cauliculos & folia emittit maiora Auricula vrsina dicta: & interdum longè minora; specie tamen aut natura minimè diuersa.

*Varie-* { Luteo pallentis itidem *Sanicula* eadem est ratio, puta maioris & minoris.  
*tas.* { Hæ omnes aluntur in horro generosi viri D. Ioannis Dilsi materię Medicę peritissimi & a-  
 mantissimi.

*Paralytica Alpina SANICVLÆ angustifolia*  
 maior floribus rubore & candore confusis.  
*Primula veris florib. rubris.\**

*SANICVLÆ Alpina minor, sive media.*




\* Qui maiore *Paralytica* *Saniculam* tantillum fimbriatis folijs Aduers. pag. 244. memoratã videt, has mox subdendas non potest non nosse. Hæc quæ maior, folia *Gnaphalij montani* longiora promit. flores multiplici fatu umbellæ instar in pedibus & dodrantalibus mollioribus pediculis purpurantes aut ex roseo & albo confusis micantes, visumq; oblectâtes. Vienna Austria à Clusio nostro D. Brancioni transmissa.

*Sanicula Alpina minor.*

Media folio est minore tantillum crenato: floribus non disparibus in cauliculo palmari & dodrantali. Radix multum fibrata.

SANICULA *Alpina minima.*

Omnia minima vix vnciam & sesquiunciam æquat; folijs item car-  
nolis, sedifolij Cotyledonis minoribus, summis oris fimbriatis & dēcula-  
tis. Flos purpureus.

DIGITALIS *purpurea.*  
Aduers. pag. 245.\*BACCHARIS *Montbellienfum.* Aduers. 245.  
*perperam Conyza maior* Matth. & Dod. *Conyza Helenis* Cordi.

\*Sommerfeti Angliæ rustica turba huius decocto febricantibus purgationes & interdum super-  
purgationes & vomitiones humidioribus aluo, molitur, Amarore abstergit pituitosa, biliosa purgat,  
obstructiones referando.

*Varietates.* { Nihil prorsum dissimilem caule, folijs & semine; duntaxat candido flore diuersam, alunt  
amicorum horti in Belgio.  
Sed quæ giluo flore, aliàs ferrugineo, angustiore calathos spectatur, folia prouit Gentia-  
næ cruciatæ maiora, iisdem viretis atrouirentia.

Varia hæc cōspicitur Louanij floribus suauiter rubentibus pallore & rubore confusis in viridario amē-  
nissimo D. Ioannis de Limoges, aliàs Nonnij.



## BACCCHARIS Monspellensium.

Diosc. Radix in aqua decocta ruptis, vulvis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris; item diuturna rufi & vrina difficili. menses pellit: contra serpentium morsus vtiq; datur in vino. recens radix apposta, partum extrahit. puerperis eius decoctum in defensionibus prodest. in diapsmata vtiliter inferitur, iucundi odoris gratia. folia, ut pote quæ astringant, capitis doloribus illitus profunt. oculorum inflammationibus, manuum tumentibus à partu, ægilops incipientibus, ignibusq; sacris auxiliatur. odor somnum gignit.

HELENIVM. Hisp. Raiz del alla. Aduers. 246.  
Panax Chironium Anguillara.

BYGLOSSVM latifolium sive BORRAGO.  
Aduers. 246. Perperam Lycopsis Anguillara.



Diosc. Radicis Helenij decoctum potum, urinam & menses ducit. Iosa deniq; in eclegmate cum melle sumpta, rufi, orthopneæ, rupturis, conuulsionibus, inflammationibus, \* venenatorum morsibus prodest, calefaciendi vi quam in v-  
muer san habet. folia eius in vino cocta, ischiadicis vtiliter illinuntur. Radix etiam Helenij in passo condita, stom-  
acho vtilis est. Siquidem salgamarij paululum secatam eam, mox decoctum, frigida aqua demergunt, postremo in  
defrutum coniectam ad vsum recondunt. Eatriia & pota sanguinem excreantibus auxiliatur.

\*Eadem  
Pha.

Gal. Rubrificant radice ea partes frigidis & diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum piffiones, ischiadas vocant, & exiguæ assiduæque quorundam articulorum præ humiditate luxationes.

Herba trita ex vino pota mirificè morsus viperæ sanat Apuleio, & venenum discutit.

Plin. subdit. Radicis succus decoctæ tineas pellit & lumbricos.  
Radix recens & succo adhuc madida farctui pulmonum vtilissima, & efficacissima, eadem quæ in Eryfino diximus, ratione, abstergit enim, concoquit, & incidit.

*BVGLOSSVM latifolium sine BORRAGO.*

Diosc. In vinum delectum animi voluptates auget.

*BVGLOSSVM angustifolium.* Aduers. 246.  
*Cirsium Italicum* Fuchs. Germ. Welch Chylenzung.

*Echysfacie BVGLOSSVM minimum flore rubente.*



*BVGLOSSI vulgaris varietas.*

{ Altera folio habitiore, flore caeruleo, rarius albo.  
Altera strigosior, folio angusto, flore purpureo rubello. } *hortenses.*

*BVGLOSSVM minimum.*

Belgis hortense est; radice & folijs angustifolij Buglossi, sed exiliotibus Echij paribus. Flos ex rubello violaceo nitet. Semen Buglossi haud absumile. Saporis, odoris & vltus non disparis.



*SYMPHYTUM pumilum repens Borriginis facie.*

*BORRAGO minima herbariorum.*

Speciosam hanc plantam alit illustriss. Princeps de Chymay D. Carolus de Croy, ceteriq; peritiores stirpium exploratores Belgij; folijs Borriginis aut Pulmonarie minoribus: floculis item cæculoputpureis borraginis; sed radix pulla Vimaræ aut Caryophyllatæ fibris implexa. Floret hyeme in pensilibus hortis: Vere etiamq; Augusto in hortis. Gustanti cum mucositate nonnullam acrimoniam exhibet, quod Borragini aut Buglossò negatum est. Quamnam sit hæc antiquis, adhuc ignoramus.

*BUGLOSSI peregrini radice multifida varietas.*

*Advers. 247.*

Eandem aut per similem videndi copiam fecit Ioannes Muttonus perbonus & industrius Nervienensis pharmacopœus, in suo stirpium ditissimo & amantissimo paradiso; eius tamen folia confersa novis Pulmonariæ ritu erant: flores necdum videre licuit.

*ANCHUSA. Hisp. Ancusa.*

*Advers. pag. 247. 248.*

*Diosc.* Radix manus inficit sanguineo colore. late solo nascitur. Radix adstringit. ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est. igni sacro cum polenta medetur. lepro & vitiliginibus illinitur ex aceto. parvis extrahit, vulne indita. eius decoctum venum vitij, lioni, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Si sunt alium folia in vino pota. Radice pigmentarii vinctur ad vnguentorum spissamenta.

#### ALCIBIADION.

*Diosc.* Est & altera, quam aliqui Alcibiadion, aut Onochiles appellant. hæc à priorè distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in panicum vergentem: radices rubras, oblongas, quæ mesibus sanguineum succum fundunt. in subulosis nascitur. vis ei solisque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maximè viperarum, auxilietur, siue cibo siue potu, siue alligatu. nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit.

Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuat, eam interficiet. radix acetabuli mensura cū hyssopo † & nasturtio pota, latus ventris vineas exurit. † Eadem Gal.

Gal. Anchusæ quadruplex species est. Quarum Onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantē & desiccantē, tū adstringentē, & subamarā, tū quæ sufficiat extenuandis & extergendis humoribus biliosis, corporibusq; condensandis. Ceterum folia habet imbecilliora quidem radice; adstringūt tamen & ipsa & desiccant.

Porro *LYCOPPOS* cognominata refrigerat & desiccet, magisq; quā *ONOCLEA* adstringit. At *ONOCLEOS* calidior est, & magis medicata. Nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimonie. Hac verò etiam calidior est parua, quæ est amarior, & magis etiam medicata est.

Anchusæ nō omnes easdē vires obtinēt: Nam Onoclea quā vocāt, radicem simul habet adstringentem & subamarā, corporibus condensandis & modicè extenuandis idoneā; tū abstergēdis quoq; & abluēdis biliosis & salis fucis. Dictū enim supra est quo qualitas acerbā mista amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurugini & lienosis vrilis est. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polenta illita iuuat erysipelata: & abstergit non modò epota, sed & foris impolita. Proinde vitiligines & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidē hæc opera sunt & operum facultates quas diximus. At folia ipsius herpæ, radice quidem sunt imbecilliora; non tamen aliena sunt à resiccatione & adstrictione. Itaq; etiam profluuium sanāt pota cum vino. Et quæ *LYCOPPOS* nominatur, eodē modo erysipelatis congruit, & radicem habet quā Onoclea magis adstringentem. At *ONOCLEA* & *ALCIBIADII* cognominatæ vis magis est medicata: Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis morsū sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esā. Reliqua verò, nempe quarta, quæ parua est, & ferè nomine caret, ex illis sola Alcibiadio quidē per similes est, verū & amarior & magis medicamentosa; ac proinde ad latus lumbricos idonea oxybaphi mensura cū Hyssopo & Nasturtio epota.

AN-



*Varietas.* Anchusam latifoliam Buglosso angustifolio, parem, radice cruento inficiente & flore albo habuit Muttonus noster.

*ANCHUSA lutea minima.*

Ethanc Monspelliensis ager spontè dat, sed rariùs multo. Floribus luteis in pusillis pediculis in se conuolutis Echij ritu caudam Scorpionis aliquantum æmulantibus; cuiusmodi scitè meminit fidus testis doctus & industrius pharmacopœus Franciscus Penninus Antuerpianus.

*LYCOPSIIS altera Anglica.*

*Aduers. pag. 249.*

*Perperam Cynoglossum Matthiolo.*

*ECHIUM floribus purpurantibus rubellis.*

*Aduers. pag. 249.*



*Diosc.* Radice rubra & adstringente. Cum oleo illita vulneribus medetur; & cum farina hordeacea ignibus sacris, sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

*ECHIUM.*

*Diosc.* Radix non modò à serpentibus percussis ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, fieri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Luniborum dolores sedat. in vino aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

*ONOSMA. Aduers. pag. 249.*

*Diosc.* Folia in vino pota partus extrahunt: prægnans si eam supergreditur, abortum facere dicitur.

CYNO-



CYNOGLOSSVM *Vulgare sine flore.**Lycopsis Lacuna. Adversf. 250.*CYNOGLOSSVM *vulgare cum flore. Angl. etiam**Dogges tongue. Ital. Cinoglossa. Adversf. 250.*lege axungia.  
lib. 33.CYNOGLOSSVM *maximum.**Varietas.* [Folijis, floribus, semine, omnique sui parte duplo maius occurrit in hortis Belgicis.]*Diosc.* Folia cum suillo adipe veteri, medetur moribus canum, alopecijis, & ambustis. Emollit aluum decoctum herba ex vino potum. Subdita pessio hemorrhoidas sanare fertur.CIRSII *varietates.*

In Belgarum amicorum hortis Cirsij plures è folijs & capitulis conspiciuntur differentiae, præter genera dudum memorata. vni caules quaternum & quinum cubitorum, foliaq; incana Buglossio hortensi angustifolio altero tanto maiora & longiora, oris & ambitu laciniosis & spinosa. Flos purpureus, alterius Cirsij, singulæ cymæ singulus, papposus in duplo maiore squamulis loricato capitulo, minus spinulis horrido.

Quarto caules cubitum & sesquicubitum æquant, spinulis delicatioribus serrata folia, & echinata capitula duplo minor.


Minus adhuc alterum compactis item squamulis echinatis rotundis capitulis, staminibus purpureorum florum refertis; laciniata spinulisq; horrida foliola. Instar teli pinnati aut alati sinuati & spinulis ornati cauliculi.

r

CIRSIVM

**CIRSIVM**  
Dioscor.  
Aduersl. 251.

**CIRSIVM**  
differentiæ  
Canaceis  
affines &  
con. eneres.  
Aduersl. 251.



**CIRSIVM**  
maius sin-  
gularibus  
capitulis.





## CIRSIVM Anglicum.

Videtur hoc Spinam albam adumbrare, spithameo caule, & folijs Cirsij, cui refertur commodè potest flos singularis Cardui bulbosi. Radix Bellidis aut Hellebori nigri modo fibrosa. Provenit in pratis C. viri D. Nicolai Pointz equitis præfecturæ Glostrienfis in villa vernaculè Acton nomine: Gustu adstringente, præficcò, moderatè calido,

Diosc. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

SYMPHYTUM Alun. seu Alus. Offic. Consolidamaior.  
Germ. Walswurtz, Schwarzwurtz, Schantwurtz,  
Schmiedwurtz, Belg. Watwortel. Aduers. 251.

SYMPHYTUM tuberosum.



Diosc. Radices trita & pota cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia vulnera illita conglutinant. Carnes quoq; si coquantur, vna coquunt. Inflammationibus sedis potissimum, cum Senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Gal. Symphytum magnum similem Petraeo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neque odorantibus odoratum apparet, sed ijs sanè ab illo diuersum. Cæterum quatenus viscositatem quan-  
dam & mordacitatem obtinet, Scillæ simile est. Vtitur eo ad omnia quæ Petraeo.

Subdit Plin. Ossibus quoque fractis medetur.

leg. perappo-  
sitè & im. 40.  
Symphytū.

SYMPHYTVM *tuberosum*.

A superioribus non ita diuersum ortu & facie, sed speciosius quod ex Italia delatum in D. Ioannis Brancionis amicorumque viretis in Belgio vultur sola tuberosa radice diffidens; floribus ex luteo pal-  
lentibus, caule item & folijs non disparibus, vulgare Symphytum æmulantibus.

*Indorum sana* SANCTA, *sive* NICOTIANA Gallorum, *Petum Clusij & Recentiorum.*

*Hyoscyamus Peruvianus* Dod. *Aduers.* 252.

Gustu mordet & feruet in ore: calida & sicca ordine secundo intenso, minimè frigida, stupefaciēs, vt vult Dod. tenuium partium, quemadmodum aliqua calida sunt & crassarum partium, vel frigida tenuium partium, frigida lenta, vel crassa. Quæ verò λεπτομερής sunt, citissimè exerūtur: vel calfaciēdo vel refrigerādo, soluēdo aut adstringendo: quia sine negotio altius vis eius permeat. Ideoq; calidiora quàm sunt, vulgò creduntur. Hoc in alumine satis cōspicuum, quod stipticum à facultate adstrictoria dicitur, quæ in terrea substantia consistere videtur. Illud tamen scissile, vulgò [*Depluma*] vocatū, effi-  
caciū ob partium tenuitatem habetur. Secundum locum sibi vendicat στρογγύλον *sive* rotundum, vel Saccharinum. Hæc tria adstringunt. Porro quibus naturā aptior adstrictio est, potentius adstringunt. Quæ tamen tenuitate partium, substantia minus conueniente, minorique adstrictione, quia citius id efficiunt, vel etiam quia abditissimas quasvis corporis partes permeant, tanquam validiora habentur & preferuntur. Ideo à quibusdam, qui gustu calorem sentiuntur, & explorant, calidissima, aut frigidissima dicuntur. Nicotiana calida & sicca in secundo intenso ordine. Sed quia ob partium tenuitatem mordet linguam, calidior quibusdam credita.

Ad gangrenas, vlcera sordida, strumas, & quoslibet morbos doloresue abigendos, Panacis olim decantatissimæ more, succus hodie melle excipitur. Dentibus attrita folia copiosam pituitam alliciunt, cerebrum expurgant, in ventriculum illapsa & deglutita etiam famem & sitim sedare creditur. Dentium dolores mulcet, à frigido ortos. Syrupus è succo, vel Stillauitæ aqua cochlearis mensura asthma-  
ticis orthopnceisue medetur.

HERBA *sancta, sive* TABACVM *minus.*

*Sana Sancta, sive* TABACVM *minutum.*





HERBA *sancta*.

Quæ minor habetur, folia promit Hyoscyami lutei, mucronata, angustiora, pediculo inhærentia. Flores minores aliquantò, non abfimiles, saturiores, purpurantésue.

*Sana Sancta* sive TABACVM *minimum*.

Alia minima dodrantalis herba facie non diuerfa, eodem item feruido vrentique gustu. Flosculi Hyoscyami lutei multo minores ex flauo herbacei. Folia Doronici aut Plantaginis angustifoliae minora, & angustiora Pulmonariæ. Radix pusilla fibrata; qualem hoc autumno Mechliniæ in hortulo Ioannis de Vroede rizotomi nouissimi vidimus.

MACULOSA PULMONARIA. *Aduers. 252. 253.*

In horto Mutoni *variat floribus albis.*

## PULMONARIA Gallorum flore Hieracij.

*Auricula muris maior Tragi.*

PULMONARIA *alba exotica*.

Huc meritò & hæc inferenda figura cognatione, quam alebat Petrus Coldenbergius pharmaceutices & simplicium peritissimus. Foliis Britannicæ aut Alimatis humi prostratis. Floribus Solano proximis exilioribus, muscosis.

ARCTION Montanum. *Advers.* 253.  
LAPPA minor Galeni.

PERSONATA. *Advers.* pag. 253.



Montanum ARCTION.

In agro Sommerfeti Angliæ tribus à Bathonia miliaribus, secus ædes generosi viri D. Ioânis Coltes, in mōtosis & syluosis Lappæ minoris genus reperi folijs & caule gracilioribus subrus incanis; capitulis quadamtenus Lappæ maioris; sed mollicellis & multò delicatioribus, vt Cumini syluestris. Flos purpureus; caules cubitales & bicubitales, graciliores & molliores quàm Bardanæ. Radix longa, edendo apta, intus alba, vt Lappæ.

**Diosc.** Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si continueatur ore decoctum. ambusta peritionesq, fouentur eodem. bibitur ad coxendicum dolores & stranguriam, è vino.

**Gal.** Facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exsiccantis, [extergentisq;] tamen modicè. Quamobrem radix ac semen eius cocta cum vino quadamtenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta & chimetia non horum modo decoctum perfusum, sed & caules teneriores sanare possunt.

PER-



## PERSONATA.

**Diosc.** Radix drachma pondere cum pincis nucibus pota, sanguinem & purulentam excreantibus auxiliatur. Articulorum quoque dolores, qui ex membrorum fractionibus collisionibusque sunt, trita & illita sedat. Quinetiam folia vetustis ulceribus viriliter illinuntur.

**Gal.** Discutit simul & deficcatur, sed & astringit mediocriter; quomobrem folia eius veteribus ulceribus mederi possunt.

Radix & semina urinas & calculos eiciunt practificantium experimento.

**APVL.** Succus herbæ cum vino veteri in potionem datus omnes serpentium morsus mirificè sanat. vulnus etiam si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorum eius foueto: deinde ipsam cum nitro & axungia, cum aceto tere, & in panno inducito & imponito. Ad canum rabidorum morsus, radix cum modico sale trita imponitur morsui, & statim æger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, urinam prouocat, & vesicæ dolorem tollit. Pulvis seminis eius cum vino optimo per quadraginta dies datus, ischiadicos mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui & impolita, ambusta mirificè curant.

XANTHVM. *Advers. pag. 254.*

**Diosc.** Fructus ante collectus quàm perfectè siccetur, tunditur, & fictili vase reconditur. Flavos autem facit capillos, si acetabulum instar tepida aqua madescat; mox capus, nitro ante perfrictum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

**Gal.** Fructus discutiendi vim obtinet.

Tys.

TVSSILAGINIS flores, Angl. etiam Horfe houe.  
Ital. Vnghia cauallina. Hisp. Farfara & vngle  
caualluca. Aduerf. 254.

TVSSILAGINIS folia.  
Aduerf. 254.



TVSSILAGO.

An Chamæleuce Plinij, Farfanum & Farfrugum secus fluuios nascens folio Populi, sed ampliore? cuius radix imponitur carbonibus Cupressi: atque is nidor per infundibulum fūehitur in tussi veteri.

Diosc. Folia ex melle trita igni sacro & omnibus inflammationibus † illitu medentur. arida fumus per infundibulum bianiore raptus, hos sanat qui sicca tussi \* atque orthopnæa infestantur. pectoris vomicae rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiicit.

† Gal. propter aqueæ humiditatis admistionem, qua omnia virētia tenera, alia plus, alia minus participant: nam sicca folia acriora sunt, quàm vt inflammatione laborantibus partibus conueniant.

\* Eadem Plin. & Gal. est autem modicè acris, vt sine molestia noxæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere.




## TUSILAGO MONTANA MINIMA.



Se ipsa preedit radicem & foliorum indice, & quibus figura nihil, sed magnitudine tantum discerni videtur. Siquidem tusilagini nostrati facie proxima foliola in pediculis binum & ternum digitorum Soldonellæ alpinæ paria, similibusq; lateribus, pariterque aversa incana, tomentosa, & carnofa. Hanc cum rarissimis plantis Vienna Clusius misit in Belgium præclaro D. Brâconi, penes quem flores videre necdum licuit.

PETASITES. Ital. Cappellazi. Hisp. Sombrereta.  
Tusilago maior Matth.

PETASITES sine flore. Aduers. pag. 254.  
An Persoluta & Personata Plinij?



f CACA.

Diosc. *Contraphogedana*, & *vlcera* qua *cacoëthe* vocant, efficaciter idem.  
Idem Gal. & Aegin.

CACALIA. *Advers. pag. 255.*

Diosc. Radix † in vino madefacta, ut *tragacantha*, delinctu aut manducatu per se in sibus, febribus & arteria m' detur. Grana qua post excussum florem innascuntur, tria & cum cerato illita faciem erugant, & cutem extendunt.

† Gal. quia radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicè exsiccantem, essentiam grassam & emplasticam.

\* similiter ut *Glycyrrhiza* Gal.

SOLIS FLOS Peruvianus, sive SOL Indianus.

*Chrysanthemum Peruvianum* Dod.

*Lusitanicè Gigante à proceritate stirpis.*

SOLIS FLOS minor.



Solis peramānus flos, quos vnquam vidi, maximus, Chrysanthemi vel Chamæleonis albi aureo micant. fulgore, orbiculatus, discum pedalis & nonnunquam sesquipedalis latitudinis superat, speciosis quæ radiantibus luteis folijs ambitu circumcinctis. Caulem edit rectum quindecim, 18. & 20. pedes procerum Maluæ arboreæ. Folia perampla Cacaliæ, Bardanæ, Sydæ Theoph. maiora, carnosa, atro-virentia. Radix aliquantum tuberosa. Semen compressum ferulaceum. Multis hodie Belgij hortis in delitijs est; vbi tamen rarè maturitatem adipiscitur: quia serotina planta hyemis sæuitia emoritur. Huius vsus hactenus nullus.

SOLIS Flos minor.

Alter minor caule alis brachiato, folijs similibus, & florem minorem folijs in stellæ morem cingentibus.

CHELI-



CHELIDONIUM minus.  
Advers. 256.

CALTHA Palustris Gesneri & recentiorum. Caltha Virgilij  
Tragi. Tussilago altera Matth. Chelidonium minus palastre  
Cordi, & Dufij. Chamaleace Plin. Anguil. Germ. Mat-  
tenblumen. Geel wijs blumen. Advers. 256.



Diosc. Vis ei acris. & anemones modo, summam cutem exulcerat. psora & scabros vngues eximit. succus † Eadem Gal.  
radicibus expressus ad purgandum caput naribus insunditur. decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificè id  
præstat. & omnia pectoris vitia extrahit.

Gal. cum acrius sit maiore, illitum confestim cutem exulcerat vnguesq; scabros eijcit.

Idèd hæmorrhoidibus, strumis, exterdndique ficubus illinitur, sub cineribus cocta in folio ficul-  
neo aut Betæ.

#### NYPHÆA alba.

Diosc. Radix sicca cum vino pota cælicus, dysentericiq; auxiliatur: lienem absomit. Radix stomachi ac vesicæ  
doloribus illinitur. virilgines ex aqua emendat. imposita cum pice, alopecij medetur. eadem contra Veneris insomnia  
† bibitur. siquidem ea prorsus adimit. pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potu efficit. Nym-  
phæa nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet.


† Eadem Gal. Cæterum Nymphæa quæ candidam radicem habet, potentioris est facultatis, vt &  
muliebri profluuiio medeatur. Verùm & hæc, & ea quoq; quæ atram habet radicem, ex vino nigro  
austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergendi vim obtinet, ita vt aphthas & alopecias fanent.  
Ad aphthas verò macerantur aqua, ad alopecias pice liquida, Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra  
est, sicut ad alia, cuius alba.

#### NYPHÆA lutea.

Diosc. Huius semen & radix contra saninarum profusum efficaciter ex vino nigro bibuntur.

Subdit Plin. Tenefimo radix ex vino bibitur. Dolores vesicæ sedat ex vino. Manantia sanat vlcera.  
Maculas omne emendat. Trita plagis imponitur. Vlcetibus priuatum ijs quæ calceamēto facta sunt,  
prodest arida infusata.

*NYMPHÆA alba.* Aduer. f. pag. 257.



*Nymphaea lutea.*  
Aduer. f. 257.

*RANAS bicolors.*  
Aduer. 258.



*Ranunculus aquatilis.*  
Aduer. f. 258.



## TRIBULVS aquaticus.

**Diosc.** Vterque refrigerantis & inspissantis est natura. ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. vlcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillâsq; per sanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis nuamentum affert. Drachma terrestri tribuli pota, illitâne, ictos à vipera recreat. contra venena cum vino aptissimè bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amne habitant, virenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

**Gal.** Tribulus ex humida essentia modicè frigida & sicca, non mediocriter & ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum, frigidum, quod & adstringens ostendimus: in aquatico vero aqueum. Propter utrumque itaque, & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes influxus congruunt.

**COLOCASSIÆ, sine Faba Aegyptia species.**

**ARVM** Aegyptium Dod. & Recentiorum.

**Hisp.** Manta de nuestra Señora.

**Advers.** pag. 259.

**ARVM**, ἄρον, **Officin.** Iarus & Pes vituli. **Belg.** Calfs=boet. **Gallis** Pied de veau. **Germ.** Phaffen pint.

**Ital.** Gigaro. **Hisp.** yaro. **Ang.** Cockleppint.

**Advers.** pag. 260.



**Diosc.** Caulem habet cubilem, digiti crassitudine: flore roseum, dupla papaveris amplitudine: & ubi flo-  
ve exiit, fert folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampulle modo, prominet.  
**Ciborium** aut **Cibotium**, i. arculum ideo nominant, quoniam seratur ipsa humenti gleba mandata, & ita in aquam  
demissa. Radice firmatur arundine crassiore qua cruda coctave estur. Colocassia faba adstringendi facultatem ob-  
tinet, & stomacho vitilem: dysentericis, celiacisq; prodest, in parso polenta vice, lomento. Datur quoq; in pulve. Cor-  
sices in vino mulso decocti si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad arrium dolorem, quod in eorum  
medio viride spectatur: gustu amarum, sititum, & cum rosaceo coctum instilletur.

† Bellonius etiam negat illi florem aut fructum.

**Gal.** Sicuti nostratem fabam magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisque  
excrementitia sortita est.

*lib. observatio-  
num. cap. 28.*

## ARVM.

**Diosc.** Radix decocta essit, utpote cum minus acris sit, folia ad esum reconduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen & folia Dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagræ illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Gal. Terrena & ipsum essentia constat, sed calida; proinde extergendi vim possidet: verum non valenter sicut Dracontium. Est itaq; in exsicando & calcificando primi ordinis. Radices eius maximè sunt viles: siquidem comestæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeò ut & excreationibus ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium.

**ARVM maius Veronense;** perperam Arisarum. *Aduers.* 260.

videtur idem cum Dracunculo altero seu Helicophyllo Cordi.

Tanti discriminis relationi quorundam acquiescere, quantæ fraudis, imaginibus argutissimè picturis credere. Quibus radicibus olim nos donauit Franciscus Calceolarius Veronensis sedulus & harum peritissimus pharmacarius; temporis progressu eam assequutæ sunt magnitudinem, ut meritò & affabre Aron matus, vel Dracunculum minorem quidam statuerint. Aro siquidem per omnia similis: sed folia maiora intercurrentibus venis & notulis albis variata, in hyemem perstât. Racemus item & radix Ari, quæ pluribus bulbillis adnatis propagatur.

**ARISARVM Hispanicum congener cum Arisaro latifolio Clusij.**

2<sup>o</sup>. Arisarum Clusij.

**D.** Brâcionis Adonidis pensilibusq; hortis nuper inquilinum Hispania delatû radice tuberosa anemones, folio hederæ aut violæ nigræ oblongiore: neque semen neque florem cernere hæcenus datû.

**Diosc.** Radix olivæ magnitudine maior quam Aron acrimonie. Vnde illius nomas sifit. sunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illius radicis genitale animalis cuiuscumque in perniciem agitur.

**ARISARVM latifolium Clusij, num idem cum Narbonensi? Hisp. Iaro & fraillilos. i. fraterculi, Clusio interpret. Aduers. pag. 260.**

**ARISARVM angustifolium cum fructu racemoso albo, & cornicuto purpurascente.**  
*Aduers. pag. 261.*





## ARISARVM latifolium.

Ternis aut quaternis folijs Smilacis, satis carnosis, mollibus, viridibus, & acribus, oblongo pediculo  
 fulvis, lunata falcataque basi. flos Aristolochiæ longæ extrema parte nigricans in sequivinciali pedicu-  
 lo, notulis rubris vario. radix rotunda Aro minor. Sponte oritur ad margines agrorū Lusitanie in col-  
 libus & dumetis.

## ARISARVM angustifolium.

Varietas. [Mechliniæ in horto Georgij Ryensis rei herbariæ perquā studiosi folio aliquanto latio-  
 re & corniculo virenti à superiori diuersum visitur.

ANGVINA DRACONTIA. Hisp. Tragontia. Ital. Serpentina. Gall. Serpentine  
 grande. Serpentaria Colubrina. Germ. Draken wurz. Stangenkraut.  
 Belg. Drakenwortel & Speerwortel. Aduers. 261.



Diosc. Seminis succus cum oleo instillatus, atrium  
 dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus poly-  
 pum absmit. Carcinomata illius siliis. tringinta eius gra-  
 na, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odore autem  
 postquam flaccidi flores emarcuerint, conceptus adhuc te-  
 neros enecare. Radix excalfacit, orthopneis, ruptis, vulsis,  
 tussi, destillationibus, auxiliatur. humores pectoris excrea-  
 tu faciles reddit, siue cocta tostataque cum melle, aut per  
 sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. vrinam  
 pellit, venerem excitat, cum vino pota. phagedenas vlcera,  
 & qua cacœthe vocantur, trita cum melle & bryonia al-  
 ba, expurgat, & ad cicatricem perducit. collyria ex ipsa  
 ad fistulas & eijciendos partus fieri solent. qui radice suas  
 manus perspicuerint, à vipere ferri negantur. illa ex a-  
 ceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, lina-  
 mentorum vice, conuenienter imponuntur. decoctum in vino  
 pernionibus apposuisse prodest. caseus folijs inuolutus, à  
 putredine defenditur. Succus radices ad nebulas, albugi-  
 nes, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda cocti-  
 ue, ad sanorum vsus, pro oleo recipitur. in Gynæsijs insu-  
 lis, qua Baleares vocantur, coctam radicem cum melle  
 multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mes-  
 fibus effodiunt, lotaq; frustatim concidunt, & limo traiecia  
 siccatur in umbra, & ita reconditur.

De altero Dracunculo inter notha Dioscor.

## DRACONTIVM, siue DRACUNCVLVS Gal.

Quiddam Aro persimile obinet, tum folijs tum  
 radice: ceterum illo tum actius est, tum amarius,  
 ac proinde calfactorium magis, & tenuioribus  
 partibus. Habet etiam leuiculam quandam ad-  
 strictionem, quæ quandoquidem cum compre-  
 hēsis duabus qualitatibus acris scilicet & amara cō-

iuncta est, medicamentum factum est, vt quæ maximè efficax. Nam radix viscera omnia expurgat,  
 crassos potissimum & lentos succos extenuans: optimūq; remedium est contumacium vlcerum, quæ  
 naxosibz nuncupant. Expurgat quoque extergetq; strenuè tum alia quæ extersionem desiderant, tum vi-  
 tiliginem cum aceto: tum folia item vitore similem facultatem habentia. Vlceribus, vulneribusque  
 recens inflicta accommodata sunt. Et quando minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nam quæ  
 sicciora sunt, viribus sunt acriteribus, quæ vt vulneribus conueniant. Creditum est quoq; caseum hu-  
 midum si illis foris testis reponatur, ob temperaturæ illorum siccitatem à putredine conseruari. fru-  
 ctus valentior est non folijs tantum, sed & radice: Itaq; & caneros & polypodas eliquare creditus est.  
 Succus quoque eius vitis oculorum expurgat.

A P L. Ad omnium serpentium morsus & aspidum: radix ex vino trita tepefacta potui data, vene-  
 num omne discutit. Radix cum axungia facta quasi malagma & imposita, mox ossa fracta de cor-  
 pore educit, & lapides extrahit.

Foliorum stillatio liquore vtuntur Angli ad Pestis contagia, vna cum Draconis siue Taraconis  
 aqua. Dosis singulorum ʒj. & f. Theriaces ʒj. sudorem copiosum eliciunt.

Aquatica

*Aquatica ANGVINA, sive DRACUNCVLVS.*

*Dracunculus arundinacea radice Plinij.*

*Germ. Wasser se;langen kraut. Belg. Water slangen  
crupt. Gall. Serpentine d'eau. Aduers. 261.*

*ASARVM. Angl. Felfoot & Myra barrara.  
Aduers. pag. 262.*



Plin. Lib 24. cap. 16. Eam ex aqua vel vino contra serpentes dabant.

#### ASARVM.

**Diosc.** Radices habet odoratas, excoalscientes, & quæ linguam vehementer mordent. Excoalscentiam vim habet. vrinam cit. hydropicis & vetusto coxædicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsâ potæ, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguentis additur.

**Gal.** Radices facultate similes radicibus Acori, intensiores tamen. Itaque ex ijs, quæ de illis prodita sunt, hic faciendâ coniectura.

**Plin.** Nardi vim habet Asarum, quod & ipsum sylvestre Nardum aliqui appellant. Secundo ordine excoalsciunt & siccant tertio Asari radices. Mesueo attenuant, referant, resoluunt, & prouocant. adstrictione tamen non vacant. Bibitum Asarum non modò vomitione ciet, sed & per aluû ducit.

**Mesue.** Tota planta est aromatica, & gustum mordens. Radice præcipua, præsertim magna, odore tenni, sapore acri, & parum styptico. Calida sicca ordine tertio, vel potiùs cum Dioscoride calida secundo, sicca tertio. Tenuat, resoluit, obstructa aperit, hepatis, lienis, & horum duritiem soluit, & affectus alios inde natos, febres putridas & diuturnas, icterum, hydropem, præsertim vino infusum. Purgat vomitu & deiectione, & vrinis bilem, sed pituitam manifestiùs, etiam ex ilibus, ichio, & aliis articulis: ob id harum partium dolores mitigat, præsertim infusum, vel aliter exhibitum.

Oleum asari cum ladano spinæ illitum sudores mouet, & rigorem febrilem inhibet. Vrinæ mouet, semen auget. Valentiùs agit cum sero lactis, spica & hydromelite. Mustum his radicibus conditum post tertium mensem hydropes & splenem sanat. Mediocriter coqui & teri potest: & quò tenuiùs est tritum, eò magis vrinæ mouet: minùs autem aluû ducit. Datur infuso ab aureis duobus ad drach. quatuor: puluere autem à drach. vna ad aureos duos.

*Ischiadici*



*Ischiadicis & quartanarijs vomitione, vtilis.*

**ASARINA** *sterilis Seuena Narbonensis agri.*


*Aduers. pag. 262.*

*Asarina diuersa à Matthioli q̃i florem Antheidm̃ esse scribit.*

**SOLDANELLA.** *Brassica marina.*

*Belg. Zeevinde. Hiss. Soldanela,*

*& verca marina. Aduers. 263.*



Folia & flores dilute purpurantes Hederæ terrestri conueniunt; sed maiores, longiores. Rupibus & cautibus Veganio conterminis Seuena oriunda.

**SOLDANELLA.** *Brassica marina.*

**Diosc.** Folio pingui concretu, salso gustu, & aliquantulum amaro. tota herba stomacho incommoda est, acris: alium maxime soluit in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Tertio ordinis excessu, calida & sicca censetur.

Tormina & flatus gignit, flauas hydropicorum aquas & pituitas educit.

**Gal.** Suprà quàm quodd ventrem deijciat, vt pote subfalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis vlus & ad omnia ea ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea.

GRAMEN PARNASI Recentiorum Hederaceum.  
*Hepatica alba Cordi. Germ. Asperblumelin.*  
*Adverf. 263.*

GRAMEN PARNASI duplicatis floribus.



**Diosc.** Densus fruticat. Succus in vino cum melle pari, & Myrrha dimidio decoquitur. Adjicianturque pipere & thuris terræ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in area pyxide reconditur. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen vehementius urinam impellit; aluum, vomitioneque sistit.

**Gal.** Semen eius urinam ciet; & fluxus ventris & stomachi resiccant. vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacuta.

GRAMEN PARNASI duplicatis floribus.

**Varietas.** { Prosum idem, vdis Brabantini agri etiam quò loci aliud vna sponte oritur, legit sedula manus D. Lucæ Eersfel medici Louaniensis harum perquam studiosi & peritissimi, sed sola florum speciosa duplicatione varium.

CYCLA.



CYCLAMEN folio Hederae. Rapum terræ. Arthamisa.  
Belg. Heughebaert. Advers. 264.



**Diosc.** Radix cum hydromelite pota, pituitam aquamq; detrah. menses potu appositivè ciet. Tradunt, si pragnans radicem transgredietur, abortum fieri. partum appensa accelerat. contra venena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur. illita contra serpentium ictus remedio est. immista vino inebriat. regium morbum discutiit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contextum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quòd facilius exudet. eiectionem autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. ad deicienda quoque alui excrementa, in vellere sedis subicitur. illito umbilico & imo ventre coarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit. suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur succus cum aceto illitus. prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. eruptiones papularum reprimit, vulnibus ex aceto per se aut cum melle medetur. \* lienem absorbit. vitia cutis in facie, & alopecias emendat. eius decocto laxata, podagras, & capiti vlcuscula, perniciosesque foveri congruum est. ipsaque in oleo vetere servata, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere serventi imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cere momento, ut frigmenti crassitudinem ringentum contrahat, cum primis vitæ perniciosis. Radix, scille modo, concisa reputatur. Narrant, ad amatoriam assumi contusam, & in passillos diuisam. Nasitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

Eadem Plin.

\* eadē Gal.

† eadē Gal.

\* Gal. eadē.

† Gal. eadem. & menses siue pota, siue imposita euocat. non modò viscus purgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens, proinde à potione omnibus modis adiuvanda sudoris prouocatio est.

**Mesue.** Calidus succus initio tertii ordinis, incidit, tenuat, resoluit, terget, expurgat, obstructions aperit, sudorem copiosum mouet, cutem fœditate eius ablata omnium maxime expurgat. Pituitam lentam & crassam sumptus, & suppositus, atque adeò femori, ilibus, & vicinis partibus illitus purgat. Obstructions viscerum, præcipuè splenis aperit, maximeque ex oxymelite, & sumptus, & emplastri modo ad motus colicum dolorem à pituita, aut stercore suppresso sanat, caput & oculos insigniter expurgat, præsertim erithino ex ipso in nares recepto, præsertim post purgationem per Hieram, aut Theodoricon, aut catapotia fœtida, aut similia. Quapropter visui imbecillo, & aquis in ipsum ruentibus, hemicrania, cephalalgia, tortura, paralyti, & ceteris cerebri affectibus frigidis confert, erithino, ut dixi, attractus. Icterus sanat experientia certâ, præsertim succo cum oxymelite, vel ænomelite sumpto, & operto deinde diligenter corpore. Nam sic sudore largo materia etiam in vaporem versa bilioso excremento exonerabitur. Duro lieni confert quouis vtendi modo, & tumoribus aliis, ut etiam strumas iuuat. Menses mouet, sumptus & suppositus hæmorrhoidas potentissimè aperit. Corrigitur ut dracunculus, & bryonia. succi huius drach. quatuor cum saccharo solutas, & ad tertiam coctas, manè sumptas, icterum sanare certissimum & expertissimum affirmat filius Serapionis.

Gal. Cyclaminus varias vires obtinet, nam & extergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit. Clarum verò id est ex particularibus operibus: nam succus eius hemorrhoidas reterat, violenterque ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasque durities discutientibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit. Ad hæc quoque per nates expurgat.

*Varietates.* { Cyclamen vernum flore rubro Ferraria misit D. Alfonsus Pancius, cui folia Martio crūpunt: Aprili & Maio floret. Semenque maturat initio Iunij.  
Belgij vireta folio hederaceo rotundiore tantillum crenato fusque deq; maculis variato colunt.  
Breuiori flore est illud quod fundit Romanus montanus ager.

ARISTOLOCHIA. Gallis *Aristologe* & vulgo *Saragine*.  
Ital. *Aristologia*. Hisp. *Aristoloquia*. Germ. *Osterlucepe*,  
& *perperam* Hollwurtz. *Aduers*. 264. 265.

ARISTOLOCHIA ROTVNDATA.

ARISTOLOCHIA Clematitis nostras, *perperam* longa Matthioli & Fuchsi. *Aduers*. 265.



Diosc. Rotunda ceteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues drachmæ pondere ex vino bibitur & illinitur. Potæ cum pipere & Myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum onera eijcit: eadem efficit in pecto subdita. Rotunda ad eadem pollet; insuper singultientibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterisq; doloribus, potæ cum aqua singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit. Osium squamas illita adimit. putrida vlcera excarificat, & sordida expurgat. caua cum tride & melle explet. Extergit gingiuas & dentes. Creditur & Clematitis ad eadem prodesse, viribus tamen inferior est.

Gal.



Gal. Radix amara & subacris, sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarum verò duarum Clematidis vocata magis odorata est: itaque ea ad vnguenta vtuntur vnguentarij; sed ad sanationes infirmior. Longa verò minus quidem tenuis est, quam rotunda; sed nec ipsa inefficax: Verùm abstergendi & calfaciendi facultatem possidet; minus tamen quam rotunda abstergit, atque digerit: sed non minus calfacit, imò fortassis etiam plus. Itaque in quibus vsus est modicæ absterfionis, commodior est longa; putain carnis exulcerationibus, & vteri fomentationibus. In quibus autem crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Proinde dolori ab obstructione, aut crassitie crudorum flatuum natos, magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera repurgat, dentes, gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisque, vt si quod aliud medicamentum, idonea est.

APVI. Herba Aristolochia sicca suffumigabis febricitantem, & hilariorem eum facies. Fugat & demonia. Frigore exustis, herba Aristolochia ex oleo vsque ad calefactionem vim habet cum axungia porcina. Si infans contristatus fuerit: herba Aristolochia suffumigabis infantem, hilarem facit, & conualescit infans, fugato dæmonio. Canceromata quæ in naribus nascuntur, herba Aristolochia cum Cypero & Draconteæ femine trita & cum melle imposita, emendat.

PISTOLOCHIA & Polyrhizon Plin.

Aduers pag. 265.

Conuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, viliissima esse traditur: semine pleuriticis & neruos confirmare, excalfacere. putrida vlcera exest, vermesq; extrahit, & cætera cuncta <sup>legi promi-</sup> <sub>scuè. lin. 38.</sub> potest quæ superiores.

Aristolochia CLEMATIDIS altera Hispanica.



Candore, sedulitate & industria D.C. Clusij nobis Clematidis alterum genus innotuit; qui ex Hispania Bætica, & Hispalensibus tractibus itinere Olysiipponensi in sporulas denectam D. Brancioni & amicis videndi copiam fecit. Senticetis & dumetis gaudet, flexuosis, anfractuosis, viticulosis, ramosis

mosis, gracilibusque cauliculis atreptit & ample statur vicina cremia. Radice reptrice, prælonga, anfractuosa, geniculata, Smilacis aspera, & notatis Clematidis colore. Flores incurui nigricant ex purpurea: lagenulæ, & folia Aristolochiæ Clematidis minora, rigida, leuia & tantillum acuminata. Facultatibus cæteris haud absimilis creditur.

*VIOLA MARTIA purpurea, flore multiplici.*  
Hisp. Violeta. Ital. Viola mammola & viola  
porporea. Aduers. pag. 266.

*VIOLA MARTIA surrectis cauliculis.*  
Aduers. pag. 266.

Flos Violæ Mar-  
tiæ simplex.



**Diosc.** Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex potentia illinuntur aptissime stomacho æstuanti, & colorum inflammationibus, \* sedique procidenti. \* inflammationem, tensionem & dolorem leniendo.  
Semen calculos vesicæ comminuit, urinas ciet: exiccare, uti plantaginis, creditur.

**Mesve.** Violæ refrigerant & humectant ordine primo; cum tamen siccæ minus refrigerent, & Eadem minus humectent. Humiditas quæ superflua recentibus inest, aluum emolliendo ciet: verum arefactæ, deiectionis sunt facultatis, non quodd emolliant, sed quodd dissoluant. Violæ in summa soporiferæ sunt, refrige-



refrigerant, capitis dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt & solvunt. bilem educunt, eiusque feruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas exciauerit. Pectoris & asperæ arteriæ scabritiem leniunt. Medetur anginis & columellæ vitijs. Præcipuo autem sunt auxilio pectoris, & lateris inflammationibus, sitimque arcant. At quæ siccæ sunt, iecoris obstructions referant, inflammationes discutiunt, & morbo regio laborantibus opitulantur.

*Cauliculis ramosis Viola martia è floribus* { Hanc luteis floribus transmissit stirpium summus explorator  
*colore differentia.* { Clusius noster D. Iohanni Brancioni.

*VIOLA flammea coloria.* Herba Trinitatis Fuchf. à  
triplici floris colore. Læcea sive flos Trinitatis Matth.  
*Viola tricolor* Dod. Aduersf. 266.

*SAXIFRAGIA alba chelidonides, eiusq; varietas.*  
Aduersf. pag. 267.



Non secus ac Viola martia, gustu subacris, tenuis substantiæ & incidentis facultatis, non sine humido abstergente, cuius beneficio crassa pituita, citra exiccationem & calorem, inciditur, abstergitur, & facilius educitur. Ideo nuperis ad asthma, peripneumonias, febres, convulsos, epilepsias, materiam propellendo. Pruritus, psozam & cutis vitia emendat. Vlcera quodam lymphit lentore conglutinat.

*SAXIFRAGIA alba.*

E sola magnitudine omni sui parte huius conspicua differentia in Belgio.

lego

lege *SAXIFRAGIA aurea* Lichenis facie & natalitjs. Ery-  
sini species Aldrouandi. Aduers. pag. 267.



*Humilis HEDERA* siue *CHAMÆCIS* SVS.  
Corona terra. Terrestrius hedera. Germ. Gündel  
reih. Belg. Onderhaue. Gall. Liere terrestre.  
Aduers. pag. 268. \*

Chamæclema Cordi, quasi dicas humilis Clematis repens. Clemem autem teutonicè, est repero scandentè.



Corymbosa  
*HEDERA*.



lege fabulan-  
tur. lin. 17.

\* *Diosc.* Gustu supra modum amara. Bibum con-  
uenientissime ischia dici solia, tribus obolis in aqua cyathis  
tribus, tricenis quadragesimæ diebus. eodem pota modo,  
senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Gal. Chamæcissi flos eum sit admodum ama-  
rus, iecur obstructione liberat: daturque ex cox-  
dice laboranubus.

*CHAMAELEUCE.* Aduers. pag. 268.  
Caltha palustris Gesneri.

*Diosc.* Lumborum doloribus propitia est.

Corymbosa



*Corymbosa* *HEDERA*. *Hisp.* yedra. *Ital.* Hedera. *Aduers.* pag. 269.

**Diosc.** Hedera omnis acris est, & adstringens. nervos tentat. flos<sup>a</sup> trium digitorum carptu facit ad dysentericos, in vino bis die potus. ambustis cum cerato tritus illinitur. recentia folia<sup>b</sup> ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, henes sanant.<sup>c</sup> foliorum & corymborum succus, cum urino vnguento, melle aut nitro,<sup>d</sup> naribus infunditur. & contra veteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi vtile est. purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. nigra hedera succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mētemq;<sup>e</sup> turbant largius sumpti. acini quinque triti, calsalique in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mirigant. denigrant capillum illiti corymbi.<sup>f</sup> folia in vino decocta illinuntur omnium vlcere generi, etiam si cacoci be sint. vitia cutis in facie & ambusta sanant, vii antea diximus, decocta. mouent menses triti & subditi corymbi. idem poti, post purgationes foeminarum, drachma pondere, concipiendi spem adimunt. pediculus foliorum melle irrigatus, ac vulua inditus, menstrua & partus extrahit. instillatus succus putrida tedia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. lachryma hedera ptilotbrum est: illitu pediculos enecat. succus radicum, cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit.

<sup>a</sup> [Flos] Gal. flores aut quodammodo validiores sunt, vt ad læuorem redacta cum cerato ambustis conueniant.

<sup>b</sup> eadem Gal.

<sup>c</sup> eadem Gal.

<sup>d</sup> Gal. capiti purgando idoneum existit.

<sup>e</sup> eadem Plin.

<sup>f</sup> eadem Gal.

Hedera omnes refrigerant Plinio. eodem tamen auctore decoquuntur contra horrores febrium, eruptionesque pituitæ, aut in vino teruntur. Eadem quæ Diosc. Plin. qui subdit:

Hedera, quam Chrylocarpon appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita vt terni cyathi potentur, aquam quæ cutem fubierit, per vrinam educit Erasistratus. Hedera nigra corymbos decoctis suis hydragogis præscribat Rondelletius. addidimus & nos ad vnciam vnam.

Plin. Radicis succus, in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoq; ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt; moxq; comburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, eoq; vtantur ad dentes erosos, frangique tradunt, proximis cera munitis ne lædantur.

Gummi etiam in hedera quæritur, quod ex aceto vtilissimum dentibus promittunt.

Gummi

Folia vino infusa calculos & vrinæ pellunt. Fontanellis vulgo dictis imponuntur commodè. Huiusmodi allicunt, inflammationes & putredines arcant.

*HELI* sue *Prouoluta*, sterilis Hedera. *Aduers.* 269.

*CYMBALARIA Italica* hederaceo folio. *Aduers.* 269.



## HEDERACEVM THLASPI.

In Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino portu Plimmouvvæ, alijsq; maritimis Angliæ cautibus, repens herbula dodrantalibus & spithameis gracilibus cauliculis, striatis, puniceantibus, folijs sinuosis hederaceis, carnosiss. Flosculi candidi & semen exile in folliculis gustu & habitu Thlaspi expriment.


## De NASTURTIO Indico ex Dod. \*

DOD. Speciem exhibet Cœnoluculi folia eius lata angulosa, & pulchrè depinguntur virentia, flos luteus retro propendens habet corniculum instar floris regij, quem Delphinium appellant.

## NASTURTII Indici genuina effigies.



NASTURTIVM  
Indicum.



Hanc eandē Nasturtij plantā Neruij semine satā in pēsilibus hortis anno elapso alebat induritus & materix medicæ gnarus Iacobus Plateau; quæ miru affabrè picturam Dodonœo missam delinatā, ostendebat. Folia quippe peltata, ambitu circinato, & leuiter sinuata, e quorum medio centro pediculi Coryledonis ritu, caulis ternū & quaternū cubitorum multis concavis alis. Semina Betæ quadam tenuis, qualia mihi ostēdit prædictus Plateau.

Cuculo



Cuculo Indiano ferè paria assererebat D. de Bracion in filiqua admodum eleganti, qualem habeo à naucleris reducibus ex Peruvianis Indijs, tereti, rotunda, vnciali & duos digitos longa, coriacea, strijs & rugis exarata, luteola, summo & imo ventriosa, tantillum falcata. Apud nos florum rudimenta dūtaxat videre licuit. gustus illi Nasturtio proximus, vnde nomen asciuit.

An CYCLAMINOS altera, hederaceis folijs planta.

SMILAX ASPERA. Aduers. pag. 270.



CYCLAMINOS altera.

Si quid coniecturæ captari potest, cuiusmodi stirps fuerit Cyclaminos altera; cognata Hedera & Cyclamini planta accipienda videtur. Hanc multæ adumbrare videntur, nulla autem explere, aut asseri potest. Cordo Dulcamara, alijs Bryonia nigra, & Periclymenon alterum, nonnullis stirpium venatoribus aliæ magis placent. In Italiæ collibus, quo loci & qua radice iam non occurrit, repertæ plantæ, inque sportulas coniectæ sedulis vestigatoribus iconem & descriptionem exhibeo. Herba est Hedera folijs sinuatis paribus in mollibus flexilibus cubito prolixioribus, nilabat memoria, cauliculis. flores oblongi, galericulati, ex purpura pallentes.

Diosc. Est & altera Cyclaminos folijs Hedera, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassissq., circa vicinas arbores, capreolorum modo, se voluentibus: flore candido, odorato: acinis Hedera mollibus, lenti gustus aliquantulum acris. Radix superuacua. Nasctur in asperis. Huius acini drachma vnus pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per vrinam & aluum absumunt. Ad orthopnœam bibitur. Reliquias à partu purgat.

SMILACIS ASPERAE è spinis varietas.

Folio non spinoso & sarmentosis viticulis multò minus spinis refertam munere D. Bracionis alit amoenissimus & stirpium ditissimus paradisus Ioannis Mutoni, cæteroquin cætera cuncta similima aut eadem; fructu nigro.

Diosc. Folia & acini, & ante & post epos, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in luccam editis, qui ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

lege SALSAPARILLA. Aduers. 270.

Radicum decoctum exsiccat: sudores & vrinæ cit: cutem euacuat, & quæ cutem subierunt educit. Folio Smilacis asperæ spinoso & sarmentosis implexis viticulis, spinis aduncis, horridis, & radice crebris implexa loris, qualem superius dedimus, alit Ioannes Muttonus.




σμήλαξ λεῖα. SMILAX levis minor. Germ. Winden-  
kraut. Belg. Winde & wrange. Ital. Vilucchio  
maggiore. Hisp. Yedra Campana. Gal. Liferon.  
Angl. Wpndwecht & wintc. Malococissus Dama-  
tratis Anguillara. Aduersf. 271.


Diosc. Semine cum Dorycnio poto, ternis singu-  
lorum obolis, varia & tumultuosa in seminis obuersa  
traduntur.

Gal. Hanc Smilacis asperæ quodammodo si-  
mitem esse vult.  
Nullius vsus Plinio.

CONVOL-  
VULVS mi-  
nor purpu-  
reus. Ital.  
Vilucchio  
minore  
Aduersf. 272.



SCAMMONIVM.  
Aduersf. 272.



SCAM-



## SCAMMONIVM.

**Diosc.** Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavaatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectus inglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quam simillimum taurinoglutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asia deportatur. Nec attendere solū par est, si lingua tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quo d'admisso fit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat; id quod misti tithymali argumentum est. natione aut Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, densa, erui farina & tithymalo vitata. Succus drachma vnus aut quaternū obolorum pondere haustus, ex aqua pura vel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, aliōe semine, sumpsisse satū est. dantur efficaciorū purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloës drachma vna. Fiunt purgatoriū sales, drachmis viginti succi scammonia, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportione virium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo: minimus, vnum. Radicis drachma vna aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis virili. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus. tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. decocto in aceto peruncta lepra abiguntur. diurni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

## SCAMMONII Monspelici Varietas.

Apocynos siue Periploca prior Dod. & Belgarum quorundam.



Cognata figuræ & naturæ est cū Scammonio Monspelienfi, flore, succo, viticulis, & lōgo radicis re-  
 patu subtus terrā hinc inde porrectæ, quæ adeo viuax est, ut semel in hortos ascita, vix runcari dele-  
 rine queat, etiamque; frustillo tantillo relicto, repullulet; sed folijs longioribus, filiquis verò & semi-  
 ne Vicetoxici, cuiusmodi è littoreis Adriatici sinus, & mediterranei maris in hortis nostris alitur.

CONVOLVVLVS minimus spica solius, sed eius effigies  
minus scite expressa Aduers. pag. 274.  
Scammonium tenue Plin. quorundam.



ASVREVS siue Caruleus Conuoluulus, Campanula Lasura  
herbariorum. Aduers. 274.  
Noctu florens Pleutonaria di Cta.



CONVOLVVLVS peregrinus Clusij.

In Collibus iuxta Tagū lato solo, Bætica, pluri-  
misq; Hispaniæ locis nascentem peregrinæ elegā-  
tiæ C. Clusius Cōuoluulum folijs Althææ minori-  
bus vberi admodum proventu inuenit, indidemq;  
in Belgium D. Brācioni misit apud quem excreuit;  
sed tandem emortua hyemis iniuria flexilibus ca-  
ducisq; viticulis cubitalibus, nonnihil hirtis, vicina  
quæuis arripit, folijs Althææ minoribus, cristatis,  
fimbriatis, & nōnihil laciniatis oris: flores Martio  
purpurantes aut candicantes Conuoluuli æmuli,  
quinque itidē plicis complicati longiusculis pedi-  
culis insidētes. Radix longa, tenuis, pulla, summo  
cespite serpens. & hinc renascens.

Diosc. Foliorum succus potu deijcie aluum.

CON-



CONVOLVULVS peregrinus Clus. Conuoluulus Scammienj facie;  
an Helxine Cissampelos Diosc.: Hifp. Campanilla.  
Lufit. Verdezilla, Aduerf. pag. 274.



Helxine CISSAMPELOS altera, Atriplicis  
effigie. Aduerf. pag. 275.  
Conuoluulus niger, & Helxine Cissampelos Dod.

VITIS ALBA. BRYONIA Diosc. Aduerf. 285.  
Ital. Zuccha faluatica. Hifp. Nueza blanca.  
& Norca blanca.



VIT

## VITIS ALBA, Bryonia.

**Diosc.** \* Aspmagi decocti in cibo, album & vinam cient. Folia, fructus, radix, acrem vim continent. itaq; vlcum phagedani, gangranis, chironis, putrentium tibiurum tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. vicia cutis in facie, varicosque, lentigines, & cicatrices negras emendat, cum eruo, creta Chis, & sarno graco. eodem effectu prodest decocta in oleo, vsque dum liqueat. sin illa tollit. redauias committit. inflammationes discutit illa ex vino. suppuraciones rumpit. medicamento apte in n. isetur, quod carnem exest. in fracta ossa extrahit, trita & imposita. datur comitialibus in potu drachma pondere, quotidie, anno toto. prodess attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. contra viperarum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur. partus necat. mentem interdum subvertat. foeminarum locis apposita, partus secundisque morantes trahit. cit vrinam pota. eclegina ex ea fit cum melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterum doloribus. lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta diebus, consumit. illinitur ad eadem cum fico. ad muliebres infusus decoquitur: siquidem vuluas purgat, sed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitiam, cum aqua mulsapota. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeat. <sup>†</sup>

\* Contradi-  
cui Dodo-  
naus.

\* eadem Plin. & Gal. eo quod astingat, stomacho gratum edulium: habent enim amaram & modicè acrem \* adfrictionem, quare vrinam moderatè mouent. Radix autem abstergentem nonnullam, desiccantem & tenuium partium, ac moderatè calidam vim obtinet, quamobrem & lienes induratos liquefacit, tum epota, tum foris cum ficibus imposita.

† Plin. Splenem ternis obolis pota 30. diebus consumit.

Plin. folia & caules exulcerant corpus: vtiq; vlcum phagedanis, & gangranis, tibiurumque tadio cum sale illinuntur. eadem Plin. Eadem Plin. subditque: & ipsa autem largior aliquanto, purgat sensus. serpentium, Plin. eadem. eadem Gal. & Plin.

Plin. illinitur eadem cum fico & pterygij digitorum. Succus radice colligi debet ante seminis maturitatem, qui illitus per se & cum eruo, latiore quodam colore, & cutis teneitate mangonizat corpora, serpentes fugat. Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulentur; aliàs vit, nisi frigida abluatur.

Bryonia bilem, pituitam & serosa purgat. ventriculum subuertit, & naturæ vim infert. Hydropticis, coxendicis & diurnis capitis frigidisq; morbis vitilis.

BRYONIA, siue VITIS nigra.

lege VITIS siue BRYONIA siluestris. Sigillum Maria.

Advers. pag. 275.

Tamus, & Bryonia syl. Dod. Tamaro Italis.

Hic annectenda Bryonia nigra, quam ea beneuolentia & quo solitus candore eruditissimus Dodonæus, necnon alij Mechlinienses herbarum cultores peritissimi significarunt. Radice, viticulis, capreolis, folio, floribus & semine Bryoniæ albæ paribus, similibusque. Sed acini nigri dum maturi, non rubentes: & radix foris nigra, intus buxea, conspicitur. Prouenit in VVestfalia, Hessa, Saxonia; etiamque in Pomerania & Misnia Cordo & Dodonæo testibus, qui meritò Vulgatū Sigillū Salomonis siue Bryoniam nigram, syluestrem Bryoniā, Tamumue statuit.


**Diosc.** Viticula quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. vrinam cient. lienem absumunt. vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis, pro sunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur. luxatis itidem imponuntur.

Supradictæ ad omnia similis Gal.





Peruviana MECHOACÆ provinciæ planta Bryonia similis.



Perinde falluntur qui putant Bryoniam esse hanc, atque illi qui Laurum Cinamomum, & Smilacem Asperam Salsam parillam, aliâsq; complures exoticas easdem specie cum nostratibus faciunt. Hanc mittit Insula omnium quæ nostræ ætati in Occiduis Indijs innotuerunt, auro, pecore, stirpibus distillima, Mechoacam vocata, cui radicē cognominē fecerūt Indi, vsumq; docuerūt Hispanos primum, ferè 20. abhinc annis, à quibus has acceptas pingēdas curauim⁹, & quarū sesquidrachmę & drachmarum duarum puluisculo solo, sed ex vino propinato, cōmodissimē qualibet die, hora, & etate, nulla molestia aut incōmodo quinquies, sexties, aut septies flauas Hydricorum aquas eductas, pituitasque quasvis cōperimus. Reliquæ plātæ descriptionem & historiam debemus libro Hispanicē scripto, cuius copiam nobis fecit D. Hector Nonius magni nominis & peritiæ in Anglia Medicus Lusitanus, qui etiam huius radicis multam copiam habuit. Hanc non visam qui cupit nosse, intueatur

Bryoniæ radicem: sunt enim cōcolores cortice, rugis, & ferè magnitudine: sed huius taleolæ, frustula ve rotunda transuersim secta, siccandi causa, intus multis circulis à centro ad ambitum parallelis, distinguuntur: mandendo sapore farinaceo, nec acri, odorisq; neutiquam ingrati est: cætero albida & friabilis, vt Bryonia, cui similem faciunt farmentis pedamenta scandentibus, & racemis. Folia Sinilacis asperæ, cuiusmodi tenellâ adhuc & pullulante plantulâ creuisse in stirpium exoticarum distillimo vireto Petri Coldenbergij meminisse iuuabit.


Varietas. [ Duplex tamē differētia in viretis nostris aliquādo cōspicitur, vbi oritur Hispano semine Cāpanillæ Lafuræ similis vel Scammonij, folio Bryoniæ syluestris. Hyemis impatientissima emoritur.

VIORNA valgi. Vitis nigra Fusch. Clematis altera Matth. & Cordi. Germ. Waldreben & oder ignen.

Vitis alba Italarum. Aduers. pag. 278.

CLEMATIS peregrina canulea & prorepens: an Pothos Theoph.?

Clematis altera Diosc. Dodonæo.





CLEMATIS altera vrens, vulgi FLAMMVLA.  
Aduersf. 276.


Diosc. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt Smilax. Semen tritum, pituitam bilēque detrahū, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras \* purgant. Cum Lepidio conditur ad cibos.

\* Gal. acrem & adurentem facultatem obtinet, adeo vt & lepras excoriet. Fuerit itaque in quarti ordinis excalfacientium initio.

FLAMMVLA altera surrecta.



CLEMATIS  
altera minor  
longifolia.  
Clymenum  
quorundam.



Folio vegetiore hac, & grandiore, Iasmini lutei, ad Viornam accedente. Caules surrecti, ternū quaternūue cubitorum, & nonnunquam hominis proceritatis nullis adminiculis egeni, è fibrosa, depacta radice, & papposo iuxta semen tomento, Viornæ aut vulgatæ Flammulæ ritu. Hanc etiam elapso anno, Italo semine satā, in paradisis amænissimis & raris stirpibus diuissimis D. Alardi Ruerij medici Insulani celeberrimi, & eruditissimi; et illius Iohānis Mutoni Neruiensis materię medicę gnari florentē & inquilinam factam vidimus.

CLEMATIS longifolia.

Quadam insuper Clematide nos donauit Iacobus Plateau Neruiensis simplicium peritissimus, cui folia insunt Flammulæ siue Clematidis albæ multò longiora, ex aduerso bina: cubitales & bicubitales cauli culos etiam humi spargit. Semen, radix, ceteraq; facies non diuersa à Clematide vulgari. Hanc quidam Clymenon arbitrabantur.

CLE-



CLEMATIS Batia Clusij.

LUPVVS salictarius, siue LUPVVLVS. Ital. Lupulo.  
Hisp. Hombrezillos. Aduersf. 277.egelm. 18.  
bouillon  
vocata.

Affine nomine, & facie Clematidis alterum genus industria Clusij assequuta est posteritas. Folia quippe Clematidis alteræ, quibus capreoli subsunt, Viornæ ritu dēcata. In summis virgulis pulcherrimum lanitium tollit, tortilibus crinibus crispatum, carminatum bombacis pensum oblongum, glomeratum, quasi per torulos conflatum, Musci terrestri ritu, spicatumque comam referens.

## LUPVVS salictarius.

Poperingæ vrbe culæ Flandriæ maximo prouentu luxuriat, vbi pampinīs & asparagis vitis ritu spoliatur, ne tota vis & spes florum abeat in folia & caules.

MESVE. Flauam bilem detrahit, sanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes extinguit. Sero caprino maceratus, valentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrupi modo, morbo regio laborantibus medetur. Sed profecto mirum est, quod eo nostræ ætatis medici, tam parè raroq; vtantur, cum tamen præstantissimum sit medicamentum. Quamobrem tum herba ipsa per se, tum etiam succus potentæ admixtus, capitis dolorem à caliditate contractum tollit. Iecinoris & ventriculi æstus mitigat. Syrupus ex saccharo & eius succo paratus vtilissimè exhibetur in febribus à bile, & sanguine excitatis.

Vrinam ciet; obstructions & viscerum sæctus referat. flores caput opplent, maiore copia Bieris incocti.

VITIS VINIFERA. Aduers. pag. 277. Germ. Weintock.  
Belg. Wijngaert & wijnstock. Ital. Vite.  
Hisp. Vid. Angl. Weintre.



Diosc. Folia vitium & triticapreoli, capitis do-  
lores illius mitigant, & inflammationem stomachi ar-  
doremq; cum polenta: folia etiam per se, vi qua refri-  
gerent & adstringant, imponi solent. Potus eorum suc-  
cus dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis,  
& gravidarum malacia medetur. Eadem efficiunt ma-  
desacti in aqua capeoli & poti. Lacryma vitium, qua  
veluti gummi in caudicibus conrescit, ex vino pota  
calculos pellit: illita lichenas & plicas leprasque nigro  
prius perfrictas sanat: eadem cum oleo sopius pilis illitis,  
psilorbri effectum habet: maximeq; sanies, quam accē-  
sa samenta vitium viridia exudarunt: qua & peruncta  
verruccarum informicationes extrahuntur. Cinis sar-  
mentorum & vinaceorum, detractis in sede condylo-  
matis, & thymis, illitus ex aceto medetur: prodest lu-  
xatis & viperarum moribus: contra lienis inflam-  
mationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca  
duorum generum est: alterius vna non maturefcit, sed  
flore tenuis ananthen nominatam perducit. Altera ad  
frugem peruenit, parvis acinis, nigra, & adstringens.  
Folia, caules, & clauicula quibus repunt, vim habent  
cultra viri similem.

VVA.

Diosc. Vna recentes aluum turbant, & Stoma-  
chum instant: innocentiores, qua decrepta diu pende-  
re, (ideo quod in eis copia humoris exsiccat) virileque  
sunt stomacho, aegrisq; atque cibi auiditatem excitat.  
In vinaceis & ollis seruata, ori & stomacho grata sunt:  
aluum sistunt, (sed vesicam & caput tentant) & san-  
guinem excreantibus conueniunt. Similesque quae in mu-  
sto fuere. Sapa aut passo condita, stomachum magis  
infestant. At quae solem prius passae in aqua celesti con-  
duntur, minus vinosa sunt, siticulosi, ardentibus &  
longis febribus salubres. Reconditi vinacei inflammatis

mammis, rigentibus ac praeuritis, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, celiacos, & feminas fluxione vul-  
uae laborantes inuauat infusa: ad defecationes, ac fotus assumitur. Nuclei acinorum astringendi vim obtinent. Stomacho v-  
tiles sunt: inspargitur farina rostorum, polenta modo, dysentericis, & celiacis, & solutis stomacho. Vna passa alba  
adstringentior est: prodest esitata caro earum tussis, faucibus, renibus, ac vesicae. Estur in dysenteria per se cum nucleis:  
& decocta in patinus cum melle, admixta milij ac hordei farina, & ouo, valet ad purgandum caput. eiusdem gratia  
cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos,  
epiphyllidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangranas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat:  
podagra conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe Diosc.

Oenanthe vocatur Vitis sylvestris fructus, cum fletet. Recondi debet sicili non picato, collectaque sub-  
strato limbo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phoenice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho  
acciuanda vna virilis: aluum sistit, ac sanguinis excreationes: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita  
efficax est: capitis doloribus tam viridis, quam sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplas-  
mate, & incipientes agilopas, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflam-  
matione vindicat: pestis miscetur, ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardo-  
res, cum polline polenta & vino illinitur. Cinis cremata in testa, cadentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta  
reduans & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omph-



## Omphacium Diosc.

Omphacion, succus est acerba vuae, nondum maturescens, è Thasia vite aut Aminaa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro are, linceo cooperto, insolare, vsque dum cogatur, semperq; quod ceruici vas concretum habet, relicto humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectum referri: quandoquidem nocturni rores ipsum concretum non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, vnam, vlcera oris, humida gingivarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vulua laborantibus clystere infunditur: oculorum clariari, & scabritia, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excretionem, etiam si rupta parte aliqua cõtingat: sed pauco, & aquatior est vtendum: valde siquidem exurit.

## Vini natura Diosc.

Vino vetere nervi leduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare cauendum ijs qui intestina alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nonum inflat, egre coquitur, insomnia parit grauis, & vrinam ciet. Aetate medium, virag, vitia fugit: quare ad vitium sanorum agoromq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctum difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vipote quod medium est, medias inter vtrumq; vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cū primis laudatur album. Quin & vina sapore distant: siquidem dulce crassis partibus constat, & diffusius à corpore exprat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt muslum, turbat: sed minus inebriat, renibus, & vesica aptissimum. Austerum, per vrinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusq; vrinam expellit, nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho adueratur: stimulat nervos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod vni sole siccatu in area, & concoctum torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sapa qua sit musto igni decocto, Graeci siron aut hepsima appellat: nigra quidè & qua dicuntur melapsithia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidi, tenuius: & heluola inter hac media, medias sortiuntur vires. Omnia tamè adstringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus venena, qua exulcerando necant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pharicon, toxica & concretu in grumos lac item contraveni, ac vesica pruritui, rosiones, exulcerationesq; inflant tamen, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest melapsithiu, si venter rheumatisinu sentiat. Aliu, magis ceteris emollit aluum. Gisso conditum nervus officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesica aduersatur: contra venena ceteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excrementibus inimica. Quae verò aparachya vocat, vt quae adnissam saram recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, agrius in halitum expirant, stomachum male habent. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur. Pulsus excutit, aluum astringit, stomacho vile: sed vesica nocet, atque ijs qui visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minime idoneum. Albana crassioribus constanti partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emollunt (sed concoctionem non aequè adiuuant,) & nervosa minus infestant: vetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Cacubum, cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus & colorem alit: egre tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet: & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suauius redditur, & stomacho vile. Adrianum & Mamertinum in Sicilia aequè crassis partibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocysime inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu deferretur, odoratum ac tenuius est: quare liberatiter potum sallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istrictum Paratypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est: bene alit, & minus inebriat. fluxiones cohibet, oculorum medicamentis vile. Lesbium facile membra subis, Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur: verum Asianum è Tmolio monte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & nervos laedit. Coum verò & Clazomenium, quoniam multam sibi mari aquam vendicant, facile corrumpuntur: status mouent, aluum turbant, nervis offiunt. Vinum omne (vt reliqua in commune dicantur) merum ac sincerum, & sua natura austerum, excalfacit. facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget: somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiame, meconium, argenti spumam, taxum, acouita, fungosve; contra serpentium morsus; & omnium ictus qua refrigerando necant, aut stomachu in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; praecordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si venter aut interanea rheumatissimum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime alba, vetera, & odorata. Quae tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesica accommodatiora redduntur: vlnaribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagadenica, & fluxionibus obnoxia, commode persunduntur. Quae marinam non receperunt, austeriora & alba, ad sanorum vitium vsurpantur. In his praestant Italica, Falernum, Surrentinum, Cacubum, Signinum, & permulta Campaniae, & Paratypianum ab Adriatico si-

nu, & Siculum quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygætes ex Epheso. Crassa vòd & nigra, stomacho negotium exhibent: inflationem pariunt: corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius vinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tenent. In mediâ etate, vè à septimo anno, potus saluberrima sunt. Modus autem proestate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definitur. Non sitire, & modice cibos prohi, o, timum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maxime astilua: siquidem obfessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutiorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maxime post aqua potus, vitium nanq; modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cava corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicuius gratia facta temulentia remedium affert frigida.

Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vna, paulò ante maturitatem decerpta, triiduo aut quatriiduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolat. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malacia, & crudis: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt.

Lora, quam deuteriam, aliq; potum appellat, fieri solet adiectis metretis tribus aqua, in vinacea, quibus triginta vini metretæ extracta fuerint: calcatis vinaceis, expressisq; decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios modici eius qui remansit, binis salis sextarijs: post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, coacti sape desiderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, lora vires habens, hoc modo: Pares aqua, & musti mensura coquantur molli igne, donec absumat aqua. quod, vbi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marina & celestis aqua, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadragesima diebus insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri vna nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & ceteris quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum Gal. ex secundo est ordine excalfacientium: sed quod admodum vetus est ex tertio, sicut mustum quod vocant, ex primo. Caliditati eius proportionem respondet siccitas.

#### Vinum melitites. Diosc.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: nanq; alium leuiter emollit, vinâ ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus absterius odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso quod fit vno vetere, austero & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò magis ad effervescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

#### Mulsum. Diosc.

Mulsum e vetere vino, austeroq; & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus, corpus alit: media etate, alio prodest, vinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij vitilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentium vinum mellis alijciunt: & vbi serbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

#### Aqua mulsa. Diosc.

Aqua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Cruda vitium, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: vt ijs qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere microphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditumque, quod aliqui hydromeli propriè vocant, media etate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quam lora prodest. Inueterati tamen vsus damnatur, inflammatis, aut constricis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluvie aqua veteris ad vnam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aqua adijciunt, & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutus aqua suis confici ac seruari solet: sed meracius confecti conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxiu est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

#### Acetum. Diosc.

Acetum refrigerat, & adstringit: stomacho vitile, appetentiam excitat: erumpentem vnde cumq; sanguinem, potu infestive sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur, inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimat procidentia sedus, vultusq; item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcera que serpunt, lepras, imperiginas, pterygia, cum aliquo conuenienti effica est: phagedænas vlcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. podagricis calido fotu, cum sulfure auxiliatur: fugillationes rapit cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidu velleribus, aut spongia imponitur. Ad aqua inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus, sibilosq; feruentis vapor proficit: instillatum quoque aurium vermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admoueat, pruritus permulcet. Contra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur: & frigidum, ijs que exurens virus eiaculantur. Calidum potum, atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiu, laxumq; cum sale



*fale.* Haustu voratas hirudines, si sorbeat, ejicit: rufum veterem mitigat, & recentem laceſcit. In orthopneia calidum commodè sorbetur. gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. anginis & vna procidenti conuenit: contra dentium dolorem, calidum colluitur.

*Acetum mulfum. Dioſc.*

Acetum mulfum, modo oxymel vocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque, ſalis marini pondo, mellis minas decem, aqua ſeſtertios quinque pariter coquito, decies efferueſcente cortina: atq; vbi reſixeris, diſfundito. Sump- tum craſſos humores extrahere, & iſchiadicis, comitialibus, & articularum morbo conſiſtatis prodeſſe creditur. Contra morſum eius viperæ quam ſepa vocant, hauſtum meconium, ixiâmve, auxilio eſt. Anginis vtiliter gargarizatur.

*Scillinum acetum. Dioſc.*

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traieſtaq; lino ſegmenta modi- cis intervallis, ne ſe contingant, ſiccantur in vmbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni ſextarios duodecim immergitur, & vaſe diligenter operto ſeptenis diebus in ſole maſceſcit: poſt eum numerum dierum ſcilla eximitur, & expreſſi abijciuntur: defecatum acetum tranſfunditur, & reponitur. Aliqui ſcilla minam, quinque aceti ſexta- rarijs miſcent. Alij citra exiccationem repurgantes, parvam menſuram adijciunt, & ſenis menſibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit: gingivæ humore pregnantes collatione ſtingui firmatq; & motus dē- tes ſtabiliter: putredines oris, & graues halitus tollit: durat fauces ſorbitione, & calloſas facit: vocem expedit, & lim- pidam canoramq; reddit. Datur ſtomachicis, egrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginofis, mente capitis: item vulvarum ſtrangulationibus, lienis incremento laborantibus, iſchiadicisq;. Imbecillos admodum re- creat: corpus animum reddit, & bonum colorem præſtat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoq; aurium inſuſione purgat. In ſumma, ad omnia efficax. Cauendum tamen in teſtibus exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum vitijs. Datur quotidie ieiunij ſorbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vſq;. Nonnulli limos dant cyathos, aut largius.

*Scillinum vinum. Dioſc.*

Scillinum vinum fit hoc modo: Diſſectam, vti dictum eſt, ſcillam, & ſole ſiccataſſe contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in vicenos ſextarios muſti recentis ac boni demergito: vbi trimeſtri ſpatio maduerit, elutriatum vinum, obſtructo diligenter vaſe, recondito. Licet quoq; ſic humida ſcilla vti: In orbiculos, rap- modo, diſſectam duplicato pondere, quadraginta diebus in ſolari oportet, & valde inueteraſcere. Alia parandi ratio: Scilla diſſecta & repurgata, tres minas, in Italicam metretam muſti demittito, & ſenos menſes in vaſe obſtructo ma- cerari ſinito: poſt id tempus defecatum & excolatum vinum recondito. Vtile eſt contra cruditates, & ciborum corru- ptiones: item ijs qui reuolunt cibum, eſtiſque picuita in ventre, aut ſtomacho coerit. Prodeſt lienofiſ, malè habitis corpo- ribus, aqua inter cutem, regio morbo, diſſicili vrina, torminoſis, inflationibus, reſolutioni neruorum, horribilibus ton- gis, vertiginofis, & vulſis. Menſes pellit, minime neruos infeſtat. Hoc vinum vetuſtate fit melius. Cauendus in fe- bre vſus, aut ſi interanea vluſ ſentiant.

*Vina marina. Dioſc.*

Marina variè ſaltantur: Aliqui enim ſtatim quum decerpta ſunt vna, aquam maris admiſcent. Alij in area v- nas ſole ſiccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij paſſas prius vnas in dolio marina aqua macerant, mox cal- catas expriment: id magis paſſi generibus adſcribitur. Quæ tamen auſtioris geſtu temperantur, contra februm ad- uentantium indicia valent, ſi modo meliora non adſint: alium ſubducunt: proſunt purulenta extuſientibus, aut ſi du- ra alius exerceat. Quæ ex Aminæis vinis ſunt, caput tentant, ſtomacho aduerſantur, ſtatu creant. Verùm quo plenior babeatur hiſtoria, ut qui huius ſtudio tenent, non inutile exiſtimamus varias vtrorum compoſitiones adſerre, nõ quod frequens eorum aut neceſſarius exiſtat vſus, ſed ne quid omiſſiſſe videremur, quod ad eorũ rationē attineret. Sunt autem quedam ex iis facticia, minoris cura ac impendij, quæ cadunt in vſus: vti quæ ex cotoneis, malis, pyris, ſiliquis, item myrti baccis componuntur.

*Vinum Cydonites. Dioſc.*

Cydonites nomine alio melius appellatur, & ita fieri conſuevit: Mala cotonea exemptis ſeminibus, fruſtatim rap- modo ſcinduntur, & duodecim minarum pondo, in muſti metretam, triginta diebus macerantur. poſtea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad ſingulos mellis ſextarios, denos ſucci cotoneorum ruſorũ preſſorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adſtringit: prodeſt ſtomacho, dysenteria, hepaticis, rennum vitijs, & vrinae diſſi- cultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, ſic fit: Cotonea mala ſeminibus ſuis caſtrata, in quàm plurimum mellis, quo penitus demerſa contegantur, conijciuntur: id poſt annum miteſcit, muſſo non diſſimile. Præſtat eadem quæ ſuperior compoſitio.

*Hydromelum. Dioſc.*

Fit hydromelon duabus menſuris aquæ coctæ, & ſub Canicula ſydus inſolata, additis ad vnam melomelis ſacti ex cotoneis. Vſus huius eadem eſt.

*Omphacamelites. Dioſc.*

Omphacamelitis faciendi ratio hæc eſt: Acerbe vna adhuc immatura, & tribus diebus in ſolare exprimentur, & ad ternas ſucci partes, mellis optimi de ſpumatiſ ſingula partes adijciuntur: & inſolatur in vaſa tranſuſum. Vinum reſtri- mendi ac refrigerandi habet: ſtomachicis colicisq; conuenit. vſus poſt annum eſt.

*Apites.*

## Apyres Diosc.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apyres nomine, sed ita vt pyra non magnopere maturescant. Ex si-  
liquis erianm, mēspilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hac genera acerba sunt, & adstringūt: stomacho vitia  
sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum Diosc.

Fit è feraci vite sylvestri, quod vocatur Oenanthinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post trigin-  
dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, celiacos, &  
dysentericos.

## Rhoites Diosc.

Fit è punicis malis maturis quod rhoiten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest,  
apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrem cum alui pro-  
fluuio exortam: stomacho vitile: adstringit aluum, & vrinam mouet.

## Rhodites Diosc.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam in sextariis octo musti demergito: & post  
tres menses, defecatum vinum transfundens, recondito. Vitile ijs qui febris carent, & ad stomachi coctiones, & dola-  
res à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarum, addito melle, quod rhodome-  
li vocant, quod arteria scabritijs conuenit.

## Myrtites Diosc.

Myrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem excesserint, tustis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij  
baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aqua heminas adiungunt, & vini veteris parem  
modum, postea exprimunt, & seruant. Magnopere adstringit: stomacho vitile: fluxionibus ventris ac stomachi prodest:  
& contra intestinas ulcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

## Myrsinites Diosc.

Myrsinites sic temperatur: Rami nigri myrti cum suis baccis & folijs tust, decem minarum pondo, in tribus mu-  
sti congijs seruescunt, donec duo superint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra surfures,  
vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentæ aureis efficax est. sudores sistit.

## Lentiscinum &amp; terebinthinum Diosc.

Lentiscinum similiter vt myrsinites temperatur, nec secus terebinthinum. Nanque bacciferi eorum rami sumi de-  
bent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicae, & sto-  
machi, & sanguinis profluuio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia: fori ad cicatricem perducunt: fluxiones vulua ac  
sedis, in seipione cohibent.

## Palmeum vinum Diosc.

Palmulas maturas, quas vocant chydaas, in vrcolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittitis  
lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aqua congijs infundito. quod si ipsum ita dulce esse non  
libeat, quinque congijs infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito vinum crassum & dulce,  
& reponito. Suae illud quidem, sed capirinoxium. contra fluxiones, propter adstrictioriam vim, efficax: stomachicis,  
celiacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto-  
re, faciunt, quod tandem acore vitatur.

## Catorchites ex caricis vinum Diosc.

Catorchites, aliquibus scyites vocatur, in Cypro fit, ita vt palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantur-  
dem humoris adiungunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Carica quæ chelidonia aut phœnicea appellantur,  
praesertim nigra macerantur, vti diximus, & post decem dies humor excipitur. atque iterū aut tertio, idem modus a-  
que in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. De macera-  
tarum liquor non secus acorem contrahit, & acetū vsu præbet. Id tenue est: flatus gignit: stomacho aduersatur, fasti-  
dium parit, aluo tamen proleat, vrinam ciet, menses trahit, lactis vbertatem facit, vitiosum sanguinem creat, &  
elephantiasin adfert, vt potio quam zythos appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarijs adiungunt. Alij muria  
amphoram: quod non facile vitatur, & aluo iloneum fore censent. Alij thymum & feniculum imo subiiciunt, & ca-  
ricas superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sycomoribus eodem modo vinum. sed in acetū acre de-  
generat, quoniam non ita prauolet vis eorum, vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Refinatura



## Refinatum vinum Diosc.

Refinatum vinum populatim facilius solet: copiosum in Galatia: quoniam vinum illic coacescat, vna non maturiscentis, ob calidam calorem nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice trunditur, & amphora dimidiata hemina permiscetur. Alij si vbi effervuit, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hæc vina vetustate dulcescunt. Omnia capitis dolores, & vertigines faciunt: concoctionem tamen adiuvant, & vinam cient: tussibus, ac destillatione vexatis consueviunt: item celiacis, dysentericis, & hydropicis, & feminis fluxione vulvæ laborantibus: alius exulcerationibus insperditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

## Strobilites Diosc.

Strobilites sit macerata in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus. Si quis madefactas nuceis pini musto decoquat, potum assatum convenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

## Cedrinum vinum Diosc.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione sunt. Divisos recenterrimos, cum fructum edunt, aut soli, aut balneo, aut igni, admonere oportet, uti consudent, congiorq; vini minam vinam permiscere, & post duos menses transfundere, & ante quam recondantur, insolare. Facilius vinorum vasa impleri debent: namque non plenis vasibus, vina in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina, recte valentibus insalubria. Omnia excolescunt, vinam cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excolescit. Fit quoq; fructu cedri maioris vinum, congior musti, adiecta tusarum baccarum selibra: diebus quadraginta insolari debet. & defocatum in vasa transferri. Fit etiam vinum è baccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excolescit: extenuat, tussis antiquæ vitæ sine febre, pectoris laterumq; doloribus, torminibus, ventris & interancorum vlcibus, purulentis excreationibus, mulieribus vulvæ causarijs, hydropicisq; facit adversus ventris tinea & horrores: contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus insillatum medetur.

## Picatum vinum Diosc.

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Eadem autem primum marina aut muria transierit eluere oportet, dum inaluerit, & sincera maris aqua destuat, mox aqua dulci proluenda: congior octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur: vbi effervuerit & consiterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excolescit, concoquit, purgat, abstergit: vitæ doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vulvæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in alium recedentibus, tussis, suspensio, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

## Absinthites Diosc.

Absinthia faciendi ratio euariet. Aliqui enim duodecimum sextarijs Italicarum amphorarum, admixtam absinthij Pontici libram decoquant ad tertias: & vbi infuderint sex aceti sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conqueuerit, defecant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tusamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, castæ, floris iunci odorari, calami, elatæ, palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimitunt: postea defecatum vinum transfundunt ad usum. Alij addunt in musti cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriat. Alij in senos sextarios musti, absinthij sextantem, & sicca pini resine sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vitæ est stomacho: vrinam cient: tardam concoctionem accelerat. hepaticis, regio morbo, & renum vitij auxiliatur: fastidia discutit. ijs prodest quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionem, & inflationem, teretesq; venteritineas, & remotos menses: contra hausta iuxta venena quam plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

## Hyssopites Diosc.

Hyssopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur. sicq; similiter, soliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coacta. luteo colore cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, ut degravatus pondusculo fasciculus fidat: vinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspensio prodest: vrinam cient: torminibus, & horribus febrium circuitu repentibus auxiliatur: menses mouet.

## Ex diuersis plantis facta. Diosc.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excolescit, discutit: conuulsis, regio morbo, vulvæ inflationibus, tarda concoctioni, incipienti aqua inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stachadites non secus temperatur.

Congius sex stachidis minam addere oportet. Crasitiem, inflationes, laterum, neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitibus commodè datur cum pyrethro & figapeno. Fit ad eadem acetum è steechade herba, ut paulo ante diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum è betonica, quam egeston psychotrophon appellunt. Herbum semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minapondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad mustum interaneorum vitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in unguento dicatur, salicitia vina, sibi misturarum vires adisciscunt: quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: verum tamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiam vinum è betonica acetum, ad eadem vitia utile. Tragoriganites sit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agri concolitionibus. E napi sit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusinapi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Distamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarijs octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc vinum pectoris vitijs, & omnibus quibus marrubium. Thymi tusti & cribrati vncias centum linteolo colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra agras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum, & præcordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut purefcit locus. Simili modo è satyria vinum fit, quod eadem que thymites præstat. Sic quoque origanites ex heracleotico origano conficitur similiter cum suprascripto. Facit eadem que thymites. E calamimtha, pulegio, & abrotano vina sunt eodem quo thymites modo, profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod vrinam moueant. Fit item è conyzæ vinum, contra venenata ante alia efficax.

#### Aromatites Diosc.

Aromatites ita fit: Palma, aspalati, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactus ingentibus ofsis & in sextarios duodecim austeri musti deiectione, operculato vase, quadragesima diebus quiescere sinito: deinde ubi sæpe expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami vncia, piperis drachma septem, costi drachma dua, nardi syriaci drachma sex, cassia vncia, croci drachma quatuor, amomi drachma quinque, asari drachma quatuor: omnia simul trita & linteolo colligata in cadum musti demerguntur, & postquam vinum deseruerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrinae, horribilibus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita crasitiem extenuat: colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicæ vitijs auxiliatur.

#### Ex diuersis odoramentis facta Diosc.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tusim, inflationes, & si humor in stomacho coit: Myrrha dua drachma, piperis candidi drachma vna, iridis drachma sex, anisi drachma tres: omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex vini sextarios coniunguntur: vinum post triduum colatur, & in Legena reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnius mensura. Fit quoque, nectaries ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congijs sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; vinum factuatur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congijs mittito: post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aqua. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celtica nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vrinam ciat: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis fluestri nardi recentis & trita cribrataq; bestem, in congium musti conijcito. duos menses quiescere sinito. Vitale est hepaticis, difficili vrina, inflationibus, stomachicis.

#### Ex diuersis herbis facta Diosc.

Radici dauci contruse drachmas sex in musti amphoram imponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vulua menses pellit, ructus ciat, & vrinam: prodest tussi, ruptis, vulsisq; Salvia vncia in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tusim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnoæ: lienis crasitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aqua inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro & dulci radice consimili modo sunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congijs mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vrinam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati vncia nouem in linteolo colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat: stomachicis, & difficili vrina auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & petroselino, vina eodem modo sunt, & ad eadem efficacis. Fit & è flore salis vinum, multo ad purgandum efficacius, quam vinum: aqua marina temperatum. Fauces, vesicam,



vesicam, renes, & Stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum quod phiborion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, veratro aut scammonia, aut sylvestri cucumere, iuxta radices vitium sato, siquidem vites sibi illorum vires adsiscunt. Id vinum partus enecat: datur icuinis mulieribus, qua ante vomuerint, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelae cum suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in cistigios tres musti, & leui igne coquito, donec congi duo supersint, defecatumque, recondito. aquosa purgat excrementa. & lientem absorbit. Chameleae dum floret, cum folijs tusa & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congiugnum additur. Post duos menses vinum in vas transferitur. Aqua inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus qua a partu egre purgantur. Chamepityinum simili modo fit, ad eadem cūueniens: vinum quoque ciet. Librum radicis mandragorae concidito, segmenta lino traiecit, quod selibram aequat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad menses tres, deinde transfundito. Media portio, hemina dimidium: bibitur, passo in duplum addito. Aiuunt hominam vini congiognum istam, potu seipsum adferre: cyathus vnus cum sextario vini potus enecat: mediocri vsus eius, doloris sensum auferit: fluxiones incrassat: olfactu, potuque, & cum inditur idem praestat. In congiugnum musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito: dumque esset tuerit, in marina aqua congiognum quatuordecim aut quindecim, vbi pleniusculè fegerit, inijcito: post aliquot dies colato, & rritor. Dato cyathum vnum ex aqua balnei in potu, ad aluum soluendam, ijs qui euohuerunt a cana. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iunci odorati vncias duodecim, spica Syriae vncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septem vini Coisextarios, diebus quadraginta macerandas indito postmodum colato, dabis in potu sesquibemina. Aliter: Decocta marina aqua ex alto petita sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die, quam madeseceri, colato, & rritor. Alia ratio: Veratri drachmas duodecim, & aphroniti quaternas, in senis musti sextarijs diebus quinisdenis macerato, max colato: & semestri exacto, rritor. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut vnas in sole siccatas imposito in musti metreta (implet autem metreta congiognum duodecim) & gypsum in vinum mittito podo drachmarum viginti, & biduo residere finito, conijcito veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhae & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutas. Purgat a partu, & abortu feminas: fetus extrahit, contra strangulatus vuluae efficax. Scammonites sic fit. Radicis scammonia per menses effusa trita, & linteo colligata drachmas quing, in musti congiugnum mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

#### Vini spiritus Chimistarum.

Quidam vini fortissimi non adulterati libras duodecim ampullae indunt, & per vas refrigerato. G. Alderna. rium, vulgari modo destillant, vique dum vini efficacia imminuat: tunc amoto vase quod excipit vinum distillatum vitro amplo recondunt diligentissimè, ne quid expirer, & in aquam calidam ponunt, sinuntque: ebullire per dies octo: postea in vapore balnei spiritum vini subtilissimum extillant. In hoc autem opere tria notari debent: primò ne vas in quo vinum digeritur, altius aquae calidae imponatur quam vinum appareat: secundo, vt commissurae luto optimè circumlinantur: tertio vt spiritus inter destillandum rectè separentur a vino, caloreque moderato euocentur.

Porro idem vinum alcalizatum, vt vocant, parant: dum aquosam materiam ex distillatione vini vinum Alrelictum, exhalare sinunt ad succum faculentum vsque: hunc deinde probè exiccant, conteruntque, & calizatum, igne vehementi in calcem albam redigunt, quam sal vini appellant: Postea spiritus vini 3. duas salis eius semunciam miscent, induntque ampullae: hanc diligenter oclusam per dies 24. in cineribus sinunt. Sal vini. Mox ex iisdem primò lento, deinde fortissimo igne educunt: postea salem relictum iterum exurunt, conteruntque, & spiritui vini imbuunt, digerunt, euocantque vt prius, atque hunc laborem toties reiterant, donec sal per operculum extillat: sic nobilissimū vini spiritum alcalizatū prouenire aiunt, ad rerum colores extrahendos magisterium.

Vel, Vini rubri valentissimi, vt Hispanici, aut Alfatī i, aut alterius similis libras octo pellicano, aut ampullae vitreae satis ample infunduntur, & vase diligenter obturato, macerantur in fimo equino, vel aqua moderatè calida diebus triginta: tunc oleosus liquor phlegmati innatare videbitur: qui igne lento in ampulla frigidiusculè tandiu separatur, donec oleosum illud, tenue ac purum, vel spiritus vini vegetabilis a summitate operculi emanare defierit. Hic postea rursus in aqua calida digeritur per dies viginti quatuor: atque sic 6. libra vini emergit essentiae scrupulus, verum ad vitam producendam praesidium. Ex hoc vini liquore subtilissimo essentiae hinc unctiones rerum, & aquae vitae parantur, dum stirpium plantae & odora menta, nec non metalla, aliaque terrae fossilia praeparata in illo macerantur, liquantur, extrahuntur, destillanturque.

#### Liquor Tartari.



Pulueris Tartari vini albi exiccati lib. quatuor ampullae incuruatae, vel erectae argilla obductae induuntur. haec in fornacem locatur, & vase quod excipit amplo appposito inuncta luto ocluduntur. Facile enim expirare solet. Postea igne paulatim auctiore vrgetur, donec nulli amplius spiritus appareant. Tunc refrigeratis vasis liquor eximitur: infunditurque ampullae vitreae erectae, & in balneo calente corrigitur, separaturque aqua ab oleo.

Vini spiritus  
praequantur.

Paracelsus.

ASCLEPIAS. Belg. Swaluwe wortele.  
 Germ. Schwalbenwurtz. id est hirundinaria.  
 Ital. Vincetossico. Advers. 278.

ASCLEPIAS altera flore nigro.



ASCLEPIAS altera flore nigro.

Est & aliud Vicerotoxicū in agri MonsPELLIENSIS collibus Frontignan vicinis & Belgij viridarijs, quod à floribus colore pullo, nonnihil purpurante, minimè albo uti alterius, nigrum vocatur. Cauliculis flexuosis ternariis & quaternariis cubitorum, proxima quavis fulera Periplocae æmulatione, quam etiam quia refert, Periplocam minorem fecerunt, scādendo ambit. cætera priori similia. succo pallido turget.

Diosc. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia adversus vulnè mammarumque vlcera, quæ cacoëthe vocant, illinuntur.

Nullum eius periculum fecisse se testatur Gal.

Fuchsio & recentioribus Asclepias menses ducit, hydropicis auxiliatur; canis rabidi moribus venenifq; resistit. Illita sordida purgat vlcera, & ad cicatricem perducit. miscetur antidotis.

APOCYNVM. PERIPLOCA Græcæ.

Apocynum Guilandini, Mart. & Italorum. Cynocranibe Gal. & Cynomorus, quia canes celerrimè interimit, sicut Lycostonon lupos. Advers. 279.

Diosc. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras cunctas in cibo data, & proxi-

Gal. Hominibus venenum est, herba multum grauiter olens: proinde omnino calida est non infrenuè; non tamen proportionè desiccata. Itaque illius admodum digerentis est facultatis.





PERIPLOCA  
sarpentaria  
guilfordia  
Advert.  
Pag 279.



PERICLY-  
MENON  
perfoliatum  
calidarium  
regionum.  
H. P. Macle  
y lva.  
Advert. 280.

## PERICLYMENON.

**Diosc.** Huius semen postquam maturuit, collectum & in vinbra secdum drachma pos. dere detur in vino, quadragenis diebus, lienei absumit, laetudinem discit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. orthopneæ, & singultui prodest. partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita. quatericenis septenis diebus epota, sterilitatem & facere produntur. perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.



† Gal. tum fructus, tum folia adeo vehementer incidentis & exsiccantis facit, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant. Competens portionis mensura est scrupulus unius pondus cum vino.

Rondelletius ad partus facilitandos & accelerandos Periclymeni vsum reuocauit: mandauitq; aquæ stillatitiæ ex pulueris seminis Lauendulæ descripti à fescuinia ad duas 3 & tres.

*Belgis hortense est ob floris suauitatem, qui totam æstatem perdurat.*

**PERICLYMENON non persiliatum.**  
Aduers. pag. 280.

**Allobrogum PERICLYMENON. Xylosteon Dod.**  
Aduers. pag. 280.




**SESELI Aethiopicum. Aduers. pag. 281.**

**Diosc.** Semine amaro, Massiliensi odoratiore, & aciore, multum suauis. Hinc colligere est esse ad omnia præstantius quouis Sesele. Pete plura in Sesele Massiliensi.



CAPPARIS folio acuto. Belg. Cappers.  
Aduers. pag. 282.

CAPPARIS retuso folio variat.  
Aduers. pag. 282.



**Diosc.** Caulis & fructus cibi gratia condiuntur. Aluum turbat: stomacho aduersatur: sitim gignit. Cocta tamen stomacho quam cruda, vilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lenem absumit, & urinam cruentamq; excrementum emittit. Bibitur vtilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione; item ruptis & conuulsis. Menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat: semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit. Vlcera omnia vetera & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demossa, dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, virilgines albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutiunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat. Aphrica & præsertim Maritima capparim, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Libyco, & quæ rubro mari desertur, mirum in modum acris est: si quidem in ore pustulas excitat, gingivisq; ossæ tenui exest; quare in cibis non abs re damniatur.

Idem Gal. eadem Gal. & ex capite detrahit, quod ἀποσπῆματιζεν vocant. Gal. prædictarum qualitarum ratione. Illa exterget, nec segniter delicat. Gal. eadem Gal. amaritudine sua. Gal.

Gal. Capparim radicis cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam; ex quo liquet quòd diuersis, pugnantibusq; confert facultatibus: quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: excalfacere, incidere, digerere, acrimonia: porro contrahere, densare, costringere, acerbitate: quapropter lienes induratos, si quid aliud, hoc medicamentum iuuare valet, tum foris idoneis illinendis remedijs admistum, tum intro in corpus assumptum, siue decoctum in aceto, aut oxymelite, & id genus, siue aridum contusum, illisque permixtum: quippe cum aperitè crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum euacuet; nec eos tantum per vrinas, sed & per ventrem sæpe etiam sanguinolentos defert; vnde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolores.

CIL.


**CLEMATIS DAPHNOIDES: an Centunculus Plinij?**

Angl. Peruincia, Gal. Peruenche, Gallobelgi Van-  
che & pucelage, Flandris Wincoz de Brab. Maech-  
den palm & ingroen. Germ. Fugrun & Zpn-  
grun. Hisp. Peruinqua. Ital. Peruinca.

**CLEMATIS, siue PERVINCA Meier.**

Advers. pag. 432.

lege sim. 27.  
capiti aptata.



**Diosc.** Caules ac folia in vino pota, alui profluvia & dysenterias finiunt. Vteri \* dolores cum lacte & rosaceo aut Cyprino, in pessio subditi, sanant. Commanducata dentium † dolorem mitigant. \* Venenatorum moribus imposita profunt. Fertur etiam contra aspidum morsus cum aceto pota auxiliari.

Gal. Daphnoides Clematis, nequaquam exulceratorium est, aut acre, sicut quod ante dictum est; imo profluuijs ac dysenterijs cum vino potum prodest. tantum abest vt perinde vrat aut viceret, ceu illud superius.

Aegin. Siccandi virtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhoeam dicunt, intestinorum tormina, & dentium dolores finit.

Menstruis albis sistendis vtebatur Rondelletius.

Plin. lib. 24. cap. 15. Centunculi est egregius effectus ad sistendam aluum in vino austero. Item sanguinem sistit tritus cum oxymelite; aut aquæ calidæ cyathis quinque denarij vnus pondere. & ad secundas mulierum efficax. vulnera glutinat, vrinas ciet.

Daphnoides **POLYFLORA CLEMATIS purpureo rubens.**

Peramæna florû duplicatione & incremento, coloris purpureo rubentis, in Belgij hortis variat hæc.

**VISCVM.**



VISCUM. Hiss. Ligay Liria. Lusit. Visc.

lege POLYGONATVM. Angl. Adonis vernalis.  
Advers. pag. 283.

**Diosc.** Viscum optimum est recens, inius porraceum, extrà solum, quod asperi nihil, aut furfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxo fructu folio. comsum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiunt: gignitur quoque in malo, pyro, & pterisq; alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fructuum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. paroidia, tubercula, ceterasque collectiones, ad maturacionem perducit. cum resina autem & cera pari, epinyctidas in splenio sanat. vetera viscera abscessusque quos caecothibes vocant, ex thure mollit. lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum & impositum absmit. cum sandaracha, aut auripigmento illitum, vngues extrahit. mistum cum calce & vini sace, suam vim intendit.

**Gal.** Viscum ex plurima aëria & aquea, paucissima terrenâ substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiæ respondent. Siquidem ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus admoda exalfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut Thapsia: Sed & supra hoc comonuius inesse calidis facultate medicamentis, vbi largum continent humorem excrementitium.

**Aegin.** Calefacit cum acrimonia, humores ex alto validè elicit, & Thapsiæ modo discutit, hac tamen multò est ignavius.

## POLYGONATVM.

**Diosc.** Radix vulneribus efficaciter illinitur; quin etiam maculas in facie delet.  
Stillatitius aqua hodie quoque mulieres Italæ faciem fucant, absterguntque.

Eadē Græ.

POLY-

POLYGONATO affinis planta fortè LAVRVS ALEXANDRINA.

Nullus est paulo exercitator quilibet percepto Polygonato maiori aut Hippoglossò, non opinetur hanc esse è ce ista Polygonati aut Lauri Alexandrinæ: folijs Myrti maioris æmulis ortu & positu, in cauliculo sesquipalmari, Polygonati, Belgij opera Clusij inquilina, vbi nondum floruit.

RVSCVS. *Exuropisim.* Centronirini Theoph. Angul.  
Angl. etiam Kuehult, & Kuehulme, Detigert.  
Aduers. pag. 283.

HIPPOGLOSSON Bonifac. Angl. etiam  
Bois tonge. Aduers. pag. 284. & 284.



Diosc. Radice graminis simili, acerbæ, & subamaræ. Folia & bacca in vino potæ urinam ciunt. menses pellunt. v. fca calculos frangunt. stillicidio urina melentur. dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitiis locis nascitur. Decoctum radice in vino potum, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes. asparagorum vice, in cibo sumuntur. amari autem sunt, sed urinam mouent.

HIPPOGLOSSON.

Diosc. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malaginata radix, succusq; admiscetur.

LAVRVS ALEXANDRINA.

Aduers. pag. 283.

Diosc. Difficiles partus accipiat, radice pota sec. machinarum ponere in vino dulci. & stillicidio urina au- cadē  
siliatur. sed sanguinem extrahit. sc. Pl.



CYCVMIS esculentus. Hisp. Cogombro.  
Ital. Cocomero. Advers. 285.

CYCVMIS esculentus.

Diosc. Satius cucumis alio & stomacho per quā  
utilis habetur. Refrigerat \* qui corruptionem non sentit.  
Vesica prodest. Olfactu renovat, quos animus liquerit. Se-  
men † modicē urinam movet cum lacte aut passō. Vesica  
exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus  
canum sanant: & epinyctidas cum melle.

\* & humectat secundo ordine Aegin.


† Aegin. & Gal. Semen abstergendi inci-  
dendique virtute præditum. urinas movet & cor-  
pus mīdum efficit. Aridus siccatur primo ordine,  
vehementiusque abstergit, & semen & radix.



CYCVMIS Anguinus flexuosus fœ.  
Advers. pag. 285.



MELŌ vulgi, sine MELŌPEPO Dioscor. Ital. Mellone & Pepene.  
Hisp. Melon. Aduers. pag. 236.



## PEPO.

Diosc. Peponis caro in cibis vitiata cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra aduersionem infantium quam hriasm vocant, sinuipiti imponuntur. Fronti admota oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine adiecta farina, siccatus in sole coquitur in smegmata, quae faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca & ex hydromelite pota, drachma pondere, vomitionem mouet: si quisquam moderate secundum eam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque, illita cum melle vlcera concreta in modum fusi, quae ceria vocant.

CITRVLVS Officinarum. Germ. Citrullen. Aduers. 236.  
Cucumer Citrulus Euchs. Anguria Matth. & Ital.





OBSERVATIONES.

PEPO oblongus vulgarissimus. Ang. Gourd. Belg. Depoenten.  
Germ. Pfschen. Aduers. 286.

365



PEPO maximus Indicus compressus. Aduers. 286.



magnitudi-  
dine à stu-  
perioribus  
differt, fru-  
ctus aut  
interdum  
80. libras  
p. m. tr. &  
foliarotū-  
diota.

PEPO rotundus compressus Melonis effigie.  
Aduers. pag. 286.



z f

CVCV.



CUCURBITA, siue ZYCCHA omnium maxima  
anguina. Angl. Gourd. Aduers. 287.

CUCURBITA ligenaria.  
Aduers. pag. 287.



**Diosc.** Cucurbita esui apta: Cruda trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriasim vocant, in fucipite illununtur. Oculorum inflammationes, podagraq; refrigerant. Succus è ramentis tustis, per se aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis in ardenti febre illitu inuat. Totius seruesacta & expressa succus, cum melle exiguo & niropotus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub dio teneatur, poru aluum leuigabit.

† Gal. aurium doloribus cum phlegmone. Comestia humida est, & sitim arcet: Cruda cibo infuavis est, stomacho perniciofa, & cocta planè inexpugnabilis, aded vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam compellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore ventriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euertet, & ad vomitionem concitabit, quæ vna eum ab vrgentibus symptomatibus liberare potest. Hanc igitur, aliaque ex fugacibus complura, aut mox quam elixata est, aut frictam in sartagine, aut assam omnes homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est, humidum frigidumque corpori alimentum præbet, ac id ipsum ea de causa & exiguum, sed leniter per aluum subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob communium omnium humidorum ciborum rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè infeliciter concoquitur, modò non auertat eadē corruptione.

Plin. Valerianus subdit.

Fuchs.

Cinis aridæ corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerem didicimus ab expertis vulnera in veretro, iam in putredinem versa purgare, & ad cicatricem vsque perducere. Semi ni sicco illa vis traditur, vt in puluerem tustum & inspersum impleat vulnera quæ cavata sunt. Quidam illud in vino bibendum dedere, vt solutiones alui fluentis inhiheret. Vtricula quoque Cucurbitæ iam fenescentes cum passo & aceto dysentericis datæ, miro modo sanctia intestina componunt.

Aegin. Colocyntha Cucurbita frigidi, humidique in secundo abscessu temperamenti est. SETHVS addit.] Pituitosos lædit, colicosq; affectus; si malos humores assurgunt, ab ijs corrumpitur & malum succum generat. Semen genitale minuit, & Veneris appetentiam extinguit. Sanguis ex ea procreatus, consistentia tenuis est. Thoraci, pulmmoni & vesicæ prodest.

COLO-



COLOCYNTHIS. Gal. Coloquinte & Courge  
sauuage. Hisp. & Ital. Coloquintida.  
Aduers. pag. 287.

COLOCYNTHIS pyriformis.  
Aduers. 287.



ex dulco-  
rauit lin 6.  
pag 288.

**Diosc.** Emittit fructum in speciem mediocris pile conglomeratum; vehementer amarum, quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatorium vim habet, si quatuor oboli cū aqua mulsa, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in cataportum. Arefacta pile teruntur, & infusa chysteribus prosunt nervorum resolutioni, coxendicū doloribus, & coli vitijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. satius a timore enecant. dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto & nitro inferuefeat, hoc quæ iure decocti dentes colluantur. si aqua mulsa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuino refrigescat, poru crassum humorem & strigmenta alui detrahet. stomacho supra modum aduersatur. subdita ex ea balni, alui excrementa eiciuntur. Virentis succo vitilissimè ischiadici persficantur.

Gal. gustu amara est. Sed quæ illi amaritudinis dum potatur adsunt opera, ea euidenter efficere nequit ob purgatorium facultatem, quam validam in se continet: nimirum cum ijs quæ expurgant, antè & ipsi per aluum excerni præuertens.

\* Plin. Intestinatorum omnibus vitijs clysteribus infusa, & renum & lumborum, & paralyfi eie-Eadem Gal. eto semine medetur. Carnes eius cum absinthio & sale dentium dolorem tollunt. Succus verò cum Aegina. aceto calefactus mobiles sistit.

CUCUMER Elaterij syl. *elaterij* & *elaterij*. Hiss. Cogombrillos amargos.  
Ital. Cocomero saluatico. Aduers. 288.  
Cucumis Asiaticus Officinarius.



Diosc. Infiltratus foliorum succus, amicum dolori  
conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumore  
discutit. imposita cum resina terebinthina, tubercula rum-  
pit. ischiadici infunditur. podagras discutit, decocta ex a-  
ceto, & illita. eius decocto dentes in dolore colluuntur. ari-  
da farina impetiginem, lepras, & vitiligines absterget.  
nigri cicatricibus colorem reddit. & in facie maculas ex-  
purgat. Radicis succus se squiboli pondere, & item cortex,  
acetabuli quatuor parte, bilem pituitaque deiciunt, pra-  
sertim in hydropicis. deiectiones autem citra stomachi in-  
iuriam mouet. radicis se libra, in vini praesertim Libyci be-  
minia conteritur, dantiurque ex eoterni cyathi triduo, dum  
tumor abunde deprimi cernatur.

Gal. Radicis succus, vt & foliorum, licet ela-  
terio vim similem habeat, imbecillior tamen.  
Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet.  
Abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro  
cortex ea potentius desiccatur.

#### ELATERIVM. Aduers. pag. 288.

Diosc. Abimatu ad decem annos deiectionibus vtile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pue-  
ris, chalcis duo. siquidem copiosius periculum adfert. Bilem ac pituitam vtriusque parte extrahit. optima suspiriosis est  
purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij, quod colorare sufficiat, ex aqua, erui  
magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aquae tepidae sorbeat. ad citandas tamen vomitiones aqua diluens  
elaterium, subiectas linguae partes penitus pinna oblinito. quod si quisquam difficilis euomat, oleo aut vnguento  
irino resoluito. somnum inhibeto. porro his qui eximie vacuantur, continue vinum & oleum dari conuenit. etenim vo-  
mendo restituantur. quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum den-  
sando corroborant, offerenda sunt. Ciet \* elaterium menses. partus† enecat, in pello subditum. morbo regio \* mede-  
tur, cum lacte naribus infusum. diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissime anginis illinitur, cum vetere oleo, mel-  
le, aut felle taurino. \* cadē \* cadē

† partus enecat. Gal. ceu alia omnia amara & subtiliū partium, maximè si quam habeant caliditatem,  
velut nimirum Elaterium. summè siquidem amarum est, leuiter calidum; vt ex secundo sit ordine ex-  
calfaciendum: Porro tale protinus quoque digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes  
inungunt quidam cum melle aut oleo vetere.



BATATA Hispanorum, siue Camotes aut Amotes. *Aduers. pag. 317.*



Foliis scabris & reptantibus multis Cucumeris asinini æmulis cauliculis. Radices in taleolas dissectæ multis Baticæ maritimis locis hodie panguntur, vt fidus testis est C. Clusius,




BALSAMINA cucumerina punicea.  
MOMORDICA. *Aduers. pag. 289.*  
*Germ.* Balsam kraut. *Gal* Pommes de merueilles.  
*Ital.* Caranzi, Viticella, & Balsamina.

Colico dolori leniēdo, pota efficacissimè mederi fertur. Mordaces vellicationes & partus dolores finit. Dente demorsa, eius dolores tollit. Thoracis sanat vlcera: Ruptis, cæcis vtiliter illinitur. Hæmorrhoidibus imposita subuenit: conuulsionibus & neruorum malis auxiliatur.

*Doronicum  
annuus offici-  
narum. Ad-  
vers. pa 299,  
& 285.*



*Doronici ter-  
restris.*



D  
bra  
die  
for  
ri  
ue

Goff  
sue X



**DORONICI** tertij varietus. *Advers. pag. 290. Aconitum Pardalianches* Dod.

Huius tamen sapius radices Ioannes de Vroede rizotoimus sine noxa vlloue percepto incommode impunè deuorauit, quamuis canibus perniciosum prodatur.

**GOSSYPIUM**, siue *Xylon*. *Advers. 291. Hisp. Algodon. Ἀλδορ ἁποκόπον* Guilandino.

**MALVA** vulgaris procerior. *Hisp. & Ital. Malua. Advers. pag. 292.*

**MALVA** sylvestris repens pumila. *Advers. pag. 292.*



**Dioscor.** Esui aptior hortensis mallo quam sylvestris stomacho noxia. Aluum bonam efficit, praesertim can-  
les, intestinis\* & vesica viles. Folia cruda illa, & cum modico sale addito melle commanucata, egyplos sanant.  
Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale viuendum est. Contra<sup>b</sup> apum vesp arumq, iclus illa prodest. Et si cruda tri-  
taq, cum oleo antea se inmixerit aliquis, nō feritur. Acherus suosq, cū vrina illa sanat. Sacris<sup>c</sup> in nibus & ambustis  
decocta folia tritaq, vtiliter cum oleo imponantur. Eius decoctum<sup>d</sup> vuluas in sectione mollit. Prodest erosionibus intesti-  
norum, vuluas sedisq, clystere infusum. Ius decoctae cum radice sua omnibus lethalius venenis auxiliatur, si continuo à  
bibentibus reuocatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac praeclarat. Semen eius admisto loti sylvestris semi-  
ne potum cum vino, vesicae dolores lenit.

**Gal.** Malua, agrestis quidem, digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis: hortensis  
verò, quanto plus habet aquae humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto validior  
est, quanto & siccior. Gal. simplic.  
medic. lib 7.

Modicè refrigerat, & quasi tepidum quendam calorem obtinet: facile hoc olus deorsum labitur,  
non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum. Gal. 2 de ali-  
mentorum  
facult.

**Plin.** <sup>d</sup> Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Tensismo & dys-  
entericis vtilissimè infunditur: item sedis viciis, vel si foreatur. Melancholicis quoque succus datur  
cyathis ternis tepidus, & infanientibus quaternis. Decocta comitialibus heminae succi. Hic & calcu-  
losi, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Succus decoctae  
porri meatus suauis facit.

\* <sup>e</sup> Sethus: Vesicam, thoracem, pulmonesq, iuuat, & raucam vocem lenit syl. Malua. Decoctum  
potum lapides conterit, frimum conciliat, faciemque partum praestat, si mulier ea crebrius vtatur. Ea  
quae indurata sunt, emollit.

*MALVA cristatis oris, vulgò Malva crispa.*

Vetante Maluam æmulatur; sed foliorum oræ  
fimbriis & plicis valdequam elegâtes: caulis assur-  
git ad quaternos, quinos, senos, & interdum denos  
cubitos, multis ramulis diuisus, copiosis flosculis  
pallidis & semine onustis.

*MALVA Rosea fruticosa.*

*Aduers. pag. 293.*

Flore simpliciore.

*MALVA Rosea multiplex.*

*Aduers. pag. 293.*



ALTHÆA. Aduers. pag. 293.

Hisp. yerua Cannanera, & Matmaic, & Maluauisco.  
Ital. Maluauischio.

ALTHÆA arborescens C. Clusij.



**Dioscor.** Decocta in vino aut aqua mulsa & per se cum imponitur tusa, efficax est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores. siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinae, ut malagmati lentor fiat, facit ad vulvae inflammationes, praeclosuresq; in pestu subdita. decoctum eodem fungitur mungere. onera vulvae, reliqua q; a partu extrahit. decocta succus ex vino potus, succurrit vrinae difficultati, calculosorum cruditatibus, dysenterici, ischiadicis, tremulis, rupris. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta colluto inde ore. Viride semen si cum trium, virilignes in sole perunctas emendat. eodem cum oleo & aceto peruncti, a venenatis non feruntur. valet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium, in posca aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, simuliumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morfib; & igni ambustis illinantur. Constat aquam, tria radice addita, sub diuo addensari.

Eade n ferè Gal. & Aegin. Eius vis discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata concoquit. Radix verò & semen reliqua sanè intensa habet; verùm exterit vitilignes abstergitque, praecipue autem semen calculos quoque confringit. <sup>1</sup> Exterforia vi Gal. <sup>2</sup> Gal. radice decoctum dysenteriae, alui profluuii & sanguinis reiectioni vile est, nempe cum astringentem quãdam facultatem possideat.

**ANADENDROMALACHE** Gal. Porro huius generis est & ea quæ Anadendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo appellatur etiam Althæa.

**Varietas.** Frutescit Bismalua, hominisque proceritatem assequitur. In D. Brancionis vireto amœnissimò & ditissimò Hispano semine facta. Tota facie cæteroque cum nostrate eadem.

ALTHÆA frutex Clusij.

Hanc sanè eandem existimo cum althæa arborecente descripta in Aduersariis nostris, quæ à me fata Londini in horto Morgani pharmacopœi peritissimi & optimi, in arboris æmulationem assurrexerit.

Aa 3

ALCEA

Althæa alia  
Clusij.

Luteis florib.  
ALTHAEA.



Alcea folio-  
qua.



ALTHAEA palustris Citini flore. Aduers. pag. 294.  
Alibaa hortensis Dod. Sida Theophr. tamen preior  
hec palustris planta.

Sida enim Theophrasto capita papaueris fert &  
lacustris est planta.

Luteis floribus ALTHAEA, an Theophr. IBISCUS,  
& Auicenna ABUTILON?  
Aduers. pag. 294. & 295.

Vulgaris ALCEA. Aduers. pag. 295.



DIOSCOR. Alcearadices in vino aut aqua pota, Aegin  
dysemericu, ruptuq, medentur.

Fruticosior ALCEA. Aduers. pag. 295.  
Cannabis syl. Diosc. Mutua.

ALCEA peregrina solisqua. Aduers. pag. 298.  
Alcea Veneta Triagi, & Vesicaria Dod.  
Perperan Hypericum Matth.

SABDARIFFA



## SABDARIFFA.

Huc spectat peregrinus & noua planta, quam quidam Sabdariffam vocat. In cultissimo & stirpiū ditissimo vireto D. Ioannis Brancioni, flores Side, Alceæ peregrinæ ferè concolores & similes, ex luteo cinereo obsoletos; sed maiores, cauli singulari, alis donato, quinos & senos cubitos alto, insidentes, atro sanguineo medium cingente, protulit. Eius item folia Maluam adultam propius æmulantur, sapore prorsus Oxalidis. Caulis hominis proceritatem adipiscitur.



GERANIUM Robertianum. Aduers. pag. 96.  
Herba Roberti. Ger. Gubrecht's kraut. Dhat  
ten kraut. Belgicæ, Robert's crup. Angliæ,  
Herb Robert.



Tertia Robertiani Geranii varietas est Syderitis Achilleæ  
Diosc. Panax Heracleum Angul. Belg. Bloet wort-  
tele. & Geranium Hemarodes. Angl. Pinch needle,  
& neldre. Gal. bec de Gru. Lusit. & Hisp. Pico  
de Gru.

Dioscor. Syderitin aliam esse tradunt, quam  
Crataegus Heracleam vocat, in maceris & vineis nascentem  
foliis Coriani, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis,  
leuibus, teneris, in rubore cæcis. Aribus: flore purpureo,  
paruo, gustati amaro & lento. Huius ea vis est, ut quamuis  
recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.


## MYRRHIDA.



MYRRHIDA Plin. Aduers. pag. 296.  
Rostrum Ciconia seu acus Moschata.

PES COLUMBINVS, seu Diosc. alterum  
GERANIVM. Aduers. pag. 296.  
Belg. Duppenboet. Germ. Taubenfuß.  
Gal. Pied de pigeon.

Geranium  
Batrachioi-  
des.



Nephriticis, & vulnere sauciatis medetur. urinas  
mouet potum & impositum.

GERANIVM BATRACHIOIDES, siue Gratia  
Dei. Aduers. pag. 296. 297. Germ. & Belg. Gottes  
genade, & blau botterblommen. i. Batrachium  
caeruleum.

GERANIVM BATRACHIOIDES alterum  
longius radicum.

Alterum verò Geranium Batrachioidi cognatum  
prolixioris serpit, flexibus variis in obliquum &  
cespite summo sparsa radice, rufescente, subtus fi-  
brata, geniculata & odorata, digitum paruum cras-  
sitie æquante. Folia Saniculæ rotundiora aut Ge-  
ranij Batrachioidis, albida, nonnihil incana: pedi-  
culi, & flosculi purpurouiolacei alterius minores.  
Angliæ & Belgij hortis inquilina.

GERANIVM



GERANIUM fuscum flore liuido purpurante,  
& medio candicante.

GERANIUM BULBOSUM Diosc. primum.  
Aduers. pag. 297.



lege folio  
multiparti-  
to.

lege lin. 20.  
obuium.  
hortis Bel-  
gicis inquil-  
num.

Saniculam item & Geranium longius radicatum vultu æmulatur, sed folia maiora maculis fuscis pullisq; nonnullis nigricantia. Ineunte æstate valdequam eleganti flore phæo liuidoq; purpurante, medio candicante, reflexo. Cauliculis pedali bus aliquam multis exilibus alis donatis fruticat, & propagines fundit è radice oblonga. Hoc primū vidimus & habuimus Mechliniæ beneuolentia Georgij Rije; ac deinde Liæræ & alijs locis in vrceis pensilibusq; hortis nobis repertum.

GERANIUM Creticum annuum.

Folio rubete Geranij & flore caruleo luculenta magnitudinis, semine reperto inter Di&amni Cretici fasciculos Ioanni Mutoño perbono & docto pharmacopæo ortum.

Radice reptice GERANIUM alterum.

Folia altius laciniata, circinata rotunditatis: radix repens rediuiua multis annos perfans: flos singulus in singulis dodrantalibus petiolis. Hortense est apud Belgas.

GERANIUM BULBOSUM.

Diosc. Radix drachma ponderi in vno pota vulua inflationes discutit.


Ægin. eadem. & Plin.

Plinio, bibitur contra phthysim drachmain vini cyathis tribus, bis die. Succus radicis auribus medetur. Opisthonicis semen drachmis quatuor cum pipere & Myrrha potum.

Bb

GERA-

GERANIUM  
μαλακκίδης  
Aduerl. 277.



ALCHI-  
MILLA.  
Drosum  
Cordi.



SA  
vel  
RA

Alpi  
LYBO  
Sani  
Elleb  
gri f  
Adu



## SANICULA, &amp; DIAPENSIA. Aduersf. 297.

Internis & externis vulneribus, sanguinis eruptionibus, vlceribus, dysenterijs, ruptis & vulsis auxiliatur, decocta pota & imposita.

ALCHIMILLA, *Drosum Cordi*. Aduersf. 298.

Chirurgi hanc vsurpant ad enterocelas, vulnera interna & externa ferruminanda. Admodum sicca & adstringens: ideo commendatur ad menstrua alba, & matricis pituitosos fluores, vterum adeo irrigantes, vt à concubitu semen fetus spes elabatur; conceptus præpediatur & præcludatur.

Mammas imposita contrahendo duriores & solidiores reddit Matth. & Dod.

RANUNCULUS pratensis, etiãq; hortensis reptante cauliculo. Germ. Smal;blum. Belg. Hancuhoet & Botterblummen. Hisp. Yeruabelida. Ital. Pic coruino. Herba Sclerata Apuley. Aduersf. 298.

Surrectis cauliculis pratensis RANUNCULUS.  
hortensis secundus Dodonao.  
Aduersf. pag. 298.



Varietas.

Diosc. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare vngues scabros extricant, scabiem eximunt. Stiracra delent, formicantes verrucas, & pensiles, alopeciaeque paulisper illita, tollunt. repente decocto permixtos fouentur. sicca radix, triuâque, sternutamenta citet, naribus admota, dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Eadem Plin. & Gal. omnes vehementer acrem facultatem possident.

paulisper illita. ] Gal. Nam si diutius inhæreant, non exoriatur solum cutis, sed & in crustam vritur.

Gal. vehementer exiccando frangit.

*Pratenfis RANUNCVLI varietas.*

*Aduers pag. 298.*

*Tertius fl. Dod. echinatus. Hortensis simplex Fuchf.*

*Ranunculus. POLYANTHEMOS, multiflorus sue  
holeraceus hortensis primus Fuchf. Germ. Gefulter  
hanenfutz. Belg. Lupaerts clauwen. i. pes sine vn-  
guis Leopardi. Syluestris 2<sup>o</sup>. Dod. Aduers. 299.*



*BYLBOSVS RANVCVLVS. Aduers. pag. 299.  
deme hirsuto, muricato semine. Germ. Clepner ha-  
uenfutz. Ranunculus tuberosus Dod.*

*Batrachium Apulej.*

*Multiplici floris fætuta hic paruus Ranunculus  
in hortis variat.*

*Arvi. Ad lunaticos, qui cursum Lunæ patiuntur.*

*Herba Batrachion si lunatico in ceruice ligetur  
lino rubro luna decrefcete, cum erit signum tau-  
ri vel Scorpionis parte prima, mox sanabitur.*

*Ad nigras cicatrices: herbam Batrachion Tu-  
sam cum sua radice mixto aceto impones his qui  
habent cicatrices nigras: exediteas, & similē cor-  
pori reliquo reddit colorem.*

RANVN-



*RANUNCULVS niveus polyanthos.**RANUNCULVS albus flore simplici.**Varietas.*

Pulcherrima exoticæ elegantiae planta, quæ flores latos multiplici fætu & prouentu Lieræ Belgarum Maio mense dat in hortorum delitijs summi admiratoris & humanitatis summæ clarissimi viri D. Iohannis vander Dils. folia & ortus Ranunculi albi aconiti facie.

*RANUNCULVS albus alter.*

Ibidem loci albi peramæni, sed simplicis floris, Ranunculi albi \*aconiti facie duplo maioris, & folijs minus altè diuisis, ex semine Burgundo.

*Varietas.*  
fo- \*sive Aconi-  
ti batrachoi-  
dis.

*RANUNCULVS minimus albus.*

Folij & quàm Tormentillæ minoribus; flos albus, sed rarior, qui satione in luteum mutatus est D. Dilsio.

Bb 3

RANVN-



Flammeus  
RANUNCU-  
LUS aquari-  
cus angustifolius.  
Flammula  
vulgi.  
Belg. Egel-  
hoolen. 1.  
carbo. Ad-  
vers. 299.\*



RANUNCULUS PALUSTRIS rotundiore folio.  
Ranunculus aquaticus Fuchs. sine Apium risus. Germ.  
Wasser hanenfutz. Aduers. pag. 299.  
Apium aquaticum & Ranunculus aquaticus Tragi.  
Ranunculus Sylvestris primus Dod.

ARVL. Si quis homo eam gustauerit, ridendo exanimatur. est enim caustica. Ad ulcera chironia: herbam Sceleratam tusam cum axungia sine sale impones vulneri, excomedet putredinem, & si qua fuerit sordes, expurgat: sed non diutius patiaris quam necesse est, ne & corpus sanum exeat. Si argumentum rei experiri volueris, tunde eam, & super manum sanam impone & alligato, statim rodit corpus. Ad strumas & furunculos & apostemata, ut sine ferro aperiantur: Herbam Sceleratam tusam & subactam cum fimo porcino impone strumis, furunculis & apostemaibus, intra paucas horas discuit, & pus eiecit.

RANUNCULUS aquatilis angustifolius serratus.



\*Varietas. ] Visitur hic nonnusquam iisdem natalitijs & rivulis, folijs serratis.

Pumilus



*Pumilus RANUNCULVS folijs gramineis.*  
*lege, Narbonensis Gallia pratenſibus, quatuor à Monſpelio leucis,*  
*ne quis cum D. Dodonao urbem Narbonam putet.*

**RANUNCULVS Illyricus.**

**RANUNCULVS Sanguineus multiplex.**  
*Conſtantiopolitanus D. van Eckenbeken*  
*apud Cluſium.*



Præter iam recensita Ranunculi genera, exotici duo Belgij nuper inquilinifacti sunt; quorum alter ex Illyria delatus, ex vno apice quasi nodulo Corradæ æmulatione, quamplurimas acervatim cōgestas, tanquam cirros, tuberantes Chelidonij minoris fere pares, sed oblongiores habet radices; è quibus rotundi dodrantes pedales & sesquipedales cauliculi, & folia oblongiora altè minutim filia, nō nullo tomento incana, exeunt. Flores luteo pallentes, Ranunculi pratenſis & semen racemosum, exile.

**RANUNCULVS Sanguineus multiplex.**

Merito hanc Ranunculum dixere; tantopere namque cum Ranunculis quadrat, ut illis propior sit, quam Anemones speciebus: cuius sanè elegantia captus illustris vir Carolus Rym, D. van Eckenbeken eius effigiem affabrè expressam Constantinopoli rediēs secum detulit, quam amicis & Carolo Clusio communicavit, qui eam pro solito candore omnibus rei herbariæ studiosis iconē, & his fere verbis exhibuit. Caulis pedalis in duos aut plures ramulos diviſus, quorum extremitatibus insident flores peramēni, pulcherrimo cocci colore nitentes, multiplicibus foliolis aspectu iucundissimis: folia circa radicem quina aut sena dilute viridantia, palustris & echinati Ranuncolorum media: quæ verò per caulem sunt, minora, nec adeò incisa, nec admodum frequentia: Multæ illi radices simul congestæ, Lusitanici Ranunculi radicibus persimiles, flavescentes.

**RANUN-**

RANUNCULVS LVSITANICVS.\*  
autumnalis Clusij.

Nemorosus RANUNCVLVS. Aduers. pag. 300.  
Ranunculus quartus Fuchs. lacteus & luteus.  
Anemones quinta & sexta species Dod.  
Candidus ranunculus Cordi & Tragi.

petalis  
rotundiora,  
& flores, grā-  
diores quam  
pictura.



\* Nihil habet cum Ranunculis commune, præter semina racemosa, & flores luteos in palmaribus pediculis. Folia rotundiora, rigida, rugosa, neruosa, ambitu crenata, Bugulæ latiora. Radix Illyrici ranunculi, magisq; protuberans. Ipsa bruma floret Mechliniæ in horto clarissimi viri D. Ioannis Bräcionis & D. Ioannis vander Dils. Gustanti acris vt Ranūculi genera: Olysiippone inter oliueta frequēs, & plerisque Bæticæ locis, Clusio teste.

Nemorosus RANUNCVLVS.

Hanc duplis floribus nonnunquam in Belgio meminimus:

Minimus RANUNCVLVS Septentrionalium. Muscatella Cordi.  
Aduers. pag. 300.

RANUNCVLVS Montanus Alpinus glomeratus.

Ostensis vallis, Mindinensium, Auerniæ, Germaniæ, & Helueticorum montium amans & sectatrix hæc Ranunculi aconiti facie species, cuius folia filia peramplis multisque diuisuris, Ranunculi polyanthemi aut Aconiti batrachoidis, rotundiora viridantia: luculentò flore luteo Calthæ palustris Potter blomen vulgò nuncupatæ, sed in orbem glomerato, minime expanso aut referato. Radix multum fibrata, qualis pratensis Ranunculi, aut Batrachoidis aconiti.

RANUN-





ACONITUM  
Hyemale  
Belgium.  
Ravunculus  
n onchyl-  
los, & Ane-  
mone Beno-  
nicus.



ACONITUM  
luteum Pô-  
ticum.

ACONITVM hyemale Belg. &c. lege BVLBOSA VNIFOLIA BATRACHIODES,  
 Elleboracea plantula. Aduersf. pag. 300.  
 Aconitum luteum minus Theoph. & Dod.

Radicis bulbillus initio quantus Fumariæ Plinianæ. Adultus & valde vetus, tuberculis eminet, & veluti geniculis obliquis accrescit, pluribusq; folijs donatur, vt scitè animaduertit Dod. qui perne-  
 cabile virus asserit.

## ANTHORA.

Aduersus morbos contagiosos & febres vtuntur Veneti, qui Zedoariâ & Mosi Napellum fecerunt.

Αυκοντόου. ACONITVM luteum Ponticum lupicida. Germ. Wolfswurtz.

Gall. Tue Loup. Hist. Mata Louo. Aduersf. 301.

Diosc. Radice ad luporum venationes vtuntur. Inscitè carnibus crudis, & à lupis deuorata eos enecant.

Aconitum LYCOCTONVM flore Delphinij.

LYCOCTONVM Ceruleum paruum,  
 facie Napelli.



Ob floris differentiam, Lycoctonum flore Delphinij discernūt nuperi; cui radices ternæ, quater-  
 næue Anthoræ, quasi nodulo aptæ in fibras desinentes. Caulis binum, interdum ternum cubitorū.  
 Folia altè & minutim diuisa Anthoræ vel Napelli, sed minora. Semine & siliquis non diuersis.

## LYCOCTONVM ceruleum paruum.

In Belgij hortis etiam hoc Aconiti genus aspectu iucundum, caule, folio & flore Napello proximū.  
 Sed radix bulbosa coni effigie; è cuius media basi cirri multi & fibræ tortiles exeruntur. Flos singularis  
 in petiolis cærulea purpura nitet. Caulis pedalis & sesquipedalis alis diuisus. Floret Augusto & Septē-  
 bri mensibus.

## ACONITVM minimum.

Alterius huius speciei flos item cæruleus, cauliculi spithamei: Semen & folia Aconiti lutei, omnia  
 tamen longè minora. Radix non abssimilis Aconito proximè descripto fibrillis donata. Toxica vis om-  
 nibus eadem. ætate floret.

## ACONITVM autumnale facie Napelli.

Toto vultu & paritate Napellum refert: Augusto & Septembri floret. Radix illi Napelli. Belgis  
 hortense est.





HELLEBO-  
RA-TRVM.  
Be'g. Oiera  
crust. Ad-  
uert. 303.  
Verum in  
alter. in ni-  
grum. Dod.

HELLEBORASTER innoxius flore & semine p. aghans. Sesamoides magnum Cordi, & Confiligo Ruelij. Ang. etiam  
Bret. flore.



**HELLEBORVS niger.** *Ital.* Elleboro nero. *Hisp.*  
Verdegambre nero, & yerua de vallesteros.  
*Aduers.* pag. 304.  
*Napellus Auicem.* Guiland.

**ASTRANTIA nigra.** *Aduers.* pag. 304.  
*Elleborus niger* Diosc. *Dod.* *Sanicula*  
*farmina Fuchs.*



*lege pag.*  
*Succisa*  
*do, coi*  
*albo, n*  
*hil purg*  
*tant.*

**Diosc.** Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituita<sup>q</sup>, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis, decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumpti<sup>an</sup>tur. prodest morbis comitialibus, melancholicis, infantibus, articularijs doloribus, & resolutis menses indutum trahit. partus necat. purgat fistulas impositum, & tertio die detractum, item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. scabiem sanat illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo. viriginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur. dentium dolorem collutione mitigat. erodentibus medicamentis commiscetur. hydropicorum ventri vtilissi<sup>ne</sup> imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. confectum proximè radices vinum, vinum purgandi facultate donat. Huius res par<sup>u</sup> domos expiari arbitrantur.

**Gal.** Helleborus vterq; tum albus, tum niger, exurgens est, & exca<sup>l</sup>facientis facultatis. Quamobrem ad alphos, lichenas, ploras leprasque accommodi sunt. Quinetiam niger, si in fistulam callo induram infundatur duobus tribusve diebus, callum detrah<sup>it</sup>. dentibus prodest cum aceto colluentibus. S<sup>un</sup>to autem in tertio ordine exca<sup>l</sup>facientium & desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus amarior.

*Veratri nigri extractum Chimycum.*

*G. Andem.*

Cortices corticum Veratri nigri medulla exempta, in aqua Anisi amoto oleo per horas viginti quatuor macerantur, bulliti sinuntur, dum aqua fere consumatur. Postea validè exprimuntur, colanturque: ac tandem illis cum syrupo rosaceo solutio ad spissitudinem quanta sufficit, in coctis, liquor vase



vase vitreo reponitur ad usum. Ex hoc scrupulus vel 3. dimidia datur ad humorē melancholicum expurgandum, morbosque inde ortos emolendos. Valde commendatur Veratri nigri ex aqua Anisi maceratio; dum Anisi semen ex aqua cinamomi stillatitia prius macerant; deinde super cortices radicem Veratri nigri purgatos incisosque fundunt; & in vase vitreo imbui sinunt; donec vis omnis extracta videatur; postea aqua effusa cortices sub prelo validissimè exprimunt: & succum expressum ampullæ imponunt, operculoque applicato, aquam extillant, dum ille ad iustam crassitudinē pervenerit.

## ASTRANTIA nigra.

Ellebori nigri facultates Astrantia nigra tribuit Dod. additq; Germanos medicos eius radice felici successu curasse melancholicos.

CHRISTOPHORIANA. *Advers. pag. 304.*  
*An Aſtea Plin.?*

PEONIA *femina. Germ. Peonie blumen, Sunigblum.*  
*Belg. Pionien est maestbloemen. Gal. Peuoilne, pi-*  
*uoine. Angl. Peonpe. Hisp. Peonia, Rosa del mō-*  
*te & Rosa albardera. Advers. pag. 305.\**



\* **Diosc.** *Fœminis à partu non purgatis siccat radix datur, ciet \* menses nuci \* græcæ magnitudine pota, sic vñ a eadem Gal-*  
*tris doloribus cum vino auxiliatur. valet contra regium morbum, & † renum, ac vesica dolores. decocta in b vino b austero*  
*alium sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt decem vel duodecim pota in vino austero & nigro. stomachicus & Gal. etiam*  
*erosionibus ea esse prodest. à pueris pota, inuria calculorū eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus † noctur- iecur obstu-*  
*ni, valvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. etum.*  
\* **Gal.** *radicem habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine: ac si plusculum dentibus*  
*mādas, acrimoniā item quampiam subamaram subesse percipies. proinde menses cit ex melicrato.*  
*Regium morbum & renum. ] Gal. Sed hæc efficere nara est, quā acris & subamara est: quā verò quid-*  
*dam etiam adstrictoriā obtinet, fluxiones ventris sistit.*  
*† cephalicas vocant.*

C c 3

Gal.

Gal. Est porro omnino & resiccatoria: ea propter haud desperauerim eam ex collo pueris suspensam meritò comitalem morbum sanare. Equidem vidi puellum quandoque octo totis mēsis morbo comitali liberum, ac postea forte fortuna, quum quod a collo suspensum erat decidisset, protinus denuo conuulsione correptum, rursusque suspensum in locum illius alio, inculpatè postea egressum.

Porro visum est mihi satius esse rursus id collo detrahare, certioris experientie gratia. Id cum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus; magnam receatis radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaque erat aut partes quaspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare, aut aërem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam iuuat, & melanthium frictum palam catarrhos & coryzas desiccet, si quis id in calidum lin-teum raram liger, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. At nunc Pæonia cognoscendum temperamentum est, tum exsiccativum, tum subtile esse partium; haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.


Plin. eadem ferè quæ Diosc.

*Varietas.* Albo flore diuersam ex Germania superiore nactus est D. Brancion.

*Melanthium  
desiccet ca-  
tarrhos.*

PAEONIA mas.  
Aduers. 305.

PAEONIA promiscua seu neutra. 305.  
Pæonia Fœmina prior Dod.



PAEONIA



PAEONIA *femina Polyanthos.*

Belgij hortis specioso florū incremento, qui duplicati one & fatura, vti papavera, maximum Althææ hortensis florem æquant, & interdum longè superant.

## LEONTOPETALON.

*Aduers. pag. 305.*



Diosc. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota, nec alia res celerius dolorē finit. misceatur ischiadicorum clysteribus.

Gal. Radix digerendi facultatem & exiccandi calfaciendiq; in tertio ordine possidet.

ALABASTRITES altera. Dentaria altera herbariorum. Coralloides altera Cordi.

Nobis hæc hortensis est; à superiore foliorum situ & positu duntaxat diuersa, cæterò quin nō dissimilis. Folia Valerianæ stylis suis gemino situ digesta: flos albus: radices & filiquæ non dissimiles.

DEN-



DENTARIA *puffill.* ENEAPHYLLON.

Accersendas etiam Dentarijs has duas exoticas à C. Clusio Vienna Austriæ missas, facies ortusque suadent. Vni autem folia tripartita & radix alabastrici priori quadam tenus affinia, sed longè minora.

DENTARIA *Bulbifera.*

Alteræ verò folia atrouirentia Valerianæ sylvestris positu & æmulatione parilitate alterius. è radicis cernice bulbos pullos nitidos emittit. Flores nondum vidimus. Lieræ Brabantorum studiose altitur in vrceis à C. V. Dillio.

seæ Castaneæ  
equinæ.



RICINVS. Gallis Palma Christi. Hisp. Figuera di l'inferno. Ger. Wunderbaum & zeckenholz. Grenchbaum. Belg. Molencruyt & wonderboom. Ital. Girasole. Ang. Palma Christi. Aduers. pag. 306.

Diosc. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamq; per alium extrahunt. vomitiones mouent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio. siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varicose expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt. rigentes mammæ cohibent. eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Grana saccharo condiuntur eludendis domesticis.

Gal. Semen Ricini, quod etiam purgat, extergendi & digerendi facultatem obtinet. Sic verò. & folium; sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius, tum renuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quoque digerit.



## RICINVS AMERICVS, Curat.

A doctissimo C. Clusio descripti Ricini grana dono accepi anno elapso Londini à pharimacopæo doctissimo Ioffroy Gallo; qui è Brasilijs aduectû allerebat. Pericarpio aut techâ triquetra clauduntur, cortice nigro striato cuculo Indiano ferè pari, medullosa intus nucleo, violenter infernè & supernè purgante, vel vnico assumpto nucleo. Curcas vocari testis est Clusius, qui se vidisse in Hispania ad fretum Herculeum huius Ricini plantas humanæ crassitudinis & trium hominû proceritatis, refert.

STAPHIL.



STAPHISAGRIA. *Hisp.* yerua pioenta &  
piolheyra. *Ang.* Stauis alter.  
*Aduers.* 306.

Diosc. Grana quindecim si trita in aqua mulsade-  
derit, crassa per vomitum purgant. Sed qui biberint, am-  
bulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, &  
aquam mulsam potui dare, quodd strangulationis pericula  
inferant, & fauces deurant. Trita eadē, & ex oleo inun-  
cta, pediculationi, prurigini & scabiei auxiliatur. Pluri-  
mam cir pituitam commanducata. Decocta in aceto, den-  
tium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingarum rheu-  
matismum sistit. Vlcera oris, aphthas nominant, cum  
melle sanat. Misceatur praeterea vrentibus malignis.

Ea dem fere  
Plin.

Gal. Vehementer acré obtinet facultatem, adeo  
vt ex capite purget pituitam, abstergatque valen-  
ter. Itaque ad scabiem accommodata est. Sed &  
vrendi vim aliquam habet.

Pediculationi. Plin. Haec quidem in aceto deco-  
cta, etiam vestes eo tædio liberat.

QUINQUEFOLIUM sine Pentaphyllum vulg.ve.  
*Germ.* Funffingerkraut & Funfblat Belg. *Diss.*  
ningerkrup Gal. Quintefueille, *Hisp.* Cinco en  
rama. *Ital.* Cinquefoglio. *Angl.* Cinkfolp &  
spue fingere grassle. *Aduers.* pag. 306.



Dd

QVIN.

## QUINQUEFOLIUM. Pentaphyllum.

**Diosc.** Plurimis pollet remedijs. ius radicis decocta ad tertias, si in ore contineatur, acenium dolores sedat. putrida oris vlcera, collutione sistit. arteria scabritas, gargarizatu laeuat. contra alui profluuium, & dysenterias auxiliatur. item articularum coxendicium, cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita serpentis vlcera cohibet. strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit. ignes sacros, reduuiss, condylomata, psorasq; sanat. Tenuia radicis succus contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest. item aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana verò, ternum: in quotidiana, vnius. ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. illia cum melle & sale, tam vulneribus quam fistulis remedio sunt. enterocelici auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profluuium & poru & illius sistit. ad expiationes, lustrationesq; sanguinis profluuium & castimonias inciditur.

\* decoctis in lacte radicibus & poris ad dysentericos deploratos Quinquefolium laudant.

\* eadem Plin. fistulis quae omni parte serpunt Plin. \* eadem Plin. \* Plin. Decoctum ad tertias in vino ictericis dari atque illini vtilissimum est.

Gal. radix desiccatur vehementer, minimum verò actis est, quare in multo est vsu, velut alia quoque omnia, quae cum sint tenuium partium, citra morsum desiccant. Est enim desiccatoria ex tertio quodammodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis.

**Aepul.** Ad vitia artuum si percussi fuerint: herba Quinquefolij tusa cum axungia vetere sine sale & imposita sanabit. Ad ventris dolorem: Quinquefolij succum dabis bibere cochlearia duo, sine mora dolorem tollit. Ad cancrum excicandum: herbam Quinquefolium cum vino & cum adipe suilla vetere sine sale pisatam de ligno in lignum vino sanè veteri asperges, & sic impones, rem vnicam experieris. herba Quinquefolium trita & cum oleo mixta pedes perunges, tertio die tollit pedum dolorem.

Articulos expurgat vt Hermodactylus.

## PENTAPHYLLVM petræum Mutoni.

Minus longè est vulgato Pentaphyllo; flos luteolus, & folia auersa parte albida. Cautibus Tornaco proximis frequens & lubens oritur.

PENTAPHYLLVM supinum Tormentilla facie. EUPATORIUM Graecorum. Agrimonia officinarum. Aduers. pag. 308.





PENTAPHYLLVM *supinum*.

Pentaphylleo generi facie cognatum est: medium enim est inter Tormentillam Pentaphyllon & Potentillam, quod primum nactus sum in horto cultissimo Coldenbergij nostri. Flosculos luteo palentes, summa folia, caducos coliculos, & radicem Pentaphylli habet, sed folia ima atrouirentia in longo pediculo aptatur Argentinae siue Potentillae emulatione: fructus autem Fragariae sterilis similis.

EUPATORIUM *Gracorum*.

Diosc. Contrita huius folia, & cum veteri suillo adipe imposita, vlceribus difficile cicatrice contrahentibus medentur. Semen aut herba in vino pota, dysentericis, iecinorosis, & serpentium moribus auxiliatur. • Eadem r

Gal. Herba ipsa tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructionsiecoris expurgat, Inest iudem ei & adstrictio quaedam per quam robur visceri addit.

ARGENTINA. *Aduers. pag. 308.*  
*Anserina Tragi.*

TORMENTILLA an *Chrysogonum Diosc.?*  
*Aduers. pag. 308.*



Potu & illitu alba profluua sistit. *Subdit Trag.* Herba vino decocta & pota torminibus & docti dolore laborantibus subuenit. adstringit.

TORMENTILLA an *Chrysogonum Diosc.?*

Quinquefolij viribus proxima. Vulneribus ferruminandis, fistulis, dysentericis, febre correptis, epidemicis, & pestiferis morbis conuenit. Ius radices & foliorum sudores elicit, Dodongo teste, itaque a corde virus propellit. Pulmones & hepar infarctis liberat. Regio morbo medetur. Muliebria & sanguinis profluua potu & illitu sistit. Ad oris vlcera decoquitur. Ex succo Plantaginis epota urinā suppressam elicit, adstrictione inibi relicta, & robore parti restituto. Vlceribus & fistulis quae omni parte serpunt, humoris erodentis insultus cohibendo, opem fert. Sanguinem extra vasa concretum discutit; eoque vulsis, & ex alto praecipitatis medetur.

Medicamentis articularibus Hermodactyli ritu inferebatur Rondelletio.

FRAGARIA & FRAGA. Ang. *Straum-*  
*beere.* Ital. *Fragolina* & *fragole.* Ger. *Erd-*  
*bein.* Belg. *Erdbessen.* Gal. *Frefes.* *Aduerf.* 309.

Vulgaris CARYOPHYLLATA. *Geum Plin.*  
*Aduerf.* pag. 309.



*Varietas.*

FRAGARIA, & *Fraga maiora alba*, Gallo-belgis des Chapirons.

Hanc Angli & Belgæ alunt fructu duplo maiore, coloris non tinguinei, sed herbaceo luteo pallore & candore confusis, cætera eadem prorsus.

FRAGARIA sylvestris minimè vesca, siue sterilis.

Strigosior tota; folia, flos, facies cunctaque sumilima; sed fructus spem suppleant herbidi confer-  
 tim stipati acinuli, fragam pusillam, pallidam emittentes, austeri gustus, & præsicci. Rupibus &  
 cauitibus Cornubiæ ad ædes generosi viri D. Muli frequentissima, apud Belgas inuentu perfacilis cau-  
 tibus & syluosis Neruiensis agri.

Vulgaris CARYOPHYLLATA.

Menses & sanguinis grumos propellit; obstructions referat. Decoctum radice ad rupta, & in-  
 terna vulnera efficax: concoctionem iuuat. Colicos dolores à frigido ortos lenit. Venenis aduer-  
 satur.

*Geum Plin. lib. 26. cap. 7.* Radiculas tenues habet, nigras, beneolentes. Medetur non modò pectoris  
 doloribus aut lateris, sed & cruditates discutit iucundo sapore.

CARYO-



CARYOPHYLLATA maior rotundifolia.  
Caryophyllata montana Matthioli.

Veronensium CARYOPHYLLATA flore Sanicula  
visna. Cortusa Matth.



Quandā Caryophyllatæ raram & perelegantē speciē Italo semine ortā nihil dissimilē à Septentrio-  
naliū rotundifolia Caryophyllata nobis impertiuit singularis amicus Petrus Coldēbergius rei herbariæ  
doctissimus pharmacopœus, qui hâc in suo ditissimo vireto alit, nisi folio quadruplo maiore, & radi-  
ce crassiore digitum æquante, minusque fibrosa foret.

Veronensium CARYOPHYLLATA.

Articulorum & nervorum doloribus mulecendis, oleo amygdalino & rosaceo eius flosculi macera-  
ti commendantur Matthiolo.

IMPERATORIA, OSTRUTIVUM.

Facultates ex Fuchſio & neoteriis.

Vnicè venenis aduersatur. Item pestilentia populariter grassantis arcet contagia. Lentorem pitui-  
torum humorum incidit ac discutit, quapropter \* tussis quam frigus attulit, medetur. Crassa quæ <sup>dem.</sup> <sup>tritus & a-</sup>  
in thorace coeunt, discutit. coloris corporis bonitatem ijs qui eo vescuntur, efficit. Concretum in cor-  
pore lac & sanguinem resoluit. Stomachum esu corroborat. Pituitam ventriculi deiecit, & elangue-  
scientem appetitiam iuvat. Menses & urinam † ciet. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, † Trag. &  
si contrita folia vulneri indantur. Hypochondriorum vitij auxiliatur. Item lumborum doloribus, <sup>forus mor-</sup>  
\* Carbunculos cum polenta tritum & impositum sanat. Cum vino potum rigores discutit. Herba ip-  
sa in vino & aqua cocta vulnera interna glutinæ: & in summa omnia quæ Angelica vocata herba, &  
maiori efficacia potest. <sup>tuos & secū-</sup>  
<sup>das trahit.</sup>

\* Trag. mitigat ischiadicis ac frigidis doloribus, sudorem elicit, hydropem educit, & emortuam  
genituram restituit, id quod iuissimè credere & experiri certò poteris. Omnes tumores & colle-  
ctiones ac durities possunt hac radice aut succo eius incidi, deprimi ac sanari. Succus carnes putre-  
scentes, seu gangrænosas erodit & absorbit.

Dd 3

IMPE-

IMPERATORIA, OSTRUTIVUM, *sive Astratia*. *Laserpitium* Fuchf. *Smyrnum* Tragi. Germ. *Meester wurtz*, Belg. *Meester wortel*. *Magistrantia*. *Perperam Smyrnum* Tragi. *Ligusticum Anguil.* *Aduersf. pag. 310.*

PODAGRARIA Germanica aut Belgica. *Gerardi herba* Dod. & *Mechliniensium*. Belg. *Geraerts crupt.* *Aduersf. 311.*



ANGELICA.



ANGELICA. *Smyrnum Cordi.* Ger. *Zamp Angelic.* Gal. Belg. & Ital. *Angelica.* *Aduersf. pag. 312.*  
*Costus niger nuperorum.*

Radix venenis vnicè aduersatur: quæ si tantū dentibus teratur, pestifera aëris contagia arcet, halitu grato, & iucundo, virns excludit, etiāque cōtractum per vrinas & sudores à corde propellit eadē qua Ruta, Theriaca & huiusmodi antipharmaca, ratione. Vrinas, menses & calculos pellit; pituitam crassam extenuat; asthmaticis dum recens est & humido plena, (ne exsiccano expectoratio impediatur) farctus educendo, incidendo, & abstergendo, medetur. Crapulas & cibi fastidia delet. concoctionem ventriculi iuuat; cordi amica. Illitu verò venenatorum & canum morsibus succurrit.

AN-



ANGELICA *fol. Germ. Wild Angelick. Aduers. pag. 311.*  
*Pbellandrium PlinijGuilandino.*

## ARCHANGELICA.

*Gallobelgiæ Angelicæ de Nortvlegen.*

Folij est Satiuæ multò maioribus, atrouirentibus, latisque humi fulis, auersa parte glaucis; primo pullulatu, rubris. Caulis multis concauis alis, proceritatis humanæ imò rubens. In lata umbella flores luteoli, & semen foliaceum Angelicæ satiuæ, maius & rotundius. Radix altè depacta, parum odora. Ex Nortuegiæ, Belgij inquilinam factam afferunt.

lege PANAX *Heracleum. Heraclea sive Heraclea fronde Smyrniij vel Imperatoijæ.*

*Aduers. pag. 312.*

*Sphondylium alterum Dod.*



lege, duùm enim cubitorum caule, lanugine quadam incano.

Floribus luteis. ] nostris Belgij viretis flores albos promit; memini tamen me vidisse Venerijs Panacem facie nò diuersam in Franciscanorum paradiso luteis floribus.


Diosc. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem aut succum exprimunt, folijs excanato solo stratis, quæ sicca- Eadem Gal. ra tolluntur. Simili modo caule mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentiag, sicca, quæ cariem non sentiant, aromatica, feruientes gustu. Fructus ex media serula cibo idoneus est. sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quam amarissimus, internè albus, aut subfultus, foris ad croci colorem inclinans, levis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoniac aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalcificat, molle, & ex- tenuat, horribus febrium, circuibis,que, vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrim conuenit. cõ- tra vesica scabiẽ ex aqua mulsæ aut vino bibitur. menses trahit. fœtum enecat. inflationes quæ vuluam male habent, duritijsq, ex melle dilutus, discutit. ischiadicis illi- tur. acopijs & capitis medicaminibus admiscetur. carbun- culos rumpit. podagricis, cum vua passæ illitus subuenit. dolore dentium liberat, cauis inditus. oculorum aciem illi- tu ex citat. ex eo & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ra- menta consissa, vulua admodum, partus extrahit. ad vetera vlcera efficax est. nudata\* ossa, corpore operit. si irrita cum

melle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit. cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ vene- num ei aculantur. contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

† Gal. Excalcificans, emolliens & digerens; ponatq; ipsum quispiam in calcificando tertij ordinis, in desiccando verò secundi. Cortex radicis exicatorium simul & excalcificatorium est medicamentum: sed minus quàm succus. Quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque vitmur ad nuda\* ossium & vlcera maligna & contumacia. Sufficiens enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul ac desiccando, nec ita magnopere calcificando, quæ omnia ad carnem generan- dam necessaria sunt, velut in libris De curandi ratione ostendimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouendis medicamen accommodum.

Capus

PANAX Sili-  
12.



Caput PANACIS altera luxatum. pag. 312. -  
sic restituendum.

Venetorū quidā peritiores, etiāq; Leo ille circulator, alebant & ostentabant quandā Panacis speciem ferulaceo caule, binū, ternū, & quaternū cubitorū, multos in ramulos supernē diuiso. Folia autē scabra, asperiora in singulis petiolis singula prodeūt, ampla, tharsi instar, plumatimū ex interuallis aequis posita. Pastinacae, & folijs cōstans multis in vno petiolo oblōgo, Africani fermē floris: Luteoli aut pallētes flores in umbellis Pastinacae aut Bauciae, quā etiā assimilat tota planta, hirsutie incana, radice lōgiore, albida, nec ita dissimilis. In Veneris & Flandriae hortis meminimus gustu aromatico, calfaciente, & digerente, gummeo, Opopanacum redolente: quare merito putetur, vt si qua alia, Panax legitima. Semine reperto in Opopanace in vitridario stirpium exoticarum diuissimo Coldenbergij nostri feliciter enatam vidimus.

Costus spurius Matthioli.

Varietas.] Folio rotundiore, hirsutius, breuiore Pastinacae, vulgaris siue Elaphobosci, odore potiore.

Silphium. LASERPITIUM.

Aluēf. 3 13. 314.

Diosc. Radix exalfacit. in cibis agrē concoquitur. vesica noxia. sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur. ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato. excrescentibus circa sedem tollendis illinitur. cum putamine mali punici, & aceto decocta. venenis pota resistit. os commendat, cibis aut sili permista. Laser ē radice atque caule scarificatis colligitur. praesertim autem rufum, translucent, myrrha amulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu. quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo vt ne os quidem gustanti nisi paululum spirer. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosū reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut faba lomento. quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem magadarin, & folia masseron vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vinū habet: insationes facit. perunctis cum aceto, pipere & vino alopecias sanat. oculorum aciem exacuit. incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat. cauernis dentium in dolore induitur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis, cotinis in posca, os colligitur. ijs prodest quos bestia in rabie efferat a momorderit, vulneribus immisum, valet aduersus venena telorū, & animalia omnia, qua virus eiuculantur, potum aut illitum. scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. gangrenas praecoercitis immittitur: & cum ruta, nitro, & melle, vel per se, carbunculis, clauos callōq; prius circumrafos vellit. cerato aut aridorum sicuum carne premollitum, recentis lichenas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, polypōq; aliquot diebus cum attrimento futorio, aut erugine illinatur. extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucibus scabritijs opulatur. graue, subiedque traucescentem vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit. vnam illitum cum melle reprimit. anginis ex aqua mulsa vtilissimū gargarizatur. vescentes latiore colore manonizat. tussi, commode in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus in sellis suffusione, & aqua inter cutē, cum aridis ficis, horrores discutit cū vino, pipere & thure potum. neruorum contractionibus, opisthoronicisq; datur oboli pondere deuorandum. haerentes gula hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. ad lac intus coagulatum bibitur. comitialibus ex aceto mulso proficit. menses ciet, cum pipere & myrrha potum. caeliacos adiuuat, in acino vna sumptum. cum lixiuo autem potui datur, repente conuulsis ruptisque prodest. ad potiones resoluatur, nucibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. cum aceto mulso manditur; ad expediendum arteriam, maximē cum vno retunditur. eo cum lactucis vtuntur, exitq; in vicem eruca.

Diosc. Fertur & altera magadaris in Lybia nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & sumpgosa, ex qua non profluit succus. Eiusdem cum laesere facultatis.

Gal. Silphij liquor calidissimus est: verum enim verō & folia & caulis & radix sat strennuē exalfaciunt. Sed omnia flatulentae magis essentiae sunt, ac proinde coctū difficilia: foris tamen imposita corpori efficaciora, & omnium potissimum liquor admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias amoliendi, & liquandi vinū quandam propter propositam temperiem obtinet.

LEVISIUM.



LEVISTICVM. Germanicum Laserpitium.

Aduers. pag. 313.

Laserpitium Diosc. Guid. an Laserpitium Theoph.

Angul. ? Galobelinus, Lincelche.

Smyrnum Lacuna. Hippocleum Muth.

SPONDYLIVM. Aduers. pag. 313.

Acanthus Germanica Fuchf.

Spondylium Diosc. Angul.



Legelin 33.  
vitis. & ibid.  
quis, & paulo  
post finit.

Levistici semen menses, vrinas, & sudores ciat. calculum pellit. lienis farctus referat. vulnera coquit. flatibus dissipat. moribus serpentium imponitur. Stillatitius eius liquor aciei oculorum conferre proditur Dodonæo.

#### SPONDYLIVM.

Dioscor. Potum semen pituitam per aluum extrahit. medetur iocinoris vitiiis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulvarum strangulationi. Veterinosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum. Item capitis doloribus cum ruta illatum. serpentia vulnera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocinoris vitia. Circumrasa eadem & iniecta calculos fistularum devodit. Recentis suris succum exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur. Qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Gal. acris quippe & secatilis facultatis. Eadem Gal. Sub tris Fuchfio. exsiccat, incidit.

LIBANOTIS Theoph. Aduers. pag. 313.  
 SESELI Aethiopicum herba Dod.  
 Sefeli Aethiopicum Marth.  
 Daucus secundus Euchf.



LIBANOTIS Theoph. maior.



Libanotis  
 minor.



*Varietas.* Foliis magis carnosius, rotundioribus  
 amplioribusque nitentibus, semine cristato, Lu-  
 tetia missam alunt vireta Belgica: cetera similia &  
 reapse vna.

LIBANOTIS Theoph. minor.  
 Panacis species nonnullus.

Altera foliis exilioribus multò Saxifrage Venetae  
 proximis, gemino situ Panacis altera ritu, sed oris  
 crenatis & laciniatis: caulis bicubitalis  
 & procerior. Semen Anechi, candidum: flores in  
 umbellis albi. Radix aromatica, grati & iucundi  
 odoris.





**CORIANDRYM.** *Aduers. pag. 314.*  
*Angl. Copiandre, & Coliandro. Belg. & Germ. Co-*  
*liander. Hisp. Culantro, & Celindre. Gal. Co-*  
*riandre. Lusit. Coentro. Ital. Coriandolo.*

**DIOSCOR.** *Coriandrum vim refrigeratorem habet. Quare illucum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & plceribus qua serpunt, medetur. epimyctidas cum melle vel rursus passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. tineas interaneorum expellit semen, cum passo potum. genituram adauget, largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. quare continuo, & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerussa, spumaue argenti, necnon aceto, & rosaceo illitus: arduentes summa cutis inflammationes emendat.*

*Coriannon, Corion, Coriandrum.*

*Gal. Coriannon, siue Corion, aut virunque vocare lubet. Vetusiores Græci Coriannon\* nominabant: at recentiores medici omnes Corion appellant, sicut & Dioscorides, refrigeratorem esse herbam ipsam dicitur, sed perperam. Siquidem ex contrariis facultatibus constat & composita est, plurimum habens essentia amara, quam ostendimus esse tenuium partium & terrenam. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obinet, quæ tepentis est facultatis: his adiunctum est quod ue adstrictionis pauillum. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusque particulatim actionis causam enarrabo, tamen si propositum fue*

*rat mihi vnus duntaxat hoc in libro sententiam expromere, sed fortè nihil obstat: imò, si verum facendum est, proderit nonnihil, superiores methodos, quæ in paucis medicamentis sunt dictæ, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminatè de morbis pronuntiant, sicut sanè hac quoque tempestate nò paucos inuenias medicos, vel insignes, præter alia, hac in re turpissimè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaque reddita parte quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu antea, sed ea quæ infuxum parti præter naturam humorem vacuant, quidam tamen refrigerare perseverant: alij ad digerentia quidem transeunt, cæterum ea erysipelas sanare dicunt. Quanquam scribant, incipientibus etiamnum atque gliscentibus crescentibusve erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet postea quàm inflammatio eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neque quæ illa sanant, remedio esse putandum: sed velut si vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant exalfaciantque medicamenta poscere: ad eundem, opinor, modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud amplius frigida esse autumantes declinationis remedia: concedendum sanè est, si cui ita placet, vt talis affectio etiam erysipelas vocetur, sed eam etiam calidam dicere vbi iam refrigerata est, id verò neuti-quam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, qui cum pane aut polenta: erysipelas curet illitum. Nam quod ad vnguem est erysipelas, quod vtrique inflammatum est & flauum, haud vnquam sanare queat cum pane coriandri, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus, cum determinata ac definita experientia cuiusque medicaminis facultatem explorandum censuimus, quàm maximè fieri posset simplicissimum eligi affectum consuluimus. At plerique medici neque quod vel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius verò is qui vocatur ab omnibus nobis vlsitè, vt à veteribus quoque phlegmone; alij autem inter hos medij plurimi, partim vt sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatos: is Acinuenias nonnunquam vbi neutrum vincat: sed ad vnguem patia sint. Quinetiam nonnunquam*

\*ad hunc modum.

\*neque huiusmodi.

\*vt ipse imquit.

œdemato les esse eryspelas conspicitur. sicut aliud scirrholes: vt compositiorum morborum non par-  
uus accretur numerus. De quibus copiosus cum alibi differimus, tum in curandi rationis volumi-  
nibus. Dicitur autem & nunc quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum eryspelas  
haud vnquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione  
pars impleta fuerit. Porro quod longè à refrigeratione absit coriandrum, vel ex iisquæ ipse scripsit  
Dioscorides, discere liceat. Nam chæradas siue strumas cum eregmo siue lomento, inquit, \* discutit.  
Porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit † discutiendis chæradibus, vel  
ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta chæradas  
sanare potentia, quæ omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

\* discutit.

† iterum.

Sethus: Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in ventriculo donec probè conco-  
quantur retinet. Tostum igne ventrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. San-  
guinis profluvium potum, & si imponatur, compescit. Cum vino potum, hæmorrhicos educit: immodi-  
cus tamen eius vsus delirium facit. Huius etiam succus potus venenum est & occidit. Qui enim  
hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

Innoxium esse certum se habere nobis asseruit D. Dionysius Thomas Lusitanus apud Antuerpieh-  
ses Medicus doctiss. qui eam virentem Cerefolij & Seliniritu iussulis suis & suorum inseruerit, nul-  
lo percepto incommodo.

CORIANDRYM alterum, minus odoratum.



Ima folia habet minutius incisa, & semen habitus; copiosum in pluribus spichameis procumben-  
tibus cauliculis. Alitur in horto Iacobi Plateau stirptum exoticarum avidissimi & stu-  
diosissimi.

SELINON



SELINON, *sive Apium hortense*. Aduers. pag. 314.  
*Petroselinum* Guilandini & Angul.  
 Ger. Peterfilgen, & Peterlin. Belg. Peterfelle.  
 Gal. Persil. Hiss. Perexil. Ital. Petroselino.

ELEOSELINUM, *sive Paludapium*. Aduers. pa. 315.  
 Angl. Smallage, & Marshe. Ger. Epfich. Belg.  
 Jousfrouw merck, & Eppre. Gallobelgis, De  
 l'Appre, & Gal. Alche. Hiss. & Ital. Apio, &  
 Perexil dagea.



DIOSCOR. Hortensis apij herba ad eadem ad qua Corianum conuenit. inflammationibus oculorum, cum pane aut potentilla uillitur. astuantem stomachum mulcet. mammarum duritiam ex lacte concreto contrahant: repugnat. urinam ciat, siue crulum, siue coctum edatur. decoctum eius radicusq; potu, venenorum noxa resistit, quum vomitiones excitet. aluum cohibet. semen uehementius urinam pellit. contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. inflationes disciuit. adniscetur medicamentis que dolorum leuamenta praestant, tiberiacis quoque ac tussis remediis.

Gal. Selinon vsque adeo calidum est, vt & urinas & menses cieat. flatu quoque disciuit, & magis semen quam herba ipsa.

DIOSCOR. Eleoselinum in humidis nascitur satiuo grandius, & ad eadem efficax.

OREOSELINVM, siue Petroselinum.  
Aduers. pag. 315.

PETROSELINVM Macedonicum.  
Aduers. pag. 315.  
Angl. Stren petseip. Germ. Drein Epffich. Belg.  
Dreen Eppe. Gal. Asche des rochers. Hisp.  
Apio que crece en las piedras.



DIOSC. Vrinam ciet, semine ac radice in vino potu. menses trahit. antidoti, nec non medicamenti vrinam cientibus, & excoalscentia, inferitur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis pronenit. aliud enim est petroselinum.

Gal. Similis Selino vis est oreoselini & Hipposelini: verum Hipposelinon imbecillius est, Oreoselinum valentius.

DIOSCOR. Petroselinum in Macedonia provenit, in praeceptis locis, semine ammi, odoratiore, sapore acri, aromata olente. Vrinam cit ac menstrua. contra stomachi & colic inflationes & tormina prodest. laterum, renum, & vesicae doloribus in potu subuenit. admiscetur antidoti vrinam cientibus.

Gal. Petroselini semen maxime vti est, cum tota etiam herba una cum radice similem, sed imbecillior, facultatem fortitur. Est autem ut gustu acro cum amaritudine, sic & in operibus calidum, una cum incidendi effectu. Hinc menses & vrinam affluam prouocat: est & flatus discutiens. Fuerit itaque, & ipsum tertij ordinis tum excofacientium, tum desiccantium.

HIPPO-



**HIPPOSELINUM**, sive *Olusaurum* Diosc. *Aduers.* pag. 315.

*Macedonicum* Belgarum, Græcorum nuperorum & Matthioli *perperam* Smyrniacum.

*Hipposeelinum* Cordi, Marcelli *Lacuna* & *Frasauioli*. Angl. *Alexandrie*. Germ. *Gros*; *cyffich*.

Ital. *Smirnio*, & *macerone*. Hisp. *Apio Macedonico*, sed *perperam*.

**DIOSCOR.** Radix cruda coctave estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus preparantur, \*crudaq; muria conduntur. Vim hanc habent, ut poto semine ex mulso vino menses ciat: algentes calfacit potu, aut illius urinae stillicidio auxiatur. Radix eosdem præstat effectus.

\* Anglis & Belgis ad eadem hodie usus plurimus.

**SMYRNIUM**. *Aduers.* pag. 316.

Gal. *Smyrniacum* de Candie ou Crete.

Ital. *Smyrnio di Candia*.

**PASTINACA** domestica vulgi. *Aduers.* pag. 316.

Gal. *Pastinades*. Belg. *Pastinaken* Germ. etiam

*Pastinachen*, & *Pastene*. Hisp. *Pastinagues*, &

*canahoria blanca*. Ital. *Pastinaca domestica*.



De Pastinaca  
Diosc. proxime  
Daucum  
Creticum

**DIOSCOR.** Vis radicit, herba, & seminis excofacere. foliis muria maceratis ad obsonia utuntur. aluum sistunt. radicem contra serpentium ictus bibere convenit. tussis & orihopneas mitigat. vrima difficultati medetur. recentes tumores, collectiones, duritiasq; discutit. illita, vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vitiat. si servata subiciatur. Sen en, lienis, renum, & vesicæ vitii prode, t. menses & secundas pellit. commodè datur ichiadicis in vino, inflationes flomachi lenit. su lores ciet, & ructus. peculiariter datur hydropicis in pota, & contra febrium circutius. Leece floribus interdit.

Gal. Eiusdem generis cum apio & petroselino: fueritque apio quidem validius, petroselino autem imbecillius. Plura ferè eadem quæ Diosc. Gal. & Plin.

**SMYRNIODES** Mutoni.

Semine Smyrnij rotundo, folio nigriore & minore. è caule cubitali, flos in umbellis pallentibus aut albis. Radix longa & alba, guttu haud aromatico uti Smyrniacum. A similitudine Smyrnioidem dixit Mutonius, penes quem viret in horto.

LICVSTI-



## LIGVSTICVM. Aduersf. pag. 316.

DIOSCOR. Radicis seminisq. vis excofactoria, † concoquens, prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones, item ad inflatones, praesertim quibus stomachus turgeat. & contra serpentium idus, vrinas & menses potu trahit. Eosdem praestat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur, ori perquam vile, quare pro pipere vitatur eo indigens, ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est. Alij semen faniculi aut fescelis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

† Gal. Adeo calfaciunt, vt & menses cieant & vrinas prouocent, flatulq. discutiant. Calida & sicca ordine secundo.

## BAVCIA, an Elaphoboscum? Aduersf. pag. 317.

DIOSCOR. Elaphobosci radix esui apta, dulcis. Caulis tener pro olere manditur. Contra serpentium idus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere.

Gal. Facultas est excofactoria & tenuium partium, ac proinde exicatoria secundo maxime excessuum ordine.

## SISARVM Aduersf. pag. 317.

Germ. Gierlin. Hsp. Chertiua.

## PASTINACA marina. Aduersf. pag. 317. &amp; 318.

Crithmum 2<sup>m</sup>, Matth. Crithmum sismojum Dod.



DIOSCOR. Suavis ori elixa Sisari radix, stomacho vilis, vrinam cit & appetentiam excitat.

Eadem Gal. & Aegin. Semen tenue est & discolorum, validumque: idcirco iis quos singultus & tormina male habent, cum vino exhibetur.

Plin. Sifer erraticum satiuo simile est & effectum. Stomachum excitat, sedidum discutit. Ex aceto laerpitiano sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo vrinam ciet, vt Opion credit, & venerē. Praeterea cordi conuenire conualecentium, aut post multas vomitiones perquam vile. Heraclides contra argentum viuum dedit, & veneri subinde offensi, aegrisque se recolligentibus. Satiui priuatim fucus cum lacte caprino potus sistit aluum.



THYSSELINUM Plinij. Sylva Plin. Valerando.

Peperam Meum Batavi & Antuerpiensibus.

Apium syl. Dod.

Thyselinum Plinio capite 12. libri 25. non est dissimile Apio, cuius radix commaducata purgat capitis pituitas.

Ad hanc sanè plantam facie & viribus proximè accedere videtur hæc, qua officinæ Antuerpienæ legitimi Mei ignoratione pro Meo vsuparunt. Apio enim Pastiracæ agrestis & fœnulis folijs Coriandri adeo propinqua, ut multi etiam hodie Apium sylvestre dixerint. Caules inanes bicubitales è radice Mei ritu humi depacta, digitum & vnciam crassa, lacteum succum dum vulneratur fundente. Umbellæ Anethi Iunio & Iulio: fœculis candidis defluentibus semen compressum foliaceum Anethi maius & rotundius, gustu aromaticum & feruens. Vdis Batavorum aguis lubens oritur, & Brabantia locis nonnullis altitur etiam in hortis.

BARBICAPRA: & Plinaria vulgi. an Rhodora

Plin. lib. 24. cap. ultimo: Germ. Wald Gerstwart.

Ital. Crostefanaria. Picromon Stranfeldj.

Advers. pag. 318.

Barbæ capite radix pota, refrigerat & adstringit gustu, eoquæ ventris fluores, & sanguinis sistit, flos ex vino albo potus quartanarios muat. Rizereni carpis appositam manibulque subactam febriles æstus finire asserunt.

CENTAVRIUM maius alteram.



CENTAV-  
RIUM  
MAIUS  
ALTERAM

Fi. Cen.

**CENTAVRIUM maius.** Hiss. Rapontico vulgar. Ital. Centa'ria maggiore.

Aduers. pag. 318.

**Diosc.** Radix cum adstrictione aliqua & dulcedine acris. Conuenit, inquit, radix ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi, sanguinem expuentibus, non febricitantibus cum vino, febricitantibus cum aqua. drachmarum duarum pondere exhibita: item & ad tormina, ac ad vteri dolores. Ducit etiam menses ac fetus collyrii forna vtero imposita. Est & vulneribus idonea, recens tusa, aut arida prius madefacta contrusag, coniungit etenim ea, ac glutinat. Quin & carnes coalescunt, si contrusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio vuntur.

**Gal.** Centaurij magni radix sicuti gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus præstat. Secundum omnium autem qualitarum actionem ruptis, conuulsis, dyspnœæ & inueteratæ tussi conuenit.

**Arvl.** Ad hepatis dolorem: herba Cētauria maior in vino decocta & potui data, mirifice auxiliatur.

Ad spleneticos: herba Centauria maior in vino decocta & potui data, splenem per sanat. Nos ipsi experti sumus.

**CENTAVRII maioris varietas.**

Aduers. pag. 318.

Est & hæc perquam similis Centaurio & penè par, qualibet sui parte superiori & imæ, quam olim in hortis alebāt generosus vir D. Dilsius & Guilielmus Driesch pharmacopæus peritissimus. Virentia ampla admodum sunt folia Rumicis, ambitu serrata. Flos luteo purpurascens pallens, & semine Cnici simile & par in turbinato & squamulis loricato capitulo.

Collibus lapidosis iuxta Tagum duntaxat spontè natum inuenit C. Clusius.

**OTHONNA Italarum.** Aduers. pag. 318.

**Germ.** Indianisch blummen. Gall. Oilleiz d'Inde.

Ital. Garofano Indiano.

*Tanacetum Peruvianum Cordi.*

**OTHONNA maior polyantha.**

Aduers. pag. 318.



Ex gravi fetido, que odore venenata vires, quales Lycopersici Galeni produuntur, quo utebatur Centaurio ad arum dolorum. Folem huius flore casco permixto cinotruan fidus testis est Dodonæus.

**VALE-**



*VALERIANA maior*. *Hiss.* Yeru benedeta.  
*Ital.* Valeriana maggiore.

**Diosc.** Excalcacit. urinam mouet, si sicca potus detur; Decoctum eadem prestare potest. ad lateris etiam dolorem efficax: menses cit. antidotis inferitur. Adulteratur radice rufi ad mista: sed maleficium comprehenditur: quoniam hac dura est, & frangenti consumax, sine ulla odoris gratia.

Ad epidemicos, pestiferos, & venenatos morbos, pota & olfacta, præstans viribus radix. Pectoris vitij medetur; vulneribus ferruminandis efficax.

Nardo viribus similis Gal. sed infirmior ad multa. urinam plus mouet quam aut Indica aut Syriaca Nardus.

*VALERIANA minor syl.*

*Aduers.* pag. 319.

*VALERIANA fluestris.*

*Aduers.* pag. 319.

Ruptis, vulvis, ex alto deuolutis nuperorum experimentis opem fert. Decoquantur folia ad aphthas & oris vlcera. Antidotis item inferitur.

Ff 2


VA-



VALERIANA  
peregina  
Belgarum.  
Adverf 319.  
Valeriana  
Graeca, Dod.



PIMPINELLA, aut Bipi-  
nella. Ad-  
verf 320.  
Sydenhis  
Anguillare  
& Guilford.



SAN-  
SOXE  
ram  
ue Pi-  
nella.  
verf.



*PHY minimum alterum. Galobelgæ, Sallade de Chanoine. Belt troppen Belgarum.*

Quasi dicas Lactucam campestrum, quia folia primo pullulata habet lactucis aut seriolis adhuc tenellis similia, & in Quasdragesima cibo & acetarijs expetatur lactucarum more. Frequentissima in agro Antuerpiano. flos, & radix Monspelicam æmulatur: folia minus laciniata.

MONTANA Nardus. Aduers. 326.

Diosc. Ad eadem qua Celtica, efficax.

Galeno prædictis debilior est.

Monspelensium PHYTEUMA. Aduers. 326.

Diosc. Ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

BERPINELLA saxifraga hircina minor. Aduers. 321

Thalictrum Rondelleij.

Natrix Plin. Guil. & Anguil.

PEMPINELLA maior Fuchs. Saxifraga magna.

Belg. Beurrenarret.



Non secus ac Eringij radix conditur ad iuuendam concoctionem ventriculi, & viscerum. Colicis affectibus, diuturna febris, conuulsis comitialibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Urinas ciet: menses, secundas & fetus mortuos pellit. Pota ex aceto magnæ commendationis ad pestiferos morbos: nomis & vlceribus fordidis succus & folia commodè illinuntur. Faciem absterget & defadat, lentigines delet. Dentibus attrita pituitam elicit; eoque dentium dolotibus mulcendis, apoplecticis & conuulsis prohibetur.

Minor saxifraga folijs rotundioribus Pimpinellæ proximis in agro Britanno & Belgio.

Ff 3

DAV.



Amur per-  
pallidam.  
Aduers. 323.



DAVCVS *Selinoides secundus*.

Aduers. 321. 323.

Rosmarinum siue Libanotis prima Theoph. fo-  
lio Apij palustris. Ital. Valdebona vulgò & Saxi-  
fragia Venetorum.

DAVC1 *secundi Selinoidis varietas*. 321.

siue *Selinoidis Cordi*.

Petisimilis omni sua parte; sed minus exilius: in  
syluis Neruo proximis oritur.

AMM1 *Creticum aromaticum*.

Aduers. pag. 323.



In hor-  
Couden-  
gij lapon-  
Pastinac-  
semine ar-  
matico pr-  
uenit.

lege flauu-  
lin. cultiva-  
pag. 323.

AMM1 *Diosc.*

Diosc. Vis ei excelsa floribus, feruens & exsiccans. \*Eadē Plin.  
Facit ad \*tormenta, urinae difficultatem, serpentium ictus,  
cum vinopotum. Menstrua ciet, misceatur de rodentibus cā-  
rbaricum medicamentis, quae edoria vocant, urinde exor-  
tu urinae difficultatibus reficit. \* Sugillata cum melle tol- \*Eadē Plin.  
lit, colorem potu aut illitu mutat in † pallorem. Suffitum †Eadē Plin.  
cum vna passa aut resina, vulnus purgat.

Calidum & siccum in fine tertij ordinis Gal.  
tenuium partium gustu subamarum & acre: &  
clarum est quod digeratur, & urinam moueat.

Vulnus purgat. ] subdit Plin. Tradunt facilius  
concupere eas, quae odorentur id per coitum.

AMM1



AMMI vulgatus, an Bubonium Hippocr. i in mor-  
bis mulierum Guil. Aduersf. pag. 321. 323.

ANISVM. Angl. Mese & anise.  
Aduersf. pag. 322.



## ANISVM.

Diosc. Anisum ius summa excoctat, exiccat, oris halitum incundiores facit, doloris leuamentum praestit. vrinam cit. aquam qua subijt cutem, dissipat. potum sitim cohibet. animalium venenis aduersatur. valet ad inflationem <sup>lege</sup> diffpan-  
nes. aluum & alba seminum profusum sistit. Lac ad mammas † elicit. Venerem stimulat. Dolores capitis leuat, sus-  
citum narium: cum rosaceo tritum instillatumq; sacris auribus medetur. <sup>tibus & de-  
me emitten-  
tibus.</sup>

† Sertus eadem, & obstructiones tollit.

Plin. subdit: Praecipuum autem est ad ructus, idem inflationibus stomachi, & intestinorum torminibus, & calicis medetur. Singultus & olfactum decoctum potumque inhibet. Potum somnum conciliat: calculos pellit. vomitiones cohibet & praecordiorum tumores. Et pectorum vitij, nervis quoque quibus succinctum est corpus, vtilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant, idem dysentericis & tenasinis datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendum cum anetho parturientibus. Phreneticis quoque illinitur recens cum polenta. Sic & in fantibus comitiali vitium aut contractionem sentientibus. Pythagoras quidem negat corripit vitio comitiali in manu habentes, ideoq; quamplurimum domiserendum. Parere quoque facilius olfactantes. Sofimenes contra omnes durities ex aceto vsus est. Semine ejus poto, lassitudinis auxilium viatoribus spondit. Strangulationes vulvae, si mar duce-  
tur & linatur calidum, vel si bibatur cum castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines a partu cum  
semine cucumeris & lini pari mensuram trinum digitorum, vini albi tribus cyathis, discutit. Cum vino  
Andorem leuiter praestat. Oleum stillacitum ad omnia efficacius.

lege

legē. **DAUCVS** Cretensis.  
Advers. pag. 323.


**Diosc.** Omnium semen extrahit potum. vrinam, menses, & parus extrahit. torminibus liberat: veterem tuum mitigat. phalangiorum morsibus potum in vino, auxiliatur. tumores illius discutit. Semen duntaxat in alijs generibus inualuit vsus: in Cretico, etiam radice. qua maxime contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Eadem Gal.

Plinius addit. Datur quadrupedibus percussis, capitis dolori medetur. Eius radix in vino pota, dysenteriam sistit. contusis & eueris potum duobus obolis, in mulsi cyathis tribus subuenit; aut si febris adsit, in aqua multa. Calculos eiecit: folia omnia tela infixia corpori extrahunt.

Sifer Lacu-  
az.

**PASTINACA** Diosc. **CAROTTA** syl. vulgi.  
Belg. Wilde Caroten. **DAUCVS** Offic. Ital. Pastinaca saluatica. Hsp. Canahoria saluagc. Ang. Wild Carrot. Advers. pag. 323.



Pas-  
sua

D  
Th  
Gen  
Ru  
Ca  
pas  
Bel  
pas  
wo  
Ga  
nad  
rot  
nes

D



**DAUCVS sylvestris officinarum.**

Num Pastinaca sativa vulgaris nostras, non Diosc. ē Baucia Arabum siue Campeltris vel sylvestris femine nata, sit Dioscoridis *ELAPHOBOSCV*? & contrā, nū potius *CAROTTA* syl. siue Daucus officinarū, & *CAROTTA* sativa, sit Dioscoridis *PASTINACA* syl. & sativa, folio Gingidij, sub amaro, umbella Anethi, flore candido, in cuius medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferē ad croceum accedente? cuiusmodi affabrē exprimuntur in floribus Carottæ: flores autē Pastinacæ vulgi, lutei sunt, quales Elaphobosci esse debent. Radicis magnitudo, demensu siue nihil obstat; cū collibus & calidioribus regionibus sponte enatam palmaribus cauliculis & exili radice euulserim: cultu verō & mangonio altius Cichorij modo, quinque aut sex pedum longitudine pangatur.

**Diosc.** Radix cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. ijs conuenit in potione, quos vrinae difficultas torquet, aut luteris dolor excruciat, aut si aqua cutem subiye. serpentium moribus ictibusque prodest. presumentes id nulla affici iniuria a serpentibus traduntur. conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit. venerem stimulat. partus apposita, eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedanas vlcera purgant. Sativa ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Eadem Plin. & Gal. Sylvestris ad omnia potentior. Habet etiam absterforium in se quippiam: quamobrem pascentia vlcera quidam folijs eius cum melle, quō pura reddant, illinunt.

Plin. Erraticæ Pastinacæ semen contritum, & cum vino potum, tumentem aluum, & suffocatio- nes mulierum, doloresque lenit in tantum, vī vulvas corrigat. Illitum quoque ē passio ventri earum prodest. Viris verō cum panis portione æqua tritum. Ex vino potum, contra ventris dolores. Pellit vrinam & phagedanas vlcera sistit, recens cum melle impositum. Vel aridæ farinæ inspersam radice- m eius Dieuches contra iccoris & lienis, ilium, lumborum & renum vitia, ex aqua mulsa dari iubet. Venerem stimulari hoc cibo certum est: idē conceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Radice- eius circumscalpti dentes, dolore liberantur.


**PASTINACA sativa atrorubens.**

**DAUCVS niger** Theophrasti. Belg. *absolusē Caroten*. Gal. & Gallobelgus Pastinades & Carotes rouges.  
Germ. *Rot Auben & Pestinep.*



CARVM. Angl. Caruwapes. Belg. Sucrepsen.  
 Germ. Feld Humich. Hsp. Alcarouca.  
 Advers. pag. 323.

GINGIDIVM folijs Baucis Syriacis.



Diosc. Cari semen excoctat, urinam concitat, stomacho vilē. Os commendat, concoctionem adiuvat.  
 vtiliter miscetur antidotis & oxyporis, anisi vicem prabet. Radix cocta pastinaca modo, manditur.  
 Flatus extinguit, & urinas ciet, non semen modò, sed & planta. Gal.

GINGIDIVM.

Diosc. Oler hoc crudum, coctum, conditum ē estur magna stomachi vilitate: urinant cit. Decoctum  
 ex vino potum vesica prodest.

Gal. Gingidium sicut gustu amaritatem & adstrictionem præfert, sic temperie quoque ipsa calidi-  
 tatem & frigiditatem. Secundum vtramque verò qualitatem desiccatorium est. Sedenim stomacho  
 amicum est ut pote non parvam obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam  
 caliditatem possidet; duobus autem numeris desiccatur.



GINGIDII species videtur CEREFOLIUM.  
Angl. Cheruel. Aduers. pag. 324.

GINGIDIVM folijs Baucis Syriacum.

Hæc dodrantalis planta missa Venetijs Alepo Syriæ Sequini Martinelli opera: flos illi albus, & sa-  
por Gingidij, folia verò Baucis vel Elaphobolci minora.

VISNAGA. Aduers. 324.  
Gingidium Angul.

VENERIS PECTEN Plin. an SCANDIX.  
Angl. Pinkeneble & Storkes byll. Aduers. 324.

leges 10.  
quam etiam  
facie.



Plin. lib. 24. cap. 19. Veneris Pecten appellant à similitudine pectinis. Cuius radix cum Malua  
tu'sa omnia corpori infixæ extrahit. veteriosa curat: quæ exedum vocatur.

Diosc. Sylvestre olus, amarum, subacre, † quod crudum coctumque mandatur. Stomacho & ventri vile  
est. Decoctum in potu, vesica, renibus & iecineri confert.

† Gal. eadem, siccat & exsiccatur secundum ordinem intensio: urinam citius valenter: viscera obstru-  
ne liberat ex dictis qualitatibus constans.

PERCHEPIER Anglorum, an sit Scandix?

Gg 2

CAV.

leges Cereto 11j  
proxima &  
paulo post de-  
scriptam ar-  
bitramur.

CAVEALIS  
albis floribus  
vulgaris.  
A. uers. pag.  
324. 325  
Germ. *Me.*  
herkletter  
Lapp. *ag.*  
stis Fragi.



CAVE  
flor  
foli

OENAN-  
THE, FILI-  
FEROVA.



OEN  
angul



## CAVCALIS.

DIOSC. *Crudum coctumie olus estur. vrinam mouet.*

Gal Quidam Daucum sylvestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gustu simul ac viribus. ex. *lege Cerefolij proxima. & pan o poffe lege descriptam arbitramur.*

Sapor Pectinis veneri, medicatus.

Varietas. Flosculis exilioribus, multò candidis: & semine loricato minimè horrido, hortis Belgij inquilinus.

OENANTHE, FILIPENDULA dicta, an MOLON Plin? *Aduers. 325.*

DIOSC. *Folia cum mulso vino pota secundas eijciunt. Radix è vino vrinæ stillicidio conuenit.*

## OENANTHE angustifolia.

Exiliore folio ab altera vulgata Oenanthe solùm diuersa.

Plin. lib. 26. cap. 7. Molon scapo est striato, folijs mollibus, paruis, radice quatuor digitorū, in qua extrema Allij caput est. vocatur à quibusdam SYRON. Ex vino stomacho & dyspnœæ medetur.

OENANTHE Cicutæ facie. *Aduers. pag. 326.*

videatur eadem cum OLSENICHIO Cordi.

*lege pag 326. filamentis.*

## OENANTHE aquatica.

Oenanthe quarta Matth. Dod.

an Sylaus Plin. folio Apij palustris?



Facie & facultatibus inter Cratœg Lauer & Oenanthē naturæ dadalæ munifico luxu & lusu media est hæc riuulorum sectatrix septentrionalis plāta. Cauliculos emittit graciles, teretes, pedales & cubitales è radice prolaxiūs reptante, sparsa & fibrillis donata: alis & summis folijs è gemino situ positis exilioribus, Oenantes minotis Montpellieracæ. Ima verd folia & terræ proxima. Apij hortensis, Oenantes vel Cicutariæ. Flos in umbellis, candidus, Thlaspi minoris: Semen Cicutæ, in riuulorum marginibus, vbi spontanea & in hortos translata, radices Oenantes ritu tuberosæ euadunt. Vrinam cit. Stranguriæ Laueris & Oenantes modo auxiliatur.

CICUTA-Hisp. Ceguta, Canaheia.

CICVTARIA maxima Brancionis, an Thapsia  
tertia Salamanticensium Clusio.

Diosc. Cicuta letale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succum exprimitur contusus cacuminibus, priusquam semina & coma siccificent; qui sole densatur in pastillos. multus ad mendicantem vsus est aridi. commodè miscetur collyriis, quæ leuandi doloris gratia temperantur ignes sacros, & vlcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit, sed genitale resoluit. lac puerperarum mammis apposita extinguit. in virginitate mammæ coërcet, & in crescere non patitur. pueris præstat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima vis Cretica, Megarensi, mox Attica, & in Chio & Cilicia nascenti.

Gal. quodd extremè refrigerantis facultatis sit, omnes norunt.

CICVTARIA maxima, an Thapsia tertia Salamanticensium Clusio, vulgo Canaheia: Caule humanæ proceritatis, crassitie quatuor digitorum, folijs, semine & radice Seseli Peloponensis longè maioribus, quæ clinicis celebratur ad menses, vomitus & alias deiectiones ciendas: an num potius Cicutaria nostra maxima fatida?

CICU.



*CICUTARIA fatua. Aduers. 327.*  
*Cicuta minor Cordi.*

*CICUTARIA latifolia fatidissima, perperam*  
*SESELI Peloponense quorundam.*

Herbarij septentrionales Belgæ multos iam annos habuerunt Cicutariam hanc, & nondum inuento genuino Peloponensi Seseli folio Cicutæ latiore & crassiore (cuiusmodi huius sunt) SESELI Peloponense folio Cicutæ dixere. Facultates tamē reclamant. Vniuersa namque planta simul ac tantillum tangitur, virus halat, qua nota à Peloponensi Seseli discernitur. Radice crassā & tota facie Myrrhidem odorem vescam quadamtenus exprimit; sed folia latiora, longiora, nigriora, & semen breuius Angelicæ vel maximæ Cicutariæ fatuæ par in umbellis latis excusso candido flore. Caulis alis brachiatus, sesquicubitum & duos cubitos æquans.

Eius flores non appinximus, quia nondum floruerat hoc anno, quos aliàs daturi in Appendice nostro.

*MYRRHIS altera parua. Aduers. pag. 327.*  
*Daucoides minor Cordi.*



Cicu-





*CICUTARIA palestina.*  
*Phellandrium Dod. & Sion tertium.*

*PELOPONENSE SESELI maius*  
*Thapsia latifolia Clusij & quorundam.*



Nonnullæ stirpes Plinij Phellandrium adumbrare videntur. Lutetiani quidam Pigami species, siue pratenſes Rutas, Dodonæus Cicutæ facie Coriandriſoliam plantam aut Cicutariam nõ fatidam, ſcrobibus & foſſis oriundam, Phellandrium Plinianum fecere; cuius nullæ meliùs dotes quàm Saxifragiæ noſtræ hircinæ, vti ſuperius pag. 321. monuimus, explere videtur. Dodonæi quippe Phellandrium ſiue tertia Sij ſpecies folijs coriandrinis, Selini horteniſis exilioribus, atroïrentibus, exiguis floribus in umbellis Oenanthes cicutariæ, candidis. Caulis ferulaceus, multis concavus alis, inanis, geniculatus, binum & ternum cubitorum: radice è geniculis fibroſa: & ſemine Cicutæ. Angliæ, Nortmaniz & Belgij ſtagnantibus, foſſis lenefluentibusq; aquis plerumque obuia. Cicutarijs quia facie propior, eis anneſcenda fuit, vſque dum facultates exactiùs ſint compertæ & exploratæ calida guſtanti, odore Laværis.

MYRRIS. Aduerſ. pag. 327.

DIOSC. Radix cibo non inſuavis; quæ in vino pota, phalanſiorum morſibus auxiliatur; cit menſtrua & parvus ſecundos, purgatq; à puerperio ſeminas: ſubuenit & phthiſicis † cocta in ſorbitione. Aium quoque eandem bu die teriùs potam ex vino in peſtilentiam ſalutarem eſſe; & ne morbi contagia ſentiantur, obſtare.

† Thoracem ac pulmonem degrauant Gal. Itaque ſecundo ordine calfacit adiuncta quadã partium tenuitate.

PELOPONENSE SESELI.

In Belgij ſtirpium cultioribus & ditiſſimis hortis Hiſpano ſemine ortum altero tanto maius, maioribus latioribuſque folijs & ſemine viſitur.

DIOSC. Folia habet Cicutæ, latiora, & craſſiora: caulem ſupra Maſſilienſis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua ſemen latius, odoratum, & carnoſius pendet. Eiſdem viribus prædium eſt, quibus Moſilienſe.


Gal. Sefeli & radix quidem, ſed & fructus vſque ad ð exalfacit, et admodum urinam mouere queat. Sed & tenuium eſt partium, vt comitiali morbo & orthopnæis competat.

TORDI-



Tordiliſtus  
Seeli Creti-  
cum inais.

Varietas.



Seeli Prae-  
tense Mon-  
speliensis m.  
Aduerſa pa.  
328.

Hh



**TORDILION.** Sefeli Creticum, Adacr. pag. 328. Ordeison Nicandri Angul.

**Dioscor.** Semen contravrina difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis caulisque virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad viendas pectoris excretaiones, in delinctu cum melle.

**TORDILII, sive SESELI Cretici varietas.**

Eruticosius multo, longioribusque foliis & bicubitalibus caulibus in pratis Latrensibus Monspeliciagri & Lugdunenſis Gallia perſoenſecia occurrit. Belgii hortense est.


E seminis  
magnitudi-  
ne differetia.

**SILER** Montanum officinarum. Ligusticum Diosc. Dodonao. Sefeli Massiliense Diosc. Matthiolo.  
Angl. Siler montanum. Germ. Sefel. Gal. Sermontrain.

Latiore semine breuiore in Belgii hortis variat.

**SOPHIA** Chirurgorum sive Thaliarum Diosc. 2  
Aduers. pag. 328. Thaliarum Dod. vel num sit  
Eruca Geratina Italorum: perperam Seriphium  
Germanicum Tragi, Fuch. & Cordi. Germ. Do-  
phykraut, & Welsamen.

Lege. An **CONSOLIDA** Regia, sive Calcaris flos  
recentiorum, sit **DELPHINIUM** Diosc. 2  
Chamamelum et anthemum perperam Fuch.  
Calcitrapa candida Cordi. Aduers. pag. 329.  
Bel. Gadder spozen. Ital. Sproni di caualieri.\*



**Dioscor.** Tritum illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducit.

Gal. Vis ei inest exicatoria citra morſum, itaque vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

Potum in aqua ferrata ſanguinis deiectiones ſiſtit. Cancro mederi aſſerunt Germani.

**Vires ex Trago.** Calida & ſicca temperatūra, internis corporis partibus, & ad chirurgicam accom-  
modatiſſimum. Singularem enim experimento obſeruatum eſt, ſemen eius, quemadmodum Plantagi-  
nis alui fluxiones quaſuis cohibere cibo & potu: Multi etiam crediderunt oſſium contraſtiones (mo-  
do illa rite redintegrentur, ac reponantur) in pecoribus ſanari, quum primum herba & ſemen affectæ  
parti adalligentur.

Herba in vino decocta & pota lumbricos expellit, ſicut & alia lubricorum ſemina. Tuſa & impoſi-  
ta, aut eius ſuccus inſtillatus vermes è ſordidis vlceribus & vulneribus hominum & pecorum expellit,  
& oſſium contraſtationibus, vti Symphytum medetur.

\***CONSOLIDA** hortendiſ maior, flores etiam albos promit.

Leg. pa. 329.  
li. 3. quidem nre  
adnoſum.

DELPHI-



## DELPHINIUM.

**DIOSCOR.** Semen in siliquis milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussus. Aiunt enim obi ēta herba, scorpiones resolui atque ignavos torpescere: semota verò ea, sese recolligere.

Alterum superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

lege floram  
cuculata in-  
fundibula.  
h. 21.

Segetum **CONSOLIDATA** regia strigosior tota.

Aduers. pag. 329.

**MELANTHIVM**, siue *Nigella Romana* odora.

Aduers. pag. 329. Germ. Schwartz rospander.

Hisp. Neguilla, & Alipiure. Ital. Nicella.



Varietas. Vistur & hæc albis & rubentibus floribus in horto Mutoni nostri.

## MELANTHIVM.

**DIOSCOR.** Semen panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Irino & infusum naribus tollit lepras, lentiginis, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & testa, prodest. Teretes ventris tinea expellit peruncto ex aqua vmbilico. Destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum. & hac extrahit. difficultatem spirandi cum vino sumptum leuat. Phalangiorum moribus ex aqua, drachma pondere haustum auxiliatur. Inceso serpentes fugantur. Tradunt largius eorum enecare.

Eadem Gal. Quia exsiccabit atque deficcet tertio ordine: videtur etiam tenuium esse partium. Si intro in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit. vnde constat essentia ipsam esse subtilis, & ad vnguem à caliditate elaboratæ. Propterea sanè etiam amarum est. \* Ostensum verò in quarto horum voluminum est quod cum ad extremam tenuitatem atque elaborationem terrena pertingit substantia, amara proueniat qualitas. Itaque mirum non est si lumbricos interimat non esum modò, sed etiam foris ventri impositum. Siquidem & id præstare posse saporem amarum, monstratum est.

\* Gal. Qui ob crassitatem aut viscositatem retenti fuerint. In summa verò, vbi sectione, extersione, deficcatione, exsiccatione est opus, præstantissimum id remedium est.

Melanthium  
sylvest.



MELANTHIUM sylvest.

Advers. pag. 329.

Cuminum sylvest. Cordi.

MELANTHIUM sylvest. alterum capitulis reflexis  
Aquilégia. Advers. pag. 329.



Cuminum  
Diosc.



CYMINUM Diosc. Sativum & sylvest.

Advers. pag. 330.

Belg. & Angl. Compin. hisp. & Ital. Comino.

**Dioscor.** Cuminum sativum erigratum est. sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regem appellavit. secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur. Provenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Tarentia, & plerisque aliis tractibus. Excalisunt, adstringit, exsiccatur, ad tormina inflationesque convenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina ibitum, orthopneus datur in posca: demorsus a serpente, in vino, testium collectionibus auxiliatur, impositum cum ura passa, aut lolij farina caratone, mensum abundantiam inhibet. contritum aurem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profusio sistit. colorem libentium aut pernicietorum mutatu pallorem.

Sylvestre



## SYLVESTRE Cuminum.

Semen acerosum, gustu Satiuo acrore bibitur ex aqua, aduersus tormina inflationesq; item contra venenatas bestias, ex vino singultus ex aceto sedat. stomacho vtile, quem humor vexat. fugillata tollit, si manducatum cum melle & vna passa illinatur. testium inflammationibus, adiectis eiusdem illitum medetur.

Est & aliud Sylvestris Cumini genus, Satiuo non dissimile, quod à singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus praesidio est. calculosis & iis qui vrinae stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lorio reddunt, auxiliatur, sed apij semen seruesactum postea bibendum est.

Gal. Cumini femine maximè vtimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, pettoselini. Est verò & facultatis exsiccantis, sicut illorum vnumquodque, tum vrinam mouentis & flatum extinguentis; ex tertio ordine exsiccantium.

CUMINVM sylvestre alterum Diosc. Italorum.  
Hypecouri Clusij & Dodonaei.  
Cuminum syl. Marib. alterum.

NVCVLA terrestris. Aduers. pag. 331. & 325.  
Aptos Turneri Angli, an Bunion Diosc.?  
& Bulbocastanum Trallian. Angl. Cardnuts.  
Perperam Oenanthe Marib.



Eadem est hæc effigies cum corniculata plantula descripta pag. 331. Aduersatiorum; arido solo Galloprovinciæ eruta & à pictore deprauata: cuius semen olim Massilia in Belgium transfusa, vbi feliciter enatam, sculpendam curauit Clusius noster. Folius est Rutulæ syl. montanæ aut Melanthij, flore luteo.

## NVCVLA terrestris.

DIOSCOR. Exsiccant Bunion. vrinam vici. secundas detrahitis. lieni, venibus, & vesica vtile. eo humeni aridius vtuntur, exempto radice & caulibus succo, ex aqua mulsæ.

Trallian. lib. 7. Bulbocastani radix calida & sicca moderatè, simul & adstringens percipitur, sed efficacius semen.

Sanguinem spuentibus & mingentibus vtilis Dod.

EACHYRUS. GAZA vertit Aureliam. Aduers. pag. 331.

ELICHRYSON. Amaranthus Galeni.

Hist. Scobahedionda. 1. Scopasaxida.

C. Clusio interprete. \*

Leg. lin. 37.  
sine autem fls.MILITARIS, sine Millefolium terrestre vulgare,  
est STRATIOTES Millefolium Diosc.

Aduers. pag. 333.

Leg. pa. 332.  
lin. 1. floris.

\* DIOSCOR. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, yrina stillicidia, ruptaq., coma è vino pota opitulatur. ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesica absumit, pota cum mulso, ieiunus, trium obolorum pondere, sistit distillationes, data in vino albo diluto, vestibus inferitur, vt eas ab erodentium iniuriis tueatur.

Gal. Amarâthum facultatis est incidentis & extenuantis: coma igitur eius menses cum vino pota educit, sed & grumos sanguinis liquare ac soluere creditur; non solum in ventre, sed & in vesica: sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infesta.

SANGVISORBA. Bipinella nostras, an SIDERITIS altera Diosc. Aduers. pag. 332. & 320.

DIOSCOR. Huius feminis vis, foliorumq., ad vulnera, precipua est.

SIDERITIS Robertiana. Aduers. pag. 332. Heraclea Crataeva Diosc.

DIOSCOR. Gustant amara. Huius ea vis est, vt quamvis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Gal. Sideritis habet quidem etiam abstergerendi quandam facultatem; sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula vero inest adstrictio: quare phlegmonem sedat & glutinat.

SIDERITIS Achillea Diosc. Aduers. pag. 332. Stratiotes millefolia Dod. editione vernacula.

DIOSCOR. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo cœtetur. Erumpentem sanguinem inhihet, & cruenta vulva profusiva, in vellere. Decocto quoq., insident femina fluxione vulvae laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Gal. Quidam etiam vocant Achilleon Sideritin, quæ proposita quidem, quod ad iam dicta attinet, viribus non est dissimilibus; cæterum adstrictione exuperat: Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias & muliebres profusuum congruit.

MILITARIS, siue Millefolium.


DIOSCOR. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaq., profluentem sanguinem, & fistulas.

MILLEFO-



MILLEFOLIUM terrestre purpureis floribus.

Aduers. pag. 333.



PEDICULARIS.

Gal. Terrestris verò Stratiotes nonnihil  
habet adstrictionis: proinde sanè & vlcera  
glutinare potest, & vlceribus esse vtilis.  
Sunt qui eo & ad sanguinis eruptiones v-  
tantur, & ad fistulas.

MILLEFOLIUM luteum. Aduers. pag. 333.


Achillea luteo flore C. Clusij. in agro  
Nemausensi plurimum.



PEDICULARIS Alekorelophos.

Aduers. pag. 334.  
Fistularia Dod.

Tanacetum.

Tanacetum  
nō odoratum.

TANACETVM, Aduersf. pag. 334.  
 Angl. Tansy. Ger. Geyfarn. s. fluk  
 in ripis nascens. Ital. Tanaceto.  
 Artemisia monoclonos Fuchs.  
 Albanasia & Artemisia scitica  
 species Ruellio.

Speciosius TANACETVM cristatum Anglicum.  
 Aduersf. pag. 335.



TANACETVM non odoratum.  
 Aduersf. pag. 335.  
 Perperam Syderius Italicorum.

MATRICARIA



**MATRICARIA nostrat.** *Aduers.* pag. 335.  
*Artemisia tenuifolia* Fuchs. *Ger.* Mutterkraut.  
*Angl.* Fleueseto, & Fedderfeto. *Ital.* & offici-  
 nis, Amarella, & Matricaria. *Belg.* Morder-  
 crupt, & Mater. *Gal.* Matricaire, & espar-  
 goutte.

**ABSINTHIUM vulgare.**  
*Ponticum* Ruellij.



**DIOSCOR.** Absinthium, aliqui bathy picon, herba vulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in mon-  
 te Tauri nascitur. Vinum habet calfaciendi & adstringendi. bilem expurgat, \* qua & stomacho & ventri indest. vrinam  
 cit. crapulam præsumptum arceat. ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum fesele & nardo gallico potum.  
 fastidia discurit. arguatos sanat. madesacili dilutum, aut decocti ius. quotidie tribus cyathis haustum. menses cit potum,  
 aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. aduersatur ixiæ venenis cum  
 vino. item cicute, & muris aranei moribus, & draconimario. angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epiny-  
 elides ex aqua, ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. denarium auriumq. do-  
 lores decoctum vaporis suffitu compescit. decoctum in passo dolentibus oculis oblitur: item præcordiis & iocineri, tritum  
 cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo. cum ficiis autem, aceto & loliacea sari-  
 na, aqua inter cutem lienosisq. subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthitem vocant, præsertim in Propontide & Thra-  
 cia, quo ad antea dicta vtuntur, cum febris caret. alioquin in aestate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem re-  
 ferunt. Insparsum arcis absinthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat. culices ex oleo perunctum abigit, & à corpo-  
 re arceat. atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum  
 eosdem præstare effectus. Atramentum potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem.  
 Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

\* Gal. Adstrictoriam, & amaram, & acrem simul qualitates possidet exalfaciens pariter & exterges,  
 & roborans & deficcans; proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit, ac per  
 vrinam euacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per vinas expurgat. Ob hæc contentam in  
 ventre pituitam nihil adiuvat sumptum: sic sanè si in thorace aut pulmone contineatur. Nam adsting-  
 gens in eo facultas, quàm amara, valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco maiori por-  
 tione calidum est quàm frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum  
 primas circumscribere facultates (& si anomoeretes & dissimilare sit) calidum ipsum dixit primi  
 excessus, sic cum tertij. Succus autem eius longè quàm herba calidior est.

Gal. Absinthium Seriphio Santonico & Abrotano minus calidum, nempe plurimam obtinens adstrictionem. Quod cum sit & minus quoque tenuium quam illa parium, & vtiq; minori etiam quam illa, ad eundem modum extenuandi facultate: attamen non minus desiccatorium est. At cæterorum Santonicum, proximam habet facultatem. Seriphio paulo imbecillius in extenuando & calfaciendo desiccandoque. Porro ipsum Seriphium Abrotano minus est calidum; verum calidius Absinthio, stomacho impendit inimicum, nempe cum amaritate salfedinem quandam præferens: sed & quandam licet minimam adstrictionem obtinet. sic & Abrotonon & Santonicum admodum infesta sunt stomacho.

*ABSINTHII Pontici multe similitudines & varietates.*

Quia foliorum demensus, parilitasque & odor doctos magnoperere torserunt, Turnerus Anglus quoddam Absinthium in Apeninis Italia montibus foliis minoribus à se repertum posteritati Anglico idiomate prodidit; cui aliud minimum & tenuifolium quoddam genus etiam subdunt & statunt; qualia hodie etiam studiosè alunt, & cæteris præferunt de dote aromatica & iucundo remissione amaro, ventriculo & visceribus gratiores, doctissimi pharmacopœi P. Coldenbergius & Ioannes Muttonus. At superius docuimus *ivordlay*, non gratiam odoris vel suauitatis, sed fragrantiam & vehementiam plerumque indicare; & potentiore id pollere facultate, cuius opè potentius agit. Amari autem est aperire, abstergere, urinas ciere & bilem purgare.

*PONTICVM supinum herbariorum.*

Alterum quippe horum Ponticum supinum vocant, ut cuius cauliculi procumbant: folio & semine Absinthij arborecentis mox infra descripti. Odor suauissimus, gustus aromaticus, amaricans.

*PONTICVM Tridentinum Herbariorum.*



Ex Ponti & Tauri montibus & Romania nobis & Tridentinis impertitum asseritur, cuius omnium minima folia sunt albida, aromatica, adstringentia & subamara.



*ABSINTHIUM arborescens.*  
*Absinthium del Comasco Anguillara.*



*ABSINTHIUM album, capitulis squarosis, floribus albis, umbella Achilleæ montana.*



Vulgari non ita foliis, & flore dissimile, sed fruticis arboreæ habitus, Abrotani modo hominis proceritatem adipiscitur: candidiore & minore paulò folio semper virente. In Belgio aliquando emoritur ob hyemis & calis inclementiam. Gustu amaro, aromatico, odore non ingrato.

*ABSINTHIUM album.*

Rarius multò hoc Absinthij genus in Belgio, Gallia, Anglia, & Italia, nullidum memoratum scriptori: vni C. Clusio nostro agnitum, & D. Dilisio Vienna Austriæ transmissum. folio Chrysanthemi diffusura, Artemisiæ marinæ copcolori in cauliculo dodrantali. flos albus Parthenij in vmbellis fenis foliolis: gustu subadstringit, nonnihil amaricat.

*ABSINTHIUM vmbelliferum alterum Italicum. Ital. Assenzo ombelifero.*

Nehoc quidem adhuc literis proditum, quippe non frequens obuium vel minus notum; ortu, colore incano & habitu ipso non ita diuersum cum superiore, sed omnia exiliora multò. Cauliculos plures spichameos emittit, summis flosculos in glomeratis capitulis incanis gerens. Itali stirpium exploratores, à quibus studiòse alitur, Vmbelliferum Absinthium dixerunt. folia amara Absinthium Pericium Tridentinum, non multum magnitudine superant.

*Varietas.*

SERIPHII Abrotani femina facie differentia.

Aduers. pag. 336. & 337.

Santonicum maius Cordi.

Santolina Dod.

Diosc. Galatium Sardonium ABSINTHIUM,

Perperam SANTIOMICVM vulgi,

est Absinthium ROMANVM officinarum falso creditum.

Abrotanum candidum Cordi. & femina Fuchf.

foliis & similitudine quadam Achilleæ,

Ponticum Absinth. Dod. & Fuchf.

Santonicum Ruellij. Aduers. pag. 337.



Huius sex varietates in horto alebat noster Ioannes Muttonus, quarum pars foliis est Chrysocomes Monspeliacæ angustifoliæ pars verò foliis cristatis Chamæcyparissi, Sabine vel Ericæ, minutis. Ex Hispania & Galloprovincia Belgij inquilina facta sunt. Horum nullum est officinarum Semen sanctum, siue contra vermes, vt credidit D. Dodonaus.

Seriphium Galloprovincia. Aduers. pag. 337.

Succellu temporis degenerat: fragrantia, tomento & candore exiuit in Belgij & Angliæ viretis.

Marinum ABSINTHIUM, siue SERIPHIVM.

Dioscor. Herba est tenuis, abrotani parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamaræ, stomacho inimica, ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit, per sese aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tinea, adiecto melle enecat. alium leuigat. cum edulio autem vellenticula decocta, eadem præsare potest. percora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scaturit, id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum sabamarum est, non aded seminis fecundum. Eadem quæ Seriphium potest.

Santonici.

Gal. Non a quæ vt Absinthium adstringit; & plus exalfacit, amaritatem quæ quandam cum falsedine respicit. Stomacho inofensum est, magis quæ absinthio lumbricos necat, siue foris impositum, siue intro in corpus assumptum. Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intento censendum est, exsiccare in tertio.

SERIPHIVM vulgare, Dioscoridis perperam putatum. ARTEMISIA marina tenuifolia. Artemisiam tenuifoliam potius refert, minutissimis incisus foliis albis, semine & floribus; odore Lauendulæ & Abrotano proximis vel Artemisiz marinz.

ABSINTHIUM inspidum.

Absinthio Põtico supino folio, ramulis & floribus, quodammodo simile, sed gustus & amaritudinis expers.

XANTONICVM vulgare, è Xantonum Gallorum agro, Saintonge vernacule.

Seriphio vulgari non ita abssimili, longiore & viridior folio, ingrati & saporis & grauioris odoris. Belgis hortense apud Ioannem Muttonum nostrum.

SEME



*Aliud peregrinum sive ÆGYPTIVM ABSINTIVM. Aduers. pag. 337.*



*CAPNOS. Aduers. pag. 338. Angl. Fumoterp.  
Ital. Fumoterra.*

**DIOSCOR.** Succus claritatem facit oculis, delacyrmationemq; unde nomen traxit. Illius cum gummi enulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam vrinam † trahit.

\* Eadem Gal. & Plin. † Gal. addit: sanatque iccoris obstructions & debilitates: quia acris simul & amaræ qualitatibus est particeps: nec tamen planè expers est acerbè. Plebeius quidam ea vti solebat ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam primùm siccata condebat deinde cum vti volebat subductionis quidam gratia melicrato inspergebat; roborandi verò causa, vino nimirum diluto.

Plin. lib. 26. cap. 7. Capnon herbam qui edere, bilem per vrinam trahunt.

Serum humoris adusti & melancholici ducit. necnon pituitosum additis Stœchade, Zingibere, Betonica, Selino, Marathro, & huiusmodi pituita concoquentibus & præparantibus.

pa. 338. l. 42.  
deme, mollicet.  
loteneroij, rasil  
in aquis sicutas  
re, vñ, radice exi  
gua enulsio faci  
li.



*Capnos tenuifolia.*




*CAPNOS tenuifolia cauliculis surrectis.*  
*Aduers. pag. 338. Hisp. Palomilla.*

*Varietas.* Hæc eadem Belgicis in viretis nostris caducis & procumbentibus cauliculis oritur vbi semel lata fuit. Semen compressum sublateum: flos hilari purpura rubet.

*CAPNOS alba latifolia.*  
*Spith album quorundam.*



*Fumaria lutea montana.*



*Varietas.* Floribus albis & latioribus foliis in segetibus Cornubiæ, & syluosis agrorum marginibus Brabantia: provenit: capreolis sepes arcepit.

*Κορυδάλιον. FUMARIA lutea montana,*  
*sive SPLITH.*  
*Chelidonium Capnites Aetij.*  
*Corydalis Anguil.*

Urinas strenuè cit, Anguillara teste.



**RADIX CAVA** herbariorum, siue Bulbosa  
*Fumaria* Plin. Aduers. 338. & 339.  
*Perperam Pistochoia* Fuchs. Germ. Holwurtz.  
 Belg. Holwojtele. Gal. Racine creuse.  
*Chelidonia phragmitis*, *Capnium Aetij*, &  
*Capnos phragmitis* Plinij Cordo.

*Fabacea radice CAPNOS* aliter.  
 Aduers. pag. 339.



Radix amara, excessu secundo calida, & sicca. Digerendo, abstergendo & defluxiones inhibendo, anginis & laringum tumoribus gargarizata prodest, pituitamque extergit.

*Fabacea radice FUMARIAE* varietas.

Herbaceis florum rudimentis variat in hortis G. Driefch & Mutoni.

**CHELIDONIUM** maius. Aduers. 339. Num *Virga Tinctoris* Auicen.?  
 Ital. Celidonia maggiore. Hisp. Celidonia & yerua de las gol ondrinas.

**DIOSCOR.** Succus in aevo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folia, caule, radice, succus exprimitur ineunte estate, & siccatu in umbrâ digeritur in pastillos. Radix cum aniso & vino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quae serpunt. imposita cum vino, aut manducata, dentium dolor em sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excaecatis pullis adnotâ herba visum restituere.

Eadem

Eadem Plin. & Gal. Admodum extergentis & calidæ facultatis est: vtiq; in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur discussione indigens, & ad acutendum visum succus eius commodus est.

Et cicatrices extenuat Plinio. albugines etiam iumentorum.

*Essentia Chelidonij Theophrasticè.*

Chelidonij herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul pultis instar contunditur, inditurque ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur. Deinde in balneo humor ad siccum siccitatem usque extillatur: postea hæ conterantur in puluerem, & humore paulò antè prolecto, perfunditur. Rursusq; diebus triginta in fimo maceratur, ut prius. tunc ex cineribus calidis destillatur, separaturq; aqua ab oleo: quod Chymici verà Chelidonij essentiam appellant. Ex siccibus in cinerem reductis cum aqua sal elicitur, atque hoc modo tria illa simul principia Paracelsi conficiuntur, quorù apud Chemicos vtilitas ad multa commendatur.

*AQVILINA. Aduers. pag. 339. Ital. Aquileia & Celidonia saluatica. Lege, num sit Pothos Theoph. Leontostomi Gesneri, siue Leo herba Dod.*



Tragus & Matth. seminis 3. j. cum croci obolo ex vino, obstruētis hepate & vesica fellea regio morbo vtiliter dari afferunt. Ad pestiferam luem commendatur.



CHELIDONIA  
majus.



ARTEMISIA

AQUILEIA  
picnis &  
tiplicis  
sua uisum  
floribus  
ueris cu  
hortens  
tiplici ca

Varietas



Diosc. Viraque excaesat, extenuat. feruifacit  
conuenienter in muliebres defessus adiungitur, ad detra-  
hentos menses, partus, secundasque. item ad praefusiones  
vuluae, & eiusdem inflammationes. calculos comminuit.  
remor atam vrinam cient. menses pellunt pubi illis a. Suc- *lege lepto-*  
culi vuluae inditus ex myrrha, eadem qua in sefro trahit. Co- *phyllō. lra. 18.*  
matribus drachmis eorundē educendorum gratia bibitur.


Gal. ad renum calculos mediocriter, & ad vte-  
ri fomentationes prosunt.

Addit Plin. eandem quoque secum habentibus,  
negant nocere mala medicamenta, bestiamūe vl-  
lam, ne solem quidem. Bibitur & haec ex vino ad-  
uersus opium. Alligata priuatim potens traditur, *Eadē Apul.*  
potatūe aduersus ranas. Alligatam qui habet viator  
negatur lassitudinem sentire.

APUL. Hīs virtutibus praedita est: herbam  
Artemisiam monoclonon, si quis iter faciens secū  
in manu portauerit, non sentiet itineris laborem.  
Fugat & dēmonia in domo posita, & prohibet ma-  
la medicamenta, & auertit oculos malorū hominū.  
Herba Artemisia monoclonos tusa cum axungia  
& imposita, pedum dolorē tollit. Pisata & in pul-  
uerem redacta, cum aqua multa potui data, intesti-  
norum dolorem sedat.

Ad stomachi dolorem: herbam Artemisiam le-  
ptaphyllon tusam & cum oleo amygdalino bene  
subactam mote malagmatis induces panno mun-  
do, & impones stomacho, quinta die sanabitur.  
Ad neruorum dolorem atq; tremorem: Artemisiā  
leptaphylli contrita succo expresso, & mixto cum  
oleo rosaceo, si perūges eos, desinet tremor, & om-  
ne vitium tollitur.

ARTEMISIA  
marina su-  
perioris folia  
incisa. quoni  
manifestas  
incisuras pi-  
ctor omise-  
rat.  
Aduers. 241.





*ARTEMISIA marina.**Abfimbium angustifolium* Dod.*Perperam herbariorum abfimbium odore Lauendula.*

Videtur Pliniana suaui odoris: odor ille quippe Lauendulae & Abrotani maris ferme.

Vera Artemisia marinae folia habent manifestas incisuras, quae littoreis natalitijs conspiciuntur, & nonnunquam etiam in hortis. plura require in Abrotano foemina pag. 341.

*leg. fm. 9. inci-  
sura, Portu-  
lacc marinae  
&c.*

*AMBROSIA sativa hortensis procerior.**Aduers. pag. 341.*

*leg. folia Ru-  
tulin. 24.*



*AMBR  
spontan  
ter. goli*



*AMBR  
tenuifolia*

*AMBR  
altera M*

*Etiam Gal.*

*AMBROSIA varietates.*

In triplici differentia est Ambrosia, quarum hortensis propter cultum campestem & sponte enatam foliorum magnitudine longe superat: odor, sapor, habitus non diuersi.

*AMBROSIA tenuifolia: Abrotani vel Artemisia: leptophylli species sortè.*

Ambrosijs haec facie cognata, sed folio & floribus multo minoribus: nec alias aut odore aut sapore illi.

*Diosc. Vis eius reprimere ac repellere, & illam adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.*



ABROTANVM *seminna.*

*Chamaecyparissus* Plin. *Herbariorum.* *Santonicum*  
*minus* Diosc. *Cordi.* *Hisp.* *Yerua* *Lombriguera.*  
*Advers.* 341.

ABROTANVM *mas.* Gall. *Aueronne.* Belg. *Aue-*  
*ronne.* Gallobelgis *nonnullis.* Bois S. Jean.  
*Ang.* *Borberntwoud.* *Advers.* 342. \*



*Chamaecyparissos* Plinio herba ex vino pota contra  
 venena serpentium omnium scorpionumque pollet.

\* **Diosc.** *Crudum* *mentritum* & *feruifacitum* ex aqua in potu auxiliatur *orthopnoicis,* *tonicis,* *raptis,* *co-*  
*xendicibus,* *vrinae* *angustis,* *urinis* *suppressis,* *aut* *remorantibus.* In vino potum *exitialium* *venenarum* *antidotum*  
*est.* *Horribus* *ex* *oleo* *illinitur* *serpentes* *et* *substratu* *et* *nidore* *fugit.* Contra *ictus* *eorum* *cum* *vino* *potum* *pro-*  
*dest.* *Pruritus* *efficax* *contra* *fiori* *orum* *et* *phalangiorum* *venena.* *Oculorum* *inflammationibus* *commode* *illinitur.* \* *Eadē* *Gal.*  
*Cum* *coroneo* *colto,* *aut* *pane* *tritum* *cum* *urina* *hordeacea,* *decoctum* *et* *tubercula* *difcutit.* *Irimi* *compositionibus* *ad-*  
*miscetur.* *Idē* *femina* *gravioris* *odoris* *videtur* *hic* *Diosc.* *agere.*

*Calidum* & *siccum* *tertio* *ordine* *Gal.* *stomacho* *infestum,* *de* *quo* *capite* *De* *Abfinthio.*

*Gal.* *Abrotonum* *ustum* *calidum* *siccumque* *facultate* *est,* *magis* *quam* *Cucurbita* *sicca* *vita* & *A-*  
*nethi* *radix:* *illa* *enim* *ulceribus* *humidis* *simul* & *citra* *phlegmonem* *callo* *induratis* *conueniunt:* *ac*  
*proinde* *maximē* *ulceribus* *quae* *pudendorum* *præputijs* *competere* *videntur.* *At* *cinis* *Abrotoni* *ul-*  
*ceribus* *omnibus* *mordax* *est:* *ac* *idcirco* *cum* *oleo* *tenui,* *cicino* *scilicet,* *aut* *raphanino,* *aut* *sicyo-*  
*nio,* *aut* *veteri,* & *maximē* *Sabino* *ad* *alopecias* *accommodatur:* *tum* *barbam* *segniū* *tardiusque* *ena-*  
*scens* *cum* *a* *liquo* *dictorum* *oleorum* *elicit:* *Sed* *nec* *minus* *illis* *lentiscino* *maceratam;* *quippe* *pro*  
*eo* *quod* *est* *tenuium* *partium,* *rarefaciendi* *vim* *obtinet,* & *mordax* *est* & *calidum.*

Kk 2

Odoratum

*Odoratum ABROTANVM humile  
dense fruticosum.*

*ABROTANVM inodorum.*



Materiæ medicæ peritiores hanc vnâ nobiscum Abrotanorum vnâ se hinc vult, quibus bellè quadraret. Est quippe folijs non absimilibus, sed viticulis densissimis, folijs fruticat sesquicubitalibus duorumque pedum, tenuibus, lignosis, copiosis flosculis Abrotani ex herbido luteis, odoratis: Radice lignosa, flexuosa & proluxa. Belgis hortense est.

*ABROTANVM inodorum & inspidum.*

*Varietas.* Abrotanum inspidum & inodorum vultu, folio, flore & semine Artemisiæ tenuifoliæ è collibus Gallobelgij alit Muttonus, Coudenbergius & Iacobus Plateau harum studiosissimi & peritissimi.



**ANTHEMIS vulgarior.** Hisp. Manzanilla & Manzanilla saluage. Ital. Camamilla. Gall. Camaille des chams vulgaire. Aduers. pag. 342.

**ANTHEMIS seu LEUCANTHEMIS odorata.** Parthenium Tragi. Germ. Eet Chamil. Gall. Camemille & Camomille. Hisp. Manzanilla. Angl. Camomple. Aduers. 342.



**Diosc.** Vim habet radices, flores & herba excoassaciendi, extenuandique, potu & infusione. pellunt menstrua partus. \* vrinam, calculosq., aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur. bilem suffusum expurgant. iocinerum vi- \* Eadē Plin. tia sanant. decocto earum vesicae fouentur. Ex on nibus † his generibus ad calculos efficacissima est, qua florem purpu- † Eadē Plin. reū habet, cuius amphitelo matu- est. hanc proprie HERANTHEMON vocant. Ea cui Leucanthemo nomen est. ERANTHE- item qua chrysanthemon dicunt, v. c. mentius vrinā ciunt. agilopijs \* illa medentur. cōmanducata vlcerum eruptio- \* Eadē Plin. nes in ore, sanant. nonnulli in clyst.ibus ex oleo vruntur. teruntur in farinam, ad abirendos febrium circuius. Flo- res & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digerī: radix quoq; sicari, dumq; ingruit necessitas, binā partes herba dari, modō floris aut radici pars vna, modō contra, floris partes duae, & herba vna, permixtatiū du- plicato pondere, alternis diebus. bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

**Gal.** Calfacit & desiccet in primo ordine. est & tenuium partium; ac proinde digerendi, laxandi & rarefaciendi vim obtinet. quapropter lassitudinibus vti si quid aliud confert, doloresq; mitigat. Præterea tensa remittit & laxat; quæ mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata condensataue sunt, rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris alicuius inflammationem infestant, dissoluit, præfertim quæ ex humoribus biliosis aut cutis densitate consistunt; aut eas quæ iam concoctæ sunt. Luuat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium Chamæmelum vel strenuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, vti si quid aliud, gratum existit.

ANTHEMIS Chrysanthemos.  
Aduers. pag. 343.

BUPHTHALMUM tenuifolium Narbonense.  
Chrysanthemum Valentinum Clusij.



BUPHTHALMUM. Gal. Oeil de beuf. Hist. Oio de buey. Ital. Occhio di boue.  
Germ. Streichblumen & Streinblumen & Gindts augh. Belg. Struypbloemen.  
Chamamelum Chrysanthemum Fuchf. Aster atticus Cordi.  
Aduers. pag. 334. & 343.

Diosc. Flores cum cerato triti, tumores duritiaq; discutunt. Aiuue ep[ist]mi post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.  
Gal. Bupthalmi flores aciores Anthemidis floribus; proinde & vehementius digerunt, aded vt & duricias sanent cerato misti.

BUPHTHALMUM tenuifolium Narbonense.

Strigosis Galloprovinciæ & Narbonensis Galliæ provenit floribus radiatis, luteis Bupthalmi & folijs Anthemidis vulgaris siue Cotulæ non fatidæ, minutis nonnihil incanis. Radix palmum æquat: cauliculi pedales, cuiusmodi etiam memini apud Franciscum Penninum & Valerandum Donreum doctissimos & fidissimos pharmacopœos Belgas erutas agro MonsPELLIACO.

ERANTHEMON. Aduers. pag. 344.

Tragus Asterem Atticum, cuius flos medio luteus, statum.  
Fuchsius verò perperam Regiam Consolidam.






Kovardensis. PARTHENION, vel Virginea est Co-  
TYLA fatida, non Matricaris.  
Camemilla fatida. Germ. Hondsdyl & Hondsbloom.  
Belg. Dabde bloemen & hoedple. Aduers. 344.  
Fen. h. perperam Buphtalmum & Thalerum Cordi.

Diosc. Siccatur, cum aceto mulso aut sale potu,  
non secus atque epithymum, & bilem & pituitam detra-  
hit. suspiriosis prodest & melancholicis. herba sine flore à  
calentiosis & aphelatoribus magna virtute bibitur. Valet  
decoctum ad insidendum in duritia valvarum, & inflam-  
mationibus. illinitur sacro igni, & collectionibus, cum  
flore.


Pyrethrum officinarum. Salutaris.  
Gér. Bertram. Belg. & Ital. Pyrethrum Gall. Pied  
d'Alexandre. Hisp. Pelitre. Aduers. 346.



Diosc. Radix gustu feruidissima, vitium elicit:  
ideo in dolore dentium decocta in aceto, collata inde ore,  
auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciet, perun-  
cto ex oleo corpore. Diuturnis horribus efficax est, &  
contra persultiones membrorum, resolutionesq; eximie  
conducit.

\*Dentes refrigeratos Gal. mitigat. \*ad rigo-  
res ante peridum, Gal. \*eadem Gal. \* & fr-  
gidos capitis affectus, vertigines & comitales.

FOENI-



FOENICVLVM. Hifp. Hinojo & Funcho Lufit. Ital. Finocchio.  
Germ. etiam Fenichel. & Angl. Fennell.  
Aduerf. pag. 347.



Diosc. Foeniculum si herba edatur aut semen cum pisana bibatur, mammas lacte replet. coma decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur. menses ciet. in febris nausea & stomachi febre, ex aqua frigida potum sedat. contrita radices & cum melle illita, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijciuntur, quae ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi ramulis, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quae ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demittunt, igni, admouent, quod facilius vi caloris exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

[Oculorum aciem] non modò succus oculorum hebetudines expurgat foris illitus: sed intro quidem in corpus sumptus Foeniculus siccando humores tenues spiritus incrassantes, claritatem adfert; vel etiam per urinas educit aquea excrementa cerebro perfusa, quae hebetudines oculorum inferunt.

Gal. Ex tertio ordine calfacientium: desiccatur verò non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: proinde lac procreat. Quod si admodum desiccaret, non sanè efficeret. Suffusus eadem ratione auxiliatur, urinas mensesque ciet.

FOENICVLVM erraticum siue Hippomarathrum.

Diosc. Est & sylvestre fœniculum, magnum, fert autem semen cachryi simile. Cuius radix iucunde olet, potaq; stranguria medetur. menses imposita ciet. ventrem sistit, radice aut semine potu. contra serpentium morsus auxiliatur. calculos comminuit. regium morbum expurgat. lactis abundantiam facit. decoctum foliorum haustum, feminas à partu purgat.

Trahitur aliud Hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo respondet, ad omnia infirmus.

† Gal. Hippomarathro facultate simile, sed debilius.

Gal. Radix & semen amplius quàm domestici desiccandi vim obtinet: quocirca ventrè quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non radix modò, sed & semen Cachryi assimile est, potestque & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesque & urinas mouere, non tamen lac congerere, sicut illud superius.



**ANETHVM.** *Hisp. Eneldo.*  
*Gall. Anet. Ital. Aneto.*  
*Advers. pag. 347.*

**MEVM.** *Ital. Finochiella. Hisp. Catalonis Sistra,*  
*Pinillo oloroso. Angl. Mew. Advers. 347. 348.*  
*perperam Fuchs. & Trago Daucus Creticus.*  
*& Cordo Toradilium.*



**Diosc.** Aridi Anethi coma seminisq; decoctum, potu lac euocat: inflationes & tormina sedat; aluum, vomitionesq; sistit. Vrinæ ciet. Singultus lenit: Oculorum aciem beberat: genituram restinguit, assidue potum. seminis vulua malo opportunis, ad defensiones viile. Condylomata illius cinis tollit.

**Gal.** secundi ordinis intensi calidum, aut tertij remissi; exiccantium verò est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque meried in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos & incoctos humores concoquit. fit enim ex eo oleû cuius propinqua fit temperies pus mouētibus, & concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum subtilius est, ac proinde digerens. Vltum autem tertij ordinis tum exalfacientium, tum desiccantium fit, & proinde vlceribus nimis humidis mollibusq; prodest; potissimum ijs quæ in pudendis consistunt: At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice includit. Cæterum viride humidius est & minus calidum; itaque magis concoquit & somnum conciliat; sed minus digerit.

**MEVM.**

**Diosc.** Radicibus longis, tenuibus, odoratis, linguam exalfacientibus. Quæ seruesacta ex aqua, vel trita citra coctionem, præclusorum renum vesicæq; sacra vitia poru leniunt. vrine difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, affecta vulua, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in cellegmate auxiliantur. sanguinem per menstrua pellunt, defensionibus seruesacta. infantibus autem illa imo ventri, vici-<sup>lege lin. 40.</sup>nas movent. quod si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt. <sup>in vitæto.</sup>

**Gal. & Aegin.** Mei radices calidæ tertio ordine, siccæ secundo: proinde vrinâ mensesque ciere volentes hoc vuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, vt pote cum plusculum sit calidum quàm siccum, quippe quod eius caliditas humiditatem caudiorẽ etiamnum, & flatuosiorẽ ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat † lædatque.

† vt amygdala, vinum & huiusmodi.

*Spurium M<sup>o</sup> v<sup>o</sup> M<sup>o</sup> alterum Italicum.*  
*Meum secundum Martb.*

FERULA. Ital. Ferola. Gall. Ferule.  
*Aduers. pag. 348.*



Superiori Meo facie non abfimile; fed folia, caules cubitales, vmbellæ, craffiora & habitiora, fubuirofi odoris. Radix item maior, foris pulla Peucedani facie & concretionē, tetti & iniucundi cum odoris, tum faporis.

FERULA.

Diosc. Hyridi Ferula medulla pota vitilis est ad cruentas excreationes, & liacosq<sup>ue</sup>. contra viperarum morsus in vino datur. erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur. sudores ciet, vnto ex oleo corpore. Caules; si edantur, capitis dolores faciunt. muria conduntur. Ferula itaq<sup>ue</sup> caulem proferit terrā sape cubitorum: folia fœniculi, longe asperiora & lutiore. qua ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur.

Gal. Ferulæ semen exalfacit & attenuat. Caterum id quod intus inest, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguinem spuentibus & cœliaci conuenit.



## GALBANIFERA Ferula.



Oritur in hortis nostris hæc peruenusta plāta femine copioso lato, foliaceo, aromatico, reperto Antuerpiæ in Galbani lachryma. Tota facie Ferulæ refert: folia exilia: stoculi item in umbellishilarioribus. radix crassa, succo prægnas.

Diosc. Galbanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & ferulæ, gravi odore, neq; valde humidum neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit, menses ac partus trahit, appositum vel suffitum. vertigines aceto & nitro perunctas tollit. deuoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. aduersatur toxicis, potum cum vino & myrrha. simili modo sumptum mortuos parius extrahit, imponitur lateris doloribus, & surunculis, comitiales, & vulua strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur, si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum, necat. dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat. vrima difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad poriones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæ. aliàs meconio, ære vsto, aut felle liquido. Si purgare galbanum voles, in feruentem aquam demittito. nam, cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt, quas hoc modo facile separabis: munda linteo raroq; alligatum in fittili aut ærea pyxide ita pendeat, vt innum vasis ne tangat, operitoq; vase in feruidam aquam demittito. sic enim syncerum, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Gal. Galbanum succus est plantæ ferulacæ molliendi & digerendi vi: fueritque sanè ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo; in deficcando verò ex secundo incipiente.

## Ammoniacum.

Diosc. Ammoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agassylim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus iurausma, id est friaturam, appellant: quod verò terram & calculos collegit, phryama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacæ arbore. Mollit, extrahit, calfacit. tubercula duritiæq; discutit. potum, aluum soluit. partus extrahit. lienem consumit, drachma pondere haustum. articulorum coxendiciumque doloribus liberat. auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum priscana succo sorbeat. cruentam vrinam pellit. albugines oculorum absterget. genarum scabritiam absumit. tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat. discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro & cyprino oleo, vice acopi.

Gal. Ammoniacum emolliendi facultatem habet intensam, adeo vt & articulorum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & chæradas per halitum digerat.

*Thapsia vulgaris* Carota effigie.

Matth. & Ital. Thassia. Gall. Turbit gris.

Sagapeni odore Ferulacea, an Sagapenisera Ferula?



Sagapeno admodum odore affinis est ea Ferulacea planta quam alit generosus vir Ioannes de Brancion, parulis & ramosis folijs procumbentibus, delicatioribus, Syderitidis Achilleæ & Corulæ fetidæ ritu diuisis. Radice succulenta Peucedani foris pulla, intus candida, odoris virosi. Flos in latis umbellis luteus, & semen foliosum Sefeli Peloponenfis. Nascitur plurima in Apulia Gargano monte Matthæ.

SAGAPENV. Aduers. 349.

Sagapenum potentissimè digerit: estque epipasticum medicamentum; alopecijs vtile, educendo, & digerendo serum pituitosum, quo locus affectus obruitur; & sanguinem ad partem alliciendo.

Diosc. Sagapenum ferulacea herba succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo formæ colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Prodest luterum & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. crassam pulmonis pituitam expurgat. datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis, item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. in vnguenta probe admittitur. menses pellit. sed satum exanimat, cum hydromelite potum. prodest ex vino haustum, serpentium ictibus. olfactu ex aceto vuluarum strangulatus excitat. oculorum cicatrices, ossis caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur vi laser, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

Gal. Liqueor est calidus & tenuium partium, sicut & alij liqueores. Sed & absterforium quoddam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin & suffusionibus & hebetudinibus oculorum quæ ob humorum prouenit crassitiem, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua prouenit Ferulæ assimilis, imbecilla & inutilis est. Sanè ipsa primum Sagapenum appellatur. At liqueor eius abusuè hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus.

THAP.



## THAPSIA. Diosc. Turbith Mesue. Aduers. 350.

**Diosc.** Radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendivario hac est: Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornici speciem in se excauata, cooperitur, quod merus succus confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fictilibus crasso insolatur. Aliqui solum vna terunt. sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus, exiccatur, atque terebinthini iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius, cum dies aprius est, & à flatu silet. quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinūt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radices, quā succus, purgandi vim habent. lacteus succus in aqua mulsa potus, vtring, bilem extrahit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminibus anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus vnus. quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tam radix quam succus omnium maximè, qua pares cum eis vires adeptæ sunt, vim habet extractoriam ex alto, vbi ex imo aliquid enocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est. vnde succus illitione, aut radix recens affrictu, alopecias explent. Radix succusq; cum aquis cera thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt: sed non plus bimis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus succus, lepras tollit. tubercula discutit, perunctus cum sulphure. in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumq; valetudinibus vtiliter illinitur. valet ad interegendam colicam glandem, ijs qui natura, non circumsione, curti sunt. tumorem enim extirpat, qui pinguium fotu emolliens, præputij iacturam resarci.

Gal. Acrem habet ac valenter exsiccantem facultatem cum humiditate coniunctam. Quamobrem ex alto violenter extrahit, & ipsum quod extrahit digerit. Verum plusculem ad ea efficienda tempus postulat, vt quæ larga humiditate excrementitia impleta est, ob quam celeriter corrumpitur.

**Mesue.** Turbith calidum est ordine tertio, purgat trahendo mediocriter, status excitat ventriculū ad nauseam euertentes: siccit quoque excrementis etiam tenuibus vacuatis. Correctum enim Turbith pituitam crassam & lentam à ventriculo, thorace, nervis, etiam à remotis, præcipuè iuncturis educit. Ob id ad dolores arthriticos vsus eius est: à plora, lepra, baras, & alijs vitijs pituitosis, tum cutis, tum aliarum partium, & pituitosis febribus, aut præseruat, aut vindicat. Hoc autem sumptu, vitabis austerum, & vsu piscium. Purgat tardè & imbecilliter, & stomachum ad nauseam subuertit, & vsu crebro corpus extenuat. Ob id cortex eius ad albū vsq; abradendus est. Acris autem, vt Zingibere, sic eius actio intenditur, vt proprietate quadā mirabili per id cumulatū, etiam à iuncturis, & his remotissimis & profundissimis pituitam crassam & lentam extrahat, cum per se solum tenuem pituitam educat, idq; tardè. Ne verò stomachū exagitet, ac euertat, medicamenta stomachica miscentur, & odorata agitationem eius placatura, vt Mastiche, Zingiber, piper longum, gallia, & aromatica alia. Ne denique corpus emaciet, oleum amygdalinum, vel amygdala vel saccharū ei miscenda sunt: vel cum Ruffo pistachia. Si quam in corpore noxam reliquit, pota mulsa calente, aut quæ saccharo rubro est dulcorata, aqua calida, eam profligabis. Coctionem & triturationem mediocrem sustinet. Datur puluere à drachma vna ad 3. duas: Decocto autem à drachmis duabus ad drach. quatuor.

**PEUCEDANVM.** Ital. Peucedano.

Hisp. Yeruatun y fenicho de porco.

Gal. Peucedane. Aduers. 350.



## PEUCEDANVM.


Diosc. Tenera radix cultello conciditur, profuensq; e plaga succus umbra mandatur. in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo persusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiat. affusione radix inutilis fit. Tam lac quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e mādāgora, verum inefficacior succo lachryma habetur, & velocius expirat. Interdū etiā concretā inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibsq; adharēs. Praefertur succus e Sardinia & Samothrace, colore rufō, odore graui, seruēs gustu. Ex oleo & rosaceo illitū Peucedanū prodest lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. omnibus, in vniuersum, vitijs nervorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. eius olfactu respirant vulua strangulatus, & veterosireuocantur. incensum serpentes abigit. aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. cauernis dentium inditum, mitigat dolorem. contra rufum<sup>a</sup> efficacissimū ex ouo assumitur. suspirijs, torminibus, & inflationibus subuenit. ventrem leniter emollit. lienem<sup>b</sup> absorbit. difficiles partus mirē adiuuat. facit ad vesica cruciatus, & renum distentiones potum. vuluam aperit. Radix ad eadem vtilis est, sed inefficacior. eius decoctum bibitur. farina eius, sordida vlcerā purgat, & vetera cicatrice obducit. Squamas osium extrahit. in cerata & calfaciētia malagmata addiunt. Radix eligi debet recens quā cariem nō senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amarissimis nucibus aut Ruta aut pane calido, aut anetho resoluuntur.

<sup>a</sup> Gal. quia succus, excalfaciens admodum & digerens.

<sup>b</sup> eadem Gal. quia tenuium partium & excalfactorius.

<sup>c</sup> Gal. morbis in pulmone thoraceque ex crassitudine & viscolitate humorum prouenientibus. Atque intro quidem in corpus sumptus: sed tamen etiam olfactu prodest.

<sup>d</sup> eadem Gal. incidendo, digerendo atque extenuando crassos humores: Sed & radice ad hæc vtiliceat, quæ & squamas celerrimè ab ossibus detrahāt, quia videlicet valdè desiccāt, minus tamen quā succus excalfaciens. Et vlceribus contumacibus remedium est optimū arida illita: ipsa enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perducit: Excalfaciens quidem ordine secundo iam completo, desiccans verò tertio iam quodammodo incipiente.





*Varietas.* Peucedanum Italicum est Narbonensi quadruplo maius omni sui parte. Progenit copiosè in collibus Lauretanis & agri Romani.

## PANAX ASCLEPIVM.

*Advers. pag. 351.*

## CACHRYS verior.

*Libaniis Galeno.*



Circa Iustinopolim & Aquilegiam Istriae spontè oritur.

*Diosc.* Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedenas, & tubercula, strita cum melle imponantur. *Adversus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur.*

*Gal.* minus est calidum Heracleio Panace: quomobrem floribus eius & semine melli mistis, ad vlcera, phymata & phagedenas vtuntur.

## ROSMARINVM ferulaceum superius descriptum

*Advers. pag. 351.*

*Est potius Rosmarinum alterum ferulaceum Diosc.*

## CACHRYS verior.

Semine est tereti, oblongo strobilo siue nucleo Pini subpari, bipartito Ferulae ritu, gustu aromatico acri Sefeli Aethiopici resinaceo, caule cubitum & sesquicubjtu aequante. folia foeniculo crassiora, pallidè virentia. Quidam Sefeli Massiliense statuerunt; & sanè facultates respondent, vii & Rosmarino facundo, cuius semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis hortense est.

*Diosc.*

**Diosc.** Trita omnium herba communiter hamorrhoidum profluvia sistit. sedis inflammationes & condylomata mitigat, concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem agere perducuntur. Sicca radices cum melle vitrea purgant. torminibus medentur, cum vino pota. & contra serpentium morsus conueniunt. menses & vrinas cient. pereres maiores illitu discunt. Tam radices quam herba succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semenque eadem pollet. si comitialle malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur. sudores mouet, cum oleo perunctum. ruptis & conuulsis prodest. podagria cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur. purgat vitilignes, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus vtendū, eius quidem quod Cachryn non ferat. quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactuce syluestris amara asperioribus, candidioribusq, radice breui, Theophrastus auctor est. potumq, idipsum alterutra parte purgare. Cachrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exsiccandi. quare abstergentibus medicamentis inferitur. contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluiatur.

Gal. Libanotides tres sunt, vna sterilis, duæ fructum ferentes. Omnes verò eiusdem facultatis, emollientis & digerentis, abstergentis, incidentis. Succus tum radices, tum herba mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat.

**ELLEBORVS FERVACEVS** Theoph.  
Consiligo Marth. Helleborinum Cordi, & Sesamoides minus Gef. Aduers. 331. & 345.  
Euphrasium Dod. & Anguillara.

**SAXIFRAGA** Anglorum, facie Seseli  
pratensis Monspelliensium.





Seseli Massiliense. Advers. pag. 351.

LIGUSTICVM alterum Belgarum.



Seseli Massiliense Ferula aut Dauci Cretici facie, maioribus, crassioribus, latioribus, latiusque sparsis Fœniculi foliis. Caulis bicubitalis & procerior: semen in umbellis Mei, compressum, anethi carnosius, gustu Seseli Æthiopici aut Peloponensis, valde aromaticum. Munere Ambrosij Boone, Bruxellensis, Regij Consilij, peritissimi, & Francisci van Zinnich pharmacopœi doctissimi, & rariorem simplicium, ut si quis alius, itudicissimi in vireto Mutton Tornaci ferendum curavit, nosque plantis donavit.

Dioscor. Seseli Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre. radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix exsiccandi vim habent. potu stranguria & orthopnea medentur. suffocationibus mulierum comitialibusq; profunt. menses & partus trahunt. ad omnia interna mala pollent. tussim veterem sanant. semen cum vino potum, conoquit, & tormina discurit. epulis febrilibus ut le, contra perfrictiones in itinibus, cum pipere & vino bibitur. capiti, ceterisq; pecudibus datur in potu, quod facilius suos facit ementur.

† Eadem Gal. superius cap. de Seseli Peloponensi.

LIGUSTICVM alterum Belgarum.

Non inelegans planta multis iam annis à me reperta in Taurinis amœnissimis collibus non procul à Padi fluentis. In hortis Belgicis alitur, caulem promens cubitalem & setquicubitalem, quem ambiunt folia Rutacea Sileris Montani laticra, rotundiora, Abundij fruticis ferè paria. Flores & semen rotundum nonnihil aromaticum in umbellis Smyrnij Cretici.

## ASPARAGVS domesticus vulgaris.



ASPARAGVS. Aduers. pag. 353.  
Syluest. Asparag. Matth.

Maritimus numerosis maioribus baccis rubellis & foliis longioribus, mollioribus, acrior est propter saluginem.

**Dioscor.** Caulicq[ue] tritum vino albo, renum dolores sedant. Assus autem coctusve, vrinae stillicidium, difficultatemq[ue], ac dysenteriam mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. decocta cum fici aut ciceribus sumpta, regionum morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq[ue] leuat. Alligata radix<sup>1</sup>, aut haustum eius decoctum conceptum admittit, & sterilitatem auferit.

Hortenses vel marini mitiores multo, magisque temperati. Rhasis calidos & humidos putat: quod de tenellis turionibus intelligendum.

Plin. Vtilissimus stomacho cibus, vt traditur, Asparagi. Cumino quidem<sup>2</sup> addito<sup>3</sup> inflammationes quidē stomachi, coliq[ue] discutunt. Iidem oculis<sup>4</sup> claritate afferunt. Ventrem leniter<sup>5</sup> molliunt. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumq[ue] vitis profunt. Vino concoquantur<sup>6</sup> addito: lumborum & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Vrinam cient<sup>7</sup> vtilissime, præterquam quod vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & in vino albo pota, calculos<sup>8</sup> exturbat. Quidam ad vuluæ dolorem radicē cum vino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit.

<sup>1</sup> Inflationes (potius quàm inflammationes) stomachi & coli discutunt addito cumino, vt magis.

<sup>2</sup> Flatus dissoluit qui dolores faciunt.

<sup>3</sup> Calculos exturbat renum: Est enim tenuium partium & caloris particeps: quare dum incidit pituitam crassam, arenulas coniunctas diuidit: vel urinam multam ad renes deducendo; calculos tam in vterere quàm vesica exturbat.

<sup>4</sup> Alligata radix.] Sterilitatem auferre, & conceptum adimere, ex diametro pugnant. Nam quæ venerem stimulant; solent fecunditatem adferre; quemadmodum ex Plinio Asparagi, nisi quispiam crediderit, Rubiæ consimili vi, non modò copiosam urinam ciere, & nonnunquam sanguinem; sed haustam & decoctam, partus, menses, secundasq[ue] trahere, & cum Plinio vesicam ulcerare: etiam quæ vterum. Quare si hoc efficiat; non mirum fuerit, si sterilitatem inducat. Hoc tamē præstare fatò videmus in mulieribus nostris; quæ frequenter Asparagis vruntur cum ad morbos, obstructions iecoris & renū; tum ad cibos; quæ tamen fecundissimæ sunt. Asparagi quippe natura etiam S. Setho media posita est inter olera & carnes, propter nutriendi facultatem plantarum & carniū, quæ similiter se habet. Olerum tenim opimum maximè nutrit Asparagus.

Sæchus.

† Gal. Tanto firmitus aliunt quàm olera Asparagi, quo ipsi sunt sicciores.

Auicennas contrarium scripsit, quod magis probarem: Augere nempe semen, coitum, & conferre difficultati inpregnationis.

<sup>5</sup> Iidem oculis claritatem afferunt.] Huius facultatis non meminit Diosc. neq[ue] Galenus, neque alij. Sed vt Funiculus sicco humores tenuēs spiritus, in crassantes claritatem afferre possunt. Vel cum urinam mouent & purgant caput; recrementis aqueis minus abundat cerebrum; & ob id sensus efficaciores redduntur.

<sup>6</sup> Ventrem leniter molliunt.] Vt acra omnia tandem ventrem mouent.

<sup>7</sup> Vrinam cient.] Ulcerare vesicam ferè omnibus medicamentis commune, quæ potenter mouent vrinam: quare his quibus affecta est vesica, frequentior vsus Asparagorum periculosus est.



## CORRUDE varietas. \*

*Asparagus petræ & myacanthinus Gal.*

## CORRUDE tertia Clusij.



\* Hispanica altera aut Lusitanica CorruDE folio est maiore, longiore & iduriore quàm Narbonica, Scorpio Theophrasti æmulo. Cætera cuncta non ab familia. Belgis studiosè in fictilibus alitur munere C. Clusij.

## CORRUDE tertia.

Tertiam CorruDE differentiam memini in Galloprovincia à C. Clusio literis proditam, ramosis candidis cubitalibus virgulis, CorruDE Narbonensi similibus, in quibus horridæ spinæ reflexæ è foliorum prioribus longiorum exortu aptantur. flosculi ex viridi pallentes inter folia ex alarum sinu, longo tenuique pediculo hærent. Baccæ veluti triloccæ, vnico intus grano, rarò duobus, Smilacis asperæ; alteram CorruDE radix æmulat.

Dioscor. Cauliculi in cibo cocti ventrem emollunt, urinam cient. Radicis decoctum contra vrine difficultatem, Regium morbum, renum viia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit. Cum vino autem, phalangiorum moribus auxiliatur; si decocti succus super\* dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur.

Gal. Abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infarctu liberat, & maximè herbæ ipsius radices & semen. \*Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maximè dentes requirunt.

Primæ pullulationes edendo aptæ, & vt marini Asparagi, abstergunt citra manifestum calorem aut frigiditatem, quæ humido absumpto calidiores & sicciores euadunt. Semen calidum & siccum secundo ordine.

DRYPIS Theophr. Anguillara.




MYRIOPHYLLUM Equisetifolium.



STIRPIUM

Radice reptice, Graminis canini ritu, in gracilioribus geniculatis ramulis cubitalibus, folia speciosa luniperi minoris, Nepæ aut Corradæ Hispanica. flosculi albi umbellati conferti. Semen, inquit Anguillara, glumis nondum exutum, Oryzæ simile; exutum autem Sertulæ Campanæ, croceum.

MYRIOPHYLLUM aut M. triphyllum palustre.  
Aduers. pag. 354. & 333. 334.



DIOSCOR. Vulnera recentia ab inflammatione vindicant, si vel viride, vel sicum ex aceto oblinatur. Præcipitatis in potu cum aqua & sale datur.

Gal. Usque adeo deficcatoris est facultatis, ut vulnera glutinet.

MYRIOPHYLLUM equisetifolium fluviale.

Aduers. pag. 354.

Myriophyllum alterum Matth.

Viola aquatilis Dod.

Belg. water bilieren.

Gal. giroflee d'eau.

HIPPURIS



EQUISETUM maius cum asparagis nouellis. Aduers.  
pag. 355. CAUCON Plin. Angul.  
Ital. & Hisp. Coda di cavallo.

DIOSCOR. Vis herba spissare, quare sanguinem  
naribus erumpentem succus ipse sistit. prodest dysenterici  
in vino potus. urinam cit. Sanguinolenta<sup>b</sup> vulnera gluti-  
nantur, tritis foliis, & illius. Radix cum sua herba tussim,  
orthopneam, ruptaq<sup>3</sup> adiuuat. Foliis in aqua potis, disse-  
ctiones vesicae & intestinorum, enterocelaq<sup>3</sup> in vnum coa-  
lescere, cogiq<sup>3</sup> feruntur.

Alterum Equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut ma-  
ior, imanis. comis per intervalla brevioribus, candidioribus,  
& mollioribus. Id cum aceto trium vulneribus remedio est,  
eademq<sup>3</sup> sanguis facillate.

<sup>a</sup> Eadem Gal. & rubrum muliebri profluuium.


Gal. <sup>a</sup> Adstringentem cum amaritudine facul-  
tatem possidet, ac proinde valenter, simulque ci-  
tra mordacitatem exiccante. Itaq<sup>3</sup> vulnera vel ma-  
xima conglutinat, etiam si praefectos esse nervos  
contigerit; praeterea vocatas enterocelas glutinat.

<sup>b</sup> Eadem Galenus ex relatu aliorum scribit.

Nervos laceros glutinat, ruptis & vullis mede-  
tur.


Plin. lib. 26. cap. 7. Caucon ad tussim & suspi-  
ria ex vino austero tritam commendat.

HIPPURIS fontalis, secundum Diosc. Equisetum.  
Aduers. pag. 355. Equisetum alterum Matth.



TRAGOS, *sive Vva marina maior*. Aduers. pag. 354.  
num Equisetum 4<sup>m</sup>. Matth. depictum, non descriptum?  
*An Croton Nicandri Anguillare?*

IVNCARIA *Salamanticensis* Clusij.



Narbonensi maior Hispanica, erectis virgultis, semine quaduplo maiore, quam opera Clusij in Belgij hortis feliciter enatam vidimus Mechliniæ & Lieræ.

DIOSCOR. Racemorum acini gustu multum adstringunt: quorum decem ex vino poti, cæliaci, & feminis fluxione vulvæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti afferuntur: quibus utuntur, cum opus est.

IVNCARIA *Salamanticensis* Clusij.

Cui plantæ generi referenda hæc exotica planta, ambigimus. Sed cum doctis, huius historiæ C. Clusius illum Iunceam totam fecerit, Equiseti tamen ritu asperam & geniculatam, illius familiæ annectendam duximus. Describitur autè à Clusio his verbis: Salamanticenses à Iunceorum canaliculorum forma & gracilitate Iuncariam appellant. Tota enim Iunceæ est, sed Equiseti modo aspera & geniculata, foliis utrinque lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & palcaceos candicantesque flores proferentibus; semen deinde exiguum, nigricans: radix tenuis & candida. Tota herba subdulcis est. Provenit locis arenosis, inter vineta secundo à Salamantica lapide. Floret Iulio, semen profert Augusto: quo tempore etiam subinde recens germinat.

ῥοδὸδανον. RUBIA maior. Rubia tinctorum officinarum. Aduers. pag. 357. Thapsia Asclepiadis Anguil.  
Germ. Kotte. Belg. Strappe, & Mee. Angl. Madder. Gal. Garance. Hesp.  
Ruia, & Granza. Ital. Robbia & Rubia.

DIOSCOR. Vinam ciet, quæ de causa regio morbo opitulatur pota cum aqua mulsæ, item ischiadicis & resolutis, crassum copiosumq; vinum pellit, nonnunquam & sanguinem; bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare: aduersus serpentium morsus, ramulos cum foliis bibere prodest. Semen ex acetopotum licet rem absunt. Imposita radix parius, menses secundaq; trahit. Albæ vitiligini illata ex aceto medetur.

TRAGON




TRAGON Matth. Aduers. pag. 356.

*Drypis* Theoph. Guiland.

Lege TRAGON improbatum Matthiolo.

RUBIA maior. Rubia tinctorum officinarum.



Radix semenque trahunt menses, alium sistant, collectiones discutiant Plinio.

\* Gal. Amara gustu & acerba est, itaque quaecunque agere diximus, ubi eiusmodi couerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias: quippe cum lienem & iecur expurget: ac medicriter quae extersionem postulant, extergit.

† Contra serpentes ramj imponuntur Plinio.

\* *Acerba Gal.* Acerbi, visceri & amari dulcis in mādendo nō nihil est particeps, unde implicatas, cōpositas & mīstificas dōtes colligas; quibus potu sanguinis grumos dissoluit & discutit, nō secus ac Carabe, † Bitumen, Pissa sphaltū siue Mumia Græcorū, egerit eliquatū per vrinas, quod, Dioscoride teste, discutit, glutinam molliat, ab inflammatione \* tuetur: purgationes mulierum cum vino & castoreo potum elicit: cum aceto discutit sanguinem concretum. Addu Gal. Merid eo vtuntur ad glutinationes vulnerum cruentorum; & ad alia omnia quae exsiccari debent cum modica calfactione. Acerbitate, dulcedine glutinosa & siccitate moderatis defluxiones cohibet, calefacta refrigerat, & refrigerata calefacit, eadem qua superius in Circea Aduers. pag. 104. diximus ratione. quibus potius a docto & modesto Dodonæo, ad rupta, cæsa, vulnera, præcipitationes, sanguinis fluores, inflammationes, omnia denique etiam thoracis & intestinorum vulnera commendanda erat; quam Dioscoridea, Galenica & Pliniana perperam refutare & incusare: Calore enim, & quodam, qui illi inest, amaro non iniucundo abstergit & educit sanguinis internorumque vulnerum & vlcus colluuiem; & rursum astringitione inibi relicta, roboreque parti restituito, sanguine in suppressione, & perianare potest.

† *Carabe* Quod sanguinem eliquat & serum separat. \* Quia discutiendo collectiones dissipat.

RUBIAE maxima varietas.

Longè maior Monspellium circa in oliuetis, senticetis & vipretis foliis atrouirentibus visenda, ubi Rubia maxima nuncupatur: semen nigrum & cætera cuncta a nostra non dissimilia.

RUBIA

Similem rationem addit Galenus de Symphyto petro.

## RVBIA minima.



Altera perpusilla, quam in rupibus Vincentij non procul Bristolio Angliæ enatam legimus. foliis est Herniaria paribus mucronatis positu rubiæ, cauliculis reptitibus sesquiunciam altis, in quibus flosculi luteoli. Radix exilis Rubiæ, corallio concolor.

## ASPERVLA, aut ASPERGVLÆ.



APARINE, *φιλίστιον* & *φιλαιρίστιον* Hipp.

Astera Lappago, siue Asperugo Plin. Dod.

*φιλαιρίστιον* & quod veslibus adhaereat.

Angl. Goethaerte. Ger. kleeb kraut. Belg. Cleef-  
crupt. Gal. Reble, & grateron. Hisp. Prefera,  
aut amor de hortulano. Ital. Speronella.



Dioscor. Seminis, caulium, & foliorum expres-  
sus succus, à phalangis & viperæ demorsis, auxiliatur. u-  
rium dolores succus infusus curat. Herba cum axungia tri-  
ta strumas discutit.

Gal. Modicè extergit & siccatur, habetque non-  
nihil tenuium partium.

Plin. addit: Sanguinis abundantiam ex vulneri-  
bus reprimunt folia imposita.

## ASPERVLA, aut ASPERGVLÆ odora nostras.

Aduers. pag. 357.

Germ. Herdtstreydt, & Waldmischer.

Alysson Plin. Cordo.

Marrishus Tragi.



## RYBIA laevis Taurinensium.

Asperulae æmulatione summis cauliculis flores candidi stellati verticillatim prodeunt. Folia quaternaria decussatim sibi mutuo exorta Cacubalo Pliniano paria, Solano tetraphyllo minora, in cauliculis sesquipedalibus & bicubitalibus ex interuallis genicularis. Frequens hæc in Pedemontuum collibus Taurino finitimis.

## ASPERULA caerulea. Perperam Alysson Gal.



Cæruleam in Flandriæ hortis; interdumq; agris videre memioimus; sed inodoram; foliis hirsutis Asperula. Semen item & flores non dissimiles; sed cærulei summis stellatim digestis foliolis procumbunt Radice rubente, tenui & oblonga.

MOLLIGO vulgarior herbariorum.  
Galton album quorundam.

Collibus inculcis & cretaceis agrorum marginibus Gallobelgij & Angliæ plurima. Folia læuia & Maio mense flosculi candidi copiosi Aparines minores in pluribus angulosis viticulosis geniculatis cauliculis, cubiti & sesquicubiti proceritatis, humis parvis. Radix lignosior, fibrosa, cimeritia.

Nn

MOLLIGO



MOLLUGO Belgarum.  
Mollugo montana Dod.



ALYSSON Germanicum Echoides, sine facio  
Molluginis Herbariorum; Aparine Plumj pusatura.



Molluginem statuunt stirpiū cultores nostri ex collibus Falkenburgenfibus Leodio proximis erutam inque hortos translatam. Galio albo tota sui parte similis, nisi complurium florum exiliū speciosa fœtura, in caule cubitali & bicubitali surrecto donata. Folia molliora. Radix nigricat. vsu hactenus incomperta.

ALYSSON Germanicum Echoides.

E radice geniculatis bicubitalibus cauliculis asperis, Aparines ritu vicina quævis arreptit: folia bina & terna atrouirentia Echij modo hispida Rubiæ paria, & aliquando maiora. Flosculi purpurei violacei, Echij minores verticillatim Cruciatæ modo, à medio caule summo tenus. Semen inuolucris foliaceis sinuosis Sefamo simile aut Thlaspi fuscum, gustanti dulce clauditur, cuiusmodi primus nobis imperitiū peritus iuxta ac amicus Muttonus Neruiensis. Vniuersa planta gustu Echium æmulatur.



*Sagina SPERGVLIA. Aduers. pag. 357.*

*Afferiunt Polygonon & hnaewel Germanorum Tragi.*

Vomitu pituitosos humores huius semen educere, refert Dod. gallinasque eius esu plura excludere oua aiunt.

*Trag.* Ad stranguriam & stillicidium vrinae mirificè facit, ideo lactis copiam auget.

*Γάλιον à latte, GALIVM luteum. Aduers. pag. 358.*

*Ger. Megerkraut, wallstroo. Gal. petit Muguet.*

*Hisp. Coia leche yerua. Ital. Galio.*

*Angl. Wapden hers.*



**DIOSCOR.** Fles eius ambustus illinitur, & sanguinis profusio sistitur: Misceatur cerato rosaceo; insolatur donec albescat: & tale est acopum Lassitudinibus viile. Radix venereum excitat.

Eadem Gal. Exiccatoriam & subacrem obtinet facultatem.

**CRUCIATA minor.** *Ger. Golden Walmeister.*

*i. Aferula aurea. Belg. Crustete. Gal. Croislee.*

Pota thoraci, ventriculo, meseraicarum & viscerum infarctus reserando, remedio est. Amalore potenter abstergit, illuuiem & excrementa pituitosa foras exigit: ideo appetentiam facit, & concoctionem iuuat.




SYLVESTRIS  
Rubia mi-  
nor vel fida  
Aduerf pag.  
357.



PORE  
TVM mi  
Rubie fe  
Chamee  
ne Diola  
Mutono  
Aduerf  
358.

REYLLITIS.



HEMIONO  
TIS.



De PHYLITIDE, &amp; HEMIONITIDE, earumq; varietatibus.

PHYLITIS. *Lingua Ceruina officinarum, & perperam Scolopendria. Angl. Wartes tunge. Germ. Wirtszung. Belg. Wirtz tunge. Gal. Langue de cerf. Hiss. Lengua Ceruina.*

Hemionitis Anglica nobis icone & oratione exhibita, Aduers. pag. 359. Mechliniæ apud D. Brancionem & Georgium Rye, quibus eam dono miseramus, studiosè in fœtilibus diu propter raritatem & teneritatem enutrita; tandem admirabili sui metamorphosi & transmutatione, in Phyllicidem abiit. Quod facit ut facillè credam Phyllicidem & Hemionitidem easdem & congeneres esse, & cultu subire huiusmodi mutationes: nec magis differre quàm agreste Cichorium à satiuo: neque facultates quas vtrique tribuit Diosc. refragantur. Nam quæ passim murorum, viarum & sylvarum vdis fertilior & lætior oritur, in longiora folia erumpit, quæ in mucronem deficiunt, & ima sui basi contrahuntur.


\* Sed quæ nonnullis rupibus saxorum interueniis provenit, folia breviora multò, ad basim latiora & falcata habere conspeximus, quorum aliqua palmum vix superabant, nonnulla verò sesquipalmum longitudine æquabant. Attamen longitudo foliorum illius Hemionitidis, quam Roma transmissam, in fœtili Mechliniæ alebat piæ memoriæ D. de Brancion, vix vncialis & sesquiuncialis erat; fortè transplantatione iniuriæ adeo obnoxia fuit, & velut semianimis, ac multum imbecilla.

\* HEMIONITIS.

PHYLITIS multifido folio.\*

HEMIONITIDIS varietas altera.

*Hemionitis altera peregrina Clus. à peregrina elegantiæ.†*



Hemionitis duplicatis foliis ad basim.

\* *Variet. æ Phyllidis.* Multifido folio in Sommerfeti Angliæ cauitibus frequens oritur, alioqui Phyllicidi vulgatæ perisimilis.

† Naturæ luxu foliis duplicatis ad basim latioribus falcatis apophyses vtrinque, lateribus mucronatas exerit, &c. Modus, ortus & parilitas superioris Hemionitidis.

PHYLITIS. Aduers. pag. 359.

Dioscor. Phyllitis gustu acerbæ est. Folia in vino pota serpentium moribus aduersatur. Quadrupedibus per insusa auxilio sunt. Et si dysenteria aut resoluta alius exerceat, potui dantur.

Gal. † Cum qualitate sit acerbæ, non absurdè diarrhœas, siue profusua, & dysenterias iuuat.

HEMIONITIS. Aduers. pag. 359.

Dioscor. Austera sapore: Ea ex aceto pota lienem absumit.

Gal. Simul & adstrictionem & amaritudinem possidet, quamobrem cum aceto pota lienosis auxi-

li&gt;

Lege lin. 45.  
quo insusa An-  
glico, & deme-  
ant aliter.  
Item leg. lin.  
48. Ad iuuat,  
non Aranthi.

Asplenum.


Lunaria Ma-  
gorum Ara-  
bum.

ASPLENV. Aduers. pag. 360.

DIOSCOR. Vim hanc habent folia in aceto ferme-  
facta, vt per dies quadraginta pota, lienem absumant. qui-  
bus etiam contritus lienem ex vino illini oportet. Strangu-  
ria & regio morbo prodest, singulū sedat. † Calculos in ve-  
sica comminuit. Conceptum adimere creditur. per se aut cū  
muli liene appensa. Tradunt noctu, silente Luna, huius rei  
gratia effodiendam.

Gal. Tenuium quidem partium, non tamen ca-  
lida est herba. Hac vtique ratione & † lapides fran-  
git, & lienem liquat.

LVNARIA racemosa. Aduers. pag. 360.



Eximie ferruminandi. ] Ideo ad enterocelas &  
hernias magnæ commendationis, & vilitatis, po-  
ta & imposita.

LVNARIA Magorum Arabum.  
Ital. Lunaria di Magi Arabi.

A foliis itidem sinuatis Lunæ crescentis simili-  
bus hæc rara planta Lunariæ nomen adepta à pe-  
ritis rei herbariæ, quam non nisi conuallibus Allo-  
brogum inter montem illum præcelsum, vulgò  
Mons Seny vocatum, & D. Ioannem Maurum,  
vernaculè S<sup>r</sup>. Iean de Morienne, collegi, nomine-  
que Lunariæ donauit. alij quo discernatur ab alijs  
Lunariis, Lunariam Magorum Arabum dixere.

Excunt



Exeunt Martio, tenella folia à radice lignosa, flexuosa, cinerea, Oxalidis Francę rotundifolię primulum erumpentis similia, Thlaspi hederaceo ferè paria. flores verò & semina necdum nobis visa fatemur, eo-  
que nihil asserimus, eiusque nullum vsum exploratum habemus.


Lege OPHIOGLOSSVM, siue ENEAPHYLLVM.

Lingua vulneraria Cordi.

Lingua serpentis. Germ. Aaterzungelin.

Belg. Aatertongen. Aduers. 360.

TRICHOMANES Diof.



Eadem quæ Lunaria potest, sed inefficacius.

ADIANTVM. Aduers. pag. 361. Callitrichon Apuleij.

DIOSCOR. Decoctum herba potum, prodest spirandi difficultati, † suffriosis, lieni, & felle suffusis & vrina diffisili. calculos \* frangit. aluum † sistit. serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas vias, & menstrua. sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur. alopecias \* densat, strumas discutit, furuncles, & manantia capitis vlcera, ex lixiuo emendat. desuantes capillos continet, cum ladano & myrino, & susino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctum eius cum lixiuo & vino infusum, idem præstat. coturnices & gallinaceos pugnaces facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum, circa ouilia. Vmbrosus, & palustris, circa parietum aspergines, & fontium specus nascitur.

\*Ead. Gal.

† Gal. Viscosorum crassorumque è pectore pulmoneq; excreationibus non mediocriter confert.

Gal. In caliditate quidem & frigiditate symmetrum est, verum desiccet & extenuat, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit.

\* Eadem Gal. Non tamen vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsam quispiam secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio.

Eadem Gal.

APVL. Herba Callitrichon pistata per se & impoita virginibus strumas sanat.

TRICHOMANES.

sc. Folia acerba, quæ eadem cum Adianto præstare constat.

SALVIA

*SALVIA* vicia. *Advers.* pag. 352.  
*Asiantum album* Theoph. *Guilandino.*  
*Adiantum album* Cordi.

*Lege* *RORIDA*, *sive SOLIS ROS*, & *Aphorism.*  
*Recentiorum alia à Drofio Alchimilla.*  
*Advers.* pag. 354 355.  
*Rorella & Salsirella* Cordi.

*RORIDA*, *sive Solis ros maior.*



*RORIDÆ* *varietas.*

*Locis* vdis Belgij nonnunquam ad dodrantalem altitudinem assurgit.

Non possunt sibi practici persuadere longa experientia & vsu edocti vim causticam *Roridæ Solis* phthificis & tabidis esse nocuam: & certè non alia ratione in corpora agere putant, quàm *Scylla*, *Pan-cratiū*, *Cape*, *Allia*, *Ruta*, *Sinapi*, *Eruca*, *Dracunculi radix* & huiusmodi acria, quæ extrinsecus ad-mota, vrere, & exulcerare solent; assumpta verò, interiora minimè atrodunt; sed ad viscida, pituitosa, putridave excrementa, (quibus phthifici aliquando suffocantur,) extenuanda, incidenda, à putredine arcenda, & exiccanda vlcera, caloremque natium inde obrutum & animi vigorem excitandum faciunt. Corrigunt enim prouentum & sabarram crassorum, viscidorum & putridorum humorum. Quam plurima hodie esitantur, quæ admota ex alto diuellunt & trahunt, etiamq; crustas inurunt. Sic *Ros Solis* sennu spiritus vegetat, crassos & lentos humores concoquendo, incidendo, attenuando, at-que abstergendo educit.



## FILIX mas.

Gallis Feugiere. Hisp. Helecho. Ital. Felce.

Aduers. pag. 362.

## FILIX Fœmina.

Aduers. 362.



**Diosc.** Gustu subastringit. Radix latae † tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa, melius si cum Scammonia aut Veratri nigritotidem obolus detur. Sed qui sumunt, allia gustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illu cum axungia vulneribus sagitta arundinacea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contra euanesceat, abiit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

† eadem Gal. est enim amara, paulum habens adstrictionis. quam ob rem vlceribus imposita vim habet valenter desiccandi; non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

## Fœmina.

**Diosc.** Radices possunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potu cum vino 3 trilus, teretes tineas eijciunt. Data feminis, sterilitatem faciunt; & pregnantibus abortum, si supergrediamur. Farina humidis vlceribus, & cicatrici repugnantibus, inspargitur. Lumentorū ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus co- & manduntur, ut ventrem emolliant.

OSMUNDÆ  
flores.



OSMUNDÆ.



OSMUNDÆ. *Aduers. pag. 363.*  
*Filix latifolia Cordi.*

APVL. Ad vulnere: herbe Filicis radicem pi-  
statam in vulnus pones, & argemoniæ drachmas  
duas cum vino potui dato, misce. curat. \* Ad ra-  
micem puerorum: herbam Filicem, quam in radi-  
ce esculi arboris inueneris, tunde eam cum axun-  
gia, & panno inducens impone, & fasciam sursum  
versus ligabis, quinta die sanabitur. Ad dolorem  
femorum vel suræ: herba Filice fumigabis loca.  
Item infantem languidum si ex ea fumigabis, fa-  
cilime conualecet infans.

\*Recentiores hoc Osmundæ attribuant.

CHAMÆFILIX marina Anglica.



Non nisi saxorum rupiumque interuenijs aut  
petrosis asperginibus Cornubiæ innatam repe-  
ri ad maris alluiones non procul ab ædibus  
generosi viri D. Muyle. E pusilla multis implexa  
pullis cirris & compacta radice Trichomanes  
aut Adianti Pliniani, foliola binum ternumque  
vnciarum, rigida, carnosæ, numerosa, atroviuentia,  
lucida, Filicis maris diuisura, ortu, positu, & gu-  
stus, lituris item auersa parte extantibus ferrugi-  
neis, quorum pediculi & medius nervus sericeo  
nitore ex fusco lucent.

POLY-



## POLYPODIUM. Filicula. Aduers. 363.

Herba Radioli Apulei.

Hisp. &amp; Ital. Polypodio.

Diosc. Radix austera aliquantum, † & gustu subdulcis; purgandi vim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum solvendum. Arida farina aqua mulsâ imparsa, detrahât bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos sunt.

† eadem Gal. austeram habet vincentem qualitatem: ut facultatis admodum quidem deficiantis citra morsum, cum vino minus adstringit.


APVL. Herba Radioli contusa atq; antè curiosè depurgata, cum aceto scyllitico vique adeo cocta donec appareat, perungito, capitis dolorem tollit. Herba Radioli radicem euulsam & cultro corticem purgatam cum malua coquito, & ius earum bibatur, sine labore vel aliquo tadio ventrè deducit & omnes æstus.

## DRYOPTERIS. Aduers. 363.

Pteridion femina Cordi.

Diosc. Radix gustu acerba, in dulcedinem vergens Eadem Gal. Psilotum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsquedum sudorem euocet: mox sudor abluatur, & recens imponitur.

## LONCHITIS Marantha.



LONCHITIS ALTERA Dioscoridis. Aduers. pag. 364.

Sirurbiopertis Cordi. Asplenium syl. Tragi.

Diosc. Vulneribus mirum in modum prodest; in eisq<sup>3</sup> inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

LONCHITIS Marantha. Ceterach Ramosum quorundam à similitudine quadam.

Pseudolanchitis aspera Matth.

videtur Pteridion masculinum Cordi.

Spithameis nitidis cauliculis, fuscis, rigidis & folijs Adianthi Pliniani; sed gemino situ, Filicis feminæ ritu, crassioribus multò; altera parte virentibus; altera Asplenij modo rubiginis. Radix pusilla capillamentis crebris fibrata.

ACANTHIVM, an ἀκανθίδιον Athenæ Anguil.  
folio lato, incano, aliquantum serrato, vbiq<sup>ue</sup>  
viarum obuior Aduers. 365.

lege ACANTHIVM ILLYRICVM.  
Onopordon alterum herbariorum & Dod.  
Aduers. pag. 365.



Diosc. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Gal. radix & folia facultatis sunt exscafactoriæ, vt & ijs qui conuelluntur auxiliuntur.

ACAN-

Etiam  
bus al  
riat.



ACANTHVS sativus.  
Aduersf. 365.

ACANTHVS syl. Scolymosimilis aculeatus Diosc.  
an Chameleonta Monspeliensium? an num potius  
hac noua aculeata Branca vrsina?

BRANCA vrsina, sue Acanthus aculeatus.



Diosc. Acanthi radices vsti & \* luxatis illita profunt. pota vrinam mouent, & aluum sistunt. T-  
bidis, ruptis, conuulsis, mirè viles sunt.

\* torsionibus & ligamentorum tractionibus aptius vertendum monuimus.  
Eadem Plin. podagris quoque illinuntur trita.

Gal. Folia mediocriter facultatem digerentem obtinent, ac radix exiccatoria est & leuiter inci-  
soria, & tenuium partium.

BRANCA vrsina aculeata.

Branca vrsina  
sue Acanthi  
varietas.

{ In agro Bononiensi Lombardiæ acedè flores & folia similia sunt huic Acantho spi-  
noso, vt nobis persuasum fuerit Diosc. esse Acanthum syluestrem, quem Diosc.  
assimilauit Scolymo syl. & latino Acantho breuiorem & aculeatum dixit.

Diosc. Radix ad eadem qua superior, efficax.

Oo 3

Sco-

**SCOLYMOS.** *Hisp.* Cardo & Cardos de comer.  
*Ital.* etiam Carcioffo. *Angl.* Artichokes.  
*Aduersf.* 365.

**SCOLYMOS** Theoph. *Eryngium latum* Monsp.  
*Eryngium Vegetij* Clusio & Scolymos Theoph.  
*Romanis* Spina Borda. *Eryngium Archi-*  
*genis* Anguil. *Aduersf.* 366.



**Diosc.** Radix illita graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat. Item si decocta in vino bibatur, copiosam autem urinam facit, et expellit: herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

† Gal. Ac proinde graueolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc sane medicamento ex tota inest essentia, nimirum cum succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum verò in secundo.

**SCOLYMOS** Theoph.

Huius primi Asparagi cum radicibus crudi aut carnis incocti eduntur apud Salamanticenses: quo ipsius lacteo succo, lactis omne genus coagulant, ut author est Clusius.

*Anguil.* ] Acetius ex sententia Archigenis Eryngium describit, folijs Atractylidis, durioribus, nitidioribus, & pallidioribus, plures ab vna radice cubitales ramos emittentem. Flores Bupthalmi, sed medium staminina sic distinguunt, ut oculi formam amplius non seruent.



*SILYBUM, siue Carduus Lacteus.*  
*Leucographis Plin. Aduersf. 366.*

*CARLINA herbariorum. Aduersf. 367.*  
*Chamaleon albus Diosc.*  
*Helxine Pliniana Anguil.*



Eadem Gal.  
 & Apuleius.

**Diosc.** Hec recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, vomitiones ciēt.

Leucographin Plin. quidam volunt; sed qualis esset, Plinius scriptum non repperit, ut ipse testatur his verbis, lib. 27. cap. 11. Qualis esset scriptum non repperi, quod & magis miror, inquit, quoniam utilis proditur sanguinem excreantibus tribus obolis cum Croco. Item cœliacis tria ex aqua apposita. Profluvio faminarū, oculorum quoque medicamentis; & explendis vlceribus; quæ sunt in teneris partibus corporis.

#### CHAMÆLEON Diosc.

**Diosc.** Radix pora acetabuli mensura, latus inter aiseorum tineas pellit. Bibitur autem in vino austero, cum origani seruesacti succo. Hydropicis † commodissime drachma in vino datur, etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resistit. Occidit canes & sues. Mures item necat, subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta. Eadem Gal. & Apul.

† Gal. exhibent ipsam aqua inter cutem laborantibus assimilem habentem temperiem ipsius nigri radicis, nisi quatenus illa acrior est.

**APUL.** Ad hepaticos: herba Chamæleonis succus potui datus cum vino, febricitanti cum aqua calida, mirè proficit. Ad hydropicos: herba Chamæleon & Chamædaphne & Chamædrys & Chamæpitys æquali pondere tusa & quā mollissimè cribrata, si in portione vini mixti, iuuenib. cochlearia quinque, viris cochlearia novem, item minoribus puellis & mulieribus cochlearia tria, puerculis cochlearium vnum dederis, mitificet aquam omnem de corpore per † urinam digerit.

† quemadmodum labrum veneris thoracis excrementa per urinas educit.

CH A.





CHAMÆLEON albus caule donatus.  
Cardopathium. Chamæleon albus &  
niger, siue Carlina Officinarum.  
Chamæleon niger vulgaris Herbariorum. Chamæleon  
albus Fuchf. Germ. Ebertwurtz. Belg. Euer-  
woytele. & Carlina. Galis item Carlina.  
Adues pag. 367.

Huius radicē antidotis suis miscet vulgus medi-  
cantium ad pestis contagia. Dentibus attrita eius  
dolores mulcet. commodius vnguentis ad pforas  
& lepras inferitur.

CARDVVS acaulis Septentrionalium.  
Chamæleon albus Cordi, & Tragi exiguus Chamæleon.



Angliæ collibus, Picardiæ, Gallobelgij & Au-  
xiaci castri satorū marginibus obuius & frequēs  
hic Carduus, vultu & folijs Carlinę, sed retu-  
fioribus lacinijs, minoribus: flores purpurantes  
& capitula Cardui vulgaris, caule carentes.

CHA-

CHAMÆ-  
LEO niger  
Diosc.





## CHAMELAEON niger Maranthes.

Diosc. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo cedrino oleo, & axungia, scabiē \* abigit. eadē cum sibi sulphur & bitumen asciunt, & cocta in aceto illinitur, impetigines † absterget. decoctum collusione dentium dolorem mitigat. cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur. eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat. vitia cutis in facie, virilagineq; cū sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur. phagedenas, tetrag, vlcera illius sanat. Quare chamaeleon vocetur, à varietate foliorum euenit. mutant enim cum terra colorem. hic viridia, illic albicantia, alibi caerulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

\* Gal. eadem, quia letale quiddam obtinet.

† Gal. in summa quæ deterfionem postulant: præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur & phagedenica vlcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calfacit verò secundo absoluto.

## CROCODILION. Aduersf. 368.

Diosc. Feruescēt in aqua & pota radix sanguinem copiosum per nares pellit. datur lienosis, eos euidenter adiuuans.

CROCODILION Fuchf. & Cordi.  
perperam Chamaleon verus Tragi.  
Aduersf. pag. 368. 369.



apud nos nascitur spina: sed efficacius tamen omnia iuuant, tum radix tum fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: tum vlcera ad cicatricem ducit, mediocrem habēs & non molestam adstrictionem.

Gal. Crocodilij semen acre est atque odoratum, vrinam mensesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam digerentem & exiccantem, succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sunt facultatis, nephriticos adiuuant. Radix pectoris excretionibus valenter conducit, minus quidem quàm semen, actis, non tamen minus amara.

Eadem Gal.

SPINA alba.  
lege ἀκανθα λευκή.  
Aduersf. 369.

Diosc. Huius radix pota, † celiacis, stomachicis, & ijs qui cruenta exiunt, efficax est, vrinam citius moribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis \* infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

† Gal. quia radix eius desiccatoria & modicè adstringens.

\* Gal. quia semen tenuis essentia & calidæ facultatis est.

## SPINA ARABICA. Aduersf. 370.

Diosc. Arabicam spinam natura alba spina similem esse constat. ipsa siquidem stringit. ad sanguinis reiectiones, mensium \* abundantiam, catersq; fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

Gal. Acantha Aegyptia (quidam Arabicam vocā) spinæ albæ nostrati similis, verum facultate validius adstringente pariter & desiccante.

\* Itaque profluuium muliebres radix eius iuuat, & alia quæcumque quibus auxilio est quæ

## LEUCACANTHA. Aduers. 371.

Diosc. *Leucacantha*, praedita est radice cyperi, valida & amara. Quae manducata dolorem dentium sedat veteri laterum dolori, atq; ischiadici prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. eadem ruptis & conussis medetur radicis epotus succus eodem praebet effectus.

\* Gal. proinde incidit & exiccat in tertio ordine; in calfaciendō autem ex primo est ordine.

## CARDVI BULBOSI Monsbellensium varietas.

Aduers. pag. 371.

Huius alteram speciem alit Ioannes Muttonus nullis spinis donatam.

## SPINA alba Matthioli: Silybum Guilandini.

Scolymus verus Diosc. quorundam.

Fortē Carduus Galaxias Plin.

Iam diu sequit hanc & virentem habuit Ioannes Muttonus, folijs, ortu, totaque facie est Spinae albæ nobis descriptæ, sed echinata capitula molliora, minusque spinis infecta sunt.

## CARDVVS tomentosus Anglicus. Aduers. 370.

CORONA fratrum Herbariorum.

Carduus eriocephalus Dod.

## CARDVVS Stellatus sive Stellaria &amp; CALCITRA

PA. perperam Polyacantha Cordo.

Gal. Chauffe trappe. Germ. Wallem thie

stel & stat en distel. Belg. Sterre distel.

Aduers. 372.



Arthesiae. & Nerviensis agri collibus passim non secus ac in Angliæ Sommerseti praefectura obuia hæc planta cuius effigies Aduers. pag. 370. flore dehiscente à pictore deliniata.

CARDVVS stellatus, &c.

An Myacanthus Theoph. cap. 4 lib. 6. Spina alba vera Rondel. An Theoph. Taibulus folio Cicerulae Ruellio?

Varietas. Candidis floribus variat in agro Nerviensi.



*Capitula spinosis CARDVVS STELLATVS, seu CALCITRAPA altera.*

*Videtur eadem cum lacea altera Granatensium Clusij.*

Hoc Calcitrapæ genus videndi & habendi copia fuit in horto Ioannis Mutoni Hispano femine ortum. Non ita diuersum ortu & habitu; sed folia maiora, molliora, laceæ nigre ferè paria & concoloria, Calcitrapæ similia; flores purpurâtes & cauliculi minimè diuiccati, sed surrecti cubitales & vegetiores & habitiores & capitulo densioribus spinis circumuallato.

CARDVI STELLATI *varietas.*

*LACEA lutea Clusij.*

*Tragacanthum Salamantinum.*

ATRACYLIS.

*Advers. 372.*



Huius generis plantam quam debemus Carolo Clusio, non abs re huic Acanaceorum familiæ annexendam duximus. Conuenit enim radiatis & aculeatis capitulis, folijs, floribus & semine cum Carduo stellato & Stella siue Spina folstitiali; sed omnia longè maiora: capitula namque Cnicum syluestre superant. Semen item & flos non absimilia, quo marcescente, è medio centro, vermiculatum Gummi Ixiæ concoloratur Tragacanthi ruffi æmulum, manat: unde Tragacanthi nominis occasio Salamanticèsis, apud quos in vineis agrorumque marginibus lubens & frequens oritur.

ATRACYLIS.

*Diosc. Folia, coma & semen trita cum pipere, vinoque pota, contra scorpionum iectus profunt.*

*Gal. desiccandi & modicè digerendi facultate prædita.*

*Ulcera fistulosa ad cicatricem perducit.*

Pp 2

CAR. Fuchl.



**CARDVVS BENEDICTVS.** *Advers.* 372. 373.  
*Germ. Cardobenedict. Gall. Chardon benit.*  
*Cnicus supinus Cordi. An Carduus syl. 2<sup>o</sup>. Theoph.?*

Magni vsus & cōmendationis ad capitis vertiginosos dolores & pestiferos morbos. Insigni amaro obstructions viscerum referat; putredinem arce; vrinas & calculum propellit. Pectoris vitia emendat. Hepati, cordi & visceribus peramicus, vt cuius stillatitia, decoctum, puluerisue 3. j. diuturnis & exitialibus febribus proffit. venenatis ictibus herba tusa, & contagiosis tumoribus imponitur.

**Sequanorum CIRSIVM LYTEVM.**  
*Carlina syl. Dod.*  
*Atractylis minor Euchs.*



lege  
lis.

**PICNOMOS**  
*Creta Salo-*  
*gentis.*



**PICNOMOS CRETÆ SALONGENSIS**  
*Galloprovincia. Advers. pag. 373.*  
*Chamaeleon nigri species foret.*  
*Acarna humilis quorundam.*  
*lege æmulis, sed maioribus in spinosis & to-*  
*mentosis oblongis capitulis.*

ACAR-



ACARNÆ, *sive Sequanorum*  
 CIRSII CARLINÆVE *varietas.*  
 CARLINÆ Syl. *minor Clusij &*  
*Eryngium Archigenis.*

PHOENIX, LEO. CARDVVS Ferox.  
*Ital. Cardo fiero, Leone ditto.*



Agro Salamantico oriunda ex Acanaceorum genere hæc plantula Carlinæ syl. non absumilis, sed tota minor: & flos luteus, non pallidus è singulari palmari cauliculo. annua planta est.

PHOENIX, LEO.

Hunc totius Acanacei generis facillè Phœnicem, Leonem & ferocem dixere nuperi à spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud è folijs altius divisis & capitulorum exordijs quàm spicula & vepres vnciam & sesquiunciam longas videas. cauliculus vix palmum æquat. flos Cnici sylvestris, pallidus, spinis & aculeis sequentibus horridisque cinctus. Quia planta rara & vix nota, eius vsus nullus: audio tamen quibusdam aridis collibus Italiæ ab Apeninis non ita distans, magno prouentu gliscere.

## ACARNA Theoph. Anguillara.

Valerandus Donceus Iustinopoli Illyriae rediens Venerias Carduos duos detulit, quorum alter flauentibus aculeis horridus virentibus sinuatis folijs, auresa parte tomento incanis, vti tota planta, plures fundit sesquicubitalis caules. floribus luteolis, semine Cnici, sed minore, in squammoso & spinis horrido capitulo.

## ACARNA Valerandi altera.



CHAMAE-  
LEON Sala-  
manticensis  
Clusij.



Folijs longioribus, spinis horridis caulem pin-  
natiu secundum longitudinem ambientibus,  
quasiue pennae telo affixis: incana lanugine  
rota pubet. caulis dodrantalis interdum cubitalis.  
Flores Carduibenedicti, coeferim stipati, mino-  
res, & Senecionis maiores. semine cnici minus.

## CHAMAELEON Salamanticensis Clusij.

Ortu, folio, totaq; facie huic Acarnae admodum  
affinis est, & forte eadem, nigri Camaeleonis haec  
species agro Salamanticensi oriunda, & a doctiss.  
Clusio licetis prodita; Cauliculo pedali, interdum  
maiore, multis alis diuiso, striato, & veluti pin-  
nis etiam foliato. Folia longa angusta, aculeis  
horrida. In capitulis coeferim stipatis, & spi-  
nosissimis, purpureo dilatis.

CAR-





**CARDVVS ERYLLONVM** siue *Dipsacus sativus*.  
 siue *Labrum Veneris*. An spina Selenitis Theoph.  
 Guilandino? Galedragon Xenocratis Anguil.  
 Germ. Harten distel, Weberkerten. Belg. Caer-  
 den & holders caerden. Angl. Tassel. Hisp. Car-  
 dencha & Cardo penteador. Ital. Dillaco, &  
 Cardo da panni. Gall. Chardon a carder.  
 Aduers. 373.

**Diosc.** sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & de-  
 cocta in vino radix, vsque dum sit crassitudo cera, imita-  
 tur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiumi for-  
 micationibus, verrucisq; penisq; remedio esse. Vermiculis  
 capitulorum in folliculo alligari, collo aut brachio appensi,  
 produntur quartanis febribus remedio esse.

Gal. ex secundo ordine exiccatoria radix est,  
 habetque nonnihil & abstersorium.

**LABRVM VENERIS.**

Aduers. 373. 374.



Cnrchs

PA-  
 18.  
 cl. 374.





*CNICVS sativus* Theoph. Germ. & Belg. Wilden garden saffran. Gall. Saffran bastard. Hisp Alazor & semente de papagaios. Ital. Zaffrano matto saluatico & Saracenesco, Angl. Wallart saffron. Aduersf. 374.

*CNICVS flor. caruleo.*  
*Cnicus alter* Clusij.



**Diosc.** Huius flore in obsoniis vtuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsa, vel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem sunt offula, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nuci iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante canam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici canaidi sextarius, amygdalarum tostiarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, ephronitri drachma vna, cum carminibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluenda alui facultate donat.

**Mesue.** Cnicus est agrestis & satiuus, idemque melior semine. Nec inutilis est flos. Calfacit or-  
di e primo, \* siccat secundo; agrestis calidior, siccior: minus flos. Pituitam & aquas vomitu, & deie. tertio vt  
ctione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde naus, vt colico affectui, & similibus  
confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat: vnde & vocem clarari reddit. Sperma quoque  
vfu auget, sed alimentum est prauum. Stomacho valde noxium, in eoq̃re & mammis lac cogere di-  
citur. fastidiendum ac nauseabundum est, ac conturbans. Facultate est lactariarum plantarum, sed  
remissa. terget, aperit, etiam flore cum mulsa icterum sanante. Ne ventriculum lædat, ei misce sto-  
machica, Anisum, Galangam, Mastichen: acia verò, vt Cardamomum, Zingiber, sal panis, sal gem-  
mæ, addita, actionem ipsius celerant, & intestinorum noxam præhibent. Sic medullæ eius drachmæ  
decem, cum Cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudine drachmis quinque sufficien-  
ter purgat Paulo auctore. Datur à 3. quatuor ad aureos quinque. flos à 3. vna ad aureos duos.

*CNICVS flor. caruleo.*

Huius effigies peregrini Cnici nomēclaturā vt qui scitē quadret Cnico vulgari, fecit. Exit enim cau-  
liculis pedalis & cubitalibus, è pulla vnciam æquante radice, in quibus folia Cnici vulgari, sed  
in capitulis squammis loricatis flores caruleis apicibus constantes. Semen item Cnici, minus, rufes-  
cens. Hortus cultissimus stirpiumq; exoticarum diuissimus P. Coudenbergij nostri hanc alit. Circa  
Cordubam & agro Hispalensi in segetibus prouenit Clusio auctore, vbi floret Maio & Iunio: apud  
nos verò Iulio & Augusto.



**CARDVVS vulgarissimus viatum.**  
Onopryos Guiland.

**CARDVVS spinosissimus vulgaris. Polyacantha**  
Theoph. Aduers pag. 374.\*



Vbiqve viarum obuius est Carduus ille vulgarissimus, quo quidem nihil notius, nulliqve regioni negatur. E radice caules cubitales, & sesquicubitales alis concauos edit, quibus folia Sonchi asperæ insunt, sævis aculeis infesta, nigricantia; flos purpureus in muricatis capitulis, pappis diffuens. Semen & reliqua nonora quam vt fusiore descriptione egeant.

\* **ACYLEOSA** Gaz. a. Agriacantha Ruellij. Carduus filuestris,  
& Scolymos Dod.

**ERYNGIVM Marinum.** Dryp. Theoph. quorundam Batavis endeloose & merretwoztele.  
Angl. Zeaholp. Ital. Iringio. Aduers. pag. 375.  
Videtur **ACANOS** Plinij cap. 9. lib. 22.

Plin. Sunt qui & Acanos Eryngio adscribant spinosam, breuemque ac latam herbam, spinisq; laxioribus. Hanc impositam sanguinem mirè sistere. Alij Eryngen falsò eandem putauerunt esse & Glycyrrhizam: quare subiungi eam protinus refert. Et ipse sine dubio inter aculeatas est, folijs echinatis, pinguibus, tactuque gummosis: fruticosa binorum cubitorum, altitudine: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platan magnitudinis, cætera pere ex Pli. ad finem capitis usque.

**DIOSC.** Folia in principio sale condita in cibos recipiuntur. Radix vim habet calfactoriam. pota menses & vienas pellit. Termina inflationesq; discutit. Contra iocinerum viui, serpentium morsus & hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima cum feminis pastinaca drachma viii. Appensa illitaue, tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

Gal. Caliditate quidem aut parum, aut nihil, quæ temperata sunt, superat. Siccitatem verò in tenui essentia consistentem non paruum obtinet.

Q 9

ERYN-



ERYNGIUM  
marinum.  
A Jacq. 375.



ERY  
cam  
Me  
neu  
Adu  
& 3

Posillum  
ERYNGIUM  
Planum  
Munoz.



ERY  
pum  
Clusij

ERINGIM



*Fusillum ERYNGIVM planum Mutoni.*

Alterum rarè ruri vel in hortis apud Belgas visitur, folijs quàm *Dipsacus* longè minoribus angustioribus, coliculis dodrantalibus & pedalibus anfractuosis & diuaticatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quàm *Campestris Eryngij*. Radix *Corrudæ* aut *Asparagi*, sed minor multo perennat. Nuppiam me vidisse memini, nisi in hortis Ioannis Mutoni.

*ERYNGIVM Montanum tenuifolium ambitu profundè sinuatum.*

*Aduersf. pag. 375. & 368.*

*ERYNGIVM pumilum Clusij.*

*Eryngij pumili* à C. Clusio descripti genus à superiore in collibus agri Salamaticensis valdè variat, vbi è lignosa & tenui annua radice cauliculum gracilem multis diuisum alis, palmum, dodrantem altum, etiamque maiorem, quem stellatim ambiunt spinosa altius laciniata & in cisa folia. flos & echinata capitula cærulea folijs septa visuntur: ima autem folia latiora, mollioraq; radiatim cespice instrata iacent; & in ambitu laciniata cernuntur.

*ERYNGIVM montanum recentiorum alterum, est*


*Critimum quartum Matth. Aduersf. pag. 168.*

*Copiosè prouenit in Flandria sabulosis secus*

*Blankebergam Brugarum.*

*POTERION. Aduersf. pag. 377.*

*Cyprii Mazino & Sinida.\**



\**Diosc.* Radices tusa, prae cisis nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest.

*Gal.* Desiccandi absque morfu facultatem possidet, aded vt & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim obtinet: quin & decoctum earum quidam exhibent ijs quibus affecti sunt nervi.

## TRAGACANTHA Aduers. 377.

Diosc. Effetianum tragacantha, lacryma: qua, vulnerata ralice manans, concremit. Præstat potucent, gracilis, leuis, sincera, & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad rufum, exasperatas fauces, retusus voces, caterasque distillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoque lingue liquefit. in passu madefacta drachma pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicae rosiones, mixto conu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Gal. similem Gummi vim obtinet, emplasticam quandam & acrimoniam hebetiorem. Et sanè similiter illi deficcatur.

TRAGACANTHA altera.  
fortè. POTERION.  
Clusio.

ONONIS, aut Anonis. Aegyptios Cratæus Anguil: Aduers. 378.  
Ital. Bonaga. Gall. Areste beuf. Bugrandes & bugra-  
ues. Gallobelgis. Bouurande quasi bubulam. Ger. Och-  
seubrech, Stalkraut, & hautwechel. Belg. Drangwoitel,  
& Stalcrup. Hiss. Detiene buey & Gauilhos.  
Angl. Camothe & peti wyne.



Aliam plantam Poterij aut Tragacanthæ nomine donauit C. Clusius ortu, furculis, folio, omni que sui parte simillimam, sed folijs hyeme caducis deciduis, cuius tamen neque florem neque semen obseruare potuit circa Guadix & la Venta el peral, arido & inuiti solo, ubi vberè provenit. Plura pete in eius doctissima & rarissima historia.


ONONIS, aut Anonis.

Diosc. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat. cibus gratissima. rami acutioribus spinis, & veluti spiculis fir-  
mioribus horrent. radicem mittit candidam. Que ex asfacit, & extenuat. huius cortex ex vino potus, vrinam ciet.  
calculos comminuit. m. urines vlcera erodit. radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione. & mitigat. Eadem  
decoctum eius potu hemorrhoidas sanare creditur.

Gal. Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excalcificentem. Radix eius maximè est v-  
tilis habens quippiam & absterforium & incisforium. Itaque non tantum vrinam prouocat, sed &  
lapides constringit. Eadem facultate & crustas detrahit.

NATRIX.



NATRIX *Plinij herbariorum.**Aduersf. 378.**Melilotus fyl. pinguis F. Pennini.*TRIPOLIUM *Pratenfe. Aduersf. 380.**Hisp. Trebol. Ital. Trifoglio.**Angl. etiam Clauet.*

\*Refrigerat, exsiccat cum partium tenuitate. Inflammationes cataplasmate, ventris torsiones colicacoscq; dolores iniectione mulcet. Exiccandi & mediocri concoquendi vi menstruis albis mederi proditur.

*Varietas.*

Fronde duplo maiore luxuriat in Gallobelgio & Ambiano agro, pinguiori veruacuo satum, saginanda veterina longe optimum.

Trifolium guttatis maculis variatum Euphrasia ritu ocularibus decoctis & collinijs nostra ætas feliciter commiscet.

In Trifolio  
lureo. 381.  
lege pusillis  
cauliculis.


TRIFOLIUM pratense Salamant. Chysij.  
Hisp. Trebol de prados.



Ramulis serpit tenuibus dodrantalibus; folijs ternis parvis minus crenatis, pusillis floribus ex luteo dilutè purpurantibus. Semē paruum rufescens in membraneis folliculis, Trifolij vulgati modo, frequens in pratis circa Salamanticam. In horto D. Ioannis Dilfsij alitur.

TRIFOLIUM Asphalteum sive Bituminosum.  
Trifolium odoratum Plin.

TRIFOLIUM Americum.





**Diosc.** Semen & folia in aqua pota pleuriticis, vrina difficultati, comitialibus, & his qui aque inter cutem principia sentiunt, feminis quoque vulva virio opportunis, auxiliantur. menses ciunt. terna drachma e semine dari debent, e folijs vero quaterna. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, praesidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctum fori dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur ac a serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis, quaterna. vt quae febrim circuitus discutiunt. Radix antidotis inferitur.

Gal. Vis plantae calida & sicca vt birumen, cui odore est similis, vrinque tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam mensesque prouocat.

Menses & partus appositum extrahit, ex vino albo potum Dod. ex Hippoc.

#### TRIFOLIUM Americum.

Similitudinis huius est quoddam peregrinum Trifolium ex America ad nos deuectum, vbi flosculi caeruleos purpureosue Agni casti, vel Lauendulae spicatum promittit. folio atrouirente Lagopi aut Trifolij asphaltitius, Domino Ioanni Brancioni & Ioanni Mutono floruit.

#### Oxys PLINIANA.



#### Oxys PLINIANA.

Germ. Saurethlee. Belg. Coehoetx, broot. Gall. Pain de Cocu. Angl. Wood sour. Aduers. 381.

Plin. datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocelen habent.

Gal. eadem quae Oxalis praebet. Tenuium est partium, exsiccans.

#### Oxys lutea corniculata repens. Oxys lutea Clusij.



Gracilibus nitidis reptantibus coliculis: flos luteus. Folia & radix Oxidi scriptae non absimilia. Belgis hortensis est & planta annua, huiusmodi trinita emoriens, sed ex corniculis oblongis rediit in semine pusillo, subruffo & compresso. Quibusdam circa Hispalim vmbrosis locis sponte, oriri auctor est Clusius.

lege



## ISOPYRVM.

Diosc. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semen ex aqua mulsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vrile.

Gal. abstergit, incidit &c.



HEPATICVM Trifolium, siue Hepatica & TRINITAS herbariorum. Epimedium Tragi Cordo.

Germ. Edelweiskraut. Nostris edelleuerkraut. id est Hepatica nobilis. Gall. Hepatique.

Aduers. pag. 382.


Refrigerado siccatur, modicè adstringit. Hepar, ventriculum & viscera roborat: ad enterocelen Oxys Plinianæ ritu bibitur.

Varietas. Flores colore variant, alii cærulei, purpurei & quandoque niuei, (qui tamen cum primum pendunt ex cæruleo tanillum liuescunt) in cultioribus Belgij vti Georgij vanden Rye hortis cernuntur.

Nonnunquam etiam folia maiora maculis notulifère variegata spe ctantur. Tardiusq; floret.

POLYAN-



*Polyanthos HEPATICA trifolia.***HEPATICA Polyanthos.**

Purpureo-eruleis multiplicibus floribus stipatam elegantia peregrina, præclaro D. Ioanni Brancioni, superioribus annis doctissimus piæ memoriæ Alfonsus Pancius Ducis Ferratiensis medicus misit: cæteroquin folia, radix, cum superioribus haud absimilia.

RANUNCULUS aquaticus Hepaticæ facie. Polyanthemum palustre Dod. & Dilfj.  
Belg. Water leucercrupt, & Witte water botterblommen.



Figura & natalitii, nempe fossis ubi torpent vel torpuerunt tesides aquæ, Ranunculo aquatico, Ranae Morfui vel Hepaticæ trifoliæ accedit: cuius superiora foliola aquis innatantia, circinato ambitu obtusis leuibusq; dentibus incisa sunt; inferiora verò capillacea Fœniculo aut vulgaræ Anthemidi amula è flexuosis tenellisq; aquis item fluitantibus cauliculis. Flosculi odorati candoris lactei, amæno aspectu micantes, medio vimbone luteo, foliolis constantes quinis. Semen racemosum in congestis capitulis Ranunculi. Radix exilis fibrata.

Rr

FOENUM

FOENVM  
Burgundia-  
cum.



LAGOPVS, Pes Leporis.

LYNARIA  
radiata Ita-  
licum.



FOENVM



FOENUM Burgundiacum, & MEDICA. Aduers. pag. 382.

DIOSCOR. Semen id ficcatum, iucundi saporis gratia, conditaneo salis admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

Triplex è floris colore differentia:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cerulea,} \\ \text{Violacea \&} \\ \text{Lurea.} \end{array} \right\}$  Refrigerant omnes. Scorpionum ictibus non secus ac Trifolium Asphalteum contusæ imponuntur.

MEDICA folliculo spinoso. Adu. pa. 383. Trifolium cochleari Dod. Gal. herbe à limassons. } Medica varia-  
Epoti omnes & impositi commotis à vipera & scorpione ictis auxiliari creduntur. } viciates.  
Lunata, siue falcata MEDICA, LUNARIA radiata Italorum.  
Quæ lunato folliculo duntaxat differt, Italis Lunaria radiata dicitur.

LAGOPVS, Pes Leporis. Aduers. pag. 383. 384. Angl. Baris foot. Germ. Hasenfuß, & Hasenklee. Belg. Hasen poothens. Gal. Pied de Lieure.

DIOSCOR. Adstringit & exsiccat, sistit aluum cum vino pota; febrientibus cum aqua danda. Alligatur eadem contra inguinum inflammationes. Eadem Gal.

LAGOPVM maximum, folio & facie Trifolij pratensis. Aduers. pag. 384.

Folio pinnato LAGOPVS altera.  
an Cytisus Tragi, & Trifolium magnum Cordi



Varietates. Sanguineo siue etuento flore Lagopus folio Trifolij Asphalteij; flore spicato, duarum vnciarum longitudine, aspectu hilari purpureo sanguineo, sapore tritici aut graminis. Belgis hortensis est.

Folio pinnato LAGOPVS altera.

Perspicua in folio varietas, quod marcescens calidioribus & Pedemontanis potissimum regionibus, nitore, lauore, & striis elegantissimis auium pennas imitatur, Filicis Osmundæ vocatæ par, posito teruo è pediculo harente. Flos item sanguineus superiori persimilis.

*Hortorum odora* LOTVS. Aduersf. pag. 384.  
*Perperam* Trifolium Asphaltaum Diosc. Fuchf.  
*Lotus sativa*, siue trifolium odoratum alterum Dod.  
*Lotus* syl. Anguil. & Matth. An Mel frugum Theoph.  
 Angl. Garden clauer. Hisp. Trebol Real.

LOTVS asperior fruticosa, siue  
 Narbonensis incana LOTVS.†



LOTVS Vrbana Dioscoridū.

DIOSCOR. Extractus succus addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasq; caligines discutit.  
 Exsiccandi & concoquendi vim mediocrem possidet Gal<sup>o</sup>. in caliditatis frigiditatisque coniugatio-  
 ne media quodammodo & temperatura.

LOTVS sflueſt. Aduersf. pag. 385. Hisp. Trebol saluage.

DIOSCOR. Vim calefaciendi & leuiter adstringendi, obtinet: vitia cutis in facie maculasq; cum melle peruncta  
 expurgat. Trita per se aut cum Malua semine in vino aut passo bibitur, aptissimè contra dolores qui vesicam malè habēt.  
 Semen Gal<sup>o</sup>. 2<sup>di</sup>. est ordinis excafcientium.

Italica LOTVS altera.

Perpuffillam hanc Lotum in agro Bononicnsi D. David van Maude Antuerpiensis Medicus legit.  
 Cauliculis repit spithameis, in quibus parua folia Trifolij pratenſis, & flosculi lutei Scorpioidis vulga-  
 rē. Semen muricatum Tribuli terreſtris aut Cristæ gallinacæ.

LOTVS Aegyptia. Aduersf. pag. 385.

\* Ead. Gal. DIOSC. Caput quale papaueris, maximū: & intus grana, ceu milij, quæ Aegyptij exsicant, & in<sup>o</sup> panes cogunt.  
 Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda, coctaq; manditur. decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.  
 † Lotorum familia reddenda est hæc, vt quæ tota facie Lotis assimuletur. In rigidis quippe & du-  
 riuſculis pallidis spithameis ramulis folia terna incana Loto pratenſi Monſpelliaica angustiora, Cyuſo  
 subparia, Dorycnij latiora. Cauliculis summis luteoli flosculi, minores & aliquantum cani.

MELILOTVS. Aduersf. pag. 386. Sertula campana, & Corona Regia.  
 Angl. Melilote. Ital. Meliloto, & Trifoglio cauallino.

DIOSCOR. Vim habet adstrictoriam, inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede aut  
 restibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo oſſuto, aut Fœnigraci farina, lini semine  
 aut polline, capitulis papaueris, intybœve. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite illita, cum  
 creta Chia, vino aut Galla sanat. Stomachi dolores & cruda & cocta cum aliquo ex ante dictis leuatur. doloribus aurium  
 mirigandis, cruda ex passo instillatur. In aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Eadem Plin.



Gal. Plus calfacit quàm refrigerat Galeno. Di-  
gerit, maturat & discutit pauxilla vi adstringente.  
Emellii] Digerendo per insensilem transpiratio-  
nem.

MELILOTVS Italica  
& Patauna.  
Aduers. pag. 386.  
Trifolium corniculatum  
alterum Dod.  
Germ. Welscher  
stephlee.

MELILOTVS Germanica. Aduers. pag. 386.  
Melilotus lutea & alba Auicenna.  
Trifolium odoratum Dod.



MELILOTVS Coronata.  
Trifolium corniculatum Dod.  
Melilotus Germanica Fuchf.  
Germ. Unser frauen  
schuchlin.



FOENVM Gracum. Aduers. pag. 387.  
 Angl. fenegreek. Germ. bockhorn. Belg. fenigrec.  
 Gal. Fenegrec. Ital. Fiengreco.

FOENVM Gracum fjl. herbariorum.



DIOSCOR. Fœni Graci farina vim habet emolliendi discutendiq; in aqua mulsâ decocta aduersus tam inter-  
 nas, quàm externas inflammationes efficaciter illinitur. lienem cum aceto & niro trita extenuat. succus decocti eius  
 feminarum malis subuenit: & siue tumor siue praelusio sit vuluæ fouentur, & insident. Fœni graci in aqua decocti cre-  
 mor expressus, capillos, surfures, & manantia capitis vlcera purgat. locos dilatat & emollit, si cum anserino adipe pesti-  
 vice subiciatur. viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. decoctum eius prodest aduersus  
 renesiuos satidamq; dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, ex myrto, capillos & genitalium cicatri-  
 ces absterget.

Gal. Calidum est secundi ordinis, desiccatur primo; proinde feruentes phlegmonas irritat: quæ vero  
 minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

FOENVM Gracum fjl. herbariorum.

Syluestre quoddam non inuenustum statuunt Belgæ ob folia Trifolio Fœnogræco æmula, nonnihil  
 etiam ambitu serrata. Flores exiles Scorpioidis leguminosæ Narbonicæ agro calidiore iisdem natalitiis  
 quibus Scorpioides gaudet. Siliquæ succedunt oblongæ, graciles, minus aduncæ, quaternæ aut quinæ,  
 semen paruum claudentes. Hortis hic duntaxat quibusdam reperitur, Hispania delato semine.

CYTISVS. Aduers. pag. 387.

DIOSCOR. Folia digitis trita Erucam olent, gustatq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant, tumores interntia  
 discutunt, si cum pane trita illinantur. decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli, quod apes allicit, prope aluearia ferunt.

Gal. Folia digerendi facultatem obtinent aquæ & temperatæ mistam, sicut & Maluæ folia.

CYTISI varietas.

Cytisus alter facie, ortu & florum fertura Genistellæ infestioræ generoso viro D. Ioanni Bräcioni  
 egregiè fruticat quamplurimis furculosis, flexilibus & viridè flauèntibus, singularibus sesquicubitalibus  
 & bicubitalibus ramulis, cuius etiam cæterorum modo folia rerna prodeunt.

CYTISVS



## CYTISVS MARANTHÆ &amp; Matth.

Foliis itē ternis nōnihil incanis & albidis vt frutex vniuersus, ramosus, ternū, quaternū, & quinū cubitorum: tortiles siliquæ compressæ tantulum falcata: flos genistæ: folia digitis trita Erucam olent, & gustata legumen sapiunt, vt Dioscor. exprimit. Belgis hortensis.

## CYTISVS Hisp. primus Clusij.



Huius generis quatuor præter hæc differentias per Hispanias obseruauit Clusius, quos in sua stirpium rariorum doctissima historia posteritati proposuit.

Prior numerosa foliola habet trifoliis Cytisis similima, ramulos hirsutos ambientia, dilute virentia, quæ gustu legumen sapiunt, amara tamen. In summis ramulis flores Genistæ spicatim prodeuntes, nonnihil odorati. Solidioribus prædatis striatis & incanis sarmentis, quinū senūve cubitorum, è lignosa implexa & variè sparfa radice.

CYTISVS



## CYTISVS Secundus Hisp. Clusij.

Huic similis alter, multò tamen minoribus sarmentis, duorum duntaxat cubitorum, & candidioribus virgis & foliis incanis carinatis & canulatis, nunquam expansis, gustu perquam amaris. Flosculi nò ab similes, saturè tamen aureòve colore micantes. Vterque Salamanucensi agro & albis vtriusq; Castellæ locis secus vias oritur Clusio auctore.

CYTISVS Tertius Hisp. Clusij.  
Valentinis, Boga & Boxa blanca.

CYTISVS Quartus Hisp. Clusij.  
vernaculè, Escabon.



Tertium & quartum Belgij inquilinum factum hætenus non comperi.

Tertius subf. utex describitur ab eodè Carolo Clusio pedibus, rarò cubitalibus ramulis assurgens, exilibus omnino ineanis; foliis ternis breui pediculo aptis, quorum medium reliqua longitudine duplo superat, colore cinereis & incanis, sapore adstringentibus & linguam exsiccantibus. Ramusculi ferè ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus floribus onusti sunt, binis aut ternis simul nascentibus, ex vaginula quadam molli, & candida lanugine hirsuta, aureo colore fulgentibus, odore iucundo, simili cum superioribus forma, sed minoribus. Inuenitur variis Hispania locis, præferim Bætica & Valentina, vbi eius plurimus est vsus: siquidem illius ramis supra tegetes sparsis ab his qui bombyces alunt, iam saturi Mori foliis bombyces stamina sua sericea his ramis aduoluunt, quæ deinde à mulierculis & pueris explicantur.

## Quartus CYTISVS Hisp. Clusij.

Quartus humana est altitudine oblongis virgis, non admodum fruticosis, neque obsequiosis, cortice nigrescente obductis: folia ei sunt Trifolij aut Medicæ, terna simul vni pediculo inhaerentia, supina parte virentia, prona verò subrufa lanugine hirsuta, sapore leguminum amariuscule: flores ex alarum sinu reliquis maiores, cum Genistæ floribus comparandi, luteo auri colore fulgentes. Circa Calpen ad montium radices & Bætica maritimis Februario floret. Hætenus Clusius.

ANAGYRIS minus sætens, vel Laburnum. Aduers. pag. 388. Anagyris 2<sup>a</sup>. Matth. an Hebenus 2<sup>a</sup>. Theoph.

Cytisus secundus Theoph. Guiland. Faba in uersa Cordi. Germ. Baumbonen.

Varietas. Gemina è folio in Belgio conspicua varietas. Quæ autem latiore folio, habitioribusque ramis fruticat, sterilis est in Belgio potissimum, vti in horto Mutoni.



CYTISI facie ALYSSON fruticans  
quorundam.

Ανάγυρις. ANAGYRIS Diosc. Aduers pag. 389.  
Ital. Fava lupina.



Legeslin 5.  
emris. & li. 7.  
Mentanth.

Perquam parū notus hic perelegans, & parum frequens exoticus frutex, nisi cultioribus Belgij viretis, ubi floribus luteis Leucoij minoribus æstate lucet, & sparsis numerosis anfractuosis Polemonij striatis cauliculis. Folia Cyti, habitiora, albida, hispida, setaceis pilis rigida. Radice lignosa duriore, & in folliculis semine.

#### ANAGYRIS Diosc.

DIOSCOR. Tenuia folia trita tumores illius reprimunt. si partus habeat, & secundum ense, moventur, drachma pondere bibuntur in passo. sic & suspensio dantur, & contra capitis dolores in vino. difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendus discutiendusq; adhibetur. Semen \* commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Gal. Frutex grauius olens & digerentis calfacientisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia, cum propter humiditatis admisionem minus sint actia, idcirco tumentia reprimunt: at reficcata, incidentis sunt exiccantisque facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex.

\* Eadem Gal. Magis autem subulium est partium.

#### DORYCNIVM. Aduers. pag. 389.

DIOSCOR. Id somniferum esse constat: copiosius \* haustum mortem adfert. Nec desuere qui dicerent, semen in amatoria expeti. \* Eadē Gal.

Gal. Temperamento Papaueri simile est & Mandragora; ac quacunque parem habent refrigerandi potentiam excellit in frigidityte aqua: quamobrem pauculum quidem soporem conciliat; pluculum verò sumptum interimit.

POTEMONIVM. Aduers. pag. 389. 390.

DIOSCOR. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam. & ex aqua, aduersus vrinae difficultatem, & coxendicum † cruciatus datur ex aceto drachma pondere \* luciofis eadem scorpionis plaga alligatur. Tradunt, eum qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: eumq; si lectus sit, nihil molesti passurum. deniū dolorem mansa mitigat. Gal. † Quia tenuium partium est, & desiccandi vim obtinet.

RUTA hortensis. Aduers. pag. 390. 391.  
Angl. Rue. Gal. Rue. Germ. Rauten, & Wein-  
ruten. Belg. Rute, & Winrute. Hisp. Ruda.  
Ital. Ruta.

Πήραρον. RUTA syluest. montana. Gal. Rue sau-  
uage. Ger. Wald Rauten. Belg. witte ruyte.  
Hisp. Ruda saluage. Ital. Ruta saluatica.  
HARMEL officinarum.



RUTA Dioscoridis.

DIOSCOR. Ruta montana syluestrisq; satina & hortensi acrior est, & in cibis damnata. satina verò qua sub ficu arbore nascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque vrui, calfacit, exulcerat: \* vrinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit, potu cibove, letalium medicamentorum antidotum est, si semini ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. folia per se praesumpta, aut cum nuce iuglandae, aridūq; sicu inefficaces venenorum vires reddunt. contra serpentes \* simili modo sumere conuenit. genituram cibo † potūve exinguit. cum anetho sicco decocta, tormina sedat, facit ad pectoris \* laterumq; dolores, difficultatem spirandi, ruffes, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut ante dictum est irem ad insolationes coli, vulua, rectūq; intestini, cum oleo decocta & infusa, foeminas † vulae strangulatu liberat, si à genitali, sede tenus cum melle subiiciatur. seruesacta ex oleo, & pota, ventris tinea excutit. articularis doloribus ex melle, aqua inter \* cutem cum melle subiiciatur. seruesacta ex oleo, & pota, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita, cruda conditaq; cibo, visus aciem excitat. dolores \* oculorum illita cum polenta lenit. \* doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur. profluentem naribus † sanguinem sistit, trita & indita, testium inflammationibus cum laureis foliis impoſita, & eruptionibus popularum cum myrto & cerato prodest. Cum pipere autem vino & nitro affricata, alba virilignū medetur. cum eisdem illita fornicationes tollit, & verrucas quae thymiflorem repraesentant. contra impetigines cum alumine & melle virilignū imponitur. succus in mali paniculatyce calfactus, aurium dolori efficaciter insunditur. Hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum semculi succo aut melle perunt. Et iuuantur ignem sacrum, vlcera quae serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerusa persanant. mansa, alium cepatumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. dum florem promit, & ad murias colligitur.

† Eadē Plin.

\* Eadē Gal.

† Eadē Plin.



gitur, eam inflat & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione: oportet itaque eam vinctis an-  
tea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinacei pullis in parsum seles arcere. Adiciunt eam quæ in Macedonia  
circa Halicarnon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis sciatet. Semen eius potum  
contra intestina viria efficax est. in antidota commodè additur. contra incontinentiam vrina totum semen septenis  
diebus potus datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris Ruta sativa similis est. Prodest comitialibus<sup>7</sup> &  
coxendicium doloribus. menstrua mouet partus enecat. acrior est viribus quam hortensis, & validior. sylvestris, vipore  
noxia, cibis abdicatur.

<sup>1</sup> Gal. Incidere atque digerere crassos, lentosque humores potest. Ob eam autem vim & vrinas mo-  
uet. Quinetiam tenuium est partium, flatusque extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac veneris ap-  
petentiam cohibet; discutit atque exsiccat strenuè: est enim ex eorum medicamentorum numero quæ  
valenter exsiccant. <sup>2</sup> Idem Plin. Et morsus canis rabiosi.

<sup>3</sup> Plin. Ideò profluuiio genitali datur, & venerem crebro per somnia imaginantibus. Præcauendum  
est gravidis; abstineant hoc cibo: necari enim partus inuenio.

<sup>4</sup> Eadem Plin. subdens, iecinorum, renum vitia.

<sup>5</sup> Eadem Plin. Discutit caligines succus eius cum melle, vel cum lacte mulieris puerum enixæ, vel  
purus succus, angulis oculorum tactis. <sup>6</sup> Plin. Lenit capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto &  
rosaceo illita. Si verò sint cephalæa, cum farina hordeacea, vel aceto.

<sup>7</sup> Sethus. Succurrit difficultati vrinæ si cum oleo coquatur, & ea vesica foueatur.

Plin. Si vrinam mouet, † vt Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare velut inhibentem porui  
contra incontinentiam vrinæ. Carbunculum ex aceto emendat. Imponunt & mammis turgentibus  
decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium verò epiphoris, cum ramis Laureæ teneris, adeo  
peculiari in visceribus his effectu, vt sylvestri Ruta cum axungia veteri illitos ramices sanari prodant.  
Fracta quoque membra femine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffulum, & in  
toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat.

<sup>8</sup> Plin. eadem: dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendum.

Sethus potâ & per clysterè injecta intestina roborare, nō solum caliditate, sed proprietate quadâ ait.

RUTULA sylvestris. Aduers. pag. 390.



Diosc. Semen cum vino, molle, croco & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem.

SC 2

HARMALA

**HARMAIA**  
Syrriaca, an  
fia S. famoi-  
des magnū  
Diosc. i. Ad-  
uers. p. 190.  
Hulpa Gi-  
mifia, & Co-  
gombrilosa  
margos, i. cu-  
cu. neresexi-  
guos ana-  
ros.



**RYTA Pra-**  
tensis herba-  
riorum. Ad-  
uers. pa. 191.  
Thalicttrum  
nigra Coidi.  
Thalicttrum  
Dod.



**RVT**  
na. A  
pag.  
Gale  
aut S  
phala  
tia D

**THAL**  
CTRV  
Cordi  
folium. A  
uers. p. 35

Legelin.  
A. superior.



Varietates



Varietates *Rutapratenfis*, sive *Thalictri*.



Binæ aut ternæ his accedunt varietates, non nisi magnitudine, floris dilutiore & saturiore colore discrepantes. Nonnunquam enim foliis & caule occurrit longè maius, & multò speciosissimum, ea-propter in hortos transfertur. Folia ex cæruleo virent; caulis purpurascit; alioquin radix & omnia cum superioribus eadem. Quandoque florum stamina ex luteo & violaceo purpurascunt.

GALEGA. Aduers. pag. 392.

FABA maior Recentiorum. Aduers. pag. 392. 393.

Bona sive Phaselus Diosc. Dod. Germ. bonen.

Hist. hauss. Ital. fava.



Veneris efficacissima] Ideo ad epidemicos morbos commendatur, antidotisque inferitur, & carbunculis tusa imponitur. Conuulsis & epilepticis medetur, ventris lumbricos enecat.

Varietas. Galegâ minoribus foliis, flore ex cæruleo purpurâte alitur Muro in viretis nostris.

## LEGUMINA &amp; LEGUMINOSA.

## FABA.

Dioscor. Faba<sup>a</sup> inflationem excitat. agrè concoquitur, ramulosa somnia facit, tufti confert, carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esurata, dysenterias & celiacorum profluvia sistit. Contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio lenior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit mitigat. cicatrices concolores facit. turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat. lac restinguit. furunculos, fugillatâ, parotidâsq; cum feni graci farina & melle discutit. cum rosa autem, thure & oui candido, prouidentes oculos, tumores, uasq; reprimat. subactum vino, suffusionibus & ichus oculorum recreat. Manducata sine cortice fasa, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur, decocta in vino<sup>a</sup> testium collectiones

a eadē Gal. b &amp; Plin.

c. i. farina fabarum Plin.

d. idem Plin.

collectiones sanar. quò tardius pubes erumpat, pueris imò ventri illinitur. viriliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimentis capeffunt. cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt. decocto earum lana inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suscite natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis. nanque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Gal. Flatulenta faba est, etiam si cocta diutissimè fuerit, ac quouis modo parata. Habent verò substantiam non densam nec grauem, sed fungosam ac leuem: quæ vim quandam habet detergendi. Apparet enim perspicuè, ipsarum farina sordes à cute detergere: ob quam sanè facultatem ventrem non cunctanter permeat. Quum autem fabarum puls sit flatulenta, multò adhuc magis erunt flatulentæ, si quis integris ipsis coctis vtatur. Si tamen fixæ fuerint, flatum quidem deponunt, sed concoctu sunt difficiliore, tardè quæ prætereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Quod si virides priusquam maturæ sint atque exsiccata, edantur, idem eis accidet. Quod fructibus omnibus, quos ante perfectam maturitatem mandimus, humidius scilicet alimentum corpori præbebunt: obque id excrementosius, non in intestinis modò, sed in toto etiam habitu: meritò igitur fabæ eiusmodi minus quidem nutriunt, sed promptius deiciuntur.

In vtroque medij temperamenti proximè est in exsiccando & refrigerando. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis continet; sicuti putamen nonnihil adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam, dysentericis, cæliacis, ac vomentibus exhibuerunt. Excretionibus ex pectore & pulmone idonea est foris imposita desiccata innoxie in podagricis: ea sepe numero vti sumus ex aqua cocta, & ita adipi suillo admixta: ad neruorum tum contusiones, tum vulnerationes farinam eius cum oxymelite imposuimus; ad eos quos ex ictu plegmone occupauerat, cum polenta sed & testium, & vberum aptum est cataplasma. Nam hæ partes quum inflammatione tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè quando vbera ex lacte in ipsis concreto inflammationem patiuntur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguuntur, sicuti puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet.

Varietas. Italica & calidioribus regionibus rarior hæc nostra maior faba quæ colore ex rubro purpurante variat in Belgio & Anglia.

SYLVESTRI'S Græcorum faba. Advers. pag. 393.

Legemini  
radine pish me-  
dicis, colore  
pube.





*CAPPARIS leguminosa, sive Fabago*  
Belgarum. *Pepleos* Petri *Quibe*  
& *Pavisorum*.

Leguminosam hanc plantā similitudinis  
cognitione Capparin Fabaginē Belgæ cen-  
suerunt. Capparis namque folia longiora &  
didyma fabæ similitudine autourentia, mi-  
nora tamen & ad Rutam accedentia. Flores  
geminâtes, Capparibus conditis similes: v-  
sus esusque hodie tamen dispar: Expasii ve-  
rò cãdidi, foris quidem herbidi; fibræ me-  
dio crocæve stamina educuntur. Vniuersa  
plãta gustu amaro Salicis aut Capparis. Gal-  
lis & Belgis nisi rarò in hortis occurrit.

*PHASEOLVS vulgaris. Advers. pag. 394. 395.*  
Turcicæ multicolor faba est *Smilax hortensis*  
Diosc. *Delicos* Theophrasti *Anguillare*:  
an *Logos* Gal.? Angl. *kidney beanes*. Germ.  
*Welsh bonen*. Belg. *soomsche boonen*.  
Gal. *Fasiols*. Hisp. *Fasiolos*. Ital. *Fagioli*.

*DIOSCOR.* Siliqua cœta, cum semine in  
oleribus, asparagi modo, estur. vimam ciet. & tu-  
umtuosa semina facit.

*PHASEOLI noui orbis. Advers. pag. 395.*  
*Faba purgatrix Clusij.*



Hic Clusij verba subdidimus.

*CLVS.* Aliquot peregrinos fructus accepi Fa-  
bæ purgatiuæ nomine insignitos: sed nullus mihi  
conspicuit est, qui fabæ à Garcia descriptæ conue-  
niret, at potius inter phaseolos, omnes recensendi  
videbantur.

Prior,

Prior, cuius hic iconem exhibemus, orbiculari ferè est forma, sed planus utrinque & quodammodo pulvinatus, digiti vnus crassitie, duorum verò latitudine aut ampliore, ex vno latere aliquantulum cauo, qua videlicet hilus esse solet, & filiquæ, in qua continetur, adhæret: cortex durus & lignosus, lævis, ex rubro nigricans; quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, ut sunt omnia phaseola: ea: sapore primum quali sunt omnia ferè legumina, sed illico linguam mordicante, & acris: quo fit (ni fallor) ut purgandi facultate præditus.

Nascitur in insula Diui Thomæ dicta, & cordis effigiem, quale vulgo pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdā Cor Diui Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieça parte 1<sup>a</sup>. Chronici ca. 112.

Alter Phaseolo vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, & hilo prominente, & renis formam minimè referente.

C. L. V. S. Cum Olyssipone essem, donatus sum Phaseoli genere ex Brasilia Americae prouinciæ delato, admodum recenti, pollicari latitudine, crasso, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili: Eiusmodi quatuor aut quinque, singulis filiquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur: flore traditur ex rubro pallescente: ego duntaxat iuniorem plantam vidi mihi semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferè similis erat, nisi quod minora erant, & auersa parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fulnescente obiti. Brasiliæ Macouna vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes, ex Africa Mauritania delatos vidi.

PHASEOLVS Brasiliæ.

Siliquæ PHASEOLI Brasiliæ.



Quales purgatrices fabas & phaseolos Brasiliæ affabrè expressit Clusius noster plantarum rariorum, ut quis alius, studiosissimus & peritissimus, idè primam laudè meritis, prima videnti & habendi copiam fecit literis & familia illustris heroina Catherina Killegre. Paulo post Lutetia felicitè enatam in horto Castellani pia: memoriæ medici Regij clarissimi paulò ante illam funestissimam mortalium stragem istic grassatam. Siliquas subdidimus quales habeo munere illustris D. Ioannis Brancionis, & primum videramus in musarum thesauris doctissimi Senetini chirurgi Lutetiani. Siliqua dodrantalis est, admodum elegans, duas vncias lata, quaternis & quinis loculis ventriosa, carnosa, corticosa & coriacea, filiquæ Carobiarum vulgò dictæ concolor, innumeris rugis exarata, qualis icone deliniata.



PHASEOLUS alter Brasiliensis. Clusij.

PHASEOLI parvi ex America delati.  
Aduers. pag. 395.



Belgarum Boeckhoep an ERYSIMVM Theoph?  
Ital. Fromentone. Gall. Bled Sarazin. fagopyrum  
Dod. Ocymum veterum Tragi. Ger. Heydenkoorn.  
Lampfana vera quorundam. Ocymum Marci Var-  
ronis Anguil. Aduers. 395.

CLUSIVS. Vidi etiam nō procul Olyssipone in  
monasterio quodam Phaseoli genus vulgari no-  
strati adeo simile, vt nostrum putarem: pergulas  
istic vestiebat opere topiario, flore purpureo; at si-  
liquæ scabre sunt, breuiores, & duplo latiores  
quàm nostri vulgaris: fructus est exiguus pisi vul-  
garis magnitudine, totus niger, nisi qua parte si-  
liquæ adheret, quæ candida est. Brasiliensis frequen-  
tem esse audiui, & Lusitanis istic habitantibus Fa-  
ua braua, id est, fabam siluestrem, nuncupari.

*Fagopyrum.*

Bieræ rubicundiores & dulciores eius farina  
concinantur.  
Melius alit quàm Milium; minus triuico.



Tt

SESA-

Σησαμύνη *SESAMVM. Ital. Sesamo.*  
*Hisp. Alegria. Advers. 395.*



*Sativus LUPINVS. ὀσπύριον ὀσπύριον Græc. Germ. Feige-  
 boonen. fava siculnea, à folio. Ital. Lupino. Belg. Vich-  
 bonen & Lupinen. Hisp. Entramocos. Gall. Lu-  
 pins. Angl. Lupines.*



**Diosc.** Sesamū stomacho inuileis cibis. halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum, commissuræ dentium inhaesit. neruorum crassitiem illitu discutit. medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasta moribus. capitis dolores qui aestuatione concitantur, ex rosaceolenit. eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Gal. non parum in se continet viscosum & pingue, quare emplasticum est & emolliens; ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod conficitur oleum: & herbae quoque decoctum similem vim obtinet. Semen pingue est, ideoque repositum celerrimè fit oleosum: quamobrem eos, qui ipso vescuntur, celeriter implet, stomachumque subuertit: ac tardè concoquitur, pingueq; corpori prebet alimentum. Liqueat ergo quoddam ventriculi partibus vigorem ac robur addere nequit, quemadmodum nec aliud quoduis pingue. Est autem crassi succi, ideoque non properè peruatit. Ipso autè solo non admodum vescuntur, sed cum melle crudo, quas *σπονδυδαί* vocant effingentes. Panibus etiam inspergitur; temperamento est calidum, ob eamque causam situm etiam excitat.

**Diosc.**



**Diosc.** Satiuus **LUPINUS** notus est. Cuius farina cum melle delincta, aut potu ventris animalia expellit. ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus praestat, cum ruta & pipere potum. quare lienosis prodest. eodem vlcera tetra, quae theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasque fouere vtilissimum: menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. farina eorum cum luore nig. expurgat. Inflammationes cum pelenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cum aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Decocti pluvialis aqua donec in succum liquefiant, faciem abstergant. Cum radice nigri chameleonis ouium scabiei medentur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta & pota vrinam cit. Vbi autem edulcati fuerint, rriti cum aceto, & poti stomachi fastidium leniunt, & cibi aviditatem excitant.


Gal. Lupinus edi potest coctus, multis ante diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, fitque tunc nutrimentum succi crassi: cæterum vi medicamentum ita præparatus ex genere est emplasticorum. At ubi nativa etiamnum manet amaritas, exergendi digerendique vim obtinet. Interficet lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus: tum etiam foris identidem per fustum vitilignes, achoras, exanthemata, pforas, gangrenas, vlcera maligna inuat, partim exergendo, partim citra mordacitatem digerendo siccandoque. Expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia assumptum: elicit menses ac farum, cum myrrha & melle impositum.

Porro lupinorum farina, sine mordacitate digerit, nec enim liuida tantum, sed & chæradas & phymata curat, sed tunc in aceto aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idque pro laborantium temperamento & affectus diuersitate, quod ex vfu est eligendo: digerit item & quæ liuida sunt, & quæcunque modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina.

Lupini dura & terrestres est substantia: quocirca ipse concoctus sit difficilis, succumque crassum gignat est necesse, ex quo non probe in venis confecto, crudus propriè appellatus succus aceruatur.

**LUPINUS** Syl.

Amarior est, & ad omnia valentior satiuo, eiusdem generis cum ipsis & facultati.



πῖσος. An **PISUM** angulosum hortorum, sit quadratum Plin. ? **Pisum** maius Dod.

Perperam Cicer arieinum Tragi.

Hisp. Arueias. Aduers. pag. 396. 397.

Gal. Pifa tota substantia cum fabis quandâ habent similitudinem, eodemque cum fabis modum sumuntur. His duabus tantum rebus ab eis discrepant, tum quod non, æquè ac fabæ, sunt flatulenta, tum etiâ quod detergendi facultatē non habent, ideoque segnius quàm illæ per aluum secedunt.

Lib. 1. de alimentorum facult.

Pro fabis pifa substituantur dummodo non sit opus absterfione.

PISVM minus ex luteo virescens.  
Advers. 397.

Coccineum Americium PISVM, an OROBI  
species?



Que prostant in officinis Antuerpianis Pifa ex nouo orbe delata, non decerpta ex quadam arbore, vt quidam putarunt; norunt amici nonnulli qui feuerūt, legumen que Pifo non ita abfimile vel Er- ruo enatum viderunt. Siliquis femine adhuc præ- gnātibus me donauit D. Petrus Quickelbergius mercator Antuerpianus, hiftoriæ piscium, testa- ceorum, conchyliorum, marinorum excremen- torum & Naturæ miraculorum summus, & explo- ratiffimus, fi quis alius, admirator. Folliculo Pifo fylueftri ferè pari, femina medullofa, duriffima, te- retia, oblonga, Præoniæ æmula, fed minora, pur- pura miniata, rutila, ad bafim vbi germen, ornata rōfpicuis nigris veltigijs, clauduntur: guftu amara & leguminofa.

OCHRYS fyl. fua ERVILIA. A. luerf. 397.  
Cl. et Orobiades quorundam.

PISVM cot-  
datum, Cor-  
Indum.  
Halicacabū  
peregrinum  
Fuchf. Vefi-  
caria repens  
Matth. Per-  
peram Do-  
ryzenium  
Cordi.



lege flore  
dido, int  
purpure  
filiqua.





LATHYRIS Narbonensis latiore folio. Angl. Cichelinge. Clymenum Matth. Ervum sativum Cordi. Pisum Græcorum Tragi. Aduersf. 398.

lege angustiore gramineo folio LATHYRIS.  
Aduersf. 398.



lege seu & ex-  
mulatione.

lege in vdis.



ἀρακός. ARACYS aut CICERA.

Ital. Mocho. Aduersf. 398.

Gal. vsus omnis Araci, & facultas Lathyridis facultati est assimilis, nisi quòd Araci sint duriores, minusque facillè elixantur: quæ causa etiam est, cur Cicerculis concocti sint difficiliores.

Tr 3


ἀρακός.

ἄφρακον APHACA. Ital. Vecione & Ceserone.

Aduers. pag. 398.

Diosc. Semina adstringendi vim habent. Quare torrefacta stomachi aluiq; fluxiones sistunt, si freſa lentis more decoquantur.


Gal. eadem. Similiter vt ipſa lenticula edi ſolet, verum egrius quam illa concoquitur: valentius autem deficcet, & moderati caloris eſt.



TERRÆ GLANDES. Apies Fuchſ. & Tragi.


Perperam Ornubegalon, & Apios Cordo.

Ger. Eerdnuſſen, erdpr chelen. Belg. Eerdnoten ende eerdeckelen, & mupfen met ſterten. id eſt, glans & nux terreſtris, & mus caudatus, à ſimilitudine tuberoſa radicis. Aduerſ. 398.



Deme in  
ſ. pag.

ERVVM  
ſylueſtre.



Manducatae radices vti caſtaneae tardiùs confi-  
ciuntur, flatulentum, ſuiam tamen ſuccù creat.  
Veneris inſentia eſt. Sanguinis vteri, renum  
& ventris fluores compeſcit. Nauſeam & vom-  
itiones procreare creduntur.

lege ERVVM ſylueſtre herbariorum, ſine  
κατανάλυν? Aduerſ. 399.

Diosc. Vtramq; narrant in amatoria expeti.  
Eadem Plin. Dioſcoridem citans.

CICER



CICER OROBEVM. *Aduers. pag. 400.*  
*Cicercula Plin. F. Pennini.*

CICER *Satiuum, Arietinum, Angl. Ciche. Ital. Ceci.*  
*Gall. Pois Cices & Cices de belier. Germ. Zps.*  
*sern. & erweyssen Zpsern. Belg. Ciceren.*  
*Hisp. Grauanicos.*

OROBVS *receptus Herbariorum. Ital. Mocho.*  
*Hisp. Yeruio, & yeruos. & Prouincialibus Eres*  
*quasi Eruum. Mocho siue Cicer satium Diosc.*  
*Dodoneo. Aduers. 400.*



Diosc. *Cicer satium aluoidoneum est, vrinam ciet, inflationem parit, colorem commendat; menses ac par-*  
*us expellit; lac auget. Cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium; verrucosus informicationes: ad scabiē,*  
*vlcera capitis manantia, impetignescēq; item contra carcinomata & vlcera quae cacoēthe vocantur cum melle &*  
*bordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur: vtrumque cit vrinās, dato cum rore marino, hydropicis aut re-*  
*gio morbo laborantibus eorum decocto. Ledunt autem ea exulceratam vesicam & renes.*

Gal. non minus quā faba flatulentum, sed valentius nutrit quā illa. Ad Venerem autem in-  
 citat: creditumque est, semen quoque generare, vnde quidem equis admissarijs ipsum exhibent.  
 Inest praeterea ciccribus facultas abstergerendi maior, quā fabis: adeo vt quidam ex ipsis calculos  
 in renibus constantes manifestē comminuant: nigra autem sunt ea & exigua, arietinaque ipsa nuncu-  
 pant, Satius autem est, succum ipsorum in aqua coctorum bibere.

Diosc.

**Diosc.** Eruum capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinem per vrinas extrahit. Elixo boues saginantur. Per anda farina ratio haec est, vberiora grana candida, q<sup>3</sup> deliguntur, permiscendoq<sup>3</sup> aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. postea torrentur, vsq<sup>3</sup> dum hians cortex disrumpatur, molitaq<sup>3</sup> farina cribro incernuntur. postremo farina reconditur. Haec aluo utilis est. vrinam ciet. meliorem colorem efficit. sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur. vlcera cum melle purgat. lentiginis & vitia cutis in facie, & maculas, totumque corpus emendat. nomas, gangrenas, duriciaq<sup>3</sup>, serpene non patitur. mammarum duritias emollit. atra vlcera qua iberionata vocant, fauiscq<sup>3</sup> emarginat. carbunculos rumpit. cum vino subacta illitu morsus viperarum, canum, hominumque, medetur. vrina difficultates, tensesq<sup>3</sup>que, ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, rostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum sumptumque, conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

**Gal.** desiccet ordine secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Caterum si fumatur copiose, sanguinem per vrinas euocat.

Hominum cibis prorsus hoc semen damnatur; est enim & insuauissimum & prauis succi. Eruo autem instar lupini preparato, ex melle vitumur, vt medicamento crassos pulmonis, thoracisque humores expurgante. Candidum minus est medicamentosum, quam id quod ad flauum aut pallidum colorem tendit.

**CICER SYLVESTRE verius.**  
Aduers. pag. 400.




**CICER Syl. Herbariorum. Ital. Ceci saluatico.**  
Aduers. pag. 400.





LENS. Hisp. Lenteyas. Belg. & Germ. Linsen.  
Angl. Lentilles. Aduers. 401.

LENS minor.  
omnia finulima sed minorā.



Diosc. Lens crebre comesta, oculorum aciem hebetat, agere concoquitur. Stomachonocet, eumque & intestina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit. Praestat quae facillime concoquitur, & nihilatri in maceratione rediens vim habet adstringendi, quae ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primaq; aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit) somnia tumultuosa excitat. capiti, nervis, ac pulmōni inutilis, melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut bacca myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisque, pyris Thebanis, aut malis coroneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quae post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhois quae obsonijs inspergitur. Acetum autem cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subversionem ventriculi trīginta grana lentis suis corticibus denudata, deuorata prosunt. Decocta cum polenta, & illita, podagram lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit, & vlcera purgat. Decocta in aceto durities & strumas discutit. Cam meliloti aut cotoneo malo, medetur inflammationibus oculorum & sedis, addito rosaceo, in maioribus sedis inflammationibus & sinu amplo, cum malicorio aut siccis rosis adiecto melle decocta. Contra nomas gangrenicas similiter vntur, aut adiuncta maris aqua. Aduersus autem pustulas, herpes, eryspelata, perioniesq; vi antea dictum est. Contra mammas grumosas lac continentes, & lactis copia turgentes, aqua maris cocta & illita auxiliatur.

Gal. Lētes mediū tenēt caliditatis & frigiditatis, desiccāt tamē secundo ordine. Ipsum itaq; earum corpus desiccāt & sistit ventrē: ceterā decoctū prouocat. Proinde etiā prior aqua abijciuntur vbi retentionis causa adhibetur. Nam quae ventri obueniūt fluxiones desiccāt, os ventriculi, intestina, & totum denique ventrem corroborans, quamobrem celiacis & dysentericis accommodatus est cibus.

Gal. Lens verò decorticata, vt illā adstringēdi vehementiā, & ea quae ipsam consequuntur, amittit, ita magis nutrit, quā quae cortice spoliata nō est; siccū crassū prauūmq; gignit: tardēq; cōmeat; nōn tamē alui fluxus desiccāt, vti ea cui cortex nō est ademptus. Iure igitur, qui largius hoc edulio vntur, elephantiasin, & cācros incurrunt. Siquidem crassa siccaque cibaria, succo melancholico generando sunt idonea. Quare ijs duntaxat, quibus aquea in carnibus est *καταξία*, lens in cibo vtiliter praebeatur: aridis verò & squalētibus admodum damnosē. Eandem ob causam visum integrum & inculpatū hebetat, ipsum immoderatē exsiccās: ei verò, qui cōtrario modo se habet, cōfest. Ad mēstruas aut purgationes nō est accommodata: crassum enim & tardissimū sanguinē reddit: at muliebri profluvio est vtilissima.

LENS minor. Est & Lens minor, flore, siliqua, seminis figura omni que sui parte priori similis, sed omnia minorā. A rei herbaria studiosis scribitur in hortis Belgicis,



VICIA. Angl. Fiche.  
Trago & Officinis Belgij *perperam Orobus*.  
Aduers. 401.

Gal. Semina non modò insuauiā, sed concoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Per spicuum ergo est cū huiusmodi naturā obtineant, alimoniam quoque quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassique succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem.

ARACVS. Aduers. pag. 401.  
Gallis velce sauage & Crocque.  
An vera Aphaca Diosc. Dalefc.?  
Gallobelgi semine columbas saginant.

ARACVS si-  
ue Cracami-  
nima. Ad-  
uers. 401.






SECURIDACA minor. Aduersf. 401.

ASTRAGALVS Montpellierensium.

Hedysaron alterum Dod.\*



\* Huius altera differentia in vireto ditissimo Hugonis Morgani, hyemis, cæli & soli nostri patientissima.

Diosc. Hedysaron amarum gustu, stomacho vile in potu. additur in ant. idota. Cuius velle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit.

Gal. Semen amarum & subacribum apparet. Quamobrem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idē præstant totius fruticis germina.

HEDYSARVM alterum clypeatum.


Helenium Aegyptium quorundam.

Speciosius multo superiore alunt Hedysarū vireta Belgica, quod Aegyptium Helenium eiusus speciem quidam dixeret; alij verò appositè Hedysaron censuere. folijs enim & procumbentibus cauliculis est Securidacæ: floribus amaris Genistæ, sed rubentibus in cauliculis summis: è quibus postea siliquæ compressæ hirsutę ternis, quaternis & quinis orbicularis clypeoli effigie loculis complures visuntur: semine intus Genistæ minore. Cuiusmodi beneuolentia Francisci Permini pharmacopæi Antuerpiani doctissimi primum vidimus & habuimus.

VV 2

ASTRA-

ASTRAGALVS Lusitanicus Clusij. Lustr. Alfabecca, Batidis Garauancillos,  
quasi dicas Cicer exiguum.



Priscis & nuperis indicta hæc, posteritati iconæ & literis prodita sedulitate C. Clusij, quæ quasi cæteris rarior & perelegantiior foret; Astragalus generica habenda certè est, quibus quidè, ut si quæ alia, exactè æquiparatur. Prodit enim facie, ortu & cauliculis cubitalibus, digitum crassitie æquâibus, duris subrubentibus, angulosos & lanuginosos; longioribus pediculis, plumatim foliorum exortus ex aduerso exactè gerentibus: folijs item hirsutis & incanis, gustanti primùm adstringentibus, deinde feruidis. Flores copiosi, Lupini, aut Fabæ vulgaris secūdum oblongos pediculos ex alarum sinu prodeuntes, ordine digesti, albi omnino, sed ante quàm aperiantur, ex luteo foris nigricantes. Radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachiali interdum crassitie, palmari longitudine, deinde in binos aut tres ramos se findens, foris nigra, rugosa; intus candida, dura & lignosa, ingrato sapore; quæ arefacta cornu duritie superat. Collibus quibusdam supra Olyssiponem, quos Tagus fluvius alluit, inter vepres; syluosis item locis non procul Hispeli, itinere Granatensis oritur. Hæc Clusius.

Diosc. Astragalus radix aluum sistit in vino pota; urinam mouet. Vetusit vlceribus sicca effraciter inspargitur. Sanguinem suppressit, agrè propter duritiâ munditur.

Gal. Fruticellus est exiguus, radices habens adstrictorias; quamobrem etiam ex numero est non infrenuè exiccantium. Nam vlcera vetera glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit: si quis in vino decoctam radicem bibat.

#### ASTRAGALOIDES altera Herbariorum.

Glycyrrhizæ vultu cubitalem herbam quadam cum Astragali similitudine Astragaloidem statuerunt Muttonus & herbarum peritiores. Radice longa, digitum crassa nititur. caulis erectus in quo flores purpurei, siliquas nigras per maturitatem relinquentes.



ASTRAGALOIDES. Herbariorum.  
*Astragalus* forte *Matth.* vel tam demum  
*Polygala* eiusdem.

*ASTRAGALVS Syriacus.*



Non ita dissimilem vultum sortita est planta, quam circa arcem diuturnam & urbiculum Tisnon vocatâ Lugdunensîs Gallia; in collibus illis, vbi solebamus effodere Acutem lapidem, sæpius erui-  
 mus & vidimus; quæ quia ad Astragalon accederet, Astragaloidem cum Valerando Dorico nostro  
 Insulano & nonnullis alijs peritis herbarum exploratoribus diximus. Cauliculos spithameos & pe-  
 dales erigit. Folia Ciceris aut Galega, sed minora in pediculis vtrinque ordine sita. Flosculi ex pal-  
 lido puniceant, aspectu iucundi. Radix crassitie digitum æquat.

*ASTRAGALVS Syriacus.*

Perelegans & rarior multo quæ hic depicta leguminosa planta, Astragalis genericæ habenda certè  
 est: quippe foliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicum prorepantium Astragalon  
 refert. Sed florum densa exortu congestorum decore, effigie, elegantiâ, magnitudine & rubore  
 ornatur amantissimo. Alepo Syria hæc plantam primùm habuimus, postea in vrcis pensilibus D.  
 Brancianis Mechliniæ Italo semine enatam scimus.

GLAUX vulgaris. Fanumgracum syl. Tragi.  
 Polygonum Cordi, & Gesneri Glycyrrhiza syl.  
 à consimilitudinis sapore. angl. Sea Trifoly.  
 Aduers. pag. 402.

GLAUX Dioscor. Clusij.



Glaucis genus illud quod doctissimus Clusius describit, ne nobis quidem inspectione notum factum, quod quia plurimum ad Glaucem Diosc. accedere videtur, non possum non huc subnectere, ut eius species & varietates indicatas nequaquam transiliamus: utque complures differentias notis inter se discernamus & notiores habeamus; de cuius assertionem Clusio libenter assentimur, & gratiam habemus, illiusque iudicio & descriptione oblectamur. Ternis aut quaternis à radice assurgit cauliculis dodrantalibus gracilibus, incanis; folijs ordine quodam utrinque digestis secundum costam longitudinem Lentis aut Altragali Hispanici iam descripti in modum; modibus, superne virentibus, inferne cana lanugine obfusa, gustu nonnihil amaro: flos extremis cauliculis confertus, & capituli spicae ut obtusa & breuioris modo innascitur. Glycyrrhizae vulgaris forma & colore perquam similis: radice exili, candicante, nusquam alibi quam ad ripas Thormis fluminis, quod Salamanticam alluit, paulo infra eam urbem obseruavi mense Iunio: verum is locus procul à mari distat, iuxta quod Dioscorides nasci tradit. haec Clusius.

CAPVT GALLINACEVM Belgarum: an Onobrychis Diosc.?

Polygala vera Dalesc. Onobrychis Dod.

Diosc. Herba suapte vi sititum illinatur, tubercula dissipat. Cum vino pota, strangurias sanat. Illita\* ex\* Eadem oleo sudores mouet.

Gal. Rarefaciendi, digerendique vim obtinet, proinde folia eius virentis imposita ad morem cataplasmatum phymata digerunt: arefactae verò si in vino bibantur, strangurias sanat.

CAPVT



## CAPVT GALLINACEVM Belgarum.



SPERRO CAVALLLO. *Advers.* 403.  
FERRVM EQVINVM.



ORNITHO-  
PODIUM.  
Polygala  
Diof. Do-  
donæo. Belg.  
Daghel-  
uort *Ad-*  
uers. 463.



STELLA fe-  
guinosa.

*Varietas.* Spōtē in syluis Auxiaci castrī Gallobel-  
gij tota minor prouenit, hyemis patientissima. Gu-  
stu amarā & Hedytaro natura assimilē facit Dod.

STELLA leguminosa. *Arturo Cortusi.*


Inter rarissima planta d' bene Cortusi Patavino stirpium amantissimo, avidissimo & peritissimo: folijs exit leguminosa & scorpidis. Rosculis Lampianæ. Semen exile pullum in corniculis tantillum falcatis vno pediculo aptis & radiatum congestis, stellam exprimentibus; gustu leguminoso & glutinoso. Numquid sit cum stella illa decantatissima herba Hibernis celebrata humi depacta, fides esto penes illos qui viderunt & referunt. Ad amatoria summis laudibus celebratur hæc.

TRIBULVS terrestris.

Hisp. Abroios.

Advers. 404.

GLYCRRHIZA echinata Diosc. Belg. Dupchout &amp; Callichout. Germ. Dufholtz, fufwurzel. Angl. E-rotes. Gall. Raigalisse &amp; Raiglice. Hisp. Regalita &amp; regaliza. Ital. Regolida. Advers. 405.



Diosc. Drachma pondere epotus & impositus cominorsis à vipera auxiliatur. Adversus item venena cum vino potus. Decoctum eius sparsum pulices necat.

Gal. Terra & frigida qualitas, quæ & adstringens superat: fructus eius cum tenuium sit partium, potus lapides renum comminuit.

## GLYCRRHIZA echinata Diosc.

Diosc. Succus radicis densatur Licij modo. Is in arteria scabritia efficax habetur: verum oportet ut lingua subditus eliquescat: æstuantops imacho, thoraci ac iecinori convenit. Sanat vesica scabiem, & renum dolores, cum passo potus. Idem eliquatus sum sedat: vubieribus illitus accommodatur. Commanducatus ori prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem convenit. eiusdem farina pterygis commodissime inspargitur.

Gal. Familiaris est nostræ temperaturæ: & cum adstrictio quædam adiuncta sit, eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad temperamentum. Porro quoniam & dulcis, nimirum & modicè humida est.

Gly-



GLYCYRRHIZA *siliquosa*.  
Aduers. pag. 105.

CORONILLA *sive Colutea minima*.  
*Polygala Valentina prima Clusij.*



Eadem & plura quàm echinatz Glycyrrhizæ tribuit Dioscorides, hæc potest.

Respiratione, omniaq; thoracis vitia iuuat: pectus dilatat; acres & falsos humores lenit & retundit. Moderato humentiq; calore, recens potissimum succoq; prægnans, & quadam tenui abstergente visceribus amica dote, eorum farctus referat; asperitates lenit; & concoctionem iuuat.

COLUTEA *Scorpioidis varietas*. Aduers. pag. 405. *Colutea Scorpioides coronata*.  
CORONILLA *del Rey Hispanorum*.

A superiore non nisi exilitate, & floribus speciosioribus, hilarioribusque corollam fertiliamve auream effigiantibus differt, vnde Hispanis Corona Regia dicta fuit. Belgij hortis cultioribus frequens. Lege COLUTEA.

CORONILLA, *sive Colutea minima*.

Harum omnium, cum sint omnia longè minora, minimam diximus; surrectis foliolis Rutulæ coloribus, alioqui assimilis cæteris. spichameus cauliculus. Belgis hortensis. Coluteæ varietas.

Agro Salamanticensi, Granatensi, Murciano & Valentino spontè oritur secus vias, vt auctor est C. Clusius.

ANTHYLLIS legumino-  
sa Belgarum.




ANTHYLLIS leguminosa Belgarum.  
Anthyllus prior Dod. Glaux quorundam.

Quæ Septentrionalibus Anthyllis prior vocatur, à similitudine videtur cum leguminibus cognata: quippe foliorum & cauliculorum effigie, lentem refert, mollioribus & incanis, & carnosiss. flores lutei Trifolij pratensis quadamtenus, nō ad: d in glomerationem compressi, sed hiantes magis & depressi. Semen item Trifolio non ita abssimile. Cieberrimi cauliculi procumbentes spithamei: radix exigua. Agrorum marginibus Lutetiani agri, Narbonensis, Germaniæ & Angliæ passim occurrat.

COLUTEA Theophr. Aduers. pag. 406.



SENA.



SENA. Aduers. pag. 406.

MESVE. Folliculo quàm foliis est efficacior, Sena præsertim si is ex vitidi nigricat, modicè amarus, subadstringit absolutus. recens in quo semen amplum, compressum. Calfacit initio secundi ordinis, siccat primo. Folia etiam primo calefaciunt. Terget, expurgat, digerit, purgat clementer melancholiam



choliā, & bilem vītam à cerebro, ſenſoriis, pulmone, corde, hepate, liene. Proinde morbis dictarum partium ab humore huiusmodi profiſcentibus ſuccurrit, vt melancholicis febribus antiquis: gaudium gignit ablatō humore ſine cauſa externa trīſtante, & floridum corpus efficit, obſtructiones viſcerum aperit. Foliorum huius & chamameli decoctum lotionē cerebrum, neruos roborat. Eadem quouis modo vſurpata, viſum & auditum firmat. Eius purgationem tardam & imbecillam celerant & intendunt miſta acria, vt Zingiber, Sal Gemmę, ſal Indus. Ne verò ſtomachum lædat, cardiaca & ſtomachica ſunt miſcenda. Ob id Galeni decreto coquenda laigo pondere ex iure Galli, Gallinę, vel aliarum carniū, vt citra moleſtiam purget: vel ſero lactis infula, cum ſpica, deinde parum diu ſeruata, vel puluis eius ex lacte dulci ſumendus eſt. Vino albo mulſteo miſcebat quidam vim magnam Senę, poſt tres meſes potandam dabat, ſicque purgabat cerebrum & ſenſoria, & gaudium augebat. Sunt qui decocto eius cum prunis & ſpica feliciter purgant. Mediocreſ autem coctionem ſuſtinet. Inſunditur ab aureis tribus ad 3 vnā.

**Lege** SPARTIVM. Geniſta ſcoparia vulgi.  
Geniſta Plin. cum Hippoſpartio,  
ſue Rapo Geniſta. Aduerſ. pag. 407.  
Hiſp. Scobas.\*

Vulgi GENISTELLA infeſtoria.  
An Lutea Plin. 3 Aduerſ. pag. 407.  
Perperam Ferula Tragi.



\*Vrinam amaritudinis ratione mouet & calculum frangit vi incidendi & extenuandi.

GENISTELLA infectoria. Aduers. pag. 407.  
Genistella infectoria Clusij. Scoba Marcianus.

SPARTIVM Dioscorideum Narbonense &  
Hispanicum. Aduers. pag. 408.



Varietates.

2. E solo folio latiore secundam differentiam alit Muttonus noster.
3. Et tertiam iuxta Zuthphaniam lectam, procumbentibus pedalis ramulis, cæteroquin non ab-  
similem.
4. Quartam differentiam Clusij icone & oratione his verbis dedit. Ad binorum cubitorum altitudinem  
crescit interdum hic frutex, nudo stipite, enodi, recto, digitali crassitudine, candicæ cortice obducto,  
in multiplices breuesq; ramos summa parte sese diuidens, tenellos & fragiles, quos ornant folia lini aut  
Thymelææ frequentia, supernè virentia, infernè verò incana & planè argenteo splendore, gustu pri-  
mùm linguam exsiccante & nonnihil adstringentè, deinde subamaro: flores summis ramulis nas-  
cuntur spicati Genistæ tinctoriæ Germanicæ similes, lutei. Totâ planta elegans aspectu. Nusquam  
hunc fruticem conspexi; quàm Muticiano regno secundum vias mense Maio florentem. Incolæ Sco-  
ba vocant.

SPARTIVM Dioscorideum Narbonense & Hispanicum.

DIOSCOR. Purgant per superna vehementer, Hellebori vice circa periculum flores & semina, quintis obolis in  
aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mor tuis, extractus succus, ischiadici & angu-  
inis laborantibus auxiliatur si cyathi modum ieiunii bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & insundere ischia-  
dici chylere, strigmenta autem elicit cruenta.

Gal. Non instrenuè trahentis est facultatis.

Ægin. eadem quæ Diosc. pota quinque obolorum pondere per superna sine periculo verari modo.


Eadem Se-  
thus.

SPARTIVM



SPARTIVM *Hisp. alterum flore luteo Clusij.*  
*Spartium monospermum Hisp. Mutoni.*

SPARTIVM 2<sup>m</sup>. *floribus albis Clusij.*  
*Facie vulgati Spartij Narbonensis aut Hispanici.*  
*Hisp. Retama, & ynieſta, & Hiniſta.*



In ſiliquis rotundis, ſemine reperto in vuis Damascenis in Belgio enatum habuit Muttonus, cuius-  
 que poſtea ramulis nos donauit C. V. D. Ioannes vander Dilſ. Frutice, radice, ſtipite ſtriato, vimineis  
 virgis iuncteſce, foliis caducis & ſtoſculis luteis, ſed minoribus vulgare Narbonenſe aut Hispanicum  
 Spartium refert. Sed in ſingula ſiliqua, lobove ſiue cartilagineo tereti oliuari folliculo, herbariorum  
 Ciceri ſylueſtri ferè pari ſubruſo, ſingulum ſemen atrum & durum, tenis effigie, claudit. Variis Ca-  
 ſtellæ vtriuſque locis arenolo ſolo oritur, vt auctor eſt Cluſius.

SPARTIVM 2<sup>m</sup>. *floribus albis Clusij.*

Geniſtam Damascenam odoratam flore albo Hiſpani referunt: quam ſubiunxit præcedenti Spartio  
 Carolus Cluſius his verbis: Aliud ſuperiori ſimile, longè tamen maius & hominis altitudinem ſupe-  
 rans. Virgulis priore tenuioribus & lentioribus magiſque obſequioſis: flore paulo maiore & omnino  
 candido: lobis à ſuperiore, forma non differentibus, ſed minoribus, ſemen etiam minus continentibus.

Huius me primus monuit Aptuerpiæ C. medicus D. Dionyſius Thomas Luſitanus, materiæ Me-  
 dicæ gnarus.

Gadibus ſolùm prouenit & locis vicinis aura marina perflatis.

GENISTELLA montana. Aduers pag. 408. Genista angulosa Cordi.  
Genista sagittalis nuperorum. Chamæspartium Tragi.

Caput luxa-  
tum a duers pag.  
408. huc resina  
mont.

Spartea & hæc herbula est, & duntaxat montium celsiorum conualibus quibusdam obuia, vt Cal-  
cari montis Narbonensis, propter cœnobium: In Germania etiam arduis spargens sesquipalmaria fo-  
lia pinnatim triquetra, sagittæ affixæ aut innatæ pennæ ritu, articulatim veluti geniculata per spatiosa &  
commissuras infecti, qualia videre est virentia etiamnum Londini, Mechliniis, Antuerpiæ & Liæræ in  
hortis; floribus luteis Genistellæ infectoriæ fastigiata, quibus succedunt siliquæ, & semen Genistæ lon-  
gè minora.

GENISTELLA pinnata altera Hispanica.  
Chamægenista peregrina Clusij.\*

ASPALATHYS secunda Monspellensium,  
An Scorpio Theoph. Clusio & Anguillara?




\* Hanc superioribus mensibus ad me misit Franciscus van Zynich Bruxellensis pharmacopœus vni-  
uersæ materiæ medicæ, vt si quis alius, gnarus, ex Hispania delatam opera D. Ambrosij Boone Consi-  
liarij Regij, quæ quia exactissimè à Clusio descripta, eius descriptionem sequemur: Vix palmari altitudi-  
ne aëurgit, admodum fruticosa, foliis Chamelææ proximis, duris & carnosis, per ambitum aliquan-  
tulum sinuosis & crispis, rigidiusculisque, vno ex altero è medio folij neruo prodeunte, quemadmo-  
dum in Chamægenista, quam nonnulli Sagittalem vocant, interdum verò binis ternisque simul exo-  
rientibus: hic verò neruus paulatim intumescit, & in ramulum conuertitur, quandoquidem tota plan-  
ta foliosa sit: in extremis istis foliis, quini, senive aut plures flores simul iuncti ex villosis caliculis nas-  
cuntur Genistellæ similes, sed minores aureo planè colore, sed quorum bina inferiora folia incana lanu-  
gine pubescunt. Floret Martio incultis locis Valentini regni.



*SPARTVM aphyllon fruticosum iunceis aculeis,  
lanatis capitulis. Aduers. pag. 409.  
Valentinus Hisp. Erizo .i. ermacum. \**

*GENISTELLA aculeata. Aduers. pag. 409.  
Forè Vlex Plin. Germ. Stehende Ginst.*



Est idem cum hac *ERINACEA* Clusij, cuius flores ex cæruleo purpurantes non videramus, nullâve foliola, quæ raro producit, scitè à Clusio animaduersa, & descripta.


*GENISTASPARTIUM spinosum alterum.*



Menses & ventris fluores sistit, Fuch. s. auctore: & ad eadem valet quæ Hippuris.

*GENISTASPARTIUM spinosum alterum.  
SCORPIVS secundus Clusij.*

Debetur & hæc Nepa Carolo Clusio, qui eam primus ab altero Spartio spinoso distinxit. P. d. m. proceritate vix æquat, aut superat. Spinæ horridæ ex aduerso binæ quadam serie exeunt, colore pallidiores quàm alterius vulgata: flores summis ramulis lutei & semina erui, magnitudine, incana, lanugine hirta latitant sub spinis. Radix totâque facies cæteroquin non ab similibus superiori. Collibus Granatæ vicinis itinere Cordubensi solummodo euulsi Clusius.




*Spina*

*Spina ACATIAE* Diosc. *Aduers.* pag. 409.  
*Acanthus* Theoph. Anguil.

*ACATIA altera* Dioscoridis.  
*Aduers.* pag. 410.

Siliqua Lu-  
 pini effigie.



**DIOSCOR.** *Acatia* in Aegypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attollens, florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, sub-  
 rufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis & semine  
 succum. Manat & gummi ex ea spina. vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis  
 utilis. valet ad ignem sacrum, ulcera quae serpunt, permiones, pterygia, & oris ulcera. procidentes oculos reprimi. men-  
 sum abundantiam sistit. prociduum vuluam cohibet. citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus. capillos deni-  
 grat. lavatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. & ita cogitur  
 in pillos. vritur etiam in cruda fidelia, donec facile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu persiata.  
 Spina decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spina gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur,  
 & viri modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum. sordidum verò ac resinosum, inutile. Cutis meatu ob-  
 struit. & medicamentorum quibus admiscetur, acrimoniam hebetat. ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur  
 erumpere.

**Gal.** *Acatia* & planta ipsa acerbæ est, & fructus & succus, qui lotus quidem & imbecillior & minus  
 mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lauatione deponens. Porro si parti alicui sanæ illina-  
 tur, protinus eam & sicciorē & contractam efficiet, nullum quidem caloris sensum inuehens: sed  
 nec frigoris admodum valentem. unde constat medicamentum id esse frigidum & terrosum, immista  
 quadam etiam essentia aquea. Et sanè coniectura est, non esse simile, verum quoddam in sese disper-  
 sas habere partes tenues & calidas, quæ in ipsa ablutione segregentur. Estoque & hoc tertij ordinis  
 • illotū verò. exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, \* absque eo verò primi.

*ACATIA altera* Diosc.

Succus eius adstringit, vitibus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

FRAXINELLA



FRAXINELLA Cordi & officinarum, an sit Tragium Diosc. ? Aduers pag. 410.  
Tragium Guilandini qui non μικρότερα, sed μακρότερα legendum probat, Plinium sequimus, qui  
illud Terebintho aequale facit.



Dioscor. Tragij semen, 'folia, lachrymaq; illitu' spicula è corpore eiciunt. omnia quoque corpori impacta <sup>2</sup> Eadè Gal. euocant. pcta stranguria medentur, caeculos <sup>1</sup> vesica frangunt. menses trahunt. Modus in sumptione est drachma vna. <sup>3</sup> Eadè Gal. fama est sylvestres capras sagittis confossas eius herbe pabulo spicula excutere.

<sup>1</sup> Gal. Tragij folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerentisque sunt facultatis. Est verò & tenuium partium, & facultate in principio tertij ordinis calida.

#### ARBORVM, Fruticum & Cremiorum observationes.

LENTISCVS Diosc. Aduers pag. 411.

Dioscor. Nota arbor est cui vis inest adstringendi semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognata in-  
sunt vires. Liqumamentum autem uia fieri solet : Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta refrig-  
gerataq; sunt, folia abiciuntur. aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote,  
valet aduersus sanguinis reuersiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. item contra eruptionem sanguinis è vultu, &  
eiusdem aut sedis procidentia. In totum acacia & hypocistidis vicem repraesentat. Idem facit succus è tritu folijs. Deco-  
ctum fori cuncta explet. & si acta ossa ferruminat. vulua fluxiones sistit. nomas arcer. vrinam pellit. motus dentium collu-  
tione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis effricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cum  
quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, qua lentiscina cognominatur, & ab aliquibus, massiche. Pota utilis est  
sanguinem reuocantibus, & iusi veteri. stomacho auxiliatur. sed rucium mouet. additur in dentifricia & illitiones faci-  
et, ad nitorem cuti conciliandum. palpebras oculis incommodas replicat. manducata halitus oris commendat. gingi-  
uas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur nitedula modo resplendescens, & candore Tyr-  
rhenica cera similis, adulta, retorrula, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris,  
resinaq; pinea nucis mistura.

Y y


Gal.

Gal. Frutex hic ex aquæa essentia leuiter calida, & terrena frigida nō pauca composuit est. Desiccatur igitur secundo ordine completo; aut tertio incipiente: in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo est medius & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus; germinibus ac foliis, præterea fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimās, similis hic ordinis est, moderatè adstringens. Itaque bibitur & per se & cum aliis medicamentis, quæ dysenterias & alui affectus sanant. Quin & ad sanguinis expulsiōnes, tum sedis vuluæque procidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nonnihil propè accedens.

LENTISCVS Diosc. Narbonensib. Restincla.  
Angl. Mastice tree. Germ. Masticebaum. Gal.  
Lentisc. Hisp. Mata. Ital. Lentisco.

TEREBINTHVS cum flore. Aduers. p. 412.  
Angl. Turpentine tree. Gal. Terebinte. Hisp.  
Cornicabra. Ital. Terebinto.\*

Lege semper  
cunctis.



\* Diosc. Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex adstringunt, & ad eadem ad qua lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur, excalfacit, vrinam mouet, venereum excitat. contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petraea describitur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aethiopia & Cycladibus insulis. Sed prævalet candida, perlucida, vitreo colore & in caruleum vergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resina omnis antecedit, proxima lentiscina, & è pinu, & abiete, has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. tussiac rabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. vitia pectoris expurgant. vrinam cient. cruda concoquunt. ventrem emolliunt. palpebras commodissime replicant. lepras tollunt, cum arugine ac sutorio atramento, nigroq. aribus saniem emanantibus cum melle & oleo: item in pruritu genitalium viles. malagmatis, acopifq. admissentur. laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Gal. Terebinthi tum cortex tum folia, tum fructus adstrictiorum quiddam obtinent. Sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaque quoddam desiccant manifestum est. Recentes quidem etiamnum humidique modicè; sicci verò ordine secundo. Cæterum fructus aridus propinquus est etiam tertio ordini desiccantium. Est enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque etiam vrinam prouocat, & lienibus prodest.




RHVS. Sumach officinarum. Aduers. pag. 412.

PISTACIA cum corniculis. Aduers. pag. 413.

Angl. pistachies, &amp; fistikes.

Ital. pistachi.



**Dioscor.** Rhus qua obsoniis aspergitur, corticosa tunica perquam vitilis est. Folia vim habent\* adstringendi, & acutius effectus praebeant. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infususq; adicitur. Instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liquefactum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut hycium conueniens. Semen eosdem effectus exhibet. Cœlix corii, dysentericorumq; obsoniis inspergitur. Fracta, desquamata, humidaq; illi: um ex aqua, ab inflammatione vindicat. Lingua asperitate: cum melle abstergit. Candida seminarum profluvia sistit. Hamori hordas sanat, cum querno carbone intrito adnotum. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi deseri, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

\* Idem Gal. Tertio ordine exsiccat, & secundo refrigerat.

Lege. **COCCIGRIA** Theop. Cotinus Plin. 413.

Quidam asserunt esse Fuffet Gallorum, quo inficiunt aureo colore.

#### PISTACIA.

**Diosc.** Stomacho amica sive. Trita cum vino contra serpentium ictus profunt, siue edantur siue bibantur.

Gal. Fructus eius quodammodo tenuioris essentiae est, subamarum quid & odoratum habens: obstructions itaque liberat, sed maxime iecoris, verumtamen etiam thoracis pulmonisque.

**GLANS** vnguentaria. Aduers. pag. 414.

**Diosc.** Drachma pondere pota lenem absorbit. cum lolij farina & aqua mulsa podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto virilignes, & nigras cicatrices cum nitro emendat; & cum lotio lentigines, varos, & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones (5.) Gal. monet. Aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur. Cortex eius magis adstringit: verum tusa & expressa succus abstergentibus medicamentis adicitur, quae aduersus pruriges & scabrities idonea sunt.

Eadem Gal.

**Mesve.** Oleum emollit: frigidis nervorum affectibus conuenit, duritias resoluit.

**Balaninum** Oleum.

**Diosc.** Reparat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras. aluum soluit. Stomacho aduersatur, contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe insillatum. Similis Sesamini ratio.

Yy 2

SYRINGA


*SYRINGA*  
*caerulea* Lu-  
*litanea.*



*SYRINGA caerulea* *Lusitanica.*  
*Aduersf. pag. 414.*  
*Lilac Matth.*

Flores racematim coherentes caerulei, suauissimum odorem fundentes: populnea fronde in ramulis Rhois modo fruticantibus.

*SYRINGA Italica.*



*STAPHYLO*  
*DENDRUM.*



Folia habet Betulae longiora, & flores Arantij vel Tiliae, albos odoratosque. Hortis Belgij hoc nomine hodie notissima.



*Σταφυλόδενδρον.* *STAPHYLODENDRUM* *Plin.*  
*Aduersf. pag. 414. Gal. Baguenaudes à patre-*  
*nostres. Ital. Pistachio saluatico.*

*Keractia*



*Keqaria Siliqua.* Aduers. pag. 414.  
Gal. & Provincialibus Carobe, à Chaldaeis sic etiam  
dicta. Angl. Silitch tree. Ital. Silique, & Carobe.  
Hisp. Algarrouas. Germ. S. Thons bot.

*Cassia purgatrix.* Aduers. pag. 414. 415.  
Officinis, Gal. Germ. Belg. Ital. & Anglus, Cassia.  
Item Hisp. Caña fistola.\*



\*Tutissimum medicamentum qualibet die, hora, ætate, sexu, etiamque prægnantibus nulla molestia  
aut incommodo, flauam bilem, pituitam, hepatis, renum, & quoslibet viscerum feruores, educens.

MESVE. Cassia fistula calido frigido temperata, nisi quod paulò est calidior, humida primo gra-  
du, clementer & innoxie à ventriculo bilem & pituitam purgat leniendo, febribus inde ortis confert,  
sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac eius sanguinis, & bilis flauæ acrimoniam frangit, resoluit  
thoracis & pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas, easque partes lenit ipsa mortuus expers, si dat,  
præsertim sumpta cum succo intybi, vel cichorij, vel solani arte depurato. Intemperiem deniq; renum  
calidam mitigat, cum diureticis sumpta, & glycyrrhizæ decocto, ob idque calculum in his gigni pro-  
hibet. Deligenda est fistulâ insigni, plenâ, ob id graui, splendente foris ac etiam in pulpa pingui, quæ  
recens sumenda est potius, quam vasis seruata: si autem viscera sunt sicciora, cassiæ lubricitas augenda  
est oleo amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sunt, minuenda myrobalanis vel rhabarbaro, vel  
aqua cum mastiche cocta, vel spicâ additâ: si ad vias vrinarias ferri eam volumus, vretica misceantur.  
Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale thymum, hyssopum) actionem eius  
intendens misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: efficaciusque purgat  
hæc, si ex sero lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, vt omni ætati, &  
ipsis etiam pueris & prægnantibus tuto sumatur.

MOLLE Clusij.

GELSEMINVM vulgatum. Aduers. pag. 415.



Molle, quale exercitatissimæ cognitionis descripsit peritissimus Clusius, hic subdere visum fuit, instituti nostri, & ordinis consecutione: vt cuius semen & herba ab illustrissimo viro D. de Brancion mihi communicata fuerint.

Molle.

CLVS. Cæterum odor fœniculi mihi in memoriam reuocat arborem in Peru nascentem, Molle vocat, cuius ego pusillas duas plantas, è semine natas, vidi ante aliquot annos Mechliniæ in horto splendidissimo illustris viri Dn. Ioannis de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis iniuria.

Molle historia.

Erant autem eæ arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folia pennata vt fraxini, sed multo minora, ex viridi nigricantia, serrata, & sub extremum angustiora, quæ ab arbusculis reuulsa lacteo succo, eoque lento & viscido, & odorato manabant, & ipsa folia trita fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis nonnihil habere videbatur. Fructus ex quo nate sunt, pipetis ferè magnitudine, oleaginosus, pellicula rubescènte tectus, racematim coherens, vt ex eius iconè, quam ad viuum depingi tum temporis curapimus, conspiciere licet: florem quem habeat ignoramus, sed quibusdam auctoribus, minutus est, viti similis.

Natales.

Hæc arbor abundanter nascitur in conuallibus & locis planis Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt: sed Petrus Ciega maximè, qui eius descriptionem hoc modo cap. 112. primæ partis Chronici dat.

Molle historia alia.

Toto hoc tractu conspiciuntur magnæ quædã, & etiam parvæ arbores, quas Molles appellant incolæ: folia habent minuta, odore fœniculi, cortice ad eò commendato, vt eius decocto crurum dolores & inflammationes summa cum vtilitate foueantur: ex ramulis sunt dentiscalpia vtilissima. Ex huius fructu cum aqua decocto, pro cocturæ modo, fit aut vinum, siue portio admodum bona, aut acetum, aut mel: tantoque in precio apud Indos sunt hæc arbores, vt quibusdam locis eas consecratas suis Idolis habeant. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa ortis auxilio esse, gummi verò eius, quod Mannæ modo candidum est, lacte dissolutum, caliginem oculorum abstergere.

Molle vinum.

Facultates.



CHAMÆEISEMINUM *granuliflorum peramicum*.

Humilis Gelsemini quandam etiam speciem elapsa ætate Bruxellis, quam alebat studiosè in vrceis pensilibus C. V. D. Ioannes de Boisor, vidisse memini, furculosis ramulis pede, vix cubito vel sesquicubito longioribus: foliis lasini vulgaris, minoribus, nigrioribus & rotundioribus. flos aspectu suavisissimus, itidem non absimilis, sed quadruplò maior, patulus, Thalerum æquans, candidus a uerfa parte suauè rubens.

BALSAMVM Diofc. Aduers. pag. 415.

DIOSCOR. Arbor \* *Cytisi*, (non *Alba viola*) *Lycij*, siue *Pyxantha*, (non *pyracantha*) magnitudine conficitur. Folium Rutæ proximum, longè candidius, perpetuo virens. In Iudæa solium quadam valle & Aegypto nascens. Huius differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, *theristum* vocant, quasi de mensile: fortassis quoniam ob gracilitatem faciliè demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardoril us, arbor vnguitur ferreè inciditur, manatq; e plaga succus, quem opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidem quàm seni septemve congij cogantur: imbiq; pondus duplo rependitur argento. Succu prolatio est, vt si recens, validi odorù, syncerus non ad arorem vergens, dilui facili, lenis, astringens, ac modicè mortens gustu. Sed variè vitiatu, nisi ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item fusino, mectopio, melle, aut Cypria cera liquida, quod maleficium faciliè deprehenditur. Namque merus in laneam vestem susus, neque maculam facit, neque si eluatur, notam relinquit: vitiatu autem inhaeret. & lac instillatu coagulat, quod adulteratu non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatu verò olei modo innatat, se conuolvens, aut in sella modum dissundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretam pessumue, & ad inasidere arbitrantur, postea dissipatu supernatare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant, probatur recens, sarmato tenui, fuluunt, odoratu, quadam tenuis opobalsamum ipirans. Necessarius etiam semini erumpit vsus, quare eligatur fluxum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum \* olens. Adulteratur † semine hyperici simili, quod à Petra oppido defertur: sed coarguitur magnitudine, inanitate, virum ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quammaximè calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pupillis effundunt. inceditur perfractionibus vultu cum rosaceo cerato appositu, menses quoque, secundus, & partus extrahit. horres illius discutiit, vlcera fordidà expungat, & cruda concoquit. vrinam potu citò, agere spirantibus prodest, datur in lacte contra acutissimū huiusmodi, aut serpentis ictus, misceatur acoris, maluginatis & antidotis. In summa, præcipuus auctoris succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulm: cū viri, tussi, ischiadici, cecitidis, vti iuginosi, orthopneici, vrinæ difficultati, torminibus, ac venenosarum bestiarum morsibus. ad muliebres suffitus perquam vtile est, vultum aperit in deflectionibus balnearum decoctum, & † humorem euocat. Lignum eisdem habet vires, alioquin o minores, ex aqua potum crudicibus, torminosi, vultu, venenatorum ictibus optulatur. vrinam citò ad capitis vultu cum sicca iri conuenit, squammas ostium extrahit, & ad vnguentorum sissimèrta additur.

*Cytisi*, \* *pyxantha*. In Auicena legitur visci pro *Lycij*, vt forsitan apud Plin. pro *vire* legendum *lycij*, vbi ait Viti similior quàm Myrtho, perpetuo folio eoq; candicante. Theoph. Folio Rutæ perpetuo virens. Addit Plin. lib. 12. cap. 25. Folium proximum Rutæ perpetua coma. Pausanias Samplicio comparauit, \* non videtur legendum *Leucoy*, sed *Cytisi* cum Strabone. Terebintho Theoph. comparauit. Plin. Hyperico; vbi potius legendum *Petrao Terebintho*; quia Terebinthi resina ex Asia Petra defertur tradit Diofc. provenire etiam in Syria, Iudæa & Cypro.

\* *Opobalsamum olens*.] Luxata est Theoph. lectio, qui fructum magis, pro minus redolere ait.

† *Adulteratur semine Hyperici simili quod à Petra oppido defertur; sed coarguitur magnitudine, inanitate, virum ignauia, sapore Piperis.*] Quidam correctius legunt: Defertur ex Petra, quo adulteratur fructus, semen Terebintho simile, quod dignoscitur magnitudine, inanitate, virum ignauia, non sapore piperis. Quæ omnia vulgato inodoro, viero & exoloto officinarum Carpobalsamo conspiciuntur. Cū *perisicav. i.* piperis sapore dicit, pugnare videtur cū viribus ignauo & adulterato, cum legitimo autem Carpobalsamo quadrate; quod mordens gustu, feruens in ore. In pipere autem non aliud quàm actis & feruens reperitur sapor.

Dicat quispiam cauillator Balsamum calidum & siccum excessu 2°. Galeno; quomodo igitur gustu, feruens & mordens erit? Dioscorides credidit Balsamum præsentissimas ad exalfaciendum habere facultates, deceptus partium tenuitate; quod euidenter Galenus his verbis testatur: Balsamum calidum & siccum excessu secundo. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit; sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quàm ipsa planta, non tamen adeò calidus vt quidam existimant, tenuitate partium falli. Porro fructus eius persimilis genere facultatis est; cæterum longè in subtilitate partium inferior.

In Nicotiana diximus, quæ calefaciunt vel refrigerant cum tenuitate partium, citius & potentius agere; vt Acetum, & alumen scissile, efficacius & citissimè constringunt, ob summam partium tenuitatē. Caphura nonnullis inferiur; vt medicamenti vis integra in abditissima sua tenuitate citius permeet & perueniat: quæ alioqui longa mora à natura alteraretur & immutaretur.

*Abstergit quæ tenebras.*] Præter illam calfaciendi vim qua pollet, absterget quæ pupillas oculorum obumbrant: quod amarore quodam præstat, & partium tenuitate, qua internam corneæ partem penetrat, non secus ac fella potiusque discutiit quàm deterget. Verum quia vlcera etiam expurgare docet Diofc. dicemus in succo amarorem quandam inesse, quo extergit.

Medetur

\* Ad materie  
excoctione,  
excoctio  
nem & inci-  
tionem.  
† a. i. super-  
fluitatem.

*Medetur perfrictionibus vulvae.* ] Quia calidum est, tenuium partium & odoratum, quo gaudet vterus.  
*Cum cerato Rosato.* ] Rationi alienum videtur, quia tenuitati partium aduersatur. Ariamen Dioscoridis Rosaceum paratur cum Schanantho. Serapio cum cera & oleo imponebat. Fortè Dioscorides Rosaceo voluit excipi, quia aestimabat efficacissimum & calidissimum medicamentum. Hinc colligere licebit, oleis stillatiis Chymistarum, & cementis Balsami liquoribus, non nisi aliis probè conmixtis & temperatis vtendum esse, quia pleraque sæpe feruore & partium tenuitate lædunt.

*Horrores illitum discuit.* ] Sæpè horror pro rigore, & contrà rigor pro horrore supponuntur, quæ secundum magis & minus differunt. Rigor fit cum maiore concussione in biliosis febribus; horror cum maiore refrigeratione in quartanis cõpositis vel *hæmipetibus*, id est, tertianis febribus imperfectis ad quotidianam accedentibus. Frigus in quotidiana. Horrores, rigores & frigora, non secus ac alia calidiora olea, Rutaceum, Anethinum, Abrotani, succus Saluie, oleum Castorei, de Euphorbio, è piperibus, & similia, spina dorsi illita soluit.

*Cruda concoquit.* ] Humores vlcera vel abscessuum crudos concoquit.

*Aegrè spirantibus prodest.* ] Crassa & cruda incidendo, & facta referando; concoquendo & discutiendo, respirationem facilem reddit.

*Datur in Lacte.* ] Quia aduersus venena pollet, miscetur antidotis: Lac veneni acrimoniam inhibet, & balsamum mitius efficit.

*Lignum easdem habet.* ] Quia minus succi; plus crassarum partium: Igitur facultates adstringentes terrea substantiæ obtinebit.

*Vulnera capitis.* ] Quia potentius siccatur, vulneribus capitis medetur, quæ summa siccitate egent.

*SORBUS domestica.* Aduers. pag. 416.

Ostia fortè Theophr. Germ. Spierling, & Spierbaum.

Gal. Cormier, & Sorbier. Hisp. Seruas. Lusitan.

Sorba. Ital. Sorbole, & Sorba.

*SORBUS syl. Alpina.* Aduers. pag. 416.

Fraxinus bubula Dod.

Gal. Cormier lauage.



*Dioscor.* Sorba colorem luteum referentia priusquam mature scant, dissecta & in sole siccata manduntur, ut alium fiant\*. Eadem est functio molitorum farina, si polenta loco sumatur, quod & decoctum eorum in potu præstat.

\* Gal. Adstringentem obrinet qualitatem, sed multò imbecilliolem quàm Mespilus: proinde sanè etiam elui iucunda est, minus què quàm Mespilus ventrem constringens.

FRAXINVS



FRAXINVS. *Advers.* pag. 416.  
 Angl. Aiche tre. Germ. \*Walbaum, Eichenbaum.  
 Belg. Eichen. Gal. Frefne. Hiff. Fralno, Ital. Frailino.

Nvx iuglans. *Advers.* pag. 416. Angl. Walnut tre.  
 Germ. Nufs, & Weifshnußbaum. Belg. Roeter,  
 & ockernooten boom, oft Kortelare. Gal. Noix,  
 ou Noyer. Hiff. Noëles. Ital. Noci.



DIOSCOR. Foliorum succus & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum icibus auxiliatur. Corticis cinis ex aqua illius lepras eximit. Ligniramenta scabemq; potu pernitiem aff. vro ir. idunt.

Spleniticos, nephriticos, & lue Gallica affectos scio curatos. quâ igitur sint ramenta venenum; siquidem ipsa aduersatur venenis: an quia corpori non venenato imprimit illam qualitatem, quam in venenum exertura fuit? Siquidem Cantharidibus hæc perquam grata est; in ea namque nascuntur, vitâit, & moriuntur. Id verò vti de Iunipero dictum fuit; ramorum asperitate posse interimere quosdâ, qui noxam non sentiunt ex decocto. Corticis radices cinis nodulo exceptus cauterij potentialis supplet vicem madefactus & impositus: indeq; foraminulum contractum referatum, immisso hederæ folio, fouetur Corticis, seminis & foliorum decoctum surditati suffitu medetur, occulta proprietate.

Sal Fraxini sudores mouet vretici mixtus: medicamentis autem purgantibus serosa euacuat: stimulosque agit.

## NVX IUGLANS.

DIOSC. Concocta difficiles sunt; stomacho inuitiles, biliosa capitis dolorem<sup>1</sup> inferentes, triscentibus inimica, & vomituris ieiunis in cibo apta. Cum ruta verò & ficis præsumpta, & à summo cibo, venenis<sup>2</sup> resistunt. nec minus si à veneni haustu comedantur. Largius esicata tinea sitas pellunt. Illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatiisq; cum mellis exiguo & \* Ruta Cum cepa autem, sale & melle, canis, hominisq; morsui proficiunt. Tormina cum calyce suo perusta, & vmbilico adnota, sedant. Putamen combustum, tritumq; in oleo & vino, infantium capite peruncto, nutrit<sup>3</sup> capillum: alopecias replet. Sistunt menses nucleis vsti, si triti ex vino admoneantur. Idem è veteribus, illius carbunculus, gangrenis, & agilopis medentur. Alopecius commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, vepotè suauiores. Itaque alio mixta eximunt acrimoniâ. Lúores in corpore illitu tollunt. Fit etiam è nucè iuglande oleum, quod caryinum vocant. Eandem vini habet quam balaninum.

1. 2. rad. Pli.

3. Plin. idem.

venena he-

betant.

4. Ph. cadem.

5. cadem Pli.

6. cadem Pli.

\* Plin. Anginam cum Ruta & oleo autium inflammationi imponuntur cum mellis exiguo.

Gal. Arbor tum in foliis, tum in germinibus adstrictionem quandam possidet, cæterum euidentem multamque in nucis putamine<sup>4</sup> recenti pariter & sicco: proinde eo fullones quoque vti solent. At nos eius expressi succo, similiter vt mororum & ruborum, in melle decocto, vice stomachici medicaminis

Z z

videtur.

vitumur. Et ad omnia reliqua adhibemus ad quæ dicti succi convenire censentur. Porro ipsius id quod edendo est oleosum est, & tenue: itaque etiam facile exprimitur: & quo diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè admodum sit per halitum evaporatorium. Itaque quidam eo gangrenas, & carbunculos & ægilopas sanant, ac nonnulli ad neurotrota, hoc est, nervorum vulnera vituntur. Cæterum si recens sit, adstringentis nonnihil qualitatis obtinet. At quod imperfectum est etiamdum, ac nondum siccum, velut reliqui fructus omnes qui virides sunt, plenum est semicocta humiditatis. Nucleus tamen eius ubi inaruit, tenuium partium & exsiccatiorum est medicamentum, morsus expers.

† Plin. Valeria. Potest & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum gastro sumpta mollire. Subdit Plin. Item sagillatis cortex iuglandium lichenum vitio & dysentericis prodest: folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuarii Michridatis maximi regis denique C. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis torridem, & rutæ foliis viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati illitique, præsentem remedium esse dicuntur.

Sethus addit: Concoquuntur faciliè nuges in frigidis ventriculis, in calidis verò in bilem magis mutantur. ante alios cibos sumpta vomitum adiuuant. Ad satietatem comestas lumbricos educere icimus.

*ZIZYPHA candida* Monspellensium, quæ perperam  
Venerorum & litorum Sycomorus.  
Lusit. Arbol paradyso.  
*AZEDARAETH* Auicenna.

*VACCINIA nigra & rubra.* Ideâ Vitis Theoph.  
Dalscampio, Clusio & herbaris peritioribus.  
Myrtillus officinarum Germanicarum & Myrtus môtana.  
Vua Vrsi Angul. Aduers. pag. 417. Gal. Autelle, &  
Airelle. Ital. Vua orla, & vigna dell'orlo.



Florem Azedaraeth calidum in tertio, siccum in fine primi, Auicenna loco supra memorato scribit, & cerebri obstructions aperire asserit: stillatitium verò eius liquorem pediculos interficere, & comæ alere, si eo vino permisto caput abluatur. Fructum autem pectori noxium & valde perniciosum esse.

Gemma



*Genuina Vva Vrsi Galeni apud Clusium.*

Genuina Vva Vrsi Galeni apud Clusium eadem videtur cum Alpigena Chamærhododendro exhibito Observationum nostrarum pa. 199. & Advers. 145. cuius flores Arbuti similes, sed ex candido purpurei aut candidi conspiciuntur.

*PALYSTRIA Vaccinia Aduers. pag. 417.*

*Oxycocon Cordi. Poterion Dalese.*

Rhus fl. Plin. Dilso. Acinaria palustris Gesneri. Helmetus fr. ostibere i. acin. palustres muscosis locis oriundi. Barani, Deen, oft Hoerbelle. apud quos luxuriant secus Vltimateum. flosculus albus.



deme Hanc  
cur cōmēta-  
tor, &c. ad cal-  
cem capitis af-  
que.

*GAGEL Germanorum. Aduers. pag. 417.*

*Eleagnos Cordi.*

CISTVS Mas cum Hypocistide. *Advers. pag. 418.*  
*Hisp. Eilepa. Lusitan. Cer. azos. Ital. Cisto.*  
*Cistus maritimus Clusij.*

CISTVS Mas angustifolius.  
*Secundus Clusij.*



Lege quidam-  
 tenui sola a  
 & paulo post  
 Omni. usque in  
 in.

**Diosc.** Vis astringens, unde flores in vino austero bis die poti, profunt dysentericis. Et nomas per se illi colli-  
 bent. Vetus. uti viderum & igitur ambustus cum cerato medentur.  
**Gal.** Folia & parua getmina ruti adeo deficcunt adstringuntque, ut vlcera glutinare valeant. At flo-  
 res magis sunt efflorescentes, adeo ut cum vino poti dysentericis, ventris imbecillitates, fluxusque ac humi-  
 ditates sanent. Cataplasmatibus ita illita vlcera putredinosa iuvant. Est enim facultas eorum non in-  
 strenue deficcant, scilicetque secundi excessus a temperatis absoluti. Adeo vero frutex hic frigidus est, ut  
 tepidi caloris sit particeps.

#### HYPOCISTIS Diosc.

**Diosc.** Vires Acacie habet, vident alijs purito magis fieri & astringit. Prodest dysentericis, celiacis, sanguinem  
 ex reantibus, seu nimiam profusio, & pora & vultu.

**Gal.** Prodest Hypocistis, quam vocant, multo est magis adstringentia quam folia; admodum efficax re-  
 medium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectiones, profusio, mellebria, celiacos, dys-  
 entericosque affectus. Quin si quam partem roborare consuevit sit, quae videlicet plusculo humore  
 exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non instrenue addit. Sic sane stomachicis, epithematis, hepaticis  
 cistij; commiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

#### CISTIS differentia quamplurima adscribuntur.

Non modò viribus, & natura multiplices sortitur varietates; sed etiam si rum colore, odore, & po-  
 tiori nunc magnitudine, dissimilique effigie longè plures Cisti & Ledi differentias conlequuta est po-  
 sterior. Quod unum enim solis latioribus, angustioribus, Populi, Salicis, Conyze, Perulace, L. auc. dule,  
 Sani-fuci, Thymi vtriusque, Rosmarini coronatij. Proueniunt ferè omnes spontè in Galloprovincia,  
 Narbonensi Gallia & Hispania. Flos aut purpurea ruber, can licet, aut laeuer. Omnes huius seminis pusil-  
 lum rufescens in triquetris pericarpis. In Belgio plures viginu & quinque differentias memini apud  
 C. V. D. Ioannem de Boisor, Petrum Coudenbergium & Ioannem Mutonum Hispano & Narbonen-  
 si semine ortas.



*Cistus mas angustifolius.*

*Cistus mas secundus* Clusij, congener cum priore, folio longiore & angustiore & viridiore duntaxat diuersus.

*Cistus mas tertius* Clusij.

Huius duas insuper differentias literis prodidit Clusius, quorum prior aequè fruticosus est; exiliioribus tamen virgultis; foliis item breuioribus dilutè viridantibus, densioribus magis rugefactis, & odoratis, quia sola nota à reliquis Cisti generibus se prodit. Supra Vlyssiponem oritur itinere Conimbricensi, atque etiam in maritimis, vti idem Clusius auctor est.

*Cistus mas quartus* Clusij.

Alter densè fruticans, nonnihil incanus; assurgit in altitudinem humanam, foliis rotundè circinatis, maioribus, rugosis & hirtis, floribus cum cæteris simillimis, saturè rubentibus & maioribus; capitula maiora hirsuta, dura, & semen maius quàm reliquorum. quod optimè creuit Iohanni Muto nobis Hispania missum.

*CISTVS mas supinus, sinuatus & fimbriatus foliis.**Cistus mas quintus* Clusij.\**CISTVS semina. Aduers. pag. 418.*


## Hisp. Xara-estepa.



\* Concinnè huc quadrat alter qui minùs cognitus, & rarior mulcò, vni soli Carolo Clusio huius historiæ scriptori clarissimo memoratus; qui arenoso admodum Lusitaniae solo, præsertim apud riuastrium Peralonga dictum, quinto supra Vlyssiponem miliariterurum, & ibidem loci semen N. Genubri lectum, in Belgium asportauit, amicisq; communicauit. E lignosa radice pedales aut sesquipedales confertim ramulos supinos vel humi fulos spargit, quos ambiunt folia crispata, quod in modo ambriata & sinuosa, incana, gustanti austera. Summis cauliculis flores aequali ferè situ umbellæ ritè quadamtenus innascuntur, hilari purpura micantes, superioribus paulo minores, quemadmodum & tamen in capitulis minus & nigrius.

CISTVS fœmina folio Portulacæ marina, fœ Cribbii.  
Cistus primus folio Portulacæ marina  
aut Halimi Clusij.

CISTVS folio Halimi secundus Clusij.



Cum D. Clusius Cisti fœminæ differentias exactissimè describeret, operæpretium duximus eius verba hic repetere, eiusque icones exhibere.

Cisti fœmi-  
næ 2. classis.

Clusius historiarum rariorum stirpium lib. 1. pag. 143. sic ait: Aliquot alia Cisti genera per Hispanias & Lusitaniam observavi, quæ ad fœminam veluti ad primum genus meo iudicio referenda videntur potius, quàm ad marem, aut Ledon: quandoquidem nullo pinguiore sint prædita, neque florem roseum siue purpureum habeant. Nisi fortè quis eam speciem, quæ Thymi foliis est, inter Ledii genera recensere malit.

Cistus folio  
Halimi 1.

Cistus folio Halimi prior (sic enim appellandus videtur propter foliorum similitudinem) cubiales, aut ampliores profert ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia Portulacæ marinae similia, sed omnino incana ut Halimi, mucrone obtusiore, subacido & adstringente gustu: summi rami multos præferunt flores quinque foliis constantes, colore luteo cum suis in medio fibris, minores quàm in superioriis, ei Cisti generi quod nonnulli Helyanthemon vocant similes: semen deinde in capitulis oblongiusculis & triangulis exiguum, & subrufum.

Hypocistis  
luica.

Ad hucus radices Hypocistin nascentem observavi luteam omnino, siue ochræ colore, plantæ ipsius florem & flore referentem, quam pueri & pastores mandunt.

Cistus folio  
Halimi 2.

Cistus folio Halimi alter, procerior est priore, ramis firmioribus, incanis ut prior: folia superiore paulò longiora, angustiora, & magis mucronata, dorso elatiore, incana tamen tota & sicca, gustu etià subacido & adstringente. Istius neque florem, neque semen vidi.

Merque frequens est in Lusitania solo arenoso, & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Vlyssipponæ, nusquam alibi mihi conspectus.

Reliquorum verò Cistorum Clusij descriptiones ab operis omissas pete infra Observat. pag. 585.

CISTVS





Cistrus fo-  
lio Samplici  
Clusi, vide-  
tur eadē qua  
Helianthos  
Alrobrugu &  
Gallia Del-  
phinensis flo-  
re albo.



Cistrus hu-  
milis angu-  
stifolius.

*CISTVS humilis primus Clusij.*

*Hilantibus nostra, descripta Aduers pag. 185. & Observationum 238.*

*CISTVS humilis angustifolius, Choris MonsPELLIENSIS foliis, Selzgo MonsPEL.*  
*Cistus 5°. Affatij. & Erica Chrysanthemis minima nostra. Aduers. pag. 447.*

*Cistus humilis 2°. Clusij.*

*CISTVS humilis annuus, folio Salicis humilis.*  
*Cistus annuus primus Clusij.*

*CISTVS annuus folio Ledi.\**



\*Narbonensis Ledi annui rara species, via quæ ducit MonsPELLIO ad præceptoris RONDELLEIJ prædiũ vulgo Terral, inter Sferrocuallo & Cristas Gallinaceas herbulas fruticæ; foliis Ledi angustifolij, hirtis; iuxta summum pedalem & sesquipedalem caulem; semen exile, angulosum rubrum pulchellum in pericarpio nitido triquetro Selaginis Pliniane dictæ, laeuore glandis Ilicis & magnitudine ferè pari. Flos luteus. Hanc plantam Francisco Pennino doctissimo pharmacopœo Antuerpiano acceptam refero, vt qui primus natales signarit, & monuerit.

*De CISTI LEDI differentiis, Aduers. pag. 418.*

*Diosc. Foliorum vis astringens, ac eosdem quos Cistus, effectus præbens.*

*De Cisti Ledi differentiis, quæ nõ minus quoque variæ sunt, Clusij nostri historia oblectamur; eiusque iudicium & descriptionem, (non possunt enim exactius describi) sequemur. Illi igitur gratias nobiscum agant herbarum studio.*



## CISTUS LEDON Primus.



**CLVS.** Primus fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris: folia, ut rami, ex aduerso sita, oblonga, transversum digitum quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, superne nigra, inferne candicantia, quæ cum tenellis ramulis pingui quodam, odorato, calidoque & transparente liquore adeo copioso aspersa sunt, ut procul etiam conspici possit, & octava miliaris parte odor naribus percipi: flore est inter reliqua Cisti genera & pulcherrimo & amplissimo, magnæ Rotæ amplitudine, simplici quinque foliorum textura, omnino interdum candido: sed cuius maxima ex parte folia singula circa unguem purpurea nigricante macula rhomboide nunc maiore & latiore, nunc minore & angustiore insignita sunt: floris umbilicus multis croceis fibris plenus, ut reliquorum Cisti generum: capitula in longis pediculis, foliisque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana non mucronata, & sæpe numero decagona, dura, intus flavescentia, quibus dehiscensibus semine decidit copiosum, subrotundum, omnium minutissimum.

Tota planta exsiccata nonnihil candicat, sed lentorem & odorem suavem retinet ad multos etiam annos.

Crescit hoc genus multis Hispaniæ & Lusitanæ locis frequentissimè, ita ut pistonibus ad calcificandas fornaces, & tenuioris fortunæ hominibus struendo igni seruiar. Nusquam tamen magis copiosè, quam in collibus, eorumque de-

cliuibus inter Tagum & Anam flumina, & toto ferè monte Sierra morena nuncupato, ut mihi aliquando contigerit ad viginti ferè miliaria per huiusmodi frutices iter facere.

2. Superata Calpe, littore marino, quæ Malacam iter est, latiore nascitur folio, quasi ad Lauri angustifoliæ formam & amplitudinem accedente; non minus tamen pingui lentoque illo humore abundat, quam id quod angustiore est folio.

Hispani utrumque *xara*, Lusitani prius *eslepa* appellant.

1 Alterum genus, ubi spontè nascitur, non tam altè fruticat, sed bicubitalibus duntaxat assurgit stolonibus, ramosis; fragilibus ramis: folijs omnium inter Cisti genera, quæ observavi, maximis, virentibus superne, nonnihil candicantibus inferne, Hederæ foliorum formam interdum, & Populi nigre plerunque æmulantibus, satis carnosus & rudibus, hyeme nonnihil rubentibus, gustu subacido & adstringente: flos Cisti feminæ, cum forma tum magnitudine, candidus: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta.

Tenellæ plantæ neque pingues, neque odoratæ sunt, sed annotinæ duntaxat, & vetustiores, autumno præsertim, quo tempore omnes Cisti qui pingues sunt, abundantiore succo, crassiore saltem & magis tenaci prægnantes esse videntur.

2. Huius generis alia species inuenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitū excedens, cuius folia etiam minora sunt: alioqui neque facie, neque flore, neq; semine, neque sapore dissimilis.

Vtrumque nascitur in Mariano monte ( vulgo Sierra morena ) qui superandus est iis qui Vlyssipone Hispalim faciunt iter. Inuenitur etiam collibus quibusdam Granatæ vicinis.

Primam speciem incolæ *xara-xarguna*, & *xaron* vocant: Granatenses *xara-estepe*, eodem quo Castellani nomine Cistum feminam appellant. Altera species incolis *xaguarga* dicitur.

Tertium in Hispaniis vidisse non memini, sed semine ex Italia misso Ledi Cyprij nomine, nobis & plerisque aliis rei herbariæ in Belgio studiosis natum est, cubitali, interdum ampliore altitudine, fruticosum, ramis nigricantibus, foliis carnosiss, nigricantibus præ virore, mediæ inter primi & secundi generis folia magnitudinis, brevioribus tamen quàm vtriusque, & rhomboide quodammodo figura, quæ cum nouellis ramis lento & roscido humore obsita sunt, non aded tamen copioso & denso, neque etiam aded odorato, vt in primo genere: flos albus, secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in capitulis rotundis.

LEDON II.

CISTVS Ledon populnea fronde, alterum cultu forte duntaxat diuersum.\*



\* Generoso D. Ioanni Boissorto hoc Ledi genus viret in amænissimo & diuissimo viroto, odore grato Ledi Gallici, folio latiore quàm superioris. Flos nõ abssimilis, sed fruticat ad hominis, imo sæpe superat proceritatem.

LEDON.



## LEDON IIII.

Hisp. Ardiueja.

## LEDON V.



Quartum genus multis ramis fruticat, cubito longioribus lentis & flexibilibus; hirsutis, albicantibus: folia reliquis Ledi generibus molliora, ad Cisti feminae folia accedentia, verum angustiora, hirsuta, nigriora, & pinguedine lenta cōspersa non modò verno tempore, sed etiam per totam aetatem: flos candidus est, Cisti feminae flore non minor, nec absimilis: capitula exigua membraneis quibusdam & laxis involucribus tecta, semen continent omnium maximum, nigrum.

Nusquam hoc genus quàm in Castella vixit observavi, vicinis pago S. Martini del Castañal locis, ubi ab incolis *ardieveja* nuncupatur, adeò frequens, ut vulgare sit istuc proverbiū,

*Qui en al monte va, y mas no puede,*

*Al menos ardiueja cogé,* hoc est, Quicumq; montē accedit, potius quàm inanis redeat, Ardiueja colligat.

Apud nos satum feliciter provenit.

Quintum eodem quo proximè descriptum affurgit modo, verum ramis duris, lignosis, nigricantibus: foliis longis oleæ, angustioribus, nigricantibus, pinguibus, & cum novellis ramulis lento humore conspersis: flos albus omnium ferè minimus: capitula oblongiuscula, angulosa, in quibus semen ex rufo nigricans, exiguum.

Ad huius radices genus illud Limodori siue Orobanthes quod Hypocistida appellat, iuveni multis <sup>Hypocistis varia.</sup> veluti squamis, ut alia, compactum, colore pallescente, lineis tamen quibusdam purpurascens, & nonnihil virescentibus distincto, cythos suos, ut quæ sub aliis Cisti generibus nascitur, summa sui parte proferens, succoque lento & glutinoso tota præguans.

Nihil isto Ledi genere vulgatius toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi, ubi aliud Ledum non observavi, sed in plerisque aliis Hispaniæ & Lusitanæ locis etiam invenitur.

Sextum ferè simile est quinto, brevius paulò, minoribus angustioribusq; folijs, lento etiam humore aspersis, quemadmodum illius folia: flos maior, quinq; folijs constans, candidus, semen etiam simile.

AA 2

Septimum

Ledon VII. Septimum cubitale est, multis & frequentibus ramis fruticans, colore cinereo, & frequentissimis folijs eos septentibus Rorismarini coronaria, sed omnino canescentibus, & hispidis: non tamen minus pinguibus & glutinosis cum suis tenellis ramulis, quàm quintum genus: flos summis ramis copiosus, candidus, superiori similis, semen etiam non dissimile.

LEDON VII.

LEDON VIII.



Valentino regno hæc duo postrema mihi solum observata sunt circa Xatiua, & ab incolis *xaguarço* dicuntur.

Ledon VIII. Octauum eadem qua superius magnitudine crescit, ramis tamen magis expansis, & folijs tenuioribus, supina parte ex atro virentibus, inferna verò candicantibus, Rorismarini coronaria: ferè æmulis, sed gustu adstringentibus, tamen lento quodam humore & pingui sint cum tenellis ramis obsita: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quinque folijs constantes, exigui, lutei: semen in exiguis capitellis ex cinereo nigricans.

Inuenitur hoc frequens incultis illis locis citra Tagum, supra Vlyssipponem, cum Cisto folijs Halimi, & nonnullis Baticæ locis, ubi ab incolis *Romero*, hoc est *Rosmarinus* appellatur.

Ledon IX. Nonum minus est superiore, folia paulò maiora, neque subtus incana, ut in Octauo, ratiorem item & magis glutinosa: ramuli quibus flos inhaeret, tenues & exsucco planeque retortidi, in quibus capitula aliquot inania deprehendi, & omnino hiantia iam excusso semine.



## LEDON IX.

## LEDON X.



Decimum pedali dūtaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, & satis fragilibus, nigricantibus, pinguibus, & lentore quodam madentibus: folia longè minora quàm in Nono, non multum à Thymi folijs dissidentia: flores, vt neque in alio; non obseruauī, sed in oblongis ramulis quasi vmbellatim prodeuntia capitula, exigua, & superiore parte aperta, iam inania & cum suis ramulis arida.

Nascuntur verò hæc duo postrema in extrema Baticæ parte qua Castellam spectat, ab incolis *xagurgo* nūcupata; tamen si posterius nonnulli etiam *turmeruela*, quod sub ea fortè tubera (quæ Hispanis *turmas* appellantur) nascantur, vel potius, vt existimo, Hypocistis quæ illis tuberis fortasse loco obseruata est.

Non iniquis perpetuo sunt folio ista Cisti genera, quàm mas & femina.

Potro *λιδον* Græcis hic frutex dicitur, Latinis Ledon, Plinio etiam Lada.

Pingue verò illud quod ex eo colligitur *λιδανον*, Latinis etiam Ladanum, officinis Laudanum.

Eius colligendi rationem Dioscorides & Plinius describere. Quam verò inter recentiores Bellonius libro 1. obseru. cap. 7. in Creta obseruasse ait, adscribere hic libet: cum ab alio nemine sit adhuc prodita.

Græci colligendo Ladano instrumentum peculiare parant, vernaculo sermone Ergastiri dictum. Ladani colligendi ratio. Est verò id instrumentum rastro sine dentibus simile; huic affixæ sunt aliquot ligulæ ex corio rudi neque densato aut preparato confectæ. Eas leniter adfricant fruticibus ladaniferis, vt illis adhæreat liquidus ille humor circa folia & ramulos concretus, qui deinde à ligulis per summos Caniculæ ardore cultus est abradendus. Itaque Ladanum colligendi summus, imò intolerabilis est labor, cum necesse sit totos dies summo Caniculæ aestu in montibus hærere. neque verò facile quisquam alius ad id colligendum operam sumit, præter Calohieros. hoc est monachos Græcos. Nusquam verò maiore copia tota insula cogitur, quàm ad radices montis Idæ, pago Cigualignus nuncupato, & apud Milo-  
topotamon. Hæc Bellonius.

## LADANVM.

**Diosc.** Natura ei spissandi, cassiendi, molliendi: ora venarum patefacit; capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & myrico oleo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydropneumonia, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit. Pessus immistum vulua duritiem sanat. In medicamenta, quae auris dolorem, tussim, sinum & malignata viulter inferunt. Alium sistit cum vino veteris potum, & urinam ciet.

Cistus aut  
Ladantum.

**Gal.** In calidis regionibus hic Cistus proveniens, tamen haud alius sit genere quam qui apud nos nascitur: eximium tamen à regione ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est: atque viroque à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque cetera quidem huius Cisti illis quae in nostrate videntur, similia sunt.

Verum Ladantum quod vocant, ex eo provenit medicamentum primo excessu iam quodammodo completè calidum, ut videlicet & secundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hanc substantiam tenui, ac proinde emolliens, siue malacticum moderatè pariterque digerens, ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandum non est si peculiariter ad vteri vitia conveniat. quādoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet. Quocirca defluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum pravi humoris federit, id omne absorbit: tum meatus quibus infixi sunt contrahit. Ceterum alopecias & ophthalmias siue lippitudines sanare non potest, utpote magis decussorias vires quam quae Ladano insunt, poscentes: quippe proveniunt isti ex pravis succis lentis crassisque, quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuant. Ceterum tenuium partium sunt facultas oportet, non tamen usque adeo tenuium partium & desiccatoria, ut nimio plus deficerent, unaque cum collectis inibi succis praeter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem, absorbant. Nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluitiem afferent.

**LEDVM** folijs Rosmarini alterum, Rosmarinum  
Bohemicum Matth.




Est & aliud nec minus venustum aut rarius Ledi genus, fruticosum, numerosis sesquipeditis ramulis, summo ferrugineo tincto obductis. Folia Rosmarino coronario angustiora, medio intercurrente nervo aequalia parti, & quae surculis inhaerent rubiginosis. Rubie radices colore, odore suavi, pertinaci, iucundo Abrotanum: gustu aromatico mali citrei, subastringente. Medijs & summis virgulis stocculiluteoli in alabastriculis Cisti Ledi, longioribus, Hyperico minoribus. Radix & ortus Eleagni Cordi siue Gagel Germanorum: ad uncas & blattas Bohemis vlti receptus, ubi copiose fructicat, Matthiolo teste.


Arbor



Arbor Cissifolia.  
Aduers. 452.



MYRTUS  
l. urea ma-  
xima.



Exotica, MYRTUS Plin. pluribus  
foliorum versibus.



MYRTUS  
maioris  
quinta spe-  
cies.



MYRTUS

MYRTI *varietates.* *Aduers.* 419.

In Belgicis amicorum hortis D. Ioannis de Brancion, D. Philippi Deurnagle, D. Ioannis Boifot & Georgij Ryensis beneuolentia Myrti differentias decem legimus: quarum sex sunt Myrti maioris.

MYRTI maioris *varietates* sex.

- 1 Omnium maxima Laurea dicta à folio laurino. Lauro Tyno siue regie simili, sed minori, & magis acuto, atro uiride, nigraq; bacca. alitur in cultissimo stirpiumque rariorum diuissimo paradiso D. Philippi Deurnagle Domini de Vroylandt.
- 2 Secunda folia habet paulo minora, supernè item mucronata & in acutum fastigiata.
- 3 Tertia folio est oblongo, supernè latiusculo, cum superiore ferè pari, bacca alba.
- 4 Exotica Myrtus Plin. pluribus foliorum versibus, siue Myrtus Mauritanica amatoria Veneriq; sacra, Arayhan Morisco maior Hispanicè vocata, folijs nõ disparibus, sed canulatis & cõsertim incudissimo spectaculo stipatis.
- 5 Vulgaris folia promit paulo minora in angustum definentia.
- 6 Inter maiores minima est folio oleæ syl. siue oleastri.


Duas insuper Myrti latifoliae differentias ex Clusio subdidimus.

MYRTVS *Batica prima* Clusij.

Myrtus Batica latifolia siue Laurea Clusij, folijs Arbuto ferè paribus, duplici vtrinque ordine sitis, dulcè virentibus, ramis crassioribus, texendis sepibus vtilis & tonderi solita, eoque rarius florens.

MYRTVS *Batica latifolia domestica, siue Laurea secunda* Clusij. Item Hisp. Arayhan morisco.

MYRTVS *minor vulgaris.* Gall. Myrte petit. Ital. Myrto Mòrtella. Angl. Myrttre.



MYRTVS *Batica secunda* Clusij.  
Cum superiore eadem ferè est, folijs tamen minoribus & densioribus.

MYRTI



Myrti minoris differentia  
quatuor.

7 Inter minores,  
maior; folio est angu-  
sto Phillyreæ tenuifo-  
lia breuiore.

8 Minor vulgata  
breuioribus & nigrio-  
ribus folijs stipata.

9 Minima, foliolis  
angustis Thymi Cre-  
tentis longioribus.

10 Pluribus folio-  
rum versibus Myrtus  
Mauritanicus alter.

Hisp. Arayhan mori-  
sco minor, folijs item  
canularis, confertis &  
densissimè striatis, vul-  
gata Myrto ferè pari-  
bus.

**Diosc.** Myrtus sativa nigra viridior est medicina quàm candida, & in hoc genere multò magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis astringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicae erosionibus. Succus virentibus bacis expressus eosdem effectus exhibet. Stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ius decocti in vino vlcerum in extremis mēbris nata sanat. Oculorū inflammationes illius cum polline potentillae lenit: contra egilopas illiniunt: crapulam arceat praesumptum vinum, quod serues factò aliquantum eius semine exprimatur: aliàs enim acorem contraheret. Praestat idem seminis effectus: vitile procidentia vulvarum in desestionibus, sedis virgēs, & seminis fluxione vulvae laborantibus. Purgat sinfures, vlcerum capitis manantia atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas lipras vocant, vti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum soliorum ad desestiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solutescentes: eo fracta ferruminatione repugnantia vtilissimè fouentur: vitiliginem emendat, purulentū auribus infunditur, & capillos denigrat, succus eorum eadem efficit. Tria folia & ex aqua illita, humidis vlceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, celiacisq; profunt: & admixto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino ad vlcerum serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epimychidas, & condylomata. Arentium soliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygjs, & contra alarum feminumq; perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. folia cruda, seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygjsq; medentur. Exprimunt folijs succus, aduso vetere vino, aut aqua celesti, cuius recentis vsus est: nam exsiccatius planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidanum dicitur adnatum inaequabile, verrucosum, intumescensq; & concolor: quod proinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur. Magis quàm Myrtus \* adstringit. Tisum aduicta austero vino reponitur. coactumq; in pastillos siccatur in vmbra: multò efficacius est folio & semine, cerato, pefu in-  
fessionibus cataplasmati admissum, vbi adstringendum aliquid est.

\* Gal. quanto dictis siccius est, tantò & desiccet & adstringit vehementius.

BB

Gal.

Gal. Myrtus ex contrarijs substantijs constat, vincit tamen in ea frigidum terreum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur. Porrò tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se adstrictione dissident. Plura Gal. eadem quæ Diosc.

πύρος. *Buxus*. *Germ. Burbaum. Gall. Buys.*  
*Angl. Burs. Belg. Palmeboom.*  
*Ital. Bosso. Aduers. 419.*



Virgultâ, lignum & folia decocta Guayaci modo sudores eliciunt. famulam pauperulam Anglam à lue venerea vindicatam huius decocto memini. Ditiorebùs propter ingratum & tetrum odorem rejicitur ad capillos luteo colore inficiendos incoquitur lixiuio.

LYCIVM. *Aduers. 419.*

Diosc. Lycium astringit. caliginem oculorum discutit, genarum scabiem, pruritus, veteresque fluxiones sanat, facit ad purulentas aureis, exulceratas gingivas, consillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illitum: cœliaci dysenterici potum in licumq; conuenit. Datur sanguinem excreantibus & tussi, ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in cataportio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Reduuijs, vlceribus quæ serpunt aut putrent, medetur. Scaminarum profluuiâ appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice cataportij deuoratum, auxiliatur.

Gal. subdit: ad paronychias vtuntur. Est autē facultatis exicatoriæ, compositum ex diuersi generis substantijs, quas ἰεροπυρεῖς Græci vocant, altera quidem tenuium partium digerente, atque calida; altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest; digerit verò & desiccatur, non parum, nempe in secundo ordine: In calore autē medijs & symmetricis proximum est. proinde ad varia hoc vtuntur medicamine, vt abstergente quidem, (ad putredines & cacoëthe vlcera) vt contrahente verò, cœliaci, dysenterici ac muliebri profluuiio adhibent.

LYCIVM



## LYCIVM Hispanicum.

Spinæ Burgundiæ aut Phillyreæ angustifoliæ non ita abfimilem perelegantem fruticellum, folijs tamen multò angustioribus & ramulis exilioribus studiose alunt in Belgio D. Ioannes Brancionus, D. Dilphius, & Georgius Ryensis. Extrema infesta spiculis virgulta; folia Thymelææ Montpelliæ, exiliora, atrouirentia, gustanti astringentia. Apud Belgas nullum fructum edit.

RHAMNVS prima speciei tertius, & fortè Rhamnus niger Theoph.  
apud Clusium. Hisp. Spino negro.



Hunc fruticem folijs viridibus, adstringentibus, perpetuò virentibus, Rhabarbari saporem referentibus, pluribus & confertis herbaceis iuxta folia flosculis; fructu nigro pruno sylvestri simili, rotundo & acerbo; non diuersum opinor à Lycio Hispanico Belgij nuper inquilino factò.

MALVM punicum. Aduers. 319.

Diosc. Malum punicum omne boni succi est, stomacho vile, perexiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho viriliora habentur: sed aliquantulum in eo calorem pignunt, inflationes pariunt, vnde in febris abdicantur. Acida adstringunt, astuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. ora gingiuasque ledunt. Vinosa verò mediani fortiantur naturam: Nuclei acinorum aculi punici in sole ficcati, & obsonijs insparsi, concoctine, fluentem alium stomachumq, sistunt. celesti aqua madescunt, bibunturq, commodè sanguinem excreantibus, ad defessus dysentericorum, feminarumq, fluxione vulua laborantium viles sunt. expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reducat, & ea qua in corpore extuberant, aurum dolores, & narium vitia; præsertim acidorum.

Huius flores cytini vocantur, qui adstringunt, sicant, cohibent, sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstunt virilitates, humida gingiuarum viui mollesque dentes decocto colluuntur, herniam prolapsum intestini erumpentem cæci, & aplasmate repellunt. Memoria tradunt, quæ tres quam minimos cytinos deuorauerit, nullâ eo anno lipitridinem passurum, eliquatur hypocistidis exemplo.

Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui fidion appellant. id spissandi vini habet, & quos cyti- Malicorium ni, præbet vsus. decoctum radicis potu latus ventris tinea pellit, & easdem euocat.

Balaustium sylvestris punici flos est, cytino similis. Cuius complura genera reperiuntur, candidum, fulvum, colore rosaceo, succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstrictoris vis inest, eandem faciens qua hypocistidis & cytiani.



STIRPIUM

MALUM PUNICUM. Aduers. 419.  
Angl. Pomgranat tre. Hisp. Granada.

LIGVSTRUM. Belg. Keelcrup, monde houdt,  
& Aepnவில்legen. Germ. Weinholztlin &  
Mundtholts. Angl. Prpuet. Gall. Troesne.  
Gallobelga Pucelage d'homme. Hisp. Alfena  
& Hallena. Ital. Conastrello Oliuella, Gui-  
strico Cambrossene. Aduers. 420.



PHILLY-  
REA Narbo-  
nensis flori-  
da.



Diosc. Folia adstrictoriam vim habent; quare co-  
manducata vlcibus oris medentur. Illita seruitus inflam-  
mationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni  
ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, quae in  
radicula succo maduerint. Flores ex aceto fronti illitus capitis  
dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum,  
excalscit, emolliq; nervos: si quae serueni natura prae-  
di-  
ta sint, assumat.

PHILLYREA Narbonensis florida. Aduers. 420.

Diosc. Folia astringunt, ad eadem vilia ad quae  
oleaster, cum adstrictione est opus. Maxime ad oris vlcera,  
commanducata, aut si decocto colluantur. Pota vrinam ac  
mensis cient.

Varietates. Belgicis hortis Hispano semine an-  
gustioribus folijs gemina Phillyrea visitur.

Item latifoliam cristatam, & tenuifoliam mune-  
re Georgij Rye plerique habent in viretis Belgicis.

PHI-



PHILLYREAE angustifoliae flores. Aduers. 420.


MACALEB Gesneri & Matth.  
Aduers. 421.



MACALEB Gesneri & Matth.

Quia Matthiolus depingit Macaleb Muttonus alit dono Petri Quthi pharmacopœi Luteriani p̄ri-  
tissiani, hyeme decidua populnea fronde: fructum nondum edidit.

FAGARA Auicenna.



Alterius Macalebi meminit Clusius qui Fagaras  
Auicennae statuit his verbis.

CLVS. Fagara fructus est Ciceris arietini ma-  
gnitudine, cortice tenni constans ex cinereo, ni-  
gricante, cui subest tenue putamen nucleum con-  
tinens satis solidum, & tenui nigraq; membrana  
obductum. Integer fructus cum magnitudine tum  
forma, & colore adeo similis est eiq̃ nostrae offi-  
cinæ Cuculū Indū, Itali Coccole di lenate appellāt,  
vt primo aspectu fallere, & pro eo sumi possit.

MEMINIT huius Auicenna cap. 266. in hunc  
modum. Fagara quid est? Granum simile Ciceri  
habens granum Mahaleb, & in cōcavitate eius est  
granum nigrum sicut Scchedenegi, & asportatur  
de Sofale. Collocat verò eam in tertio calefacien-

tium & siccantium ordine, atque stomachi & hepatis frigidity vitem esse, concoctionemq; iuua-  
re, & aluum constringere scribit.

BB 3

BOVR.

BOVRGESPINÉ Monspel. Aduers. 421.  
Alaternus Plin. Clusio & Anguil. Spina Cerui-  
na quorundam, Lusit. Calca.

Secunda ALATERNVS humilior lato folio Clusij.

OLEA. Aduers. 422. Sylvestris & sativa.  
Angl. Olive tre. Ital. Oliua. Belg. Olive-  
boom. Germ. Oelbaum & Olivebaum.  
Hisp. Azeyruna & Oliuo.



Varietas. Latoribus folijs, rotundioribus & minore frutice variat.

#### OLEA.

Diosc. Olea folia adstringunt. Trita autem & imposita, ignem sacrum, vlcera quae serpunt, epiphytidas, carbunculos, reduntias nomasq; cohibent: crustas emarginans cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant. Inflammationes panosq; cum melle imposita discutunt. cutem à capite vulsam conglutinant. oris vlceribus, & priuatim profluuium, ad motus succus inhibet. vna oculorum, pustulisq; prodest. vlcera & veteres defluxiones sistit. quapropter in collyria additur. ad genarum erosiones perquam vilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso vino aut aqua. siccatque sole in pastillos digeritur. sed longè vtilior ad recondendum succus habetur, qui cum vino quam cum aqua expressus est. auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter ciliacis cum farina hordeacea illuminantur. vruntur cum floribus folia, vt spodij vicem cinis praestet, in cruda olla, oblitio ore luto, vsque dum figlinum percoquantur. restinèd q; vino & rursus subacta, eodem modo vruntur. postremo ceruse modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. sed eisdem viribus praeditum esse putandum est. Foliorum sativa olea eadem vis intelligitur, sed aliquanto inferior. vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligno virenti accenso manus, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginosa semen illud medetur surfuribus, & vlceribus quae depascent vorantq; quod autem intra nucleum est. ex adipe & farina. Cabros vngues excutit. Colymbades trita & ambustis illita pustulas gigni prohibent. sordida vlcera purgant. muria succus collatus gingiuas contrahit; & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho vtilior est: ventri diffidit



ficilis. nigra autem & matura, corruptioni opportuna est. Stomacho aduersatur. oculis non conuenit. capitis dolorem mouet. arefacta illitu depascentia ulcera sistit. & carbunculos emarginat. Oleum syluestri oliuagingiuus putri vligine laborantibus collucitur. dentium mobilitates stabilis. calfacti fotus, gingiuus fluxione laborantibus vitis est. Linam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuus admonere, donec alba spectentur.

*Lachryma ethiopica olea Dioscor.*

Lachryma quam ethiopica olea stillat, scammonia similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. que autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, olea-friq., similem lachrymam sudant, qua commodè ad oculorum hebetudines illinitur. cicatrices albuginesq., illius emendat. vrinam & menses ciet. canis dentium impressa, ad dolores efficax est. inter venena scribitur. partus pellit. lepras & impetigines sanat. Appellatur autem ethiopica & agrestis olea.

*Amurca Dioscor.*

Amurca expresse oliuæ recrementum est. decocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros praebens lycopii effectus. insuper dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino aut mulso commodè illinitur. additur in medicamentis ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. vetustate meliorem fieri constat. vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vulua exulcerationi. si vero cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. iumentorum scabiem cum decocto lupini & chamaeleonte illitu sanat. cruda & recenti amurca podagras articularesq., dolores foueri vtilissimum. peruncta in villosa pelle, & hydropicis impoita, tumoris molem reprimat.

**Olea** syl. Septentrionalium. Eleagnos Matth.

Sizapha Cappadocia Bellonij. Sizapha candida Clusij.

Eleagnos Theophr. folio Viucis. Ital. Zeingole.

**Salix** Diosc. Hisp. Salce & salguero. Gall. Saulx.

Ital. Salice & falcio. Belg. Witgheboem.

Germ. Weidenbaum. Aduersf. 422.



## OLEA Syl. Septentrionalium.

Lutetia, Londini, Antuerpiæ & alibi in Belgio passim hortensis est, salineo candido folio, aspectu iucundo, floribus albis muscosis in nitidis argenteis alabastriculis, suave spirantibus, secundum foliorum exortus prodeuntibus: fructus & nuclei olivæ aut Asaræ Daracchi similes, qui non apud nos maturefcunt, regno Granatensi sponte oritur.

## SALIX.

Diosc. Semen, folia, cortex & succus spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere & vino pota, iliosis subveniunt: sumpta per se & cum aqua præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expulsi-  
tibus prodest: cortex eisdem præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto maceratus, illius clausos & callos tollit. Ex  
folijs & cortice succus cum rosaceo in calyce punici calsatus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras  
foueri vtilissimum: surfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea cum floret, exciso cortice. in plaga  
enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suam vim præbet.

SALIX humilis repens angustifolia.

PERSICA Malus. Gall. Pesche & Peshier.  
Ital. Persiche. Germ. Pfirsich. Hisp. Pexegos.



Ericetis Antuerpiani agri palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis repit: folio thamni præmi &  
floribus muscosis Salicis, gustanti amara.

ONAGRA Diosc. Advers. 423.  
Salicaria Germanica.

PERSI-



## PERSICA Malus.

**Diosc.** Persica pomum maturatum stomacho, quam ventri villia sunt. Acerba alium cohibent, sed sicca vehementius, decoctum est sicis alui, stomachiq; fluxiones sistit.

**Gal.** folia trita & super umbilicum imposita\* lumbricos necant: alioqui sanè discutiens medicamentum est. Pomorum verò eius succus & veluti caro facillè corrumpitur, omnineque noxam inferit; quapropter haud post alios cibos ultimoque sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo natantia corrumpuntur. Huius verò quod omnibus commune est meminisse oportet. Quaecumq; vitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facileque descendunt, succeduntque, præ alijs comedenda esse: si enim & ipsa celeriter subeunt, & alijs præeunt, ac quasi iter muniant. Postremo autem sumpta, vna secum alia quoque in corruptionem trahunt.

\* **Plin. Valer. subdit,** eadem sicca & in puluerē tusa, recentes plagas cruentorum vulnorum claudunt.

**Idem:** Nucleus capitis dolori cum oleo & aceto tritus, illinitur. Gummi gutta, quam Persici truncus illacrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum vino, etiam in vesica lapillos frangit. Trita ex aceto imperigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leuiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus æterat, & vitia pulmonis expurgat.

Syrupusè floribus eadem potest quæ & Rosatus.

## AMYGDALA. Angl. Almond tree, Hisp. Almendras.

Ital. Mandole. *Advers.* 423.



**Diosc.** Amygdala amara radicem triarum decoctum, vitia cutis in facie corrigit. Illiæ nuces idem munus præstant. menses adiecta ciunt. capitis dolori auxiliantur, illiæ fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo. epiphyctidas sanant ex vino. item putrescentia vlcera, & quæ serpunt. & morsus canum cum melle. earum autem esu dolores finiuntur, aliam emolliunt. somnum faciunt. urinam ciunt. contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. renum viis, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegiate cum resina terebinthina dantur. calculosis difficilis, vrinæ in passo auxiliantur. & illinctu cum melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis septenisque præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores. vulpesi cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & adstringit. reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. imperigines quæ summum corpus occupant, illitum cum aceto tollit. tussi vetusta cum diluto vino potum medetur. calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus valent in remedijs quam amara. attamen extenuant. urinam ciunt. recentium esu cum suo putamine, hamida stomachi vitia emendantur.

Gal. Quæ quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident; quod & qualitas ipsa indicat, & experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum Commentariorum proditum est. Caterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis discere. Si quidem ephelin expurgant, & excreationes ex pectore pulmoneque, crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. Porro ostensa hæc sunt genere quidem incidentis, specie verò extergentis esse facultatis. Quin & quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi, & ipsum supra demonstratum est. Sed & experientia monstrat. Nam in iecore crassorum viscosorumque humorum in extremis vasibus impactorum obstructiones abundè expurgant expediuntque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis & coli, & renum (sanant.) Porro & ipsa arbor similem sortita vim est: nam huius radices coctæ atque illitæ ephelis purgant. Quotquot verò sunt amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritudinem possidēt, quæ tamen dulcedine superatè occultatur. Caterum id temporis spacio clarum sit. Demonstratum autem retro est qualitatem dulcem moderatè esse calidam.

NOX MOSCHATA, siue Nux odorata & aromatica.

*Germ.* Muscat nuez. *Belgis* Nöte muschaten.

*Gall.* Noix Muscade & muguette.

*Hisp.* Nuez de especie & Nuezes moscadas.

*Ital.* Noci Moscade. *Advers.* 344.



Mas oblongior.

Urinas ciet: cerebro, ventriculo, hepatis, utero, cordi, omnibusque visceribus peramica. Cariosas & leues nuces oleaginosas & grauibas præferbat Rondeletius ad ventriculi & cerebri affectus, quæ quia immaturæ, plus adstrictionis habent qua robur ventriculo conciliatur, & vapidi fumi cerebrum ferientes præpediuntur. Oleaginosa enim cerebrum vaporibus obruit. Memini generosam Anglam gravidam esu 10. aut 12. nucum myristicarum ebriam delirasse. Oleum pressu dant necuorum morbis vtilissimum.

Mas oblongior gustu astringente, odore ferè nullo. Macis marem obducens colore est saturiore, gustu & odore non diversis, acerbo, calido; cariosa magis. Dente demorsa ceræ coctione, minus oleosa: ad affectus ventriculi & capitis commodior & aptior.



## ARBEVVS.



**Diosc.** Esu acerofus. Stomacho aduersatur: capitis dolorem mouet.

**LAVRVS.** Angl. Laurel; Bay tree. Hisp. Laurel. Lusit. Laureiro.

Ital. Lauro. Belg. Laurus boom. Gall. Laurier. eius bacca

Hisp. Vayas. Belg. Bay & Baerchelacr.

Germ. Kooßbeeren. Aduersf. 424.

**Diosc.** Laurus quadam tenui folio constat: altera latiore. Vtraz, excaustoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, vulua & vesica vitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumq; ictibus opitulantur. eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate trita cum melle vel passo profunt tibi, orthopnoea, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur. vitilignes emaculant. Succus baccarum vtilissimè aurium dolori, & grauiati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adiunguntur, quae neruorum lasitudines resciant, acopa vocant: & ad vnguenta, quae calfaciunt, & discutiant. Cortex radicis calculos rumpit. partus necat, hepaticus prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

TINUS *Lusitanica* Clusij.

MEDICA Malus: Malum Persicum fortè Theoph.  
Malum Assyriacum Plin. Malum Hespericum, Citreum  
& Chrysomela, Atheni. Ital. Cedri, & Citroni.  
Angl. Citron tree. Ger. & Gall. Citron. Hisp. Cidras.  
Belg. Citroenen. Aduers. 425.



Tinialiud genus exhibet Clusius Corni sœminæ proceritate, firmioribus & frequentioribus ramulis, cortice ex rubro virescente testis, circa quos folia superioris angustiora & oblongiora aliquantum, & venulis pluribus distincta, sibi inuicem opposita ut in priore: flores extremis ramis umbellatim etiam nascuntur, colore nonnihil putrescente, neque adeò odorati, uti superioris: fructus etiam minor, plenior, nigrior. Pæ memoriæ D. Brancion huius Tini mecum sæpe verba fecit, sed ingenuè fateor mihi incognitum, & minimè animaduersum.

MEDICA Malus.

Diosc. Semen in vino potum, venenis resistit: alium monet. Oris suavitatem commendat, decocto eius coluto, aut succo.

LIMO-



ARANTIA, Angl. Orange tree. Gall. Orenge  
& Orenger; Belg. Arangie appel Germ. Po-  
merantzen. Hisp. Naranzas.



CINNAMOMUM & CASSIA.

Aduers. pag. 525.

Diosc. Cinnamomum omne excofacit, emollit, & concoquit; urinam ciet: tam menses quam partus potum aut ex myrrha impositum pellit. Contra bestias quæ virus ei aculantur, venenâq; conuenit, caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit; crassitiem extenuat: lentigines & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit. Contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renem vitia, & vrina difficultatem efficax est. vnguentis pretiosis inseri solet. Et in summa magni ad omnia usus.


Gal. Cinnamonum summè tenuium partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem æquè desiccet eorum quæ pari sunt excofaciendi facultate; propter tenuitatem, scilicet essentia. At Cinnamomis est velut imbecillum Cinnamomum.

CC 2

CASSIA

CASSIA. *Germ. Xpmmet Hertlin. Belg. Caniel.*  
*Hisp. & Ital. Canola. Gall. Can-*  
*nelle.*

XYLOCASSIA. *Aduers. 426.*  
 an PSEUDOCINAMOMUM  
*Dioscor.*



**Diosc.** Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstanda claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita. menses trahit. contra viperarum ictus pota auxiliatur. aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum vitia, pota proficit. Fœminis in solis defidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamentis mixta, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit. nam eisdem effectus præbet, ad plurima perquam vtilis.

**Gal.** Cassia exsiccat & excalfacit, tertio quodammodo ordine; sed & tenuium admodum partium est: gustu verò plurimum habet acrimoniæ, leniter quoque nonnihil adstringens: quamobrem ob hæc omnia incidit, simulque digerit quæ in corpore sunt recrementa: & adhæc robur etiam instrumentis addit. Idoneum etiam suppressis mensibus, cum videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum quod sufficiat euacuari nequit.



**PIPER** *nigrum & album.* Ger. Pfeffer. Belg. Peper.  
Gall. Poiure. Angl. Pepper. Hisp. Pimienta.  
Ital. Pepe. Aduers. 426. 427.

**GARYOPHYLLI** *cum suo folio & fructu.*  
Belg. Groffels naghel Gall. Clous de giroffles.  
Germ. Naeghel. Ital. Garofoli & Garofani.  
Hisp. Clauellos & clauos di espetia.



anthophylli

Candidum Piper, oculariis remedijs aptum, antidotis & medicaminibus quæ contra venenata parantur, Theriacâ vocant.

Longum subinarum, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur.

**Diosc.** Nigrum odoratum esse constat candido suavius, acrius, & ovi gratius, necnon ad condimenta vilius. sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antedictis infirmis est. Eligi oportet grauiſſimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minimè surſuſum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri ſemina nutrimento deſecta, caſſa, inanis, minimè ponderis, quod vocant braſina. Viſ<sup>†</sup> omnium excalfacit. vrinam ciet. concoquit. extrahit diſcutit. abſterget caliginem qua oculis obuſatur. piper febrium horribus circūitu repetentibus ſue potu, ſine illuſi, ſubuenit. ſerpentium morſibus auxiliatur. partus extrahit. conceptum adimere creditur, ſtatim à concubitu ſuppoſitū. ruſſi omnibꝫque pectoris vitijſ, ſue eclegmate, ſue potu, ſuccurrit. angina eo & melle conuenienter periguntur. potum cum recentibus lauri folijſ, tormina diſcutit. cum vua paſſa manducatum pituitam à capite elicit. valetudinem tuetur. dolores ſinit. appetentiam mouet. concoctionem adiuuat, ad intinctus eſculentorum additum. ſtrumæ cum pice diſcutit. vitilignes ex nitro emaculat. Fiſtuli nouo, vt aiunt, motum torretur. Non eſt huius arboris radix gingiber, vs aliqui exſtimauere, ſicuti paulo poſt oſtendemus. Nanque piperis radix \* coſto ſimilis eſt. ora guſtantium accendit. ſaliuam ciet. hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota. caput etiam purgat, manducata cum ſemine pedicularis herbe quam ſtaphidem agriam vocant.

† valenter tum excalfacit, tum deſiccatur Gal.

Oleo è piperibus, ſpina dorsi ad horrores quartanæ febris illinitur.

\* Gal. Piperis radix Coſto ſimiles vires obtinet.

**CVEEBE** *officinarum.* Aduers pag. 427.

Piper Hippocratis ſimpliciter, & Piper rotundum Theoph. Guiland.

Caleſciant, exſiccant ſecundo ordine completo vel initio tertij. Frigidis morbis à pituita ortis prodeſt. Denubus attrita pituitam cerebri eliciunt ſtatu diſcutiunt; ventriculum & viſcera roborant.

**ASPALA-**

## ASPALATHVS. Aduers. pag. 457.

**Diosc.** Vim calfaciendi cum adstrictione obinet, unde decoctum cum vino ad retrahendū oris vlcera colluctanda conuenit. ad nomas genitalium & sordida vlcera infunditur. Subiectum in pess, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: vrina difficultatem, inflationemque discutit.

<sup>a</sup>Gal. docet cur calefaciat & adstringat his verbis: Acris simul & adstringens est gustu facultate verò ex dissimilibus constat, nempe paribus suis acribus excalfaciens, paribus verò alijs, austeris scilicet, refrigerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur, & proinde ad putredines & fluxiones est vtilis.

Vincit in eo caliditas, ob id calefacere dicit, sed cum adstrictione, quia adstringit.

<sup>b</sup>Ad 2492, id est calida aut ignea vlcera; quia cum adstrictione siccatur, aut cum adstrictione refrigeratur. Vlcus istud depascens est cum putrefactione & defluxione in parte laxa & loco perpetuo madente: idè medicamento vehementer exsiccante & adstringente opus est. Eadem ratione practici nuperi aquæ fortis illi soli quæ contactu oris & pudendorum aphthis, & potèntissimè exsiccantibus medicamentis & adstringentibus medentur.

<sup>c</sup>Quasi velit dicere, ad pudendorum vlcera simplicia, & ad ea quæ serpunt, aut depascuntur, & coluiues. Omnibus his paribus quia laxæ sunt, excrementis suscipiendis aptæ, desiccantibus & adstringentibus, recrementorum copiam arcuentibus & cohibentibus, occurritur.

<sup>d</sup>moderatè ob adstrictionem cum calore mixtam.

<sup>e</sup>Acria si decoquantur, mitescunt, ob aquæ mixturam, quæ diluit vim medicamenti.

<sup>f</sup>Dysuriam sua acrimonia, & status discutiendo soluit.

## XYLOALOEVS siue Lignum Aloes Officinarum.

AGALLOCHVM. Aduers. 428.

Aegireta  
eadem.

**Diosc.** Man litur, aut decoctum colluitur, commendandis libalibus gratis. Sudores arcet toto corpori inspersum, prothure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachma vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbecillitatem, feruoremque mulcet. si lateris, iocinerisue dolor ex cruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere praeest.

## AGALLOCHVS præstantissimus verior. siue XYLOALOEVS.




Istius Xyloaloes quæ officinis notissima, altera species Antuerpium aduecta, primùm nobis visa, & muneri data ab optimo pharmacopœo Antuerpiano Francisco Pennino, in cuius instructissima officina prostat.

Frustulum, quod habemus è trunco auulsum, ponderosum est multis venis constans probatissime Xyloaloes officinarum ferè concoloribus, fuscis, odore & sapore non dissimilibus, sed suauioribus amaris, & pinguioribus multò, quæ commaducatae lentescunt ceræ modo. Reliqua ligni materia & superficies alba est, fragilis & fractu facilis, minus aromatica. Istud sanè lignum Aloes est omnium quæ vnquam vidi, sapore & odore vegetissimum.



*Arabum LACCA, an sit Diosc. Caucamum? Aduers. 428.*

*LACCA cum suis Bacillis.*



**Diosc.** Vestes eo ex styrace & myrrha suffunduntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur. lientosis datur, comitialibus, & suspiriosis. menses cum aqua mulsa pellit. oculorum cicatrices confestim emendat. vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. aduersus gingiuas humore pragnantibus, dolorisque dentium, non aliud efficacius.

**MYRRHA.** Aduers. 428.

**Diosc.** Myrrha lachryma est arboris quae in Arabia gignitur, Aegyptia spina non dissimilis, è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circum caudicem concrevit. Dicitur ex his aliqua pedasimos, praepinguis, quae expressa, stacte emittitur. alia gabirea, pinguisima, lato & pingui solo nascens. ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est, quae troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo provenit, splendens, subvirescens, ac mordens. quinetiam legitur tenuis quadam, quae à troglodytica secunda est, vdelij modo mollis, verum odore grauiuscula, apris nascens. Alia caucalis cognominatur, praeter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deteriora, quae ergastima dicitur, pingui carens, cano seu obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima, improbatum aminea cognomine. ex his pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è ficioribus haudquaquam pingues, & inodorati, minus odore pollet, quae oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obfusa, levis, vndiq; concolor, quae contracta venas vnguium modo candidas & laeues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. superuacua & inutilis est ponderosa, coloris piceae. Calfacit. sapore † gignit. glutinat. siccit. astringit. vuluam emollit, & praclusam aperit. menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo ruta admoti. tuberculosa denotatur in vetere tussi, orthopnoea, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profusio, & dysenteria. horros discutit, quibus horis ante febrium accessiones, saba magnitudine pota cum pipere & aqua. subdita lingua liquataq; scabritiem arteria expolit. obtusam vocem expedit. ventris tinea enecat. contra grauem oris halitum manditur. & aduersus aliarum radia, cum liquido alumine illinitur. gingiuas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo\* ore. vulnera capitis illitu glutinat. medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleae carnibus. item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, & glaucio. ad varos autem cum casia & melle illinitur. imperigines ex aceto purgat. defluentes capillos cum ladano & vino myrte illita. firmat. diuurnas destillationes lenit, illitis pinna naribus. oculorum vlcera complet. albugines tollit. caliginem discutit. scabritiem lauigat. Fit è myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & vt postea ostendemus, ad eadem conueniens.

Fabae veterum scilicet.

\* omphacino legendum, vt suo capite docet, alioqui non conuenit.

Baeotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Baeotia nascentis. Melior est quae myrrham odore repraesentat. vis ei calfactoria inest. emollit discutitq; suffimentis commodissime inseritur.

DD † Sopo-

*Soporem gignit.*] Capitis gravitatem & dolorem etiam olfactu cum inducat, Galeno teste, lib. secundum doctores rationem alienum videtur, quia contrarij effectus, soporem & dolorem gignere. In dolore sensus acutus: in sopore vero hebes; & sensus & motus priuatio. Cum Myrrha excalfaciat, non videtur somnum posse conciliare. Soporifera autem & narcotica humida perquam frigida sunt. Sed quammulta calida quibusdam soporem inducunt, vapidis fumis imbuto cerebro; & nonnullos laevis capitis doloribus infestant, potissimum eos quibus siccior & calidior cerebri temperies. Quibus vero caput frigidius & humidius, pituita eliquatur; cerebrum irrigatur; obstruuntur & meatus, per quos spiritus ad sensus mittuntur: & cessante illa spirituum emissionem, assiduo vigiliantem tempore fieri solita, somnum conciliant. Quemadmodum Myrrha, vinum immodice sumptum, Crocus, Iris & omnia calida quae caput tentant, eadem ratione dolorem faciunt, somnum & vigilias pro cerebri temperamento & natura. In quibusdam neque somnum neque vigilias inducit, quia vapores absumuntur. *Glutinat*] viscidam suam substantiam & exsiccat vi, superfluum humorem absumendo, collectiones puris discutendo.

*Siccit, astringit.*] quod astringat, a veritate alienum videtur, quia menses & partus celeriter extrahit, expectorat. Id fieri videtur secundis qualitibus, siccando scilicet; humidum superfluum purgationis menstruae absumendo.

*Vuluam emollit & praclusam aperit.*] malactica calida sunt excessu secundo & sicca, qualis myrrha est. Tumidam vuluam emollit ob mensium retentionem, & forte refrigerationem, ob id calefaciendo, humores eliquando & extergendo, atque venarum orificia referendo, praclusam vuluam aperit.

*Menses & partus.*] quia amara acris, tenuium partium. Gal. subdit; & lumbricos tum enecat, tum eijcit.

*In vetere tussi orthopnea.*] Haec affectiones fortiora remedia vel maiore dosi exposculant, quia multum distat, & medicamenti vis permeando imminuitur vel deperditur. Memini senem quendam Anglum qui ob retentionem & crassitatem pituitae suffocabatur, a me medicamento parato ex Myrrha selecta, pipere, succo Porri, sapa, & syr. capillorum veneris cōsoquebat, expectorabat & magnam pituitam colluuiem eijciebat. Myrrha enim Gal. teste lib. 8. simpl. detergendi vim habet, tracheam arteriam, non tamen exasperat, sicut abstergentium nonnulla quae abstergendo tussim, aut fluxiones mouent, ut acria, cepe, mel magis quam sapa. Concoquendi & extergendi vim habet pulmonum & arteriae affectibus necessariam, nec dispari forte ratione ad alui profluvia efficax.

*Alui profluvio.*] Alui tria profluvia, dysenteria, diarrhoea & lienteria. Non potest de dysenteria intelligi, quia addit *uxi duces* / *lephas*. Diarrhoeae non videtur conuenire, quia laxat, ad lienterias autem concoquendo & constringendo; dysenterias vero detergendo & astringendo efficax.

*Horrores discutit.*] Horror quartanae, compositae, spuriae hemitritae, & bili vel melancholiae diffusae in sensibiles partes vel pituitae permixtae febrium est. Quemadmodum acris & biliosus humor, qui celeri motu fertur & diffunditur, rigores efficit: sic quae crassior, tardius mouetur, minus pungit, sed per diuturnum & maiore cum refrigeratione. Frigus quotidianae est debilis rigor, vel medium quoddam inter rigorem & horrorem. Quae omnibus febrium accessionibus contingunt, in quibus materia a venis sine magna agitatione diffunditur in habitum corporis; quia fit cum sanguinis retractione & corporis refrigeratione: calida spinæ dorsum imposita, horrores, rigores & frigora soluant, corporis habitum calfaciunt, meatus referant, materiam preparant & extenuant, ut partes frigidatae transitum non remorentur. Exiguam materiae copiam horrores lenissimos efficere cernere est in febrium declaratione, & materiam sensim commotam horrorem vel rigorem non facere. exemplo enim febrium initia, quibus propter obstructions maiores materiae defluentis, nullus patet aditus. Rigores vel horrores non a solis cruatibus oriri manifestum; nam vel maximi rigores & horrores materia concocta sunt in febrium solutione, quibus copiosus sudor superueniens, ut in causone post sextum, morbum soluit, ut Hipp. scriptum reliquit. A causone rigor superueniens morbum soluit, quia multa materia concocta affatim discutitur.

Sic Myrrha, cum pipere & aqua (& vino albo in quartana) porta duabus horis ante accessionem, calfacit materiam horrores, obstructions soluit, quae transpirationem impediunt, & horrores discutit.

*Subdita lingua liquat.*] Scabritiem arteriae exsolit vel lenit citra tussim, quia sensim penetrat & leniter deterget humiditatem quae vorem rauram facit.

*Ventris tinea.*] vermes occidit amaritudine & acrimonia.

*Contra grauem oris halitum.*] faecores putredinis soboles amarore & siccitate emendat. Ex moscho hodie parantur quae putredinem non delent, sed tegunt.

*Aduersus alarum tedia.*] Cacochymicis hic affectus accideret solet, quorum excrementa putrida steter, ob partis laxam & ratam texturam, quia non refrigeratur magisque sudat, & calidior hic locus etiam ob multas arterias non procul a corde remotas. Oloratis faecor deletur. Verum quia pars laxa, alumen addit ad maiorem adstrictionem.

*Gingiuas & dentes stabilis.*] quia astringit & siccit, cum oleo non conuenit, nisi legas omphacino, quod dentes & gingiuas firmat astringendo, ut testis est Dioscor. cap. De omphacio.

*Medetur fractis artibus.*] melius contusus, nam cartilaginosa fracta curationem non admittunt.



BDÉLLIVM. *Aduers.* pag. 429.

**D**iosc. *Callositas & emollit.* <sup>BDELLIVM. Natur. pag. 429.</sup> *et turgentia guttura, humidafq; \* hernias discutit cum ieiunia salina † Aegina.*  
*dilatum. Vulus spiracula laxas appofuit & fuffitu; & parius, humiditatefque omnes extrahit. Calculos potu commi-*  
*nuit: vinam inouet. Tuffientibus, a ferpente percuffis, vififimè datur. Valet ad rupta, vulla, laterum dolores, & dif-*  
*cursantes fpiritus. Malagmati inferiuit, quia contra duritiam & neruorum modos profunt. Centufum refofuitur affufo*  
 *vino aut aqua calida.* <sup>Scirros emollit.</sup> <sup>\* cadè Gal.</sup>

STYRAX. *Ital.* Storace. *Hisp.* Estoraque.

. Aduers. 429.

BDELLII fructus.



*Idellij fructus describit Carolus Clusius in aromatatum historia, Juglandis nuci magnitudine, aut etiam ampliores, triangulari ferè forma, oblongiore tamen & ad ficum quodammodo accedente, odoratos, colore subcinereo, durissimo putamine, quod prægnans esse & nucleum continere videtur.*

STYRAX.

**Diosc.** Lacryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrha emula: verūm perpaucā manat. Adulteratur ligni scobē, quā vermiculī erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibūsdam alijs. Aliq̃ cerā aut adipē odoribz imbutū, flagrantissimīs sōlibz cum syrāce subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, vanūdatiq̃. Styracem hanc, quoniam in vermiculorum speciem cōrābat, scōleiten cognominant, quē tāquam sincerū imperiū approbant, non animaduertentes ad præcipuū odoris fragrantissimū. siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calcācit, emollit, & concoquit: \* medetur \* Gal. causā addit quā obrem n e dedit ruffi. ruffi, de stillationibz, rācedinī grauedinī, & interceptā poss. vūlū præclūsa duritiē laboranti, conuenit. cit menses potu appōstūque. alium leuiter molit, si exigū cum resina terebinthina catapotij modo deuoret, miscetur vtiliter discutientiū malagmā, acopisq̃. adoletur autē & igni torretur, vti fit ex eo, veluti ex † thure, fuligē: ad eadem conueniens ad quā thuris fuligō. ex eo etiā in Syria slyracinum oleū componitur. quod calcācit vehēmentē, & emollit. verū caput dolore afficit, adgrauatq̃, & soporem adfert.

*Kudwira mala.* COTONEA & Cydonia mala. Germ. Quitten & Nitten offel.  
Gall. Coingz. Belg. Que appel & Queperre boom.  
Ang. Quince tree. Hisp. Membrillos. Ital. Me-  
lecotogne. Aduers. 430.



**Diosc.** Cotonea stomacho vitilia. urinam ciens. verum tosta mitiora habentur. prosunt celiacis, dysentericis, purulenta extusis, cholericis, praesertim cruda. maceratorum liquor, commode in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum asus, ptius orihopnoie salutarius est. decocto foveantur vulvae & sedes, si procident. Cotonea quae melle & conduntur, <sup>† Ead. Gal. &</sup> urinam movent. mel autem sibi constringentem illorum vim & inspissantem adsciscit. quae cum melle coquantur, stomacho atque origratoria sunt, sed minus inspissant. cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendam aluum; aut si stomachus astuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, praeduros henes, & condylomata. Fit vinum ex ipsius ex-  
<sup>\* Eader. Plin.</sup> pressis, sed quod perduret, quindecim sextariis succi vnus mellis adiungitur. alioquin, in acorem degenerat. Prodest ad omnia quae dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melinum vocauimus. quo vitum quories adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quae sane sunt rotunda, parua & odorata. quae vero struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vitilia. Flos & viridis & siccat. cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens quae adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis, contra citam aluum, & mensum impetus, in vino bibitur.

Plin. addit, Lanugo eorum carbunculos sanat, cocta in vino & illig. cum cera.

THVS. Aduers. 430.

**Diosc.** Primarium tenet in eo genere masculum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffusa statim ardens. Indicium verò fuluescit & colore liuet; sed rotundum industria facit ante. nam in quadrangulares formas dissectum scitilibus versant, donec rotunditatem contrahat. verum huiusmodi tunc tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocant, minus multo & sulcius. Est & genus aliud, cui amamita cognomen est, aliqui candidum: quod dum mollietur, masti. hes more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pinirefina & gummi. quod facile deprehendi potest: si quidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit. tunc verò statim ardet. idem maleficium odor prodit. Ad calcandum & astrigendum pollet. oculorum caliginem discutit. cana ulcera complet, & ad cicatricem perducit. cruenta vulnera glutinat, infranat quo cunctas sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat. ulcera quae cacothie vocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum. formicantes verrucas inter initia, impetiginesque; ex aceto & pice illitum, tollit. ambusta igni, pernionesque cum sullo adipe aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat. paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice medetur. ad reliquos aurium dolores cum dulci vino infunditur. inflammata à partu mamma cum cimolia & rosaceo magna vitilitate perunguntur. additur ad arteria viscerumque medicamenta. prodest sanguinis excretionis potum. sed in secunda valetudine hauustum insaniam mouet, & largius cum vino potum interscitur. In scitili mundo tunc crematur, flagrante glebula succen-



succensum à lucerna, donec exuratur. post perfectam vstionem operire oportet, vsque diu restinguatur. sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, vt in eius mentione mox ostendemus. alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullit, aut pinguitudinem vaporum emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

#### Thuris cortex Diosc.

Praefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admixto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem eiacularur. thuris modo vritur. & vis eadem quae thuri, sed validior adstringentiorq. Quare potu cruentis excretionibus, vulnus fluxione laborantibus, in pecto confert. ad cicatrices oculorum, & caua, sordescq. efficax est. totius scabris lippitudinibus auxiliatur.

#### Manna thuris Diosc.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thurs, sed invalidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant: sed haec igne deprehenduntur. Neque enim aquae suffitu aerium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit. & permixtum suauolentia balius virtus habet.

#### Thuris fuligo Diosc.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas in nouam fictilem ollam concauam imponito: & aereo vase in medio perforato, deteresa diligenter sorde, obtegito. alteram admoueto, ex altera eius parte aut viraq. subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si vrantur. & qua locus capax fuerit, glebularum alias supponito. & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito: donec sufficientem fuliginem videaris coegisse. Continuo tamen externa eramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur. ita enim temperato aris feruore, fuligo omnis inhaerebit, quae aliqui per leuitatem decidua, thuris cineribus admisceatur. Deterasa itaque fuligine, cinis cremari thuris seorsum substrahendus est. idem opus, quo ad satisfactum tibi videbitur, obendum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit: vlcera purgat. caua explet. carcinomaa sistit.

Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq. laechrymatis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Gal. Thus excalcacit ordine secundo, desiccatur primo, habet quoque adstrictionem pusillam. Sed minimum manifesta adstrictio est caddido: cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoque desiccatur, adeò vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum thus, & minimum habet acrimoniam. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multas est eius vsus apud medicos in hæmoptoicis, itomachicis, cæliacis, ac dysentericis non tantum ijs quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscetes, sed ex ijs quæ intrò in corpus sumuntur. Ramus eius tum succioris, tum calidioris est facultatis quam ipsum thus, adeò vt ad tertium vsque excessum perueniat. Habet verò etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine & expurgare & implere quæ in oculis consistunt vlcera videtur, velut & myrrhe, & styracis.

Coccus Insectoria. Cocco baphicos, Narbonensibus & Galloprovincialibus Vermillon. Hisp. Colcoia frutet dicitur. Gallis graine d'escarlade. Aduers. 430.



Coccus Insectoria.

Diosc. Vis huius spissandi, vulneribus neriisq. praefixis, conuenienter ex aceto † illitum illinitur. Gal. † alij cum oxymelite.

Eadem Gal. & Paulus.



Aquifolium  
sive Agrifo-  
lium.



AQUIFOLIUM sive Agrifolium, Rhuscus fil.  
Aquifolium Plin. Palurus 2. Lacuna. Angl. Ho-  
ly. Belg. Hulst. Ger. Waldheidel, vel Hecke-  
palmen. Gall. Hous. Hiss. Azebo.  
Ital. Aquifolio. Advers. 431.  
Radix cortex herniis medetur tritus & im-  
positus, vel alius commixtus.

ILEX ARBOR. Ital. Elici & Lecini. Hiss.  
Enzina. Gall. Yeuse, Eoule & chesne  
verd. Germ. Stenpalmen. Adu. pag. 431.



Quercus  
vulgaris.



Diosc. Aligneae glandes viribus quernas antecellunt.  
Aligneae radice cortex cum aqua coctus dum malleus intra-  
bescat, & tota nocte illius, denigrat capillos, prius cimolia  
terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus pro-lege Catam-  
bus sunt, & imbecillas membrorum partes roborant. tius lucus.

QUERCUS Vulgaris cum suis excrementis fungosa.  
Belg. Eikenboom. Gall. Chesne. Ital. Quercia.  
Hiss. Robble & Roure. Angl. Oak tree.

QUER-



QUERCUS cum glande & musco suo.

BEDEGVARIS effigie  
Excrementum spongiosum & muscosum, siue Bedegvar  
& Quercu. \*



QUERCUS perpetua fronde virens. Gall. Chesnes verdz.

Huius querceta in Gallofrancia oritur audio. Glandes nostraribus similes sunt, quales D. Chriophoro Plantino hoc anno ferendas misit eruditissimus D. N. Rache apud Lutetianos medicus & chirurgus clarissimus, & stirpium omniumque Naturæ opum, ut si quis alius, gnarus.

\* E quercubus Romano agro collegi.

Antiqui cuiusdam est: Quercu instar Ledi pullulantis meminerunt excrementum quod purgat & adstringit summo opere.

Quercus, glans. Aduers. 431.

DIOSC. Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber qui corticis & ligno intercedit. quædam tamen putaminis glandis subiecta decoctum ex ijs datur dysentericis, catarracis, sanguinem excreantibus, tinnitum in pefso, sæmminus fluxione vulua laborantibus subijciunt. Glandes eosdem effectus exhibent. vimam cium. capitis dolorem & flatum in vrbum sumpta pariunt. resstunt esitata venenatorum ictibus. decoctum earum & corticis cum lacte vasimopotum prædest contra toxica. irrita cruda, inflammationes illius leniunt. ad duritias quas cacœrbe vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia conueniunt.

Folia omnium tula & vitia tumoribus profunt & imbecillas membrorum partes roborant.

CIR.



CERRIS Plin. maiore glande.  
Aduers. 431.CERRIS Plin. minore glande  
& calyce mollius echinato.

CERRIS glans immatura.

CERRIS Theoph.



Valerandus Donrez Iustinopoli Venetias rediens ramulos Quercus duorum generum asportauit, quibus me donauit. Vterque Quercui nostrari admodum assimilatur, folio & ligno, sed glandes ipsi ramo inhaerent. Vni qui minor, calyx hispidus & molliter echinatus, illicis subpar; alteri vero glandes praegrandes calycem habent echinatum, ambitu squammis praeduris sibi mutuo incumbentibus, horridum, semicono Laricis longe maiore, cuius nonnullam similitudinem retinet. Valde crassus est, interiore sui parte lenis; glans quam claudit, nisi magnitudine differt; folia autem maiora, eadem alioqui Quercui. Huius speciei obseruasse memini publica via qua itur Pefaro Romam in conuallibus celsissimas arbores, alibi minus obuias nec valde notas; e cuius tamen praegrandi & duro calyce glandes non exerebat, sed claudebat, forte quia immaturae erant. Huiusmodi folia & glandes anno 1561. liberalissimè communicauit C. doctissimus medicus Lugdunensis D. Dalescampius, qui Cerrim Plinij me docuit.



*Hæc Cisti historiæ reponenda est proximè suas effigies supra Obseruat. pag. 551. & 552.  
qua operarum incuria fuerat prætermissa.*

**CISTVS** folio Lauendulæ plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed breuibus ramis, & foliis conferim nascentibus, angustis, incanis, sapore adstringente: flores parui, non multum à Lauendulæ superiore differentes, albo colore: semen non obseruaui.

**EST** hic frutex adeò Lauendulæ similis, ut nisi odor & sapor prohiberent, pro Lauendula sumi possit: & certè quas plantas sine flore primùm conspexi, pro Lauendula habui, ideoque negligebam, donec floribus quos in plantis aliis conspiciebam admonitus, diligentius obseruarem.

Hunc ego solummodo Valentino regno inueni aridis & petrosis locis quarto à Valentia miliari, Aprilis initio.

**CISTVS** folio Samplici, planta fruticosa est, multos tenues ramulos proferens: folia in his parua, quasi rotunda, incana, Samplico similia, minora paulò, & dorso eminente, cum quadam aciditate & falsedine adstringentia: flos in summis ramis copiosus, candidus, villis & staminibus luteis, ut in reliquis Cisti generibus medium florem obtinentibus, quinis foliis constans, quorum medium macula ex purpura nigricans occupat: capitula exigua lini ferè, trigona, in quibus semen minutum Hyoscyami, ex nigro candicans siue cinereum continetur: totus ille oblongus ramulus qui florem & fructum sustinuit, arefcit eo maturo, ut in singulis Cisti generibus.

Primùm hunc inueni in Castella veteri, supra S. Martin del Castañal: deinde copiosum in Castella noua circa Caraíejo, & toto Batico agro inter Tagum & Anam flumina.

Hispani *Quiruêla* aut *quiruêla* appellant, communi ferè cum Ericæ minoris vocabulo, quoniam fortè inter Ericas recensent.

**CISTVS** folio Thymi, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, quæ magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præter quàm circa summitates, in quibus conferim nascuntur exilia admodum, viridia, Thymi æmula, gustu adstringente: florem summis ramis superiori similem, minorem, neque maculis insignitum fert: semen non obseruaui.

Hic mihi solum conspectus est extrema Baticæ parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat: potest tamen & aliis locis nasci.

**SUPERIORIVS** haud dubiè coniungendæ sunt etiam quas hîc subiiciam, cum & forma & Cisti feminae 3. classis. sapor respondeant.

**PRIOR** exigua est planta, tenuibus virgulis lignosis, & humi sparsis prædita: foliis Helyanthemo vulgo dicto similibus, minoribus tamen, omnino candicantibus, adstringentibus: flores extremis ramis insident, quinque foliis constantes, & staminibus in medio, ut in Helyanthemo, colore nunc albo, nunc pallido: semen in capitulis triangulis lini, exiguum, rufum. Radix lignosa & fibrosa.

**ALTER** à priori non differt tum magnitudine, tum ramulorum exilitate: flores item & semen similia: sed folia omnino angusta & tenuia, Cisto foliis Thymi respondentia, gustu etiam adstringentia, acerbâ, & incana.

Frequens est vtraque plantula agro Salmanticensi, vbi *perdiguera* ab incolis appellatur, quòd perdisces iuxta eam frequenter sese voluent, & puluerent.

**AD** primum genus referenda est ea planta, quam nonnulli Helyanthemon Plinij esse volunt, alij Helyanthemon. Panacen Charonium, foliis hyssopi vulgaris ferè, hirsutis tamen & adstringentibus, quam Germani, Panax Chironium. quòd locis incultis inter Ericas nascatur, & foliis hyssopum æmuletur, *Henden pillop* appellant, cuius Consolida aurea. flos aut albus est, aut pallidus, aut aureus; idè vulgo herbariorum Germanicorū Consolida aurea nuncupata.

**EST** & alia quædam plantula his congener, in vinetorum Salmanticensium marginibus, & Granatensi regno mihi obseruata, longioribus & rarioribus virgulis, rectis, foliis amplioribus Helyanthemo, & virentioribus, gustu adstringente: cuius flos superiori forma similis, pallidus, aut albicans: semè minutum rubescens in capitulis trigonis duplo quàm Helyanthemi maioribus.

Castellani *turmeræ* vocant, Granatenfes *yerna del quadrillo*.

**ALIA** item inuenitur in sylua Madritiana, secundo ab vrbe Lutetia miliari, ad Cisti genus referenda, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis tenellis, non admodum ramosis; foliis oblongis, angustis, hirsutis, virescentibus, quæ cum ramulis per Caniculæ æstus humore quodam pingui & lento sunt obsita, flos pusillus, quinque foliis constans, ut Helyanthemi, pallido colore, & macula punicante insignitis: capitula tenella admodum, triquetra, semen pusillum & cinereum continetia.

Annua vtraque est hæc postremò descripta, aut altero à sato anno floret, deinde perit.

Florent verò omnes isti Cisti eodem quo mas tempore, & semen etiam ad maturitatem perducunt.

**SUNT** autem omnes perpetuo folio: sed eorum flos admodum caducus, statimq; senescens: radices duræ, lignosæ, diuise, in diuersa tendentes.

QUERCUS pumila fructus specie, fronda  
 Ilcis molliore.  
 Robur quinta Clusij.

GALLA maior.  
 Robur secunda Clusij.



Hic subiicienda Quercus pumila siue Robur quinta Clusij, ad eam humilis, ut raro pedē magnitudine superet: glandoso semine amarulento, & calyce laui: frequens oritur prope Vlyssiponem solo arenoso.

Knäus. GALLA. Aduers. pag. 432. Gal. Galles. Germ. Galloepffel, &  
 Eychocffel. Hisp. & Ital. Galla, & bughala.

DIOSC. Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, solida, nullo foramine peruiua. altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, qua efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. trita excrescentia in carne, fluxiones gingivarum & vna, atque oris ulcerationem colibent. nucleis, dentium caruernis indutus dolorem sedat. cremata carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extrineta, sanguinem supprimit. decoctum quibus incidere expedit, efficax est & contra vuluas procidentes fluxionesq; ca; illos demittit. aceto aut aqua macerata. dysentericis caliacisq; cum vino aut aqua tria conuariantur illinuntur, aut bibuntur. obsonius addi debent.

GALLA maior.

Robur secunda siue pumila Clusij, humanam altitudinem non excedens, copiosas, & pergrandes gallas ferens ramis ipsis inhaerentes, grandioribus frondis incisuris, & in sinuatis anfractibus.

GALLA



GALLA maior altera.  
Robur angustifolia Clus. 3<sup>a</sup>.

Foliis Ilicis Aquifolij sed maioribus, aequali par-  
te candicantibus.



GALLA minor. Aduers. pag. 432.  
Robur 4<sup>a</sup>. angustifolia, siue minor Clusij.



Galla minor sine tuberculis, quales in officinis  
vulgatissimæ prostant: caudice contorto, magis que  
rugoso.



FAGVS. Aduers. pag. 433.  
Angl. bech tre. Germ. Buchbaum. Belg. Bue-  
kenboom. Gal. Fau. Hiss. Haja. Lusit. Faya.  
Ital. Faggi.

Diosc. Quercus generi assignatur, & consimile  
munus obit.

**CASTANEA.** *Aduers.* pag. 433.  
*Angl.* Chestnut tree. *Germ.* Kesten. *Belg.* Castanie.  
*Scot.* Gal. Chastaignes, Marons & Chastaigners. *Ital.* Castagne.

**CASTANEA equina.** *Aduers.* pag. 433.\*



**Diosc.** Adstringunt, glandibus similes effectus praebeant, praesertim tunica qua carnem & corticem media, intercipiat. Caro his qui Ephemerum biberint, conueniens est.

Adstringit & liccat ut ceterae glandes. calida primo ordine & sicca.

Gal. Inter omnes glandes principatum tenent, solaeque tylluestrum fractum alimentum memorabile corporibus praebent.

Tardè transeunt, & difficulter concoquuntur crudae potissimum. flatus gignunt.

\* Matthiol. Anhelosis, tussientibus, & sanguinem reicientibus equis, plurimum auxilij afferre ait.

**SAMBUCVS** *Aduers.* pag. 434. *Angl.* elder tree. *Germ.* Doller, & holder. *Belg.* Ulier. *Gallobelg.* Suyn, & sehu. *Gal.* Sulyer, & Sufeau. *Hisp.* Sauço, Sabuco, & caninero. *Ital.* Sambuco.

*Sambucus alba.*

**Varietas.**

In Belgij nonnusquam agris & hortis acinis albis variat.

**SAMBUCVS & Ebulus.**

**Diosc.** Eadem viriusque facultas, & par vsus, exiccans scilicet, aquam educens, \*† stomacho nocens. Folia oleum modo decocta, pituitam & bilē purgant. Quin etiam teneri caules in olla cocti, eadem praestant. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicis † auxiliatur. Eadem modo pota viperarum moribus succurrit. Vulus emolliet & aperit,

\* ead. Aegin. & Plin.

† ead. Plin.

1 ead. Plin.



aperit, & quæ circa eas sunt affectiones, decocta cum aqua in fessione corrigit. Fructus cum vino potus eadem efficit. Illius capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum polenta illita inflammationes mitigant. Ambustis etiam & canis moribus illita succurrunt. Profunda & quæ in cavernas dehiscunt vlcera agglutinant. Podagricis, cum taurino hirci. nove adipe illita,\* auxiliantur. • Ead. Plin.

\* † Polypodij ritu visceribus molesta.

EBULVS. Advers. pag. 434.

Angl. Walwurt, & bloedewurt. Germ. Attech.

Belg. Gadpck. Gal. Hyeble. Hiss. Yezgos.

Ital. Ebulo.

SAMBVCVS foliis laciniatis.



Gal. Vraque exiccandi, conglutinandi, modicèque digerendi facultatem obtinet.

Plin. addit: Succus cerebri collectiones, priuatimque membranæ quæ circa cerebrum est lenit infusus. Acini poti acetabuli mensura vrinam mouent. Cortex † interior tritus, ex vino albo potus, aluum soluit. Ebuli fumo fugantur serpentes. Tenerum cum foliis tritum in vino potum, calculos pellit. Impositum testes sanat.

† Corticis radicis infusum ex vino Ellebori modo purgat supernè & infernè. Decoctum verò longè imbecillius est purgando.

SAMBVCVS foliis laciniatis.

Foliis minutim dissectis in Belgij hortis variat, cæteroquin fructu, flore, & ligno à vulgari non ab-  
similis.

EE 3 MALA



**MALA** Diosc. *Aduers.* pag. 434.  
*Angl. & Belg. Appel. Germ. Apffel. Gal. Pommé.*  
*Hisp. Mançana, Manfanás. Ital. Pomi.*

**PYRA** Diosc. *Aduers.* pag. 434.  
*Angl. pear. Germ. Bsp. Belg. Perre. Gal. Poire.*  
*Hisp. peras. Ital. pere.*



**Diosc.** Folia, flores & germina, cum omnis mali, tum maxime Cotoneæ, adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest; maturis vero longè secus. Ex his verna bilem gignunt; nervos omnes ledunt; inflationes pariunt.

Mellei saporis dicuntur S. Ioannis.

Melimela ventrem mollunt, & ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent, estuosa: ea multis dulciora mala vocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vitia. Sistunt alium. Urinas euocant, malis tamen coroneis inualidiora. Sylvestria mala similia sunt vernis & adstringunt. sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt.

**Gal.** Malus non omnis eiusdem est naturæ velut nec eiusdem fructus: quippe quædam mala dulcia sunt, quædam austera, nonnulla acida, alia extrema exoluta & aquea, & sanè in istis aqueum exuperat: ut temperies eorum sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenum frigidum. In austerris vero tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sit quoque succi, cortices, foliaque arborum inter se dissident. Itaque si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio influxione repercutere, ac stomachum, ventremque exolutum ac languidum laborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & gliscientes remittere. Sed hæc iam ad curandi rationem attinent: proinde ea citius relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus extremities frigidaque insit humiditas, vel hinc liqueat, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac veritate ferre possit, verum acefcant corrumpanturque universi. Solus enim cydoniorum & struthorum (utpote quæ propter vincentem adstrictionem minus cæteris sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: tamen ipse per se non ita durare queat.

**PYRA.**

**Diosc.** Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata; decoctum è siccis & crudis ipsa alium sistunt; ieiunos estata ledunt. Achras pyrastri genus est, quod in dissimile maturefcit. Vm pyro adstringentior habet, & ad eadem conuegit. Stringit etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis essu acriter his auxiliatur, quos fungi stranguant. Ait fungus, si sylvestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Gal. Proinde sanè maiora volucria glutinât, fluxumque repellit

**Gal.** Pyri folia pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars una terrea est, alia aquea, cæterum utraq; frigida: tum alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego ex illis vulnus glutinasse me memini, cum aliud ad manum esset nihil.

MESPILVS



PILVS  
OR.EVONYMOS  
Theophr.NA vul  
lorum  
ellij.CORNVS  
Muscic.



**MESPILVS.** *MESPILVS. Aduers. pag. 434. Angl. Medler tre, & medeler. Gal. Nesples, & Nesplier. Ital. Nespeli.*  
**DIOSC.** *Pomum esu adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit.*

*Gal. subdit: Quin & in germinibus & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur.*

*ΕΥΩΥΜΟΝ. ΕΥΩΝΥΜΟΣ Theoph. Aduers. pag. 435. Carpinus Theoph. Tragi.*

*Angl. spindel tree. Gal. Fulin & bonner de prestre. Ital. Fusano.*

**Varietas.** *Fructu albo variat in horto D. Dilhij. Pecori veterinariae uocuum quidam asserunt.*

**VIVRNA.** *VIVRNA vulgi Gallorum & Ruellij: an Viburnum Virgilij? Aduers. pag. 436.*

*Germ. klepnermalbaum Tragi. i. Fraxinus minor.*

*Gallorum hanc Viurnam admodum lentam asserit familia & literis illustis Carolus de Houchin, D. de Longastre harum peritissimus.*

*Vbi adstrictione opus est, Viurna commendatur Myrthi, Pyrastræ & Rhœi ritu.*

**CORNVS.** *CORNVS. Adu. p. 436. Angl. Cornet tree. Ger. weischhirschen, Cornelbaum, kurberrbaum, Thierlinbaum. Belg. Cornelheboon. Gal. Cornier, & Corniole. Hisp. Cerezo syluestre, & Cornizolos. Ital. Cornai, & Cornioli.*

*DIOSC. Baccas fert oliua modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ\* colorem repræsentant. In cibo adstringunt; profuuius alui atque dysenteriae salutaris, siue in edulio, siue in defruto exhibeatur. Muria ut oliuæ coniunguntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, imperigini conuenienter illinitur.*

**Varietas.** *\* In Neruiensi agro fructu albo, aut ceræ colore yisitur.*

*† Addit Gal. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valenterq; deficcant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum: at paruis vulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis deficcant.*

*CORNVS femina. ΟΝΔΥΡΑΥΕΙΑ Cordi. Aduers. p. 436.*

*Germ. spindelhortz, & faulbeer. i. fusaria.*

*Cortarius expetitus frutex Cordo, Hartriegel Tragi.*

**CERASIA.** *Aduers. pag. 436.*

*Angl. Cherries. Germ. hirschen. Belg. krieken. Gal.*

*Cerises, Hisp. Cerefas. Ital. Citege.\**



*Gummi ceratorum.  
\*uti & nuciei.*

*\*DIOSC. Alio vitia sunt, si viridia sumantur, eadē siccata illa sistunt. Gūmi quod cerasi resudarūt, cū vino diluto, tusti vetusta medetur. colorē cōmendat. visum exacuit: appetentiam inuat. Idem\* ex vino potum † calculosis auxilio est. Gal. Quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minùs grata stomacho sunt. Contra austeria acida pituitosis excrementosisq; stomachis sunt apta. Siquidem austeris magis deficcant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communē omnibus viscosis & mordacitatis expertibus medicaminibus facultatē obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est. † Propriè autē siquidē quod quidā scribunt, verū est; calculis vexatos adiuuat; nā sic illi tenuiū partium inesset facultas quædam.*

**CERASA**



RASA  
pedicu-  
lata.



CERASA ra-  
cemosa. Ad-  
miff 436.

CHAMAE-  
CERASVS.  
cel. 436.



CHAMAE-  
CERASVS  
Alpigena.  
Aduer 436.

Xylosteum  
alterū quo-  
rundam.

Chamaecerasus  
Cordi.

FF

CERA-

*CERATA vno pediculo plura.*

In viretis quibusdam Belgij videntur. flos item duplicatus est.

*CHAMÆCERASVS.*

Eiusdem item cum Cerasis generis Chamæcerasus: in hortis Belgicis densè fruticat: omnia Cerasi similia habet; sed quadruplo minora. fructus austerus est.

*CERASVS autum Herbariorum.*

Virgas mittit plures cortice pullo, vestitas homine procero longiores, ramulis brachiatis, folijs Cerasi atro-virentibus, & floribus nō absimilibus, pariter albis, sed congestis, virentes acinos initio, deinde rubentes per autumnum nigros Rhamni infectorij pares, relinquentibus: sapore & odore iniuncundis.

*ALNVS nigra. Faulbaum Tragi. FRANGVIA.*

Diel haudt Brabant & Spokenhaudt.

Aduers. 440.

*Alni nigrae*  
inscriptio  
Aduers. 440.  
reddenda se-  
quenti capi-  
te, & dele-  
tux auella-  
na.  
Alni inscri-  
ptio proximè  
Betulam in-  
scrienda,

*sepe aquas se-  
cessu detur-  
bante.*



Trag. Huius arboris flauus & medius cortex cum aceto tritus, & scabiei illitus intra paucos dies illam sanat & exsiccatur. Estq; hoc experimentum singulare. Idem cortex in aceto decoctus putridis dentibus collutione prodest; nam & dolorem mitigat, & dentes ipsos purgat.

PARNVS



PRUNUS syl. Germ. & Belg. Stehedeorn.  
 Angl. Slootree. Ital. Pruni saluatici.  
 Aduersf. 436.

PRUNUS domestica; xxxviii. Germ. Pflaumen  
 boom. Belg. Prupmboom. Hisp. Ciruelo & An-  
 drino, fructus autē Ciruelas & andrinas. Gal. Pru-  
 nier & frūne. Ang. Plumtree. Ital. Prune sulino,  
 Fructus verò sulino.



Diosc. Prunus arbor est nota, cuius pomum estur. sed stomachum malè habet. aluum molli. Syriaca pruna  
 & precipue que Damasci gignuntur, exiccata stomacho vitia sunt. aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta  
 collitione & gargarizatu ruam, ginginas, & consillas † fluxione laborantes reprimunt. præstant idem sylvestriumi † Eadē Gal.  
 prunorum bacca, post maturitatem exiccata. cum sapā verò decocta, stomacho vitiores redduntur. aluumque magis  
 adstringunt. Gummi prunorum agglutinat. potum in vino calculos comminuit. Ex aceto quoque illitum, li benas m-  
 fanium sanat. lege Prune-  
 pesches, &  
 petche noix.  
 142. 436.  
 lin. 40.

Eisdem adfert Gal. rationes quas de Cerasis & pomis.

MESSE. Prunæ aluum subducunt, & alterant: sed alba, flaua, rubra, minùs sunt medicamento-  
 sa, quàm nigra: quorum quæ mēsa, id est, dulcacidia sunt, alterant magis. Dulcia verò soluunt largiùs,  
 tamen vtraque alterant & soluunt, magis scilicet & minùs. Damascena verò, & Armena, vtrumque  
 præter cætera præstant: humida tamen potius quàm sicca, quæ etiam in ventriculo promptiùs quàm  
 sicca corumpuntur. Dulcia calido frigido temperata, aut paulò frigidiora, humida ordine secundo:  
 mēsa, id est, dulcacidia frigida, principio secundi. Omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant: bilem edu-  
 cunt, ob hæc duo biliosis, tum febris, tum morbis aliis sunt salubria: stomacho nocent, pauci  
 sunt alimentis: quia imbecilliter soluunt, eis additur præsertim infusione. Tamar Indi, cassia fistula,  
 manna, violæ conditæ. Ex horum succo fit syrupus, & ex carnibus electarium in eadem salubre. Ar-  
 menoi truncum pruni arboris locis duobus vel tribus palmæ vnus interuallo tenuiter perforant: im-  
 missibque scammonio lauant; pruna ob id purgantiora euadunt. Dahur succo seu decocto cum fac-  
 charo ad libram vnam.

ARMENIACA *Malus*, Gall. Abricos, Angl. *Abre-  
rach tree*. Hisp. Aluarcoques, & Aluerchigas,  
Catalon. Albercocs. Ital. Bacoche, Armeriache  
& Albricochi. Germ. *B. Johans Pferlich*.  
Belg. Broeghen Berlen & Abricogs. Adu. 436. \*

PERSEA.  
Aduers. pag. 437.



\* DIOSC. *Supradictis stomacho utiliora sunt.*

SEBESTEN officinarum. MYXA Aegineta.

Aduers. pag. 437.

AEGIN. Facultate prunis consimilis. Serapio. epotum decoctum calidæ tussi confert, pectus lenit,  
catarrhum calidum mulcet: ardores urinæ & vesicæ reprimat.

Catarrhis, mordacibus biliosisque defluxionibus arcendis accommodatur. Ventrem subducit.

PERSEA.

Perseam nunquam nobis visam fatemur. De qua egregiè disseruit C. Clusius in sua rariorum stir-  
pium doctissima Historia in hunc modum.

CLVS. Valde rara etiam hæc est arbor, cuius ramum hæc expressum damus: nam solo Valentino re-  
gno vnicam arborem vidi, in monasterio Divæ Virginis, cui cognomen de IESV, primo ab vrbe Va-  
lencia lapide. Ex America eò delata fertur.

Potro hæc arbor Pyro similis est, in latum diffusa, perpetuæque coma virens, ramulis ex viridi  
palescentibus. Folia illi Lauri laurofoliæ, parte superna virentia, inferiore verò cinerei coloris, firma,  
neruis



neruis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore commendata, cum adstrictione linguam mordicantia. Flos Lauri ferè, copiosus, racematim compactus, pallidus, sex foliolis constans. Fructus per initia Pruno similis, deinde successu tēporis pyri in modū oblongus; nigro colore, jucundoq; sapore: nucleū cordis effigie continet, gustu Castaneæ, aut dulci Amygdalæ haud absimili. Vere florentem conspexi, Autumno maturum fructum ferè intellexi à Cl. V. D. Ioanne Plaça Medico & Professore Valentino, qui mihi illam quo nunc dixi loco demonstrabat, incolisq; Mamay dici assererat: tamen si qui nobis Americam descripserunt Hispani, aliam atque ab hac diuersam arborem hoc nomine insigniant. An verò hæc arbor Veterum Persea sit, nec ne, dispiciendum est.

Theophrastus lib. 4. de Plantarum histor. cap. 2. Perseam in hunc modum describit:

Est in Ægypto alia quoque arbor Persea dicta, aspectu magna formosaq;: folio, flore, ramo, totaq; figura, potissimum pyro vicina, nisi quòd altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructū abundè parit, omnique tempore perficit: quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas E tessarum statu conficitur: reliquum crudiusculum auferunt & recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidas, nucem intus quemadmodum prunus continens, verum longè minorem mollioremq;: carnem vehementer dulcem, suauem, concoctuq; facilem: nihil enim eos qui comederint tenet. Radice arbor exsuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine multitudineq;: materiem robustam, & visu gerit decoram, atram vt lotus, &c.

Simili modo, isdemq; ferè verbis eam Plinius describit lib. 13. cap. 9. sub Persicæ arboris nomine, voces ipsas cōmiscens, quas tamen lib. 15. cap. 13. apertissime sejungit & distinguit.

Persicæ, inquit, arbores ferè & cum difficultate transire, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primū ab Ægypto earum fuerat hospitium. Falsum est venenata cum etuciati in Persis gigni, & pœnarum causa à regibus translati in Ægyptum, & terra mitigata. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis rubescensibus similis, nec extra orientem nasci voluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter simplicia translatam, sed à Perseo Memphi satam: & ob id Alexandrum illa coronari victores ibi instituisse, in honorem atauit sui. Semper autem folia habet & poma, subnascensibus aliis.

Qui sanè locus, eorum sententiam apertissime refellit, qui Perseam arborem cum Persica malo eandem esse cerebrosius asserere volunt, vtracumq; vtriq;que arboris historiam diuersissimam esse.

Persea item meminit Strabo Geograph. vltimo, perpetuam illi comam tribuens, & fructū pyri magnitudine, figura oblonga, amygdalæ modo putamine inclusum, & corio.


Eiusdem meminit & Galenus lib. 2. de Aliment. eamq; se Alexandriæ vidisse asserit: meminit & aliis locis.

In eo omnes cōueniunt, vt Persea perpetuam comam tribuant, oblongum fructum, inclusum amygdalæ putamine & corio. Hæc quam exhibemus arbor perpetua quidè est coma; folia aut & flore laurū magis refert quam pyrum: fructus etiam oblongo est, sed qui myxis (qualem ei Plinius loco jam adducto tribuit) aut oblongis prunis similior sit, quam amygdalis, & colore (vt Plaça referebat) nigro, non herbido. hætenus Clusius.

Diosc. Arbor fructum ferens cibo idoneum stomacho vtilem. Arida folia in farinam redacta illitu sanguinis\* eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exuiosam esse, translatamque in Ægyptum, mutata natura in cibos receptam.

\* Gal. quia adstringentem vim modicè participant.

IVIVÉE Arabum. ZIZYPHA Græcorum, زيزف. Palurus Africanus Theoph. Lotus secundus Polybij. Crategus forte Theoph. Linguagotticè Guindoulier. Gall. Iuiubier. Hisp. Açofefo. Ger. Brustbeertlin & Gooßbeertlin. Aduers pag. 437.



Consimile  
minus cum  
Sebestimis  
prunis obit.

Paliurus.

Rhamnus  
prouispe-  
cia alter.  
Clusij.RHAMNVS  
secundus  
Diosc. Mon-  
speliensis  
dictus, est  
priorus Rhā-  
nus Diosc.  
Clusio.

PALIURVS. Aduers. 437.

Diosc. Paliurus frutex \* cognoscitur aculeatus, \* durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. quod potum \* tussis opitulatur. vesicae calculos \* comminuit. serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam vim habent. quorum decoctum potus alium \* sistit. vnam trahit. contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumores, que omnes discit, trita & imposita.

† Gal. tantam obtinet incidendi vim.

Gal. adeoque digerunt ut phymata curent, quæ quidem r. o admodum phlegmonode sunt & calida.

RHAMNVS primus Diosc. creditus. Aduers. 438.

Oleaster Germanicus Cordi. Bataui Depe belien. id est acini purgatrices.



Rhamni prioris speciei alterum genus Clusij.

Huic differentias duas annexit Clusius: quorum prior humili frutice sed densa fruticat, folijs item angustioribus & minoribus, candidioribus, & magis carnosiss; floribus eiusdem cum illo formæ, sed purpureo plane colore. Terrium recensimus in Lycij mentione.

Diosc.



**Diosc.** Omnium folia igni sacro & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. fama est ramos huius valuis fenestrisque impositos, veneficia depellere.

Gal. desiccet & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente, proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Ceterum ad hæc teneris vitendum est folijs.

**PYRACANTHA Herbariorum.**

*Aduers. pag. 438.*

Videtur, ut sedulus Muttonus annotavit, Rhānus tertius Diosc. & Theoph. frondibus semper virentibus minimè deciduis ut Paliuri, siue Rhamni tertij recepti & agniti, nigrioribus, latioribus, & quadam tenus rubentibus: fructu Asphodeli simili (ut vertit Ruellius). Quæ omnia sanè adumbrant nostram Pyracantham.

**SPINA** Infectoria, Cerui spina Cordi.

Nerpruym & bourgelpine Gallobelgarum.

Belg. Ghijn besien & simplicher besien boom.

Germ. Weghedoornbeer & Creutbeer.

*Aduers. pag. 438.*

**BERBERIS.** Crespinus & Spina sancta quorundam.

Angl. Berberis. Germ. Erbset, Berüch, Hautich.

& Paisselbrey. Belg. Dauselboom. Gall. Espine.

agretterid est Oxyacantha. *Aduers. 439.*

*Oxyacantha Diosc. Fuchs.*



Baccas pulvere aluminis inspergant pictores, terunt, biduum macerant, succum exprimunt, & in pensilibus vesicis recondunt.

**BERBERIS.**

Aestuanti stomacho, bilem euomentibus, & microcolis febribusque biliosis, indeque ortis morbis, non modò acinis, sed etiam folijs perutilis. Sitim arcent; dysentericis auxiliantur. Radices lixiuo Bugia. macerate crinem flauum efficiunt, cuius cortex officinis Bugia vocatur.

*Engelm. 29.*  
here acc-  
mole corni  
& name Malt  
51.

**MYRO-**

MYROBOLANT quinque.  
Aduers. 439.




Myr. flaua.



Myr. mīca.



Myr. bellerica.



Myr. chepula.



Myr. emblica.

MYROBOLANI EMBLICAE.



MESVE. Sunt etiam hæ medicamēta bēnigna. Tāntum enim abest, vt purgādo vires deiciant, vt etiam cor, ventriculū, hepar, corpūque reliquū confirmēt, cogēdoque in vnum roborēt: quare vnica his incommodant, qui sunt obstructiōibus obnoxij, has enim excitant. Præterea medicamentis acribus, & purgādo exoluentibus, vt scammonio perfectē corrigendis rectē miscendæ. Id enim contraria tum substantia, tum qualitate frangit, & purgationem iuuat. Citrinæ autem colore sunt multum citrino, in viridem inclinante, graues, quia magnæ, & carne multa densæ: si frangitur gummosa, ossē exiguo. Cepulæ subnigræ in rubrum inclinant: quod maiores, eò meliores, carne multa, ob hæc etiam graues, ad eò vtraque mergantur. Indæ sunt nigræ, magnæ, carne densa, graues, tamen exolles. A quibus notis quod harum singulæ absunt longius, eò sunt deteriores: hæ autem omnes sunt frigida primo gradu, sicca secundo. Siccando enim excrementa partium putrida valēter absumūt, mollesq; partes & laxas durant, & densant, multaque adstrictione cogunt. Cor, stomachū, reliquūq; ventriculū, & hepar roborant: quapropter exhilarant, colorem cutis, odorem oris, & sudoris cōmendant: corpus floridū & iuuenile diu tuetur, tremori cordis conferunt, hæmorrhoidibus commodant. Purgant ventriculū bile, ab eaq; tertianā, & reliquas febres biliosas & ardorem extinguūt, præsertim citrinæ. Hæ enim præter cæteras sunt cholagoga: ob id calidis & biliosis naturis salubres. Eadem omphacio, vel aqua rosarum, vel succo fæniculi macerata, confricata, oculum tergent, intemperiem eius calidā auferunt. Earum quoque puluis tenuissimū, per se quidem delachrymationem stringit, oculum ab humore multo laxiorem iuuat: cum mastiche verò, vlcera siccando sanat. Cepulæ verò sunt phlegmagoga; ventriculū purgant, & roborant, rationalē animæ partem vegetant; visum [ & sensus alios ] aeuunt: præsertim conditæ, hydropi & febribus diurnis conducūt. Nigræ melancholiam purgant, & bilē vstam, tremori, tristitiæ, lepræ, quartanæ, & cæteris affectibus melacholicis prosunt, coloremque cutis viuidū efficiunt. Quia verò dictæ myrobolani omnes obstructionem promptē excitant, in corpore obstructioni opportuno, & villis ventriculi, & intestinorum faciliē adhaerentes, ceu rugis quibusdam ea exasperant, non dentur obstructioni obnoxiiis: aliis verò dētur cum diureticis.



ticis, vel infusæ sero lactis, vel succo fumaræ, vel cum absinthio, agarico, rhabarbaro, spica nardi. Oleo autem amygdalarum dulcium, vel rosato, vel violato, vel sesamino imbutæ & conficæ, vel cum amygdalis dulcibus, aut visis passis, aut harum melle tritæ, vel cum cassia, vel manna, vel tamarindis, vel violis conditis, vel alio leniente medicamento sumptæ, ventriculorum & intestina leniunt, & citò per ea lubricant, etiam si quibusdam aliter visum est: neque amplius his adherent, aut rugas inducunt.

Datur citrinarum tritarum pulvis à drachmis duabus ad drachmas quinque: maceratarum verò expressum, à drachmis quinque ad drachmas viginti. Indarum & cepularum pulvis à drachmis duabus ad drachmas quatuor: expressum infusarum à drachmis quatuor ad drachmas decem.

Veruntamen harum decoctum promptius, & valentius obstruit, quàm maceratarum expressum. Assæ item ipsæ minùs purgant, potentiùs constipant, & adstringunt, & his magis vitæ. Harum quoque tritarum pulvis quò tenuior, eò vehementius adstringit: maceratarum verò expressum, minùs adstringit, omnium maximè purgat. Cepulæ verò conditæ purgant quidem minùs, partes nutritorias roborant magis: non conditæ contrà.

#### De Emblicis.

Emblicæ parum frigent, siccant ordine primo, pituita etiam putri ventriculorum purgant, eumque & cerebrum, nervos, cor, hepar, & partes laxas constringendo roborant: ob id tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt, furorem & latratus eius cohibent, vim animæ rationalem augent, calorem viscerum insigniorem, & inde natam sitim extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, graues, ossium paruorum: largiùs purgant, & rugis ventriculo minùs incommodant, si aqua in sole macerentur, donec humectatæ tumescant. Postea expressæ multa biduo macerantur, igni lento coquantur: vbi coctæ refrigerint, mellis albißimi parte quarta exceptæ reconduntur: aromatis quoque cinnamomo, xylaoë, cardamomo, croco, gallia, & similibus nonnulli coniungunt.

#### De Bellericis.

Bellericæ etiam sunt benignæ, & roborant: frigidæ primo gradu, siccæ secundo, cætera emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multa & densa carne, graues.



Thamar-Indorum semina recentia Cassia quadamtenus, sed maiora & angulosa, quadrati pisi ritu, compressiora tamen è siliquis carnosius & multis fibrarum cirris implexis Phaseli nostratis maioribus, quales in G. Driefsch, & aliis instructissimis officinis Antverpiæ prostant (minimè è palmulis aut eius generis fructibus, ut multi credidere, qui non viderunt) in horto fata præfati G. Driefsch nobis perelegantes arbusculas sesquipalmares sæpè pepererunt, quæ hyemis rigoribus periere. Eorum vnum hic pictum damus. Foliis vtrinque ex aduerso oppositis ordine secundum costæ aut pediculi longitudinem Osmundæ vocatæ filicis modo digestis, virentibus, & gustu acidis, quæ contrahuntur & clauduntur per imbres etiamque ad Solis occasum.

Picrocolis saluberrimi. Infusione purgant biliosum humorem extinguntque, & pituitam incidunt, attenuant: si ium delent: exsiccant & refrigerant initio tertij ordinis.


*De Tamar Indis.*

MESVE. Medicamentum excellens ac innocens, frigidum siccum ordine secundo. Ob id humorum acrimoniam reprimat, bilem purgat, eiusque & sanguinis feruorem furoremque compescit, febres acutas lenitione egentes & icterum sanat: si ium ac omnem ventriculi hepatisque ardorem extinguit: vomitum sistit.

Ne ventriculum frigidum lædant, cauetur mistis hunc roborantibus, spica nardi, mace, mastiche, succo absinthij, fœniculi, apij, intybi, cichorij agrestis. Actionem verò eorum imbecillam intendit serum lactis caprini; vel succus samariæ, lupiæ salictarij. Macerantur autem sextuplo prædictorum liquorum, vel aliorum simplicium, aut compositorum, ut triplicis granati: deinde manibus fricantur, post semel feruescunt: postremò colantur, donec porio sit liquida & clara, præsertim quando flammæum calorem citius extinguere libet: quando etiam rosæ, santala præcipuè, citrea, spodium simul cum his macerata, ut potentius refrigerent. Non colati quoque dantur, quando potentius ardor ille extinguendus est.



## GVANABANVS Scaligeri fortè Clusio.



Thamarindis annectere visum fuit simili de dote, consimiliq; vsu, graphicè à C. Clusio nostro, stirpium rariorum huius ætatis doctissimo depictos Canabanos: vt cuius folia laurina, renis effigie semina durissima, & Thamarindi albidam saporis medullam fragilem, præsciccam, sæpius degustarim, etiam apud Guilielmum Driesch pharmacopœum & ciuem Antuerpianum peritissimum.

*Clusij autem verba hæc sunt ex Ouiedo.*

GVANABANVS procera arbor est, & formosa folio eius Medicæ mali quam Limoneram appellant, virente: fructu pulcherrimo, mediani Melonis magnitudine, qui tamen interdum in capitis pueri crassitudinem excrescat. Cortex huic fructui viridis, & qui certis quibusdam squamis distinctus videatur, vt Strobilus, lenioribus tamen neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit neque crassior quàm in piris. Caro candidissima saporisque delicatissimi, quæ faciliè pinguedinis lactis instar, in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna, Cucurbitarum seminibus aliquanto maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & per æstus vrilis. Nam tamen quis integrum Guanabanum deuoret, nullum inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies. Hæc Ouiedus.

CETERVM hic Guanabanus diuersus est ab eo, cuius Cæsar Scaliger lib. de Subtilitat. aduersus Cardanum exercitatione 281. partic. 6. meminit in hunc modum.





GVANABANVS arbor est Pini stipite, procera, folio magno oblongoq; fructus Melonis magnitudine: cortici color viridis, splendor Cydonij, digitalis crassitudo. Caro intus candida, dulcedine lactis coacti, semina continet phasiolacea. Hunc enim esse puto qui superioribus annis ex Æthiopiarum Mozambique Antuerpiam allatus est. fructus crassus, sesquipedali longitudine, cui densus durusque cortex tenui molliq; vt in cydoniis, sed viridi lanugine obductus, aliquot per longitudinem excurrentibus venis, siue potius sulcis vt in Melonibus. Extrema parte in mucronem definit: superiori verò,

qua videlicet è ramis dependet, pediculo inhæret firmo duro & fibroso. Continet hic fructus pulpam candicantem, qua *Æthiopes* in febrium ardoribus vtuntur sitis sedandâ gratiâ; iucunda etenim aciditate prædita est. Hæc siccata friabilis est, sic vt digitis trita in pollinem resoluatur, remanente tamen perpetuo aciditate. Per hanc sparsa sunt semina renibus, aut *Anagyridis* legitimæ fructui similima, nigro tamen colore nitentia, ac ex vmbilico fibris quibusdâ suspensa, vt in eius icone conspiciere est. Hæc terræ commissa plantulas folio *Laurinis* simili protulerunt, sed quæ subsequente hyeme perierint.

*Placate ex Clusio in suis doctiss. Garcie versionib.*

*Fructus HIGVERO apud Clusium.*

*AHOVAY THEVETI apud Clusium.*



**C L V S.** Porro apud me seruo ex huius fructus aut huic similis seminibus, quibus exempta est medulla, lora duo filo xylyno contexta: alia item bina è fructu quodam anguloso. Constant verò singula lora duplici aut triplici filorum xylinorum ordine reticuli modo contextorum, è quibus dependent vacui fructus eo quem exprimi iussimus modo. His *Canibales* ad crura alligatis in suis saltationibus vii solent, quemadmodum apud *Mauritanos* atque etiam *Hispanos* nolarum & tintinnabulorum vsus est: mirum etenim quantum hi fructus ex mutua collisione sonitum edant. Posterius meminit *Thevetus* cap. 36. Singular. *Americæ* in hunc modum.

**AHOVAY** nomen est arboris fructu venenoso & lethali, magnitudine vulgatis *Castaneæ*, candido, forma literam *Græcæ*  $\Delta$  representante. Huius nucleus præsertim est venenum, quod alter alteri in mutuis odiis & dissidiis, præsertim verò viri vxoribus irfensi, aut contra vxores viris indignatæ propinare solent. *Peregrinis* sanè nullo modo eum fructum recens collectum communicant, atque ab eius enam contactu liberos suos arcant, nisi cui exemptus sit nucleus. Eo etenim exempto, fructu pro nolis vtuntur, quas è cruribus suspendunt, tantumq; sonitum edunt, quantum tintinnabula aut nolæ nostrates. Arbor ipsa *Piri* magnitudine, folio ternos aut quaternos digitos longo, duos lato, semper virente: cortex ligno candicans. Recisi rami succum emittunt lacteum. Arbor præcisâ terribilissimum spirat odorem: quam qd causam nullius est vsus, imò ne igni quidem struendo idonea.

**AHOVAY** *Theveti* mihi communicauit præclarus vir *D. Ioannes Dilsius*, qui *Clusio* acceptum referebat.



Lotys arbor. Aduers. pag. 439.  
 MonsPELLIENSIBUS ceteriq; Linguagottis Micocoulter.  
 Gallis nonnullis Alyfier. Hist. Almez. Ital.  
 Bagolauro, & Perlaro.

GVAIACVM Pat. unum. Vera Lotys Theoph.  
 Aduers. pag. 439. & 440.



Diosc. Alium fistit bacca: ramentorum ligni decoctum suae potu suae infusione dysentericis, ac seminis fluxione vulvae laborantibus, auxilio est. Rufat capillos: citam aluum cobibet.

#### GVAIACVM INDICVM.

Omnibus morbis ex humore praesertim frigido ortis medetur: amaritudine, acrimonia, incidit, attenuat, terget, vacuat, sudores mouet, cutis vitia emendat.

ECCER. EBENVS. Gal. Ebenennoir. Hist. Ebano.  
 Lege HEBENVM, siue XYLALOEVS Officinatum.

Diosc. Ebenus optima habetur aethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factitij cornu lauore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. sufficit in uicido odore supra carbones, sine summi radio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad coctem flauescit. Altera est indica, internatis segmentis candidantibus, & modice fuluis, nem frequentibus maculis. ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebena vaneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas asfulas resoluuntur, nihil mordacitatis in eustu. nec redolentia in cassia. Caliginē oculorum absterget. ad veteres de-

res destillationes, pustulasq; mirum in modum pollet. si quispiam sacula ex eo coticula collyrii utatur: melius proficiet. ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentave vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrea ipsa excolant, reliqua; eundem in modum peragunt. alij pro vino aqua vtiuntur. Vritur in fictili no-uo, donec in carbonem redigatur. lanatur plumbi vsu modo, & ita sicca scabroq; lupatidibus conducit.

φινύρα. TILIA fœmina Theoph. Aduers. pag. 440.  
Angl. Linden tre. Germ. & Belg. Linden. Gal.  
Tillet, & Tilleul. Hisp. Teja. Ital. Tilia, & Teio.

TILIA mas. Aduers. pag. 440.  
Germ. Steinlinden. à natalibus.  
Ital. Tilia Maschio.



Tilix cortex commansus & appositus vulnera glutinat. Tumores pedum, decoctum foliorum discutit. Dissectæ arboris è medulla defluens humor illitus alopecii medetur; defluentem capillum re-  
tinet Matth. Aqua è floribus distillata epilepticos pota, sua peculiari dote, iuuat.

πτελία. VLMVS. Aduers. pag. 440. Angl. Elm tre. Germ. Ulmen, Iffenholtz,  
Aiffenholz, Lindbaff. Belg. Olmboom. Gal. Omeau. Hisp. & Ital. Olmo.

Dioscor. Vlni & folia & cortex & rami, vim habent spissandi. Folia vrita ex aceto ad lepras efficaciter  
illuntur. vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fascie loco intorqueatur. nam in lori morem flecti potest.  
crassior cortex in vino aut aqua frigida vniatim potus, puitas trahit. fracta ossa celerius solidescunt, si decocto fo-  
liorum corticis aut radicis foueantur. humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit,  
faciemq;





faciemq; splendidiorem praeſtat. qui dum ſiccatur, in animalia abit, quae culicem formam gerunt. Folia cum teneſcunt coſta, golerum more ad obſonia verſantur.

CARPINVS. Aduerſ. pag. 440.  
Gallobelgi Carne. Ital. Carpino.



Subſtantia Vlmi duriori, cortice ſubalbicante.

BETULA. Aduerſ. pag. 440.  
Germ. Birkenbaum. Belg. Berckenboom.  
Gallobelgi Bouleau, & bouillet. Ital.  
Betula, Bettola & bidollo.

Cremati ligni emanans liquor oculorum albugines & cicatrices delet.



ALNVS

Καλδρα. ALNVS inscribatur lin. 45. Aduers. pag. 440.  
 Germ. Erlenbaum. Belg. Elzen. Gal. Aulne. Ital. Alno.

Humor terebello caudice perforato emanans diutius epotus ad comminuendos vesicæ & renum calculos Matthiolo commendatur. Cutis vitia emendat, & nitorem conciliat: collutione oris vlceribus medetur.

AMELANCHIER Gallorum. Aduers. pag. 441.  
 Auelancques Linguagottorum.  
 Lege an eadem Alifler Gallorum?

CORYLVS persimilis Alno. Angl. Hazel tre.  
 Aduers. pag. 441.



# CORYLVS.

Auellanæ concoctui difficilēs; quemadmodum ceteri duriore nuclei.

Diosc. Stomacho infesta sunt: ipsa tamen trita & in aqua mulsâ pota, tussi veteri medentur. Tosta & cum exiguo piperis pota destillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia aut adipe vrsi perunctus alopecis capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, casiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, peruiso sincipite.



ΠΟΥΛΙ, POPVLVS alba. Gallobelgi Obeau, Aubel, ou Obel. Belg. Abeelboom. Hisp. Almano blanco. Germ. Abielbaum, Doppelbaum, weißalberbaum, weißpopel weyden. Ital. Popolo bianco. Aduers. pag. 441.

αΐψυ. Π. POPVLVS nigra. Gall. Peuplier. Angl. Asp, or poplar tree. Ital. Popolo negro. Germ. Aspen & popel weiden. Hisp. Alcornoque. Belg. Populier & Populacre. Aduers. 441.



Diosc. Potus albae populi cortex viciae vnius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum feti tradunt, si cum mulino rene bibatur. folia quoque cum vino post purgationes pota, idem prestare produntur, repens foliorum succus vtiliter aurium dolori instituitur. Pilulae quae primo foliorum partu exiliunt, illae cum melle oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albae populi & nigrae, particulatim casum, & salcis steroratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

#### POPVLVS nigra.

Diosc. Populi nigrae folia cum aceto illita magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quae in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymam populorum commemorant quae in Padum amnem defluit, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysophorum, id attritu incundum odorem spirat, & aurum colore nititur. tritum potumque stomachi ventrisque fluxiones sistit.

Populus Ly-  
bica.



Populus. POPVLVS Libyca. Ital. Popolo montana.  
Libyca Plinij, Crataegus Theoph. quorundam.  
Quibusdam Gallobelgis Nicope: Flandris item  
Stiepenboom. Aduers. 441.

ARBOR Iuda. Siliqua fl. Clusij.  
Acacia Matth. Aduers. 441.

Floribus albis variis.

Morpha h. exocarpus. MORVS candida.  
Morus celsa officinarum.  
Germ. Maulberbaum. Angl. Mulberry tree.  
Belg. Moerbessen boom. Gall. Meurier.  
Hisp. Moral: Mora autem Moras.  
Ital. Moro. Aduers. 441.

MORVS.



lege facta  
dulcia in  
& h. 18.  
pocini; &  
pauo ante  
lege simili  
ri Item in  
constitut  
ne.

MORVS



## MORVS.

**Diosc.** Morus arbor nota est: cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem prestat mori succus, decoctus autem areo vase atque insolatus, adstringentior redditur. facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myrica semine, tri, & thiare. Immatura mori poma siccantur, rufaq; acinorū rhois vice obsonijs miscentur, ut cothacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit, latus ventris tinea excutit. his quoque auxiliatur qui aconitum hanferunt. Folia trita ex aceto illita, ambustus igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & ficinigræ frondibus simul coctis in aqua celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus cōtra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorū ture dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisæ, facta in ambu scrobe, succum emittit, qui post tridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est, tubercula discutit, & aluum purgat.

## SYCOMORVS.



Sycomorum aliqui etiam fycaminum, id est morum, vocant. cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs mori. pomum ter aut quater anno fert: non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. quod non maturefcit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nasitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus: vbi prouenit facundo restibilisq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo vtile est, sed perquam exilem prabet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, ante quam fructum ferat, eximitur, lapide ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lachryma excipitur: quæ siccata & in pastillos coacta scissili vase reponitur. Vis succi emollit. vulnera conglutinat. discutiit collectiones coctioni repugnantes. bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerrimè terebinthem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlnus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu pruni magnitudinis, multo dulciore, supradictis cætera similis.

*Sive; Fici. Germ. & Belg. Feiguen Baum.  
Gall. Figuier. Angl. Fige tree. Ital. Fico.  
Hisp. Higuera. Aduers 442.*

CHAMÆPICVS.



**Diosc.** Fici matura recentes stomachum laedunt. aluum solvunt. sed facile contracta ab eis fluxio sistitur. sudorem euocant papulisq; stim sed ant. calorem restingunt. siccis natura excoalsaciendi. vires alunt. sed suum magis stimulat. aluo vtilis. rheumatismis ventris & stomachi contraria. gutturi autem, arterie, renibus, vesica, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima. seruesacta cum hyssopo & pota, thoracem purgant. tussi veteri, diuturnisque pulmonum vitii conueniunt. aluum molliunt tusa cum nitro & enico, dein manducata. decoctum arterie & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. cum hordeacea farina cataplasmatibus miscentur. & in muliebres foras cum feno græco & prisa. ceterum cum ruta cocta torminibus insuntuntur. cocta illisq; duricia discutunt. parotidas & furunculos emolliunt. panos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri aut calce addita. cruda si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. cum malicorio, pterygia purgant. cum atramento sutorio, deploratis serè tibiarum fluxionibus, & caeterib; vlceribus medentur. quin & cum vino decocta addito absinthio & hordeacea farina, vtilissime hydropicis illinuntur. cremata cum cerato sanant perniones, pruriginis, sonitussq; si cruda terantur. & sinapi liquoreq; aliquo excepta auribus instillantur. Tam silyestris, quam satius sicilactis succus coaguli modo lac contrahit concretumq; dissoluit, vt acetum exulcerat corpora. meatus aperit. soluit aluum. vuluum recludit cum detrita nuce b Eadē l. græci potus. menstrua ciet cum luteo. cui appositus, aut Thyrrhenica cera podagrorum cataplasmatibus cum farina feni græci & aceto vtilis. lepras, lichenas, vitiligines, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manantia, cum polenta expurgat. instillatus plaga, percussus a scorpione, venenatorum illibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur. prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum additus. verrucarum informicationes tollit cum adi. e. circumlitā in ambum carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis silyestris fici: qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi



et si exprimuntur: & siccatu in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorij medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni facilem afferunt decoctionem. lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spatula loco moveantur.

\* omnia ferè eadem Plin. \* Plin. eadem subdit: aut potius cum amylo pilos quoque detrahit, palpebrarumque scabiem emendat. \* Plin. aduersatur crabronum, vespriumque, & similium venenis, priuatim scorpionum.

ἑρπείοι, Groff. Advers. 442.

**Diosc.** Groffi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ, illita strumas nodosq; omnes emolliunt. cruda formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt. illita cum sale & aceto vlcerâ in capite manantia, epimyctidas, & surfures sanant. iis fisco exuberationes, & genarum scabritia perscrantur. Nigra ficus solijs cauliculisq; candida vitilignes perunguntur. faciunt ad canum morsus, & vlcerâ quæ ceria, id est fauos, vocant. Groffi cum sylvestris papaveris foliis ossa extrahunt. furunculos cum cera discutunt. contramuris atanei morsus, & scolopendra venena, cum erug & vino illita, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam sylvestris quàm sativa lixiuium, crematis ramorum cauliculis: quod subinde macerari opus est & inueterascere. siquidem inter caustica intelligitur. Gangranis prodest, namque expurgat & consumit quæ excreverunt, eodq; sic vtendum est: Spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & influxiones vetustas, & sinus cuniculati exedentes, magrosq; instillari conveniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atq; emplastra quæ cruentis vulneribus iniunguntur, enema vocant. bibitur ad discutendum sanguinem concretum. & contra præcipitationes, rupta, convulsa, cum cyatho aqua recenter colatum, addito olei exiguo. cæliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest. nervorum vitij, convulsionibus commodè illinitur ex oleo, vrpote quòd sudores moueat. aduersus gyphi potum & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiua, præsertim quærum, omnia tamen adstringunt.

Syce. Ficus arbor.

**Gal.** Ficus arbor calidæ tenuiumque partium temperaturæ est, seu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum uterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut vehementer abstergit, sed & vlcerat, & ora vasorum reserât, & verrucas quas myrmecias vocant, eiicit, sed & purgare potest. Porrò ficus agrestis, quam erineum Græcè (Latine caprificum) nominant, tum opus, tum succus ad omnia quàm sativæ valentior est. Sed & cradæ earum aded sunt calidæ, tenuiumque partium, vt carnes bubulas duras, si coquendis adiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

Syca.

Ficus.

Gal. Ficus aridæ vim habent exalfaciendi ordine primo etiam cōpleto, aut secundo incipiente: habent verò etiam partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt quæ tubercula dura concoquant: statim verò etiam ea digerunt. Atq; ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obtinent. Sed & decoctū earum eiusdem vtique naturæ est. Verum vbi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: vbi verò plus digerere, hordeacea; panis horum in medio. Sed hæc magis sunt propria tractatus De medicamentorum compositione, & rationis curandi: verum in præsentiarum hæc de ischiadibus nouisse sufficit. Porrò scire oportet, quòd quæ pinguioribus sunt, magis possunt concoquere: quæ verò gustu acrioribus, magis tum extergere tum digerere. Cæterū quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentiâ, sed & facultate. Porrò ficus virides comestæ propter admixtam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen alium utraq; tum humidæ, tum siccæ. Porrò ficus caprifici acris & digerentis facultatis sunt: sic etiam domesticarum grossi, Græcè vocant ἑρπείοι: inest enim illis nonnihil etiam succi ex ficu arbore.

\* ran.  
calci.

**PLATANVS.** Gall. Plane. Ital. Platano. Germani incognita.

Advers. pag. 442.

**Diosc.** Tenerrima Platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilula in vino potæ, Serpentium morsibus auxiliantur. Excepta autem adipe, igni ambusta sanant. Insidens foliorum pilularumque lanugo oculos & aures offendit.

Gal. Platanus humidioris frigidiorisq; essentia est, non ita multò quàm symmetra. Proinde folia viridia trita & illita, non obscure phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex autem & pilula magis desiccantem vim obtinent, vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulæ verò cum adipe ad vlcerâ ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamen desiccatorium & absterforium efficiunt, vt cum aqua lepras sanet: per se se autem illitum, ob humorem nimium vlcerâ vetera & sordida. Vitandus est pulvis folijs arboris insidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriam offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque lædit, sicut sanè etiam visum & auditum, si in oculos aut aures incidit.


Acer maior  
Cordi.lege frequen-  
tior. lin. 39.

ACER maior Cordi. *αμβροζιον* Anguillara.  
Gall. etiam Plane, quasi 1 latane. Ital. Pie d'oca  
& Platano aquatico. Aduers. 443.

SORBUS terminalis Plin. Aduers. 443.  
Crataegus Theoph. Anguill.



Oxyacantha.



OXYACANTHA. *Cynobatos* Tragi.  
Hisp. Espino de maiuelas. Angl. Gaudthornre,  
& May. Aduers. pag. 443.  
*Sorbus aculeata* Cordi. Spina appendix Plin. Gesnero.

Diosc. Huius bacca potu aut cibo alui profluuium  
& abundantiam seminarum sistunt. Radix illita aculeos  
& spicula extrahit. Abortu fieri tradunt, si ter radice ven-  
ter, aut sensim feriatur, aut perungatur.

Varietas. Angusto, & ipsa bruma nonnusquam  
in Anglia florer, alioqui non absimilis.

Gal. Arbor vi Pyro syluestri similem habet spe-  
ciem, ita & facultates micimè dissimiles: quin &  
ipsi fructus Pyri quidem syluestris prorsum & ab-  
solutè auste rusest; Oxyacanthæ autem tenuium  
partium est, & modicè incidit. Porro arboris huius  
fructus Pyri syl. similis non est, sed Myrti potius  
fructui. habet verò & nucl. os. Ceterum non tan-  
tum efus, sed & bibitus omnes fluxionum affectus  
cohibet & sistit.

SAMBVCVS



**SAMBUCUS** aquatica sine rosea. *Lycostaphylus mas* & *semina Cordi*.  
Belg. Gelbetroosten. *Aduersf.* 444.

**AMOMVM.** *Aduersf.* 444.

**Diosc.** Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illucum fronti, doloris sensum auferit. inflammationes & meliceridas concoquit, discutitq; iuuat quos scorpium percussit, ex ocimo illitum. & podagricos confert. inflammationes oculorum viscerumque lenit ex vna passa. ad vulvarum vitia in pestis, aut infectionibus vtile est. decoctum iocineri, renibus, podagrae, potu conuenit. Antidoto immiscetur, & preciosissimis vnguentis. Adulteratur herba amomo simili, quae amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu, nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quae ab vna radice integros surculos emittunt.

**MESPILVS** Aronia.  
Monspelienfis Pommez.  
Ital. Azaroli.  
*Aduersf.* 443.

**RIBES** Arabum: Gallic & Gallobelgic Grouseilles rouges & Grouseilles d'outremer. Ital. & Hiss. Ribes.  
Germ. D. Johans treubel & Treubtin. D. Johans beclin. Belg. Helbesien. *Aduersf.* 445.



lege Solania.  
lin. 12.

*Ribes Arabum.*

Gustus & vires Berberidi similes, ad acres alui fluores, suum & vomitus arcent. Angliæ vdis filiovis gaudet.

*Varietas.* Candidioribus folijs & ramulis Ribes in hortis Belgicis alitur, cuius acini dulces afferuntur. Apud nos floret, fructum tamen nullum edit.

ROSA

Rosa Hieric.  
contea.



ROSA HIERICONTEA. *Aduers. 445.*  
Folia parua Olee aut Monspelliaæ Phyteuma-  
tis, & flosculos albos, cauliculo palmari inharen-  
tes Bamiaë ritu, quatuor foliolis confatos Eryfimo-  
pates in alabastriculis oblongis haben.

CARDAMOM-VM.

*Aduers. 445.*

Diosc. Cardamomum optimum est, quod ex Co-  
magine, Armenia, Bosphoroq, detulitur. in India quoq  
& Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contu-  
max, occlusum, farctumq, quod enim huiusmodi non est,  
exoletum indicatur, & gustu acre, subamarum, & odore  
caput tentans. Excalfactoriam vim habet, potumq, ex a-  
qua facit ad comitiales, ischiadicos, rufes, nervorum reso-  
lutionem: item ad rupta, vulsa, tormina. latus ventris ti-  
neas excutit. Ex vino autem potum renibus, difficultati  
vrina; a scorpione ictis, neque non omnibus venenum vi-  
brantibus, auxilio est. Cum cortice radicis lauri epota dra-  
chma calculos comminuit. partus suffitu enecat. scabiem  
ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spissamentum  
additur.

Gal. Est & ipsum sanè facultatis admodum ca-  
lida, non tamen vsque adeò vt Nasturtium, sed  
quanto suauius magisq; fragrans est Nasturtio, tã-  
to & imbecilliori calida facultas inest. Nec enim  
vicerare idoneum est vel ipsum per se illitum: por-  
ro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis,  
qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter  
ploras detergit.


Cardamomum minus vulg.



Cardamomum minus vulg.



Cardamomum minimum.



Cardamomum  
medium



Millegrana  
Grana p  
diti. Adu  
pag 445.

PIPER



PIPER longum Monardi.

PIPER longum. Μακρὸν πικρὸν, Macropiper. Aduers. pag. 445. & 426.  
Angl. Long pepper. Germ. Lang pfeffer. Belg. Lange peper. Hisp. Pimienta.



Diosc. Vehementius mordet, subamarum relinquitur, antidotis & sberiactis expetitur.  
Gal. Humidius \* est: humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret.  
Calidum & siccum secundo ordine cum leni acrimonia & adstrictione.

\* De recenti  
intelligen-  
dum.

PIPER longum quoddam Monardi.

In doctissimis C. Clusij versionibus Monardi his verbis aliud Piperis longi genus describitur.

Toto continentis tractu in quo Nata, Carthago, & etiam in nono regno, magnus est usus piperis cuiusdam oblongi, quod maiore acrimonia præditum est Orientali, magisque aromaticum, & iucundiore odore spirat, quam Axi seu Capsicum; quin etiam præfertur piperi nigro, cum saporis, tum suauitatis causa. Altæ cuiusdam plætæ fructus est oblongus, crassitie quidem funiculi, at dimidij pedis longitudine, constans veluti multis granulis, circa pediculum oblongum & continuo ordine dispositis, seminis Plantaginis modo; quibus ademptis, pediculus nitidus conspicitur. Recens viridis est. Sole maturescit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

Lege VVA crispa. Aduers. pag. 445. Vitis precia Plin. Angl. Goes berry. Ger. Wegdorn, & Crutzberr.  
Belg. Dikehdesien, & Kresdesien Gal. Groiselier. Hisp. Vva crespa, sine Espina. Ital. Vva spina.



Refrigerat cum modica adstrictione. Viscerum æstus compescit; ideo febribus ardentibus viles saccharo conditi. Sanguinis & ventris eruptionibus opem ferunt. Folia tenera calculum & vrinas pelunt. Cum Berbere, Omphacio & Ribe consimile munus obit.

πόδov. ROSA. Angl. Germ. & Belg. Rosenbaum.  
Gal. Rosier. Hiss. & Ital. Rosa. Aduers. pag. 446.  
ROSA DAMASCENA.

ROSA sylvestris pomifera:  
Aduers. pag. 446.  
Belg. Tuinen-Rosen.



*Damascena varietas.*

Rosam Damascenā siue Prouincialem vulgi odoratissimam niuicis omnino floribus vel tantillo candore & rubore confusis, maximo prouentu aiebat Gandau D. Adrianus vander Gracht horum peritissimus, & studiosissimus.

Diosc. Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus foliis exprimitur, defectis sorsice vnguibus (sic appellantur candida foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in vmbra donec cogatur: & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuò versata, ne muceant, nève sitis in iis insideat. Arida rosas & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, rediunt estis, ac vulus, pinna illius aut infusus, eadem sine expresse iusa, precordiorum inflammationibus, humidis somachi vitiis, igni sacro illum prodest, sicis ac tritis femina asperguntur, misceri solent vulnerariis antidotis, atq; compositionibus quas anthemas vocant. Folia vrumur in calibephara. Flos qui in mediis rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergiur. Capita pota citam aluum, & craentas reiectiones fistunt.

Eadem fere  
Plin.  
ad oris med.  
ca men a con  
uenit Plin.

Commodior & efficacior Syrupus ex multis infusionibus in sole vti violaceus paratur.

Gal. Rosarum vis ex aquea substantia calida mixta duabus aliis qualitatibus, adstringendi videlicet & amaræ composita est. Flos earum magis etiam ipsi rosas adstringit, & proinde etiam sanè exiccato-rius est.

Sylvestris Rosa, & CANINA ROSA odorata. Aduers. pag. 446. Angl. Bredulche o; Heptre, siue  
Wetere tre. Germ. Wilder Rosen, & Heckenrosen Belg. Wilde rose. Gal. Esclentine  
Hiss. Rosa saluge. Ital. Roqo canino, Rose saluaticæ & canine.

Rosæ sylvestris & Caninæ fructus oblongi, cum teretes, tum orbiculati, & spongiosum villosumve excrementū in pollinem ducta, calculum comminuunt cum genistæ semine pota, vrinæ propellant, sanguinis profluvia sistunt.

#### ESGLENTINE.

Flore multiplici in hortis nostris variat.

Esclentine à sylvestri odore differt: Sponte oritur in Bathonia Angliæ proximis cellibus non procul ab adibus generosi viri D. Laurentij Huyde.

ROSA MOSCHATA. Nersin Serapionis Anguillare.



**RUBVS.** *Aduers. pag. 446. Offic. Morus bassus.*  
*Angl. Bramble bush, or black berry bush.*  
*Ger. & Bel. Bremen, & Biamen. Gal. Ronce.*  
*Hisp. çarça. fructus verò çarçamoras. Ital. Rouio.*

**RUBVS Ideus.** *Aduers. pag. 446.*  
*Angl. Framboise, & alpis, & Hindberry.*  
*Germ. & Belg. Pinnebamen. Hisp. çarça*  
*llamada Ideá.*



**Diosc.** Vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit. Ramorū decoctum, potu\* aluum sistit, & feminarum profusum, praeteris morsui accommodat. infusum, gingivas firmat. Orii vitii folia commanducata medetur. cohibet vlcera quae serpunt. vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus, remedia sunt. condylomatis & hamorrhoidibus folia illiuntur. cardiacis & stom. ubi doloribus, tria conuenienter imporantur. Caules cum foliis runduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia quae modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quā optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. sistitur aluus praematuri cibo, necnon flore in vino poto.

\* Eadem Plin. laborantes dentes firmat. Cinis crematorum vnam reprimat Plin. Eadem & plura apud Plin.

Eadem Gal. Radix praeter adstrictionem non paucam in se habet substantiam tenuem, propter quā etiam in renibus lapides comminuit. Folia, germina, flos, fructus & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura: Sed hoc inter se differunt, quodd folia mollia & recens nata plurimum in se habeant aquae substantiae, parum verò adstrictionis, eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas & alia oris vlcera sanāt. quā & alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies, partim ex terrea frigida essentia, & aquae tepida. At fructus si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, vti monstrauimus. Itaque ob hoc & ob modicam adstrictionem esui non infans est. At immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est ac excitatorius. Et sanè vtrique reconditur validius quā fecens desiccans. Sed & flos eandē vim fructui immaturo possidet. vtraque ad dysenterias, & ventris profluuium, tum robur deperditum, & sanguinis eruptionem idonea remedia.

**RUBVS Ideus.**

**Diosc.** Insuper eadem praeterea quae supradictis. Ceterū flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur. ignem sacrum extinguit. stomachicūq; ex aqua bibendus datur.

## ERICA quam multa differentia.

Multò plures Erica quàm priscis memoratæ varietates, præsertim in Gallia Narbonensi & Hispania conspiciuntur; quarum qui vnam nouerit, cunctas cognitas facile habebit: distant quippe fruticis proceritate, folio Myricæ, Iuniperi aut Laricis, & floris colore: non modò in Gallia, Angliæ & Belgij syluis, ericetis & strigosis desertisque locis, sed etiam in Gallia Narbonensi, Galloprovincia, Italia & Hispania frequentissima.

*Vulgatior humilis Septentrionalium & Meridionalium Erica folio Myrica descripta Aduers. pag. 447.*  
*Angl. Beth. Germ. & Belg. Hepts. Gal. Bruyere. Hisp. Queiro. Ital. Erica.*

ERICA pumila densè fruticans calyculata  
*Vnedonis flore. Erica 6<sup>a</sup>. Clusij.*

ERICA Iunifrifolia altera. Lusit. Lemerinha.  
*Erica octaua Clusij.*



Saxosis montibus Angliæ humilior tota, dodrantem vix superans densè fruticat, flore calyculato, longiore, Vnedonis ferè, hilarius purpurante: foliis Iuniperi exilioribus multò. Eius magna gliscit copia prope Bristolium ad collem vernaculè Brandon Heil vocatum.

*Varietas.* Albo flore D. Ioannes de Limoges, aliàs Nonnius, alit.

ERICA pumila Vnedonis flore albo.

Floribus albis variat Louanij hæc in horro C. V. D. Ioannis de Limoges, aliàs Nonnij.

ERICA pumila altera Belgarum. nona Clusij.

Non multum diuersa quæ multò frequentior in sabuletis sterilibusque agris Flandriæ & Brabantia, medio iunere quo Antuerpia Gandauum itur, paribus cauliculis & foliis non dissimilibus, sed breuioribus & hirsutis. Flores amœni purpurantes, simul compressi, Octobri etiam quæ hyeme persistent extremis ramis, vbi etiam gignit compacta lanosa capitula.

ERICA Iunifrifolia densè fruticans Narbonensis. Erica 2<sup>a</sup>. altera Clusij & Martb. 2<sup>a</sup>.

Quasi gaudeat aridis & squallidis speciosior, fruticosior, Romano, Tusco, & Narbonensi agro, cubitalibus, crassioribus, caudatis, comosis & prolixioribus foliis, Iunipero ferè paribus, flores edentibus calyculatos, venustè purpurantes, similitudine item Vnedonis, apiculis fibrarum ornatis.

ERICA



*ERICA luniperifolia altera.*

Altera extat apud Clusium non ita diuersa fruticosa cubitali ferè altitudine & tennibus ramulis qui terni semper circum maiores ex intervallis nascuntur; folia etiam similiter terna nascuntur, exigua quidem, sed latiora, inferiore parte nonnihil candicantia, hirsuta. Summi ramuli ad foliorum exortus verticillatim exornantur per intervalla ternis semper floribus æquali distantia inter se nascentibus & in vnam partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concavis prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurante. Arenosis Lusitanix locis oritur, floret Octobri, vt auctor est Clusius.

*ERICA baccifera, Erica septima Clusij.*  
*Camarinhera Lusitanorum.*

*ERICA maior flore albo, prima Clusij.*



*Erica pumila* nigriora positu terna cauliculos ambiunt folia, fructus aut bacca alba margaritæ instar norula subnigra inscripta. In syluis pedalis ramis fruticat, autumno colligitur fructus quem elitant mulieres & pueri. Gustu acido adstringente Lusitani Camarinhas vocant.

*ERICA baccifera Matth.*

Ad me missa ex Italia *Erica baccifera* arida planta, quam eandem cum Lusitanica existimabam, nisi monitus, Matthioli bacciferam *Ericam*: quia superiori admodum similis & fruticosa tota erat, rigidis ramulis Myrthi minoris similibus, foliis durioris Thymi angustis stipatis. Baccarum colorem, qui Matthiolo ex purpura nigricat, ob ariditatem non noui discernere.

*ERICA maior flore albo.*

Calidarum regionum indigena plerisque proueniens collibus Vallene sylvæ MonsPELLIENSIS, & ad radices montis Lupi, quarto à MonsPELIO miliari, vbi humanam proceritatem vt plurimum assequitur. Clusius eam inuenit in Lusitanie solitudinibus inter Vlyssiponem & Conimbricam celebrem eius regni academiæ, virgis duris ex rubro nigricantibus, folia exilia *Erica pumila*. Comosi flosculi venustè candicantes racematim totis summis ramulis.

<sup>1</sup>ERICA maior florib. purpurantibus. Erica 2<sup>a</sup>. Clusj.



In eisdem locis desertis huius altera varietas, eiusdem ferme magnitudinis; exilioribus tamen ramulis & foliis; floribus purpurantibus.

<sup>2</sup>ERICA maior floribus herbaceis purpurantibus. Erica 3<sup>a</sup>. Clusj.



In Grammōtia sylva, & iisdē natalibus foliis maiusculis & atrouitētib. quaternario itē sitū ceterarum ritu ramulos ambientibus, secundū quos flores erumpunt herbacei antequā explicantur, deinde diluē purpureasunt.

Ibidem loci huius speciei altera, flosculis herbaceis, sed racematim & spicatum coherentibus.

<sup>3</sup>ERICA scoparia, flosculis item herbaceis. Erica 4<sup>a</sup>. Clusj.



<sup>4</sup>Grammōtio item luto, ericetis, & plerisq; locis incultis binos cubitos æquat, & superat, densēq; fruticans, flores exigui herbacei secundū ramulos.

<sup>5</sup>ERICA quinta Clusj.



<sup>5</sup>Alteram Clus. adlit superioribus minore, cubitali tantū altitudine, gracilibus ramulis fruticantem, quos terni per intervalla ramuli ambiunt, ternis foliis admodū exilibus circa eos disposito quodam ordine & serie nascentibus; flores superiorib. paulo maiores, plurimi & cōfertī circum ramulos lōgis pediculis inhaerentes, colore purpureo obsoletere.

ERICA



*ERICA peregrina Brancioni.**ERICA Alexandrina Italorum.*  
*Sanamunda 3<sup>a</sup>. Clusij.*

Præter omnes hæc differentias, est quædam rarior species in vrceis pensilibusque hortis D. Ioannis Brancionis fruticans, cæterarum ritu, folio longiusculo & iuxta ramos flosculis purpurantibus, si bene memini, quaternis foliolis constantibus. Nescio unde delata, eoq; propter raritatem peregrinam appellauimus.

*ERICA peregrina altera, superius exhibitæ præ Vermiculato exiliori frutice Observat. pag. 207.*

Illi ferè similis, sed omnino minor & exilior, alitur etiam in fictilibus vasis D. Ioannis Dilfij, flosculis ex luteo herbaceis.

*ERICA. Aduers. pag. 447. Angl. Herb. Ital. Erica.*

**Diosc.** Eius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quàm coma serpentium \* idibus illitu mæderur.

\* Ead. Plin.

**Gal.** Digèrendi per habitum facultatem obtinet. flore eius potissimum ac foliis vtendum.

**H. Tragus:** Aquam è floribus distillatam colica laborantibus, præsertim si calor & sius adsint, vtiliter exhiberi expertus est: Eandem oculorum dolore tollere, & illorum dolorem mitigare.

Addit quosdam è recentibus, Ericæ floribus, fomenta & balnea sudorifica podagricis & paralyticis membris concinnare: persuadent namque sibi hoc pacto inueteratos impactos & viscosos humores, vnde morbus articularum oritur, dissolui & discuti.

*ERICA Alexandrina Italorum.*

Alexandrinam vocatam Ericam mittunt & obtrudunt Itali quidam peritiores peregrinitatis & notitatis titulo; cum tamen in Galloprovincia & Hispania maritimis potissimum eius facilis prouentus. Nos eam recensuimus inter varietates Vermiculati fruticis acris Observatonum pag. 207. & Aduersariorum pag. 163.

SANAMUNDA

SANAMVND A prima Clusij.

SANAMVND A altera Clusij.



Huius insuper duas differentias exhibet Clusius; quas quia non vidimus, & quia illi debentur, eius hic verba subiiciemus.

**PRIMA** multis cubitalibus ramis ab eadem radice fruticat obsequiosis, flexilibus, cortice exteriore nigrescente obductis, alium interiorem lentum & in tenuia fila se dissolventem complectente: folia Chamelæ æmula, multò tamē minora, breviora carnosaq; Tithymalo paralia aut Myrto proximè accedentia, sed hirsuta aliquantulū, circa ramulos cōfertim & serie quadam vt in Myrto distributa, gummosa si mordeantur, & gustu amaro, deinde admodum acri & adurente: flores inter folia Oleæ similes, oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteo: fructu (quemadmodum ex relatione accipi) Thymelææ ferè, sed nigricante colore, radix crassa, lignosa.

Frequens est regnis Granatensi & Valentino, vere florens, hoc est, Martio & Aprili.

**ISTIC** ab herbariis Sanamunda vocatur, à rusticis verò *mierda-cruz*, propter purgandi facultatem, cuius causa rusticis eius regionis adprimè in vsu est.

**ALTERA** ad cubiti altitudinem etiam fruticat, ramis lentis & flexilibus, cortice denso & carnoso intectis, qui (sublata exteriore cute) per vniuersam plantam, & præsertim circa radicem, Lini aut Cannabis modo in fila diduci potest: superiores ramusculi denforum confertorumque & lanuginosorum & veluti tomento quodam obditorum foliolorum comam pariunt, superiore minorum, & mucronatorum, gustu aliquantulum salso, sed tamen acri deinde & calido: hæc coma flauescens flosculorum Oleæ similium numerosa sobole exornatur: radix crassa & lignosa superiori similis.

Istius fructum non obseruari quoque, quandoquidem Februario florentem inueni petroso solo maritimis Beticæ, inter Calpen, & Estepona, & montibus Granatæ proximis.

**GRANATENSIBVS** Mauritanis Sanamunda vocatur, apud quos purgandorum corporum gratia magno est in vsu. Drachmæ etenim pondere cum decocto cicerum sumpta, mirificè purgat per inferiora.

Circa Calpen, vbi vulgò, *Eurhalaga* appellatur, nullo in vsu præter quàm exalfaciendis fornacibus.

TAMA-



*propius. TAMARISCUS. Hisp. Tamaray. & Gall. Tamaris. Ital. Tamarigio.*

*Germ. Tamariscen. Angl. Tamarisk. Aduers. pag. 447.*

Sponte vberè proeuent fruticantem Germanicam Tamariscum non procul ab arce Venetorum vulgò Citadella, inter Vincentiam & Patauium, legit Adrianus Beyerlince pharñacopœus Antuerpianus peritissimus.

DIOSC. *Myrica seu tamarix arbor vulgò cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructu quasi florem ferens compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, sylvestri cetera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter adstringentem gustu. quo conuenienter vitmur vice gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruenta excretioni in potu, & coeliacæ, & contra profusua seminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus. illic tumores inhibet. Cortex in eodẽm vsus adhibetur. Decoctum soliorum cum vino potum, lienem absorbit. ad dolorem dentium in collutionibus salutare: & mulieribus fluxioni vuluæ opportunis, in defensionibus, phthiriasi lendibusq; circumsumusum prodest. abundantiam seminarum sistit impositus † arboris cinis. potioris calices & caudice lienosis moluntur, quò datus in his potus proficiat.*

† Gal. admodum desiccatorie facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, pauxillam adstringendi.

Gal. abstergentis est ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictionem nonnullam. has ob qualitates facultatesq; admodum prodest leni indurato decocta in aceto aut vino siue radice, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat porro dentium dolores. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeo vt gallæ omphacitidi proxima sint, nisi quoddã acerbitas euident est in gallæ; sed myricæ fructui temperatura inest inæqualis. Immista enim est naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi: quod sanè gallæ non accidit. Attamen ubi galla fortè ad manum non erit, vt liceat ad omnia ad quæ illa vitmur, in eisdem & cortice.

Eadem Plin. *Ad lienem.* Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, vt afferunt, si ea alucis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum, potumq; dant in vasis ex ea factis.

*SABINA. Hisp. Sabina Gall. Sauinier. Ital. Sauina. Germ. Bebenbaum Belg. Saueboom. Angl. Sauin tre. Aduers. 447.*

*Genuina SABINA baccifera atrocerulea.*



*Genuina SABINA baccifera atrocarulea.*

Vulgatæ sterili Sabine, (quæ tamen flosculos ex herbido luteos promit) ortu totaque facie similia; sed folio paulò minus acuto minusque rigido & pungente. Bacca siue grano resinoso, Iunipero nostrati pari & concolori. Nostra vireta Belgica cultiora hanc alunt munere Ioannis Mutoni.

*SABINA baccata altera, grano item atrocaruleo.*

*CEDRVS phænicea altera Plin. & Theopb.*  
*Oxycedrus folio Cupressi aut Sabina maior Monspeliensis.*



Alterâ superiori coniungenda, ramulorum exilitate & foliorum lenitate duntaxat diuersa; mediâ inter Sabinas & Cedros phæniceas folio Sabinae aut Cupressi vocatas, videtur: sed folia tenuiora & delicatiora minimè aspera & pungentia sunt. Fructus Iuniperi minoris par, similis, & concolor. Natalibus gaudet montosis Calabriae & Apuliae, ni labat memoria.

*CEDRVS phænicea.*

Huius ternæ è sola magnitudine obsequantur differentia, vna ramis & folijs habitioribus magisque carnosiss, & baccis per totos ramos quadruplo maioribus, resinosis, phæniceis, nucem ponticam æquantibus.

CEDRVS



## CEDRVS Phœnicea media.



## CEDRVS phœnicea media.

*Juniperus maior folio Cupressi inter notha*  
Dioscoridi Clusio.

Altera superiori planè similis, sed omnia longè minora. flos omnibus luteolus, herbidus. ue caudex scaber contortus, multis ramis brachiatus. In Aduersarijs nostris Sabinam baccatam dixeramus: melius tamen quadrare videtur cum altera Cedro minori Theoph. Meo tēpore Monspelliensibus vocabatur *Oxycedrus folio Cupressi*.

*Cedrus Phœnicea minor.*

Testia eodem modo fruticat, ramis & folijs tenuioribus, granis item Sabinæ baccatæ altere paribus & similimis, sed phœniceis: Calidioribus montosis maritimisque omnes gaudent Galloprovinciæ, Narbonensis Galliæ Ceto mōte, & Apuliz.

## SABINA.

Diosc. Viriusq; folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant, & cum melle nigritia sordescq; repurgant. Sanguinem per vrinam eliciunt, partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant. vnguentis calfacientibus immiscentur & priuatim gleucino.

Gal. ex numero est fortiter exsiccantium, ideque secundū tres qualitates quas in gustu præsefert, similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica, seu odorator. Igitur huius quam modo dixi qualitas est particeps, nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, præterea amaritudinis & adstrictionis quā in cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiā potentius digerit. Itaq; glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam viriusq; illi tantum inest, vt etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter cupresso accommodari potest, maximè vbi rebelliores fuerint & diuturniores: nam hæ citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit.

¶ Porro essentia tenuitate menses quoque prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vrinas mouet: fetum etiam viuentem interficit, & mortuum eijcit. Est autem hoc medicamen tertij ordinis tum exalfacientium, tum desiccantium; ex numero eorum quæ vel maximè tenuium sunt partium.

Quidam etiam Cinamomi vice\* duplū eius subiiciunt. Est enim extenuandi & digerendi facultatis si eorum fuerit. \* Eadem Plin.

Addit Plin. Gallinacei generis pituita fumo eius herbæ sanari tradunt.

KK 2.

CYPRESS-

*arabogoss.* CYPRESSVS. *Germ.* Cipressen. *Gall.*  
Belgus, Anglus & Hisp. Cipres. *Ital.* Cupresso.  
*Aduers.* 446.

*apud.* IUNIPERI. *Germ.* Brennetbaum &  
Wergoltz. *Gall.* Geneure. *Belg.* geneuer boom.  
*Angl.* Juniper tre. *Ital.* Genepro. *Hisp.* Enebro.  
*Aduers.* 448.



**Diosc.** Refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passio & exiguo myrrha pota, vesicae rheumatisinis, & urina<sup>a</sup> dis-  
ficultati auxiliantur pilula autem ex vino tusa in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnea, aut si reijciatur san-  
guis, conuenientissime bibuntur. earum decoctum eosdem praeber effectus. tusa cum fico duritias<sup>b</sup> emolliunt, nariumq;  
polypo medentur. in aceto cocta & cum lupinis detrita scabros vngues eiiciunt. hernias intestinorum prolapsum erumpē-  
tes illitu reprimunt. Folia eadem praestant. Pilula cum arboris coma suffusa, <sup>c</sup> culices abigere existimantur. folia trita  
& imposita, vulnera conglutinant. sanguinem supprimunt. capillum ex aceto tingunt. illinuntur per se aut cum po-  
lentia ignibus sacra, ulceribus quae serpunt; carbunculis, <sup>d</sup> & oculorum inflammationibus. admota cum cerato stomā-  
chum roborant.

<sup>a</sup> Plin. Radix cum folijs trita potaque, vesicae & stranguriae medetur, & contra phalangia. Ra-  
menta pota menses eiunt, Scorpionum ictibus aduertantur.

<sup>b</sup> Item victoriat pondere in vino potus illitusq; cum fico sicca pingui, exemptis granis vitia testium  
fanat, tumores discutit, & cum fermento strumas.

<sup>c</sup> aduersus serpentium ictus bibuntur Plinio, aut si eiiciatur sanguis. <sup>d</sup> eadem Gal. tanquam  
absumat eos morbos facientem humiditatem. <sup>e</sup> Plin. exprimitur succus tusus cum semine, qui mi-  
xto oleo caliginem oculorum aufert.

Gal. Cupressi folia, germina, pilulae recentes & molles magna ulcera conglutinant in duris corpori-  
bus: ex quo, clarum est quod resiccandi vim habeat absque insigni acrimonia, aut caliditate, sicut  
certè & gustus testificatur. Apparet enim in ea levis quidem acrimonia, sed plurima amaritudo,  
multoque etiam plus acerbioris in tota planta. Tanta ei inest acrimonia, caliditasque, quanta satis sit  
deducenda in altum acerbiori, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat.  
Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depa-  
scitur, atque absumit: cum quae calfaciunt simul desiccantque, eas quidem quae contentae sunt absum-  
mant; ceterum acrimonia & caliditate alias attrahunt. Sic enterocelicos iuuat. Siquidem exsiccat, ro-  
burque addit corporis partibus praeter humiditatem laxis, ut pote cum adstrictio in altum subeat deducen-  
cente



te ipsa caliditate quæ admista est, cum seruante modum, vt deducere quidem valet, non tamen mor-  
dicare queat.

Plin. addit. serpentium ictibus tria folia imponuntur, & capitū cum polenta si à sole doleat: item  
ramici, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumorū cum cera illinuntur. Eadem tria cum duabus  
partibus panis mollis, & è vino Aminæo subacta, pedum ac neruorum dolores sedant.

## IUNIPERI.

**Diosc.** Iuniperi genera duo: altera maior, altera minor. vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mouet. ac-  
censa serpentes fugat. Baccarum nonnulla nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, alia nucem Ponti-  
cam aquare inueniuntur, rotunda, odorata, in mandendo dulces, subamara, quæ arceuthides etiam, id est bacce iuni-  
peri nominantur. Modicè calfaciunt & astringunt, stomacho viles. contra pectoris viua, tussim, inflationes, tormina &  
serpentium ictus efficacissimè bibuntur. vrinam cient. vnde ruptis, conuulsis, & vultu stranguulatis subueniunt. folia  
acrimoniam habent. ideo tam ipsa quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus, illini aut bibi prodest. Cor-  
ticis cinis cum aqua illius lepræ eximit, Ramenta ligni deuorata inter se iungunt.


**Gal.** Calida & sicca, vtriusque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non simili-  
ter siccus, verum in hoc primitiuerit ordinis. Iecur renescque † expurgat: nimirum crassos & glutino-  
sos humores extenuando, ea de causa salubribus medicamentis immiscetur, perexiguam corpori hu-  
mano alimentum ex eo apponitur. Astatim sumptus hic fructus stomachum mordicat, caputque cal-  
facit: ex quo illud quandoque implens, dolore diuocat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit.  
Vrinam ciet mediocriter.

† Plin. Stomachum, pectus & lateris dolores, inflationes languioresq; discutit, tussiles concoquit &  
duricias. Illitum tumores sistit: Item aluum baccis ex vino nigro potis, item ventris tumores illitis.

Gummi Iuniperi siue Vernix Scriptorum calfacit & siccatur ordine 2. suffribus hodie miscetur flu-  
xiones calidas à capite prohibentibus. magnæ Scriporibus & pictoribus vtilitatis & vsus. Succini vi-  
cem supplere volunt iuniperi.

**IUNIPERVS maximus, Illyricus, cærulea baccari.**  
de iur Diofcoridi maior Iuniperus aut congener.  
Aduers. 448.

**IUNIPERVS maior Monspel. CEDRVS phanicia**  
Matth. Ital. Cedro minore.  
Aduers. 448.



**Iuniperus**  
primus  
Diosc. Oxy-  
cedrus  
Theoph.  
Guiland.

**Iuniperus**  
scanda  
Diosc. cedria  
Theoph.  
Guiland.



**CEDRVS** Lycia. Aduers. 448.  
Arbor vita, & Taya Theoph. herbar. oxum.

**CEDRVS** Libani & Palaestina praelata.  
Ital. & Hiss. Cedri. Gall. Cedre du Liban.  
Angl. Cedre tree. Aduers. 448.



**Uge** Lyciam cedrum iam diu vidimus Lutetia in quibusdam hortis; folis Cupressi compresso semperuirentibus squamulis, loticatis capitulis, semen Laricis claudentibus; Belgici herbariorum viretis hodie notissima Arboris vite nomine. Eius folia tria suauissimum fundunt odorem.

**Diosc.** Cedrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, qua cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundius. Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odoris. qua dum effunditur, guttatum non dissipata coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conseruet, & viuientia corrumpat. quia ex causa mirrorum vitam aliqui appellauere, vestimenta quoque, & pelles eximie calfaciendi & siccandi doto, corrumpit. maxime ad ocularia medicamenta usus. quippe illius oculis claritatem affert, albugines cicatricisque, detergit. infusillata autem cum aceto, vermes aurium necat. cum hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosus sedat. cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. idem facit cum ex aceto collitur, peruncto ante coitum genitum abortiuum fieri constat. angina ea perunguntur. tonsillarum inflammationibus auxilio est. lentes pediculisque, illius enecat. cerastium osilius cum sale imposita subuenit. contra haustum leporis marini venena, in passio sumpta, auxiliatur. in elephantia, aut linctu aut perunctione proficit. pulmonum vlcera purgat: & si cyathus eius sorbeatur, per sanat. vermes et tinea subter indita necat, & parius extrahit.

Oleum Narbonensib.  
Cade vocatur.

Fit & oleum, a cedria separatum, dant coquunt, velleribus supra balneum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia vsus priuatiui vehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, boiumque per sanat. inhaerentes vicinos enecat. vlcera que ex tonsillis acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides tedi fractus vocantur. Calfactonaria vim habent. stomacho aduersantur. auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguria. menses eunt, ex polline piperis poti. contra haustum leporem marinum in vino sumuntur. serpentes fugantur. peruncto ex acipe ceruino, aut medulla corpore, in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet. qua eadem quapi ex fuligo vim prebet.

PINVS.



nvs  
 cauf.  
 . Germ.  
 hoitz.  
 dybau.  
 legunt  
 gho t.  
 Pinap  
 oom.  
 l. Dyne  
 Ital. &  
 o. Pino.  
 Pin.  
 erf. 449.

PINASTER.



vs syl.  
 .

Pinvs syl.  
 Mugo  
 Maith.  
 Adup. 449.



**PINASTER.** Germ. Wildtfechtenbaum. Gall. Pin Sauvage.

*Pinus syl. montana* Theoph.

Alpigena hæc in Pini arboris præcellæ æmulatione caudice recto & læui accrescit : folia Pini oblonga gemino ordine sita. Conus strobilus & nucleus Pini minor putamine minimè duro, sed cortice molliore, ceterarum ferè ritu obductus. Montibus Galloprovinciæ, Liguriæ, Alpibus & Pyrenæis gaudet.

**PINVS** syl. altera *Maritima* Pini primum genus Matth.


*Pinaster secundus* Clusij.

*Aduers.* 449.

lege æquabili plurimum exortu binolim. 10. & deme manipulatim, & paulo post ceparum instar.

**PINASTER** tertius Clusij *pumilus*,  
omnium minimus.

**PINVS** *Maritima* Theoph.





Tertium humanam proceritatem vix superans etiam exhibet Clusius, gracilibus ramis & folijs largis perpetuè virentibus. non diffère opinor à Pinastro humili Gallo Prouinciæ & Narbonensis collibus ad Lapum montem oriundo.

**PINVS** *maritima* Theoph.

Stipite, ramorum, & foliorum facie vndequeque persimilis videtur Pinastro montano, sed ramis glabris caudice nigrioribus. Conus phœniceus, breuior, & superne latior.


**PINVS**





LARIX.  
Germ. Lär-  
chenbaum.  
Gal. Melze  
& Meleze.  
Ital. & Hisp.  
Larice.  
Liduenf 449.

CEA.  
erm Rot  
unrhad.  
2 Beck-  
om Angl.  
the tre.  
l. Peft &  
ripolt.  
l Pezzo.  
p Pino  
ero Ad.  
450.



ABIES.  
Germ. Ta-  
menbaum.  
Belg. Dact  
boom. Ang.  
Dactre &  
Deele. Ital.  
Abete. Gal.  
Sapin Ad-  
uenf 450.

## PINVS Idaa Theoph.

Videtur Pinus Maritima alterum genus Matth.

Facile dignoscitur candidis & ramorum cortice scabro, circa ramos foliorum sœtura, & maioribus, longioribus speciosioribusque; numerosis conis. Hanc, cum confiterarum arborum omnibus iconibus, affabrè è viuis nature typis expressis, Roma rediēs mihi liberalissimè communicauit commilito eruditissimus Nicolaus Espilletus D. Medicus Insulanus.

## PINVS &amp; PICEA.

Aduers. 449.

**Diosc.** Pinus & picea generi eidem adscribuntur, sed quandam flagrant specierum distinctionem. Arbores vulgò cognitæ: quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, vlcibus summū corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna, vlcera delcatulorum acrimoniam recusantium, cerato myrrhino exceptus, ad cicatricem perducit. tritus cum sutorio atramento serpentia cohibet. suspiru partus & secundas eicit. potus alium sistit & decoctus in aceto, feruenti collatione, dentium dolores mulcent. Hepatici vitia sunt drachma pondere in aqua mulsa pota. Pinæ nuci cortex & folia potu idem præstant. Teda earum particulatim secta si in aceto coquatur, & decocto dens collatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earū crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornam, coloremq; mentuntur. Atros oculorum angulus, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pitydes appellantur Pinorum Piceaq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vin adstrictoria \* habent & aliquantum calfacientem. Tussi & pectoris virgū auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces pineæ repurgatæ manduntur, aut cum passō, aut cucumeris semine bibuntur; vrinam cient, acrimonias in renibus & vesica hebetant, stomachi rofiones leniunt. Data cum portulaca succo, virium infirmitatem roborat. Corruptorum quoque humorum labem obtrundunt. Pineæ nuces integræ recentior arboribus deceptæ in passō franguntur, & decoctæ, ventris tussi ac tabida ani conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

## RESINÆ aliæ.

**Diosc.** Liquida Resina è pinu & picea à Gallia & Hetruria conuehi solet: atque olim à Colophonis sibi cognomentum vindicauit. A Gallia quoq; Subalpina, quam vernaculo nomine Laricem vocant incolæ. Ea in linctū & per se magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant. siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellis liquoris similitudine: vel trigna. Cupressus etiam liquida fundit resinā, quæ ad eadē pollet. Quæ verò aridarū generi ascribitur, quædam ex pineis nucibus, aliis abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omniū odoratissima, traslucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E pinu & abiete resinæ ceteras antecedunt, odorata enim sunt, atque ibus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam tamen eorundem grati quorum & illa sumi solent. Lentissima terebinthina respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadrupla capacitatis ad humorem, qui infunditur. Itaque resina congruus in duobus aquæ plura coquitur, subiectis leuibus prunis: resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac diguis cedat. Ceterum vbi refrigit, in scilicet non picatum, quod aconitum vocant, id est non illium, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata praealerur, quò seculenta sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua primum lento igne: & vbi coire cæperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, vsque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas vnius diei spatia decoxisse satis est. Vlla odoratis malagmaribus, & acopis & vnguentorum colorationibus magnopere vitiles sunt. E resina perinde atque thure fulgo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentuntur. prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisq; oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scripterium.

## Pix liquida Diosc.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguisimis pini piceaq; lignis congregatur. Optima est, splendens, syn-cera, leuis. Contra venena, phthisin, purulentā excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores qui difficile extus fiuntur.



suntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. tonsillarum & vna inflammationes, anginaq; vitiliter perunguntur. purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium mersibus. adiecta verò paricera scabros vngues extriccat, impetiginēq; emendat. vulua duritias ac sedis tubercula discutit. cum farinaq; hordeacea & pueri in pubis vrina decocta, strumas rumpit, cohibet vlcera qua serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. ceterum cum thuris manna & cerato profundos vlcum finis conglutinat. rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. vlcera replet, & cum melle purgat. quin & cum vna passa & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probe immiscetur.

#### Picinum oleum Diosc.

Epice sit quod pissoleon appellant, separat liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu pix coquitur supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; balitu eius exprimuntur in vas. Quas pix liquida prebet vitiliter, alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum. quibus & liquida pix medetur. iumentorum vlcera scabiēq; emendat.

#### Fuligo liquida pici, Diosc.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua qua elychnium habeat, nonnihil pici incendito, lucernamq; fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibani esse solent, operito, & adoleris initio: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. vsui est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. item vbi glabrus genus pilos restitui oportet. ad imbecillas lachrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

#### Pix arida Diosc.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam. quo in genere quadam visci modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, pici resinaq; simul naturam habentes. Calscedoniam vim habet. dura emolli, pus mouet, tubercula pannoq; discutit, vlcera replet, vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur.

#### Zopissa Diosc. officinarum Pix naualis.

Zopissam aliqui aiunt derafam nanibus resinā cum cera, quam alij apoclyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

#### Bitumen Diosc.

Bitumen Iudaicum ceteris antepositur. Cuius probatio est, vt purpurea modo splendeat, sitq; ponderosum, ac validum odorem vibret. nigrum autem & sordidum, viciosum est. Adulteratur pice, Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacynto, & Sidone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus innatans. quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. namque liquidi bituminis genus esse constat.

#### Pissasphaltum Diosc.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum qua pissasphaltos appellatur: ea Ceraunius montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, astug, in litus expuitur: illic coacta in glebas mixtam bitumini picem redolet. Pissasphaltos eadem que pix & bitumen, si misceantur, potest.

#### Naphtha Diosc.

Naphthan vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur etiam nigram. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transfiliat. ad suffusiones oculorum & albugines vitilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emolli, ab inflammatione tuetur vuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito emendat. Comitiales morbos suffutit deprehendit, gagata lapidis more purgationes mulierum cum vino & castoreo potum elicit. Tussim veterem, & anhelitum adiuuat. serpentium moribus, coxendū laterumque doloribus auxiliatur. Datur celiacis in catapodio deuorandum cum aceto potum. discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum prisana liquatum infunditur: destillationibus suffusione medetur. Mitigat dentium dolores oblitur. Ceterum pillos incommodos siccum replicat, specillo impositum. concalsatum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagrus, articulorum doloribus, leibargicisq; prodest.






## TAXUS.

Diosc. Smilax à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispania contermina nascens. Auicula quæ Italica taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripuntur. Narbonæ tam præsentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius ymbra subsideant, ledantur, & sæpenumero moriantur: quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

PALMA. Germ. Dattelsbaum. Belg. Dapeboom.  
Ang. Daets tre. Gall. Dattier, & Palmier.  
Hisp. Palmera. Ital. Palma.  
Aduers. 451.

MARVM  
tus i sue  
ctyli &  
s flores.

ima Ela-  
Dioic.



Tenerima  
Palmæ.

LL 3 PALMA.

## PALMA.

In Mesueo legendum Dactyli Keyron, à Chayero oppido, vt habet verus codex. Secus Chayrun autem maximus est Palmæ prouentus. Ideo Syluius male legit Cyrron, & vertit fuluum.

**Diosc.** Palma acerbæ est & astringens, contra alui scæminarumq; profluvia, in vino austero bibitur. hæmorrhoidis sistit. vulnera glutinat illitu. Phœnicobulani recetes plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt. copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis viles in cibo. illinuntur cum cotonco, & cerato ænantino vesicæ vitij. Caryota, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat. vires recreat cum hydromelite veteri sumptum. ciboidem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo sicili, & vino restincti, cinere loto, spodij vicem efficiunt. miscenturq; in calliblephara. quod si non iustam visionem acceperint, denno cremandi. Vinum adstringendi habent. & spiracula cutis obductu suo claudunt. contra oculorum ruam & pustulas, palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præbent. corporis excrescentias cum vino reprimunt. vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas viles ex palmis humilibus Aegyptiæ.


**Gal.** Phœnix arbor adstrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus est, ex aquea substantia tepida & terrea frigida constans similis facultatis est encephalos quem vocant, [ hoc est cerebrum huc medulla ] esui aptus. At fructus eius, & maximè dulcis, non paucam obtinet caliditatem. Cæterum cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impostum, vbi quid roborare & deliccare, contrahere, stipare, densareque consilium est: sed & tanquam cibis sumptus & simul cum alijs & per se. Porro quod elate vocant, nempe tenerum illud palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod verò velut decoctum eius est, adstringentem & ipsum qualitatem habet, verum plus quàm dicta omnia exicat: utpote quod & essentia consistentia illis siccior est, & nimium habet humiditatis. Itaque iure vtuntur illo ad vlcerum putrescentia, miscentque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad hæc facultatibus hepaticis & stomachicis, seu intrò sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix plantæ desiccatoriæ citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam.

## PALMA Elate.

**Diosc.** Palma quam aliqui Elaten aut Spatham appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolutum est calyxque, quo in spissamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria, sistit vlcera qua depascunt. Laxatos artus committit. irita misceatur cataplasmati & malagmati. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iecori affecto, mixta conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat, datur bibendum congruè renum vesicæ, & viscerum vitij. Vulus ac ventris fluxiones sistit, scabiem cum resina & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & Spatha effectus præstat, non sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo aut decocta

Borassus,  
m=J uila cau  
dicis Palmæ.




VSA  
rapionis.

DRACO arbor.

MUSA fructus.  
Aducrf. 431.

MUSA.

Folius est Cannæ Indicæ maioribus, quibus  
G. Eléni inuoluitur, sesquipedalibus, duos pe-  
des longis, infernè compressis.



DRACO arbor, & eius lacryma, vulgo Sanguis  
draconis dicta.

Creuit hæc aliquot abhinc annis in cultissi-  
mo Coldenbergij horto, Antuerpiæ, ex Hispa-  
nijs delata, talis omnino qualem eam eleganter  
& scitè Clusius descripsit.

CLVS.

**CIVS.** Est verò Draco procera arbor, Pinum procul intuentibus referens, adeò æquales, semperq; virentes sunt rami. Huic truncus crassus, octo aut nouē bicubitales ramos, æquales & nudos sustinēs: hi rursus in summo finduntur, & in alios ternos aut quaternos ramos cubitales aut paulo ampliores, brachialisque crassitudinis desinunt, nudos item & sine foliis, qui in summo gestant capita plena cubitalium foliorum, maiusculi pollicis latitudine, in medio densiorum & eminentiore quodam modo costa, vt sunt Iridis folia, tenuium verò & rubentium in lateribus, quæ mucronem planè repræsentant, semperque virent: nascuntur verò ea Aloës aut Iridis modo, altero alterum amplexante. Truncus perquam scaber est, multifque rimis deluiscens, ex quo per Caniculæ æstus humor emanat, qui in rubram lacrymam densatus, Sanguis Draconis appellatur, ob quam sanè causam, ipsam arborem Draconem nuncupauit. Materia trunci firma est, ferrumque difficulter admittit, quòd veluti fibris transuersim & obliquè excurrentibus constet: at rami, cum multo succo prægnantes sint, satis facillè cædi possunt.

Eam arborem Olyssipone primùm vidi anno humanæ salutis 1564. post monasterium Dinæ Virgini sacrum, cui nomen à Gratia, octo palmorum crassitie, monachis ignotam & neglectam; quamq; neque florem neque fructum ferre asserent: rem tamen aliter se habere postea deprehendi, ramulus siue racemo ex illa ipsa arbore anno sequente reuulso donatus ab amico. Est autem hic ramus pedali amplior siue longitudine, cui inhaerent alij ramuli multo fructu racematim compacto onusti. Fructui color stanscens, sapor aliquantulum acidus, magnitudo exigui cerasi. Eum in summis capitibus nasci veri simile est, vt in Palma Dactylinascuntur: spatha tamen vt illos includi non intellexi.

Et sanè id gummi quod apud diligentiores quosdam pharmacopolas inuenitur, quodque Sanguinem draconis in lacrymis appellat, magna ex parte è Madera & Canariis insulis in Europam inuehitur: & forsitan etiam ex Aphrica, quæ Cinnabarim Dioscoridis tempore subministrabat.

An hæc arbor alicuius momēti sit in vsu medico, nemiinem scribere memini: fructus tamē aciditas argumento est vtiliter in febris præberi posse.

Eius lacryma adstringēdi vi pollet, ejusque vsus non infelix ad muliebres & dysentericas fluxiones, cruentas excreationes, firmandos commotos dentes, & roborandas gingiuas.

Quæ facultates admodum similes sunt eis quas Dioscorides Cinnabari tribuit, quamque Hamatite lapillo efficaciorē facit. Hanc ob causam, non abs re existimant celebriorē Medici, Sanguinem illum Draconis exquisitum, legitimam Dioscoridis Cinnabarim esse, præferim cum ejus tempore à nonnullis etiam Sanguis Draconis appellata sit.

**PALMITES.** *Hisp. & Neapolitanis.*  
*Cephaglioni. Palma minor Matth.*






## NVX INDICA.



FAVEL cum suo involucrio, &amp; eodem exutum.



\* AVELLANÆ Indicae ge-  
nus oblongum Clusij.

Videtur idem cum nu-  
cleo palmæ Pini nostræ Ad-  
uers. pag. 450. cuiusmodi  
præduros nucleos apud me  
seruo in musarum thesau-  
ris munere Valerandi Don-  
rez Insulani.



Palmae effigie arboris fungosæ substantiæ Fausel D. Garcia Lusitano teste fructus est: cuius sapè  
Antuerpiæ apud Petrum Quicquelbergium videndi & habendi copia fuit. Facie nucem myristi-  
cam refert, sed nigrior, altera parte sessilis: crasis & corporatura durior, lignosa, molliore & villosa  
involucro putaminève clauditur, quale olim videre memini in officina P. Coldenbergij. Gustu suba-  
stringente, nonnihil aromatico: initio primi ordinis excalfacientium. Immaturum stupefacere & ine-  
briare dicuntur. Noui generosam Anglam vtero gerentem vapida aromaticitate decem vel duodecim  
nucum myristicarum auidè comestorum cerebri ventriculis imbutis, ebriam esse redditam.

MM

AVELLANA

AVELLANA Indica. Aduers. pag. 449.



Mehenbethene, siue AVELLANÆ Indica varietas.

Inter nuces Moschatas Antuerpiæ aliquando reperitur quā pro Mehenbethene D. Cortusius Patavio misit. Colore, figura & magnitudine nucē myrticam refert, sed triangularis forma osseo & prædure cortice nūcū Indicæ nostræ; sed effracta tres cellulas habet, vnica conspicua nucleum dulcem claudente; quales acceptas refero consobрино amicissimo Nicolao de Fourmestaux mercatori Insulano.

Lege PALMALINVM. Aduers. pag. 451. linea 37.

EUPHORBIVM.



Lege CEREVS ab effigie descriptus Adu. pag. 453. est EUPHORBII arbor.

Quem Cereum superius diximus, Euphorbium statuit & asserit Antuerpianus mercator Philipus Asseliers, qui congenerem stirpem vnā cum Antephorbio ex Indiis Peruvianis asportauit. Cuius folium depactum, non secus ac ficus Indica, in plura folia & radicem crassiorē fusē humi sparsam, exit; & præclaro viro Ioanni Boifeto perquam in hac palæstra versato Bruxellis cultissimo & ditissimo orto (vt mihi idē retulit) annū integrū viruit, sed tandē hyemis sæuitia perit. A Cereo nostro tantum diffidet spinarum geminata serie & positu. Folia teretia, crassa, carinata & canulata, cucumerina, pedalia & sesquipedalia.

Dioscoridem minū nouisse arborem cūm Ferulaceā plantam dixerit, minimē mirū: cūm ne nobis quidem, cuius plantæ vel arboris succus foret Euphorbium, hætenus compertū fuerit; quippe cūm sit peregrina & ex nouo orbe aduehi solita.

Diosc. Succus illius suffusiones discit. Potus tota die exurit, quare melli collyriūq; pro acrimonia ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera portione haustus. Squamas osium eadem die eximit. Verūm eo vrentes, necesse est linamentis aut peratis communire corpus quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenuis capitis cute, inritus succus infundatur, vultusq; postea conuatur.

Gal. Caulicæ siue vrentis & tenuium partium facultatis est.

Idē vitur in alopecia lib. i. comp. pharm. Li- quor est stirpis cuiusdam spinosæ qui ex occiduis regionibus affertur. 3. lb. componend. pharm. gener.

ANTEV-



## ANTEUPHORBIVM.

Ἐρπύων. MYSCVS, Arborumve villi: item saxorum  
& terra. Vinea Arabum & Officin.

## MYSCVS Quernus.



Indidem aduectum Anteuphorbium D. Boifeto doctissimo crenit, quod admirabilis; prudens & dædala natura aduersum Euphorbij rabidas omnium longè feruidissimas & inurentes vires indigenis largita est. In pluribus carnofis virentibus teretibus caulibus folia Portulacæ. Radices item latè humi impactas fundit. Lento frigidoque succo turget, quò vrida Euphorbij vis cohibetur.

## MYSCVS.

Iis nominibus significantur cani arborum villi, quales in quercu videmus. Videntur è genere earum plantarum, quas parasiticas festiuè quis dixerit, propterea quia non nisi aliena quadra maxima ex parte vescuntur. Qui innascitur \* Cedro, Larici, & Piceæ primæ nobilitatis, odoratissimi sunt.


Secundum locum † Populneus sibi vendicat, in quo genere candidum & odoratius præstat; Nigri- \* Diofc. † Diofc.  
eans improbat: Rutilans inter vtrunque medium tenet. Quernus omnium vilissimus; præter eum qui saxi & vdis terræ glebis adnascitur, quum à natali atque parente suo muscus naturam imitetur.

Horum omnium varietates quamplurimæ villorum exilitate, differentia, & figura discretæ.

Varietates.

Quædam enim Corallij æmulatione ramosa.

Alia cincinnis & capillamentis fimbriata, vel capillitium densissimis, fusè sparsis, luxuriantibus eximium vellus sericeum delicatissimum referunt.

*Muscus terrestris denticulatus.*

Alia denticellis & sarmentosis viticellis pinnatis compressis arguta naturæ solertia elaborata, reptatu serptuque innumeris flexibus implicata.

**Diosc.** Astringendi vim habet. Decoctum insidentium vului vtile: vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Arabes inter cordis medicamenta inferunt, quod odoris fragrantia animi defectus iuuat. Ventriculorum roborat, vomitus compefcit, & aluum sistit.

Gal. Pro calamo aromatico substituit.

*Muscus terrestris denticulatus alter.*  
*Muscus terrestris repens Lusitanicus Clusij.*



Ortus & modus superiori non absimilis: sed ramuli toti densissimis foliorum quasi denticellis compressis, vel squammulis, Illecebræ multò minoribus, attractatu sericeis, conferti sunt. Sommerfeti Angliæ sterilibus montibus (Mendip vernaculè) vbi plumbum effoditur, nonnusquam magna gliscit copia, in aggeribus, & saxis.

*Muscus*



*Muscus clauatus. Pes Leoninus.*  
*Perperam Chamapeuce Cordo.*



*Muscus scoparius.*



Non minùs scitè potest hic recentioribus vocari *Lupinus Pes*, quàm alia planta *Leporinus*, propter *Leonini pedis* vel *vnguis æmulationem*. *Muscidorum* & *opacorum* est hic *soboles nemorum*, & *sterilium vdorum*. *Obsequiosis iubat* & *que farmentis*, *musco* *capillitio*, *viridi pallente*, *aspero*, *latè de fixis* *per interualla*, *hinc inde radicibus sese propagat*, *atque gyros nectit*, *spirasue anfractuosas multas*, *atque supernè emittunt ramulos comosos*, *ternos aut quaternos*, *villosos pedes & vngulas Lupinas imitatos*; è quibus *singulis hirsuta cruscula eriguntur & prominent*, *vngulas forcipulasue cancrorum aut luporum effigiantia*; *procurrentibus flexilibus ab latere viticulis albidis & glabris*, *vnde pendula cernuntur spicata nucamenta*, *muscosis floribus albicantia*: *vnde Spica Celtica Officinis & impostoribus falsò dicta & vscata*, *tum etiam quia summè ad calculum*, & *tenuum inflammationes facere scitent*. In *Angliæ*, *Nortmanix*, *Germaniæ* & *Belgiæ* *nemorosis saltibus frequens occurrit*.

*Muscus scoparius.*

*Muscidorum* item & *vdorum Belgij & Frisiæ orientalis* hic *sectator*, *multis dodrantalibus pedali-*  
*bus etiamque amplioribus ramulis*, *purpure aurea nitentibus*, *innumera cirrorum tenuium sobole com-*  
*osis*, è quibus *singulis exeruntur capitula Lini*, *Ericæ* aut *Selaginis* *minora*.

*Muscus capillusve aureus minor.*

Minor, minúſve ſpecioſo nitore, coloreque viuido, triftioreque aſpectu viſitur in complutis ruderibus, aſperginofisque limbis parietinorum venuſtiorum Gallia, Germaniæ, Belgiæ, & Angliæ.

## LICHEN, HEPATICA:



Lichen dicta, quia ſaxis vdis, opacis parietinis, aut petroſis aſperginibus innafcatur: aut quodd Dioſcoride interprete Lichenis impetigine affectis medeatur; quod ſane facit, adeoque multa difficiliora efficit, depellitque affectus hepaticos admodum difficiles. Eapropter Hepatica recentioribus dicta: notiffima vel plebeculæ; non tamen illa Muſcus dicenda, quia capillares cauliculos, floſculosque candidos, radiatos complures, Iunio & Iulio profert, è radice perpuſillis fibrillis ſuccum è ſaxis lingit ſugitque, quibus folia arctè tota ſuperficie ſquammatim ſibi incumbentiæ adhærent, quaſi aggluinata, virentia, craſſa, laciniis lactucinis ſinuata, Quercûſve terrenæ, aut potius marinæ ſimilitudine: guſtu herbido, refrigerante, exſiccante: quare Syrupum de Cichorio cum Rhabarbaro ingreditur.

**Diosc.** Illius ſanguinis profluuiâ ſiſtit, inflammationes arcer: impetigini medetur. inuat regio morbo correptos, cum melle illius. oris & linguæ deſluxiones imbibet.



BRYON *Lactuca foliis* Plin.  
 MUSCVS *Intybaceus crispus marinus*.  
*Fuci prima species* Diosc.  
*Lactuca marina* herbariorum.

BRYON *Lactuca foliis* Plin.

Saxosis & conchis marinis Mediterranei & Oceani hæc, cuius meminit Theophrastus, instrata reperitur. Eius siue facies, siue ortus non ita dispar à Lichene & Pulmonaria: lætiora tamen sunt folia, viridiora, maiora, & Lactucæ crispæ æmula, valde flaccida, teneriuscula & tenuia. Facultate itidem refrigerandi & siccandi non dispari Lichenis aut Pulmonariæ, sed propter saluginem magis digerente: Eapropter magno commodo tumoribus feruidis & arthriticis biliosis & sanguineis admoventur.

Perperam notatur Plinius, quòd Bryon, id est, Muscum marinam herbam dixerit, Lactucæ foliis rugosis & veluti contractis, quæ sine caule exeunt; minimè Lichenem, ut quidam putant, describens, qui auctore Diosc. Bryon nonnullis dicitur, quòd petris adhæreat ut muscus.

Plin. Præcipua siccandi ei, spissandi que vis, & collectiones omnes, inflammationes que cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus est.



MUSCVS *Pulmonarius*, siue PULMONARIA officinarum.

Simillimus Muscus & de Hepaticæ collatione cuilibet notissimus ad Pulmonum morbos, quos sinuosis meatibus & punctis, superficie que concolore, quadamtenus exprimit multum merito prodelle

desse creditus. Annosis rimosisque caudicum Quercus, Fagi, aliarumque, corticibus non modò, sed etiam lapidibus, & duris paucisque germinibus, inftar crustae aut loricae inducuntur coriacea, duriora, densiora, & anfractuosa folia, cartilaginea, Lichenis ritu & effigie haerentia capillamentis radicum: nusquam tamen cauliculorum aut florum vestigiis conspicuis extantibus. Multi nominis & usus apud Belgas medicos, qui ad ulcera pulmonum, tabemque, & sanguinis importunas eruptiones immoderatas ex aqua puluerem dant; frequens etiam decoctionibus indunt. Siccat admodum, moderatius adstringit & refrigerat.

LENS Palustris Aduers. 129. in Malabarbro.  
Angl. Dupeli meat.

MUSCUS Marinus vulgarissimus.



Muscus  
didus C  
lodes f  
mulis lo  
catus.

Minuto circinato rotunditatis Lenticulae folio, cui perquam tenues cirrorum villi radicularum loco subsunt. Magnae commendationis & usus ad viscerum & febriles aestus Nymphaeae de pari dote, decoctis, stillantia pota & apposita. Ad faciei, oculorum, corporis rubores & capitis dolores apponitur.

DIOSC. In aqua non fluente muscus lenticulae similis inuenitur, refrigeratoria natura: propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se & cum polenta: glutinat & procidentia puerorum interanea.

MUSCUS marinus.


†\* Diosc.

Nec secus ac telluri & arboribus muscus innascitur, sic pelagi sub vndis naturae munifico luxu & lusu, † scopulis, \* testaceis, siue conchylis, Coralliis, Mitulis, Algis, Fucis, aliisque marinis plantis, Musci Inybaei. cristatis oris, pulmonatij, fruticosi, surculosi, Coralloidis, capillacei multiplex differentia adhæret.

CORALLINA



## CORALLINA.



## CORALLINA.

Que Corallina dicitur, Officinis hodie notissima: cirratis copiosis Corallij amulatione implexis tenuibus furculis, caulis expers, colore rubicundo, aliàs luteolo, herbaceo, cinereo, aut candido, ossæ duritiæ, ad vermes profligandos decantatissimis viribus.

## MUSEUM.

Diosc. Præcipua ei spissandi vis, & collectionis cohibendi, & podagras quas refrigerare opus est.

Gal. compositus est ex terrea & aquea essentia, vtraque frigida. Siquidem & gustu adstringit, & calidis quibusque illitus, ea evidenter refrigerat & adiuuat.

## CORALLIUM.

Multò plura quàm antiquis prodita Corallia & Corallina reperiuntur: quæ nec intempestivè Muscis succedent ad seriem plantarum continuandam, ut quæ se offerant similima, ita proxima serie ex nostro instituto annectenda. Corallium fruticis forma colore Rubiæ radicis æmulum, vniuersæ Europæ peruulgatum, maximi que usus & commodi.

Varietas è colore. Reperitur & pallidum flavescent.

Diosc. Adstringit, refrigerat mediocriter, excrescentia coerces, oculorum cicatrices absorgit; vitærum cana & cicatrices explet, contra sanguinis reiectionem magnopere efficax est. urina difficultati auxiliatur; quin & potum ex aqua lienem absumit.

Math. Comitialibus commodè adalligatur, exhibeturque in potu. Corallio ædes à fulminum iniuriæ tueri superstitiosum & fabulosum. Quoties siccandum, sistendum, firmandum eruptiones quavis menstruas, dysenterias, & cruentas deiectiones, ad corallia refugium.

Vitum efficacius siccatur: Torminibus & vesicæ calculi malis medetur Plinio ex aqua potum. Simili modo ex vino potum, aut si febris sit \* ex aqua somnum conciliat.

Si febris ex aqua: \* J quia refrigerat, & aqua humectat; febris æstuosos vapores somnum perturbant. † quia vapores & inhibentes cohibet.

Plinius videtur ignorasse poliri & concinnari baccas & grana corallij globulis necandis, quibus folio traiectis preces funditabant & supputabant, moniliaque parabant.

NN


ANTI-

ANTI-PATHES sive Corallium nigrum. Diosc.


Maffilia inter corallia occurrit, insigni leuore perpolitum, colore nigerrimo.

Diosc. Specie tantum distans. est autem colore nigro arboris figura, ramosum magis. Vires supradictæ habet.

CORALLINA rubens Antipathi facie,  
An Quercus marina folia Myrica Theoph.



Corallina  
alba.



Corallina Antipathi facie variet. tres.

Alba, rubra, lutea, tercio intus corneo Antipathi concolori & nobis simili reperitur nō modo Narbonæ & Galloprovincia in diterraneis litonibus, sed etiam Angliæ occidentis & Normanniæ.

CORALLIVM album:

Idem Tyrihæni pelagi sub vndis Corallium cand. dumerellitur, similibus cæcis surculosis anfratibus & flagellis, sed acetabulis insculptum Polypi piscis æmulatione. Rubro longè magis refrigerare proditur.

Coa-



## CORALLIOIDES, siue Corallij albi varietas.



Stipite longè crassiore brachium æquante, & materia magis fungosa, multis acetabulis insculpta aut inscripta.

Vniuersa planta pedem, vnum longa est, vixque cubitum proceritate superat.

CORALLIORVM Solutio & Vnionum,  
Chymistice ex G. Alder.

Eodem modo quo margaritas in liquorem redigimus. Alij vel vniones, vel corallia minutim contusa in aqua ardenti siue viridi salis liquore solvunt prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius salsedo percipiatur: postea puluerè vini spiritu excipiunt, & per balneum sexies aut septies refundendo abstrahunt. Alij corallia in calcem subigunt: hanc resoluunt, & ex vi-

ni spiritu novies exstillare sinunt, dum salis instar dissolvantur. Quicquid autem in fundo remanet, id recenti vini spiritu perfundunt, & priore modo euocant, vsque dum tinctura coralliorum proueniat, quam ipsi animam appellant, summum medicæ facultatis mysterium: quo omnes interiorum partium affectus radicitus euelluntur, & corpus cælesti quadam vi in temperatum habitum, absolutamque & exquisitam commodationem restituitur. Sic igitur quinta Coralliorum essentia quolibet morbum comitalem à pueris & ætate prouectioribus in quinque septimanis prorsus subtrahit. Sic etiam omne alui profluuium à quacunque causa ortum, tam in pueris quam in adultis, cohibet, etiam si morbus ad extremum peruenerit. Ita sanguinem à quacunque parte manantem coarctet, quouis modo adhibita. Sic denique fluores vterinos quoscunque sistit, & ad probam naturæ temperationem reducit, ne quid mali recidiui in reliquis corporis partibus vnquam, quemadmodum ex alijs medicamentis omnibus, consequatur. Adhæc idem oculis superimpositum, eorum dolores sedat: defluxiones mirifice compescit & pustulas discutit. Intra corpus sumptum eadem propemodum, sed non tam efficaciter præstat, vt tinctura. Hæc enim decem guttarum instar ex liquore aliquo idoneo exhibita, mirabilia tam in vires, quam fœminis, iunioribus & adultis efficit. Quinetiam corallia ex singulari facultate qua donata sunt præ cæteris corpori foris aut alligata, aut appensa nimios vteri fluores, tum albos, tum rubicundos ad moderatum statum reducunt, ventris profluvia adstringunt: partum facilem reddunt: spiritus animi recreant, melancholiam, tristitiamque abigunt: sanguini profusum ex venis, vulneribus, hæmorrhoidibusque subueniunt: conuulsiones, morbumque comitalem mitigant, præcauentque.

*Vnionum solutio ex Aldernac.*

Primum in puluerem rediguntur & vitro oris angusti induntur, perfundunturque aceto distillato optimo, ita ut hoc ad duos digitos supereminet: deinde in cineres calidos ponuntur donec soluantur: postea quod solum est, in balneo extillatur ad siccitatem usque; & super calcem hanc vnionum, aqua pluuialis stillatitia funditur, rursusque distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahatur ut antea: atque is labor ter quaterue repetitur, quoad nihil aceti subesse percipitur. Tandem pulvis siue calx vnionum, aut in loco humido supra marmor dissolvitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque dum in liquorem olei instar redigatur: Cuius grana sena ex humore aliquo ad resolutionem neruorum, conuulsionem, marcorem fenilem & phrenitidem dantur: corpus sanum conseruat: laesum pristinae sanitati restituit, lac muliebre emendat augetque naturalium partium vitia, & semen corrigit. Abscessibus, vlceribusque exedentibus, cancro, & haemorrhoidibus medetur.

*Auri dissolutio.*

Per spiritum vini quidam Aurum potabile fieri affirmant; dum foliorum auri drachmae duae ex aerei spiritu prius soluuntur: deinde purgantur. Postea in aquae vitae vncijs sex per dies triginta digeruntur, redigunturque in liquorem auri praestantissimum.

*Track Nortmanorum videntur FUCI PLINIANI.*

Vniuerso illo littore occidenti pelagi Gersae & Garnesae Angliae amoenissimis insulis inter Britanniam & Nortmaniam tantus prouentus in scopulis, ut eminus tanquam syluae spectentur, ubi defluo mari secatur & auellitur, vritur Kali ritu, & cinere lato solum & veruacata latiora & pinguiora redduntur.

Maximo folia ut plurimum terna: Peti binum, ternum & quaternum cubitorum, latitudinis palmaris in caudice binum, & ternum cubitorum, sesquiunciam & duas uncias crasso, corneo, rubiginoso, vti & folia.


Plin. enim Fuci marini genera, latum & alterum longius quadamtenus rubens: tertium crispis folijs quo in Creta vestes tinguntur.

Nascuntur in mari frutices, arboreseque, minores in nostro: rubrum enim est: totius orientis Oceanus refertus est sylua.

*QUERCUS Marina.*


Quamplurima genera spectantur, quorum altera a querna frondis similitudine Quercus marina dicitur, fructu oliuari, tereti, membranaceo folliculo duricorio.

Aliae folijs laciniatis, fimbriatis, altioribus diuisuris, Absinthij, Artemisiae, & Abrotani maris: folliculis non dissimilibus; sed nunquam triplo maioribus radicem Alphodeli aequantibus, colore quadamtenus rubentibus: vel ferrugineis.

*Fucus marinus folijs Abrotani maris.*



## Fucus ferulaceus.



Ferulaceum diximus ob folia ferulacea minutius diuisa. Scapum emittit pedalem, in quo Corallina candida saepius innascitur.

## LENTICULA marina Scopionis &amp; Una marina quorundam.

## LENTICULA marina serratis folijs.




Tyrrheni maris & Adriatici indigena hæc; folijs angustis Scopariæ dictæ Osyridis, in flexilibus loricatis petiolis sesquipalmaribus refertis & onustis copiosis baccis vacuis membraceis teretibus lenticulis similibus & peribus, unde ei nomen.

Varietas. Per similibus & eadem, nisi latiora & breuiora, non nihil ambitu serrata essent folia.

NN 3

CON-

## CONFERRA Plin.



## CONFERRA.

Plin. Peculiaris est Alpinis maximè fluminibus Conferva appellata à ferruminando, spongiæ aquarum dulcium verius quàm muscus aut herba, villosa densitatis, atque fistulosa. Curatum ea scio omnibus ferè ossibus cōfractis prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata vniuerso corpori, aquam suam inspergentibus quoties inaresceret, raroque nec nisi deficientem herbam mutationis causa resolutibus conualuisse, vix credibili celeritate.

Spongiosis, flexuosis sesquicubitalibus, & longioribus quasi ellychniis & fusco virētibz staminibus villorū cirris lenè fluentibus aquæ fluitans, scitè Plin. spongiæ aquarū dulcium verius, quàm muscus aut herba, villosa densitatis. In lacu maiore Mediolanēsis agri reperitur.

## CONFERRAE marina genus videtur.



In Angliæ littore meridiano insulæ Portlandiæ vocatæ, ex aduerso Nortmanniæ, inter fluitantes Algas reperimus plantæ quoddam rudimentum; cuius si spectes, & attrectes furculos palmares & sesquipalmares, pustulosos, molles, flexiles, Spongiam prorsus dicas, cui etiam concolor est, & vixisse putes: sin habitum & ortum ramis brachiatum, Corallinis affiniorem dicas, vnde quidam apud Plinium Plocamon Hydros Corallio similem, sine folijs, præcissum mutato colore in nigrum durefcere, cum cadat frangi solitum, coniectarunt. Ea tamen videtur Antipathes Dioscoridis, cuius etiamnum ramulum paulo antè exhibuimus è Massiliensium piscationibus.



Visum est subdere aliquot rarissimas icones ex nostris rerum Britannicarum ancipitis naturæ observationibus.

BRITANNICAE Concha Anatifera.  
Gallis Macreules.

An Sapinettes Normannorum eadem?

LITHOXYLA, lignæ lapidea Anglica.




Facit specimen istud Naturæ quippiam boni vel è sordibus meditantis, ut iam multa lubeat credere quæ alioquin risissimus, si legissemus apud rerum Septentrionalium Historicos: quanquam paulo secus hiarrant, duntaxat in Scotia aut Orcadibus maris Caledonij Arctici, olim à Romana classe deuictis, compertum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam hic ad Tamesim amnē, quā Londinum præterfluit, conchas pediculo rugoso crassiore è naui annoſæ carina auulſas habemus. Sunt eæ admodum puſillæ circinatæ ſerè rotunditatis conchæ, foris albidæ, lucidæ, læues, tenuitatem quæ teſtæ ouacæ fragilem, biforem, Mituli modo præferentes, nuci Amygdalæ compreſſæ pares; pendulæ autem erant hæ foris ad imum ventricofæ nauium catinæ, cui muſco & limo ſemiputridæ innati erant quaſi fungi pedicelli, quos ſerè ouracum vmbiliculi dixiſſes, cuius extremum fruſtum ritu inferabatur latiufculæ conchæ baſi, quaſi vitam alimoniâ quæ inde ſugerent auiculæ, quarum rudimenta è ſumma parte conchæ hiulæ, conſpiciuntur. Pediculos iſtos ferunt Hiſtorici primùm è vermiculis concreari, quod non potuimus ſcire, neque dum credere: tamen ſciimus has eaſdem conchulas elegantiffimè efformatas in ſurculis arborum, quales dono mihi dedit Londini ſuperioribus annis induſtrius iuuenis Andreas de Fourmeſtraux bonus ciuis & mercator Inſulanus, quā maris æſtus alluit temerè proiectorum, aut depactorum ſobolem eſſe. Earum autem quæ humi, in ſicco labuntur, emori: quæ verò alluionibus maris rapiuntur, concha excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adoleſcere. Has voluiffe Barnacles Angli & Britanni Galli: Clakis vocat Scotia: ubi abundant & capiuntur dum per brumam concreuerunt gelu paludes. Sapit nobis eſitantibus Anatem aut Anferem ſylueſtrem. Alij Anatæ ſimilimam, ſed minorem, fuſci coloris roſtro croceo maritimam auem:

LITHOXYLA, lignæ lapidea Anglica.

Compertum nobis eſſe ænes & riuiulos, ubi meſi pali lignei, ridicæ, aut conti, aliquot menſibus lapideſcunt: imò ſerè, ut ſic dicam, ferreſcunt, eadem perſtante ſuperficie, ſinu ſtriarum & ſibrarum ductu priſtino: ut eminus, quas aſſulas ligni diceres, attrectando & lapidi illidendo dicas eſſe lapidem ferri mineræ immixtum, ſoliditate, gravitate, duritie & duratione lapidea, nec flammiſ obnoxia: cuiuſmodi magna fruſta videre eſt in illo monticulo affabrè multiplici lapidum mineralium ſtrutura planè viſenda, conſtato, ad tubulos & elices tranſmittendos fontis peramœni, qui ſcaturit Londini in horto exinię literature & prudentiæ incomparabilis Cæcilij Angliæ meritiſſimi Cæcellarij. Mirificas hæc aquas è montibus præfecturæ Bedfordiæ & in Cambria ſiue Angliæ Occidua, quam Valliam vocant, emanare multi aſſerunt.

F I N I S.





## DE SVCCEDANEIS, IMITATIONE RONDELETII,

E CVIVS FRAGMENTIS ET PRÆLECTIONIBVS

HÆC FERRE DECERPTA SVNT.

CVM attentiore lectione animaduertissem vulgatum Succedaneorum libellum, quem nonnulli Galeno, alij Paulo acceptum ferunt, scaterere mendis, & plerisque locis mutilum esse; vtpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuo Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Maurogræco, qualis fuit & Actuarius: visum fuit, quæcunque Dioscorides, Galenus, Aetius atque Paulus literis mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; eaque sic diggerere, vt quid alteri cuius æquipolleat, studiosis in posterum pateret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse vel id plus satis arguit, quod nonnulla addita inibi sint quæ Galeni tempore ignota fuere, vt Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Vt, quod fortè Chamæmelini legerant alicubi, nominis decepti affinitate, Melinum subdiderunt; quàm inscite, nullus est qui id ignoret: illud enim laxat & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitque. Eadem ineptia quod fortè Cæpæam Portulacæ similem legissent, illius vires huius facultatibus responsuras putarunt. Itidem leporem fluuiatilem cancri loco vsurpari; vel, vt alius quispiam contexit, marinum: indoctè, vt qui ignorasse videatur cancrum alimentum & antipharmacon esse; leporem verò vel odore solo vomitorium & venenum. Nec hoc falsum solummodò, at & discriminis plenum, cùm loco Opobalsami Opocarpation substituunt, quod venenum frigidum est Dioscoridi, vinoque, vt Cicuta, expugnandum, teste Gal. lib. De antidotis. Verùm si hic Carpason legamus, vera fuerit lectio, est enim tenuium partium. Cinnamomo item Behen rubrum respondere nequit. Neque placet ordo serieisque collationum: nam olea oleis, non resinis aut aquis sunt conferenda; vt, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si non licet ex specie proxima, saltè è genere, cùm abundemus probis remediis. Nec parui facio regionum vbi nascuntur proprietates, veluti Creticarum plantarum; quas Italicis efficaciores puto; nisi squallida admodum fuerit æstas: tum enim Polium Italicum aut Stœchas non cedunt Cretico aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus caremus, aut adulterata, vt loco cinnamomi, amomum. Insaniæ itidem, vbi abundamus lactuca, opocarpatum optare. Licuerit tamen, si qua sint rarius obuia aut minus trita, eorum loco vsurpare viribus similia, vt Terebinthinæ veræ loco, Lentiscum, qui frequentior & feracior est.

Quum autem succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec vbiuis medicamenta oportuna occurrunt, (turi enim *εὐπροπίστis* vtèdum: & quæ medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, vt Galenum fecisse legimus, cui Euphorbium cùm ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu vsurpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius quàm vnquam fuit; cùm multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouentus sufficiebat, hodie careamus; tum supposititia Hebræorum & mercatorum vasto ingenio adulterata transfuehantur; quæ si reicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta, antiquitus notissima & vsitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilis inuentæ compositiones efficacissimaque remedia in vsum recepta, quorum simplicia barbarie vocum nobis prorsus ignota sunt.

OO

Quid

Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in succedaneorum delectu & usu pessima illa medicorum consuetudo merito reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno aegrotantium incommodo; qua in compositione remedium omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temere; & cum omnia similia usurpant, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit.

Quod si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent; numquam succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda; certior medicamenti operatio, faciliior & citissima præparatio; pluribus remediis & succedaneis summa o artis Medicæ ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmaca licebit, & plura quam vulgus Medicorum & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Boraginem præscribat, ea si defuerit, Buglossum agreste substituet, vel contra: si scariola defuit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichoriū, Dens Leonis, vel Endiuiam: si Chamæpitys, Chamædrys substituat, si defuit, vel contra. Sed quid faciet si omnia congerantur in vno eodemque medicamento? certè nihil aliud erit, quam poeticum illud chaos,

Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant; & illos tanquam scopulos vitent: caueant item malos, auaros, improbos, indoctos & impudentes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, farragine medicamentorum etiam semiputridorum collaudant.

Quidam hoc faciunt vt copiam ostendant, vel ignorantia, vel superbia; & aliqui docti, ne videantur in remedium cognitione minus exercitati.

Porro cum sint quædam compositiones viles præcis medicis excogitatae, experientia & ratione receptæ & comprobatae, nonnulla succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ ea ratione minimè excludenda & reiicienda: cum non tanta infelicitate succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene explant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SVCCEDANEA, QUANTVM FIERI  
potest, eiusdem sint generis  
& speciei.

*Rondelet.* Herba pro herba.  
Radix pro radice.  
Flos pro flore.  
Semen pro semine.  
Succus pro succo.  
Lachryma pro lachryma.  
Resina pro resina.  
Mucago pro muccagine.  
Metallum pro metallo.  
Lapis pro lapide.  
Terra pro terra.  
Pix pro pice.  
Axungia pro axungia.  
Medulla pro medulla.  
Avis pro aue.  
Serpens pro serpente.  
Pars animalis pro parte.

COMPO-



## COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Pulvis pro puluere.  
 Trochiscus pro Trochisco.  
 Opiata pro opiata.  
 Electuarium pro electuario.  
 Pilulæ pro pilulis.  
 Eclegma pro eclegmate.  
 Tabella pro tabella.  
 Confectio pro confectione.  
 Conseruatio pro conseruatione.  
 Syrupus pro syrupo.  
 Emplastrum pro emplastro.  
 Oleum pro oleo; siue simplex, siue compositum.  
 Vnguentum pro vnguento.

## THEOREMA VNIVERSALE VEL COMMUNE.

Medicamentum quod substitui debet, siue in internis, siue externis conuenire debet	{	viribus occultis,
		manifestis,
		& consistentia.
		Sit etiam simile in
		Sapore,
		Odore,
		Ætate,
		Natalitiis & regione
		Natura & temperamento.

Nonnulla in externis remediis supponuntur; quibus in internis uti non licet: ut succus Carpati substitui potest pro Lactucæ succo in externis: cum tamen venenum sit, nõ introsumitur.

Non totum simplex; sed aliquæ partes substituuntur.

ut Muccago feminis Psyllij pro mucagine feminis Cydoniorum: non totum semen; quia pars interior temperamento differt à mucagine, & venenata putatur. Neque etiam Cydonium malum conuenit pro semine suo; quia viribus & consistentia differt.

Formulæ quædam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt. ut

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis, fructus, floris, vel radice.

Conseruatio Capillorum veneris, pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrupo consistentia non potest; quia remedij formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbæ decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum Conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Ut syr Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radice Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro vnguentis uti licet; & contra, modo pars affecta assentiat. ut Emplastro filij Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluatur aut malaxetur, non vtendum, quia emplastra imposita dilatationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat; quæ neque dura neque grauius ferre potest.

V A R I A A L I A M E D I C A M E N T A P R O A L I I S  
substituere licet, modò vires correfpondeant.

Pilulæ pro confectionibus: & Confectiones pro pilulis. vt  
Hyera simplex pro pilulis de Hyera & Benedicta; & contra.  
Et pro pilulis pituitofis; Eleâtuarium Diacarthami; de Citro folutiuum.

Pro biliofis, Eleâtuarium de fucco Rofarum & contra, obferuata cuiusq; quantitate.  
Hyera & fimilium Eleâtuariorum dofes augenda; ob mellis molem, quæ medicamenti  
vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, fi lambendo affumi debeat, vt  
Syr. Iuiubarum pro Looch fano & experto.  
Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro trochifco, & contra, vt  
Diarrhodon pro trochifcis diarrhodon.  
Trochifci de Squilla, pro eclegmate de Squilla, aucta vel diminuta quantitate pro  
ratione, indicatione morbi, & fcopo medici.

In fimplicibus partes aliquando religiofe non obferuantur.  
vt Turbith pro Agarico trochifcato, & contra. Hic fimplex pro composito ponitur, vel  
compositum pro fimplici.  
pro Agarico Colocynthis in minori quantitate.  
Carthami duplum & triplum pro Agarico, & contra.

Difficile tamen inuentu fimplex medicamentum fubftituendum quod verè vnde  
de quaque omniq; ex parte conueniat; vt testatur Auicennas in fuo canone; vbi vix  
reperies duo fimplicia medicamenta, aliorum facultate fimilium penuria, fubftitui tu-  
to poffint. Quod cum difficillimum foret, ille aliquando duo, interdum tria, pari pon-  
dere & menfura, nonnunquam duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte  
alterius medicamenti, fupponit. Quia pauciffima funt medicamenta quæ omnino fi-  
mile temperamentum obtineant, aut eandem confiftentiam, craffitiem, tenuitatem  
partium, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus eft medicamentorum vfus.  
Vel ob calorem, frigus, humiditatem, ficcitatem; in principio primi, in medio & primo  
gradus, & fic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel craffitiem, lentorem, faporem, odorem, colorem;  
quare id quod temperamento refpondet, fæpe diffidet craffitie vel tenuitate partium;  
vel alia facultate. Vt pro Afaro Acorum fubftituendum cenfent. At in omni operatio-  
ne non conuenit. non enim omnia poteft Acorus, quæ Afarum. Vrinæ quidem & men-  
fes ciet: (quare in vreticis tantum fupponendum) vomitum verò excitare, aquasq; e-  
ducere, vt Afarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchufa fubftituitur. Sed fi ob colorem Anchufa o-  
pus fit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conuenit.

Eius verò loco Lacca fupponitur; vel Brafilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel  
Coccus baphica.

Affa dulcis pro foetida non conceditur propter odorem, vt Auicennas fubftituit, in  
affeci-

pro Afaro  
Acorus.



affectibus vteri, quia odore iucundo vterum sursum alliceret; sequitur enim odorata, fugit foetida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed non conueniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus: minimè autem in adstringentibus; quia manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Pro Saccharo mel & manna.

Muccus vtilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem vsurpatur Fœnumgræcum, quod muccaginem reddit, sed calidam: ideo in sputo sanguinis reicienda, quemadmodum in externis remediis, vt Ophthalmia, in qua oui albumen præfertur quidem in principio & incremento, in statu verò & declinatione muccago Fœnigræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedij substituuntur.

vt Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguentis.

Sed in pilulis è bdellio nullo modo conceditur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet, vt supposititium in locum adulterati genuini penuria, eadem efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat vel siccabat, adstringebat vel laxabat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in compositionibus Græcorum, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Ponto vel Tauro monte, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum delectu præstare, quæ sunt alicuius regionis; modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem similitudinæ assumes. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-prouinciæ, siue Creta; vbi *Thymus* nostras angustifolius & *Epithymus* optima & copiosissima.

Secundo loco herbarum regionum humidarum, modò ætas squallida fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse Galenus docet in præparatione Theriacis.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet. nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus. &

Pro Africana, Florentinam.

Gal. de Antid.

## R A D I C E S.

Rhapontico, Radix Centaurij maioris, vel nostri Rhabarbari magma, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatum à multis propter empyreuma.

Zingibere, Costus, & contra, vel Helenium, vel Pyrethrum.

Costo, Pyrethrum.

Aristolochia longa, Rotunda, & contra, vel vna pro omnibus.

pro Acoro, Calamus aromaticus Officinarum, & contra.

**Acoro in laxantibus & cientibus vrinas & menses; Radix Afari.**  
 Afaro, quando purgare & vomitum ciere opus est; Elleborus, Semen genistæ &  
 Raphani, vel hæc tria simul.  
 Galanga; Cyperas rotundus; & contra.  
 Calamo odorato Libani; Schœnanthum, calamus siue Acorus officinarum: si ad  
 odorem solum; Santalum citrinum officinarum.  
 Althæa; radix maluæ hortensis, vel syl.  
 Asparago altili; Corruda imminuta quantitate, quia acrior & efficacior.  
 pro. Rusco; Radix Asparagi, & contra.  
 Cortice, radicis Capparis; Cortex radicis Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi &  
 Lauri.  
 Apij; Petrofelini, vel Macedonici.  
 Gentiana; medietas Afari & radicis Capparis.  
 Turbith; Thapsiæ radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiscatus, vel Colocyn-  
 this minore dosi.  
 Zingibere, Mechin.  
 Serpentaria, Iarus; Dracunculus.  
 Lapatho, Oxalydis radix.  
 Rhabarbaro ad laxandum, succus Rosarum.  
 Rhabarbaro ad adstringendum; Hydrolapathi radix, vel Galangæ maioris, si ca-  
 lore opus est; si refrigeratione, radix Bistortæ.  
 Nardo, Nardi species.  
 Secacul, radix pastinacæ marinæ.

SVCCEDANEA QUANTVM FIERI POTEST SINT SIMILIA  
 omni ex parte, viribus, genere, & specie. VI.

Omnes Dauci species,	Iuniperi,
Intybi,	Sabinæ,
Adianti,	Cedri,
Condrillæ,	Rhamni Diosc.
Hierachij,	Myrthi,
Rumicis,	Piperis,
Abfinthij.	Cyclaminis,
Abrotoni,	Ranunculi,
Sideritidis,	Hederæ, excepta Hederula terrestri.
Aconiti,	Rutæ,
Veratri,	Seseli,
Anagallidis,	Apij,
Anchusæ,	Rosmarini,
Anemones,	Marrubij,
Asparagi,	Leucoij,
Brassicæ,	Orcheos,
Calaminthæ,	Maluæ,
Cæpæ,	Polygoni maris & foemine.
Chelidonij,	Symphyti,
Costi,	Tribuli,
Nardi,	Rubi,
Rutæ,	Equiseti,
Bliti,	Viticæ,

Tithy-



Tithymalorum,  
Mercurialis,  
Heliotropij,  
Origani,  
Aristolochiæ,  
Valerianæ,  
Bituminis,  
Picis Resinæ,  
Allij,

Porri,  
Plantaginis,  
Panacis,  
Pastinacæ,  
Lychnidis,  
Conifæ,  
Nymphææ,  
Anthemidis,  
Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid prodictum inhibeat, vt de Clematide; quarum altera v-  
rere, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Diosc.

Prior verò alui profluvia & dysenterias sedat.

Sic cucumis agrestis, & satius: pepo & colocynthis. sed hæc paucis euenire solent.

De partibus etiam obseruandum. nam aliquæ facultatibus differunt, vt Radix me-  
dij menses decocta sistit per aliquot dies sumpta. Semen autem in vino sumptum men-  
strua pellit.

Iuniperi fructus introsumuntur; ramenta vero occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus, sed potius particularibus niti præstaret:  
Nam eorum plerunque est maxima differentia quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro, folia Citri, Canellæ vel Malabathri vulgaris.

Pro foliis Lauri; Citri folia.

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri minore quâritate, vel folia Hyoscyami albi.

Lactuca; Scariolam; & contra.

Cichorio syluestri; Dentem Leonis.

Pro Dytamni prima specie; secundam, tertiam, vel pulegium.

Calamentha montanæ prima; secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri; hortensem.

Malua arboreſcente; Altheam.

Thlaspi; Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio Regali; Ceruinum; & contra.

Lepidio Pauli Æginetæ; Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendrium, Ceterachivæ, & contra.

Foliis Oleæ vel Lentisci	} Folia	{ nucum Iuglandis, Cupressi, Pini, vel Pinastris.

Foliis Myrthi	} Baccas Myrthi, vel Iuglandis nuces immaturas.

Thymo; Satureiam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccatam maiori quantitate, vel contra.

Spica

- Spica Lauendula; Lauendulae species hortenses.  
 Adianto; Saluiam vitam; Polytrichum, Adiantum nigrum Plin.  
 Telephio; Portulacam.  
 Portulaca; Umbilicum Veneris.  
 Foliis Terebinthi; Lentisci folia.  
 Myrtho alba; nigram, & contra.  
 Foliis Myrthi; folia Pyri sylvestris, Sumachi, Lentisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum.  
 Foliis Oleastri; Oleæ folia.  
 Foliis Sambuci; Ebuli, & contra.  
 Petonica; Verbenacam.  
 Melissa; Marrubium, & contra: Corticem Citri.  
 Apio montano; domesticum siccum in maiori dosi.  
 Capea; Portulacam.  
 Nardo montana; Nardum Gallicam.  
 Philyreæ foliis; Oleæ folia, & contra.  
 Foliis Caprifici; Ficus domesticae folia, & contra.  
 Thymbra; Thymum vel Serpillum.  
 Coriandri foliis; Petroselini hortensis folia, in externis remediis tantum.  
 Hypomarathro altero; Coriandrum vel Petroselinum domesticum.  
 Foliis Dauici; pastinacæ agrestis vel domesticae folia.  
 Conisa prima; secundam.  
 Conisa secunda; tertiam maiori quantitate & siccata.  
 Sanguinalis foeminae foliis; folia maris, & contra.  
 Hippuride prima; secundam, & contra.  
 Semperuiuo maiore; paruum Umbilicum veneris, & contra.  
 Foliis Labruscæ; domesticae vitis folia minus cultæ.  
 Chamæla; Thymelæam, Chamæpitym primam Diosc. Laureolam.  
 Diof. Alsinæ foliis; Helxines folia, & contra.  
 Vite alba; nigram, & contra.  
 Rondel. Bubonio, siue Inguinaria, siue Astere Attico; Antirrhinum, & contra.  
 Foliis Sabinæ; folia Cupressi, Iuniperi, & Cassiam.  
 Dorycnio; Mandragoram, & contra.  
 Draguntio; Ari.  
 Foliis Abietis; Populi folia.  
 Eryfimo; Erucam, & contra.  
 Foliis Hippolapathi; Lapathi folia.  
 Foliis Piceæ; folia Pini.  
 Lathyridis foliis; Tithymali folia.  
 Libanotide sterili; folia Libanotidis coronariae.  
 Lepidij foliis; Nasturtij folia.  
 Nymphæa alba; luteam, & contra.  
 Sorbi foliis; Mespili folia, & contra.  
 Oxyacantha vera; Pyrastrum.  
 Foliis Pepli; Tithymali folia.  
 Pityusæ foliis; Tithymali folia.  
 Polygoni maris foliis; foeminae folia.  
 Filice foemina; marem.  
 Seride; Condrillam.  
 Smyrnio; Apium aut Petroselinum.  
 Solano hortensi; Halicacabum.  
 Symphyti Petræi foliis; alterius folia.



Pro Beta alba, nigram.  
 Pro Vnius speciei Tithymali foliis; folia aliorum in laxando.  
 Pro Tragorigano, Origanum, & contra.  
 Pro Foliis Tribuli terrestris in refrigerando; folia aquatici, non in humectando.  
 Pro Hypecoi foliis; folia Papaueris.  
 Pro Verbasci vnius foliis; aliorum folia.  
 Pro Spica Indica, Syriaca, Valeriana.  
 Pro Viticis foliis & semine; Ruta folia & semen.  
 Pro Seridis foliis; Lactuæ folia.  
 Pro Buglossio siue Borragine latifolia; Buglossum angustifolium.  
 Pro Soncho leui; Sonchum asperum, & contra.  
 Pro Fumaria; Senam.  
 Pro Hyssopo; Origanum, Sampsucum.  
 Pro Hyperico; Androsæmum, Ascirum, Schœnanthum.  
 Pro Stæbe Diosc. Stæben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoream bursam, Bellides, & Gnaphalia.  
 Pro Halyca, Auenæ ptisanam totam.  
 Pro Amylo; farinam filiginis siccam.

## TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS

## RADICVM ET CORTICVM.

5	COSTVS		Cinnamomum siue offic. cassia tenuis	Cortex internus nucis moschate	Asarum	
4	Zedoaria	Calamus odoratus	Cassia siue offic. cinnamomū crassum.	Nux muschata	Schœnanthum	p Cortice thuris
3	Zurumbet	Galanga maior	Phu	Macis.	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin	Galanga minor	Anthophylli	pro Folio Malabathri	Spica Celtica	vel Lentisci
1	p Zingibere	Cypeto	Caryophyllis			

Cortic. quercus	Cortic. mali granati	Cortic. myrobal. Citrinarum
Illicis	Cortex nucis Iuglandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Embleicarum
		Bellericarum

In hac tabella primum reposuimus Zingiber, quia frequentius eo vtimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis) si fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde

P P

mali

mali inde sequetur. Zerumber, Zedoariam & Costum in vltimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter vtitur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamenta parabuntur, vt quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio <sup>ad vltima</sup> indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & è contra diminuto pondere. Cum dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora; quamquam pro Cinnamomo duplum Caffiæ iusserint antiqui substitui: nam si medicamenta sint aded imbecilla, satius est eis nõ vtì, quàm duplo pondere sustituere ea: nam moles medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Vt omnia medicamenta ordine digerantur, oportet locum in multas classes diuidere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

## Capsula radicum secunda.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Pistolochia	
3	Helenium	Clematidis	
2	Iris Florentina	Arist. longa	Hermodactylus
1	pro radice Iridis Venetæ	Aristolochiæ rotundæ	Asphodeli

## Capsula radicum tertia.

5	Graminis						Glycyrrhizæ
4	Asparagi			Staphisagriæ			Tussilaginis
3	Rulci	Oenanthæ	Aristolochiæ ois	Bryoniæ	Zeduariæ	Cyperì	Helenij
2	Petroselinì rad.	Rubiæ maioris	Afari	Pyrethri	Costi	Galangæ minoris	Venetæ radix
1	pro Apio	Pentaphyllo	Cappari	Mequin	Zigibere	Galanga crassa	Iride Florentina

Capsula



## Capsula radicum quarta.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypodij	Ellebori vtriusq;		
2	Asphodeli	Suc. Rosa- rum	Turbith	Ebuli	Asari	Hemodactylo- rum
1	pro rad. Gentianæ	Rhabarba- ri	Agarico	Hemoda- ctyli	Cyclaminis	Asphodelorum

## Capsula radicum quinta.

3	Borraginis		Maluarum	Thapsi barbati	Sphondyli	Radix Vlini.
2	Buglossi	Behen rubri	Bismaluarum	Bistortæ	Pancreatij	Consolidæ minoris
1	pro rad. Gly- cyrrhizæ	Behen albi	Liliorum	Quinque- folij	Squillæ.	pro radice Con- solidæ maioris

## Capsula radicum sexta.

5		Corticis rad. lauri	Asari	Staphidis agriæ	Behen rubri
4		Cort. rad. Sam- buci, & Ebuli	Asi	Clematidis alte- rius siue Flammulæ	Behen albi
3		Fraxini, vel Po- puli	Serpentariæ	Rad. Dentillariæ	Borraginis
2	Rubiæ mi- noris	Thamarisci	Raphani agre- stis	Pyrethri	Buglossi
1	pro rad. Ru- biæ maioris	Cortice rad. Capparis	Cortic. Sam- buci		Glycyrrhizæ

## TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

1	2	3	4
pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri	Hyoscyami
Boraginis	Maluæ, Bismaluæ	Pisyllij	Cydoniorum
Lini	Fœnigræci	Lauendulæ	Keyri rubri vel Citrini

- Pro Acaciae succo; succus Prunellorum probatur. & Rhois. Diosc.  
 A uicenna  
 idem. Dioscorides succum Hypocystidis substituit: verum aliquāto magis adstringit & siccatur  
 si in antiquorum pharmacis recipiatur.  
 Pro Opio, Meconium, vel succus Lactuca syl. vel domestica, quantitate maiori.  
 Pro Absinthij succo; Abrotani, Eupatorii, vel Centaurei minoris vtriusque vel Agerati.  
 Pro succo Absinthij Pontici; Noltratis Romani succus: differt tantum regione, vt Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Sanctonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.  
 Pro Opobalsamo; Staete. i. Syrax liquida non adulterata, vel oleum Myrrhæ. In suffusionibus ad digerendum; Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tenuium est partium.  
 Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus vuarum passularum; vel vinum coctum, siue sapā.  
 Pro Lycio; Amurca.  
 Pro Citri succo; Limonium.  
 Pro Thymelææ: Chamelææ succus.  
 Pro Cyclaminis; Iridis.  
 Pro Omphacij; Rhois, & contra.  
 Pro Aloe; Absinthij succus.  
 Pro Semperuiui; Coryledonis succus & contra. Vel Solani, Lactucæ.  
 Pro Sanguine Draconis; Laccam sustinuit Auicennas.  
 Pro Elaterio; succus cucumeris agrestis aliquantum coctus.  
 Pro sapā; vinum dulce, & contra.  
 Pro Licio; Gentianæ succus in vlceribus.  
 Pro aqua fontana; fluuiatilis.  
 Pro aqua plu. fluuij potius quàm fontana, contrā quàm Galenus præcipit in Diacodio, quia composita est partim ex pluuia, partim ex fontibus.

## D E L I Q V O R I B V S E T L A C H R Y M I S.

- Pro Opobalsamo, Staete siue myrrhæ liquida natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.  
 Non { Opocarpatum, vt auctor Succedaneorum præcipit,  
 { Oleum laurinum.  
 { Liquor myrrhi.  
 Non semen Myrti, & Zedoarie, vt præceptores nostri statuerunt. pro Carpobalsamo semen Lentisci vel Terebinthi, cuius multæ sunt species. Cubebe in minori dosi, vel Terebinthi partes dux, vna Cubebarum.  
 pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi paratum per descensum.  
 { vel Gummi Iuniperi.  
 Pro Xylobalsamo, furculi Lentisci.  
 Pro Oleæ lachrymæ; G. Elemni.  
 Pro Myrrhæ; Bdellium, vel succus Smyrni, vel Apij.  
 Pro Opopanace; Ammoniacum, vel Galbanum; vel Bdellium, maximè cum emollire volumus. Gal. vsus est Propoli in externis.  
 Pro Manna thuris; cortex cui adhæret aliquid thuris.  
 Pro Thure; Mastiche & resina pini sicca.  
 Pro Styrace; Benzoinum.  
 Pro Terebinthina; Mastiche.

Masticho;



- Pro Mastiche; Abietina resina indurata aut frixa, vt docet Diosc.  
 Pro Cupressina; Laricina.  
 Pro Abietina; Resina pini.  
 Pro Pice, Resina pini cocta.  
 Pro Pice liquida; pix oleo dissoluta, vel pix ex oleo Iuniperi liquefacta.  
 Pro Pissasphalto; pix & bitumen.  
 Pro Mumia; Pissasphaltum.  
 Pro Asphalto; Petroleum; vel Gagates, & contra. Et carbones petraei è terræ visceribus;  
 quibus fabri ferrarij vtuntur.  
 Pro Lacca; Myrrha.

## D E M I N E R A L I B V S.


- Pro Antimonio; plumbum vstum & contra. Auicen. & Stagnum vstum.  
 Pro Lithargyro; plumbum vstum, Molybdæna.  
 Pro Plumbo; Stannum.  
 Pro Florè æris; ærugo.  
 Pro Spodio; Antispodium ex myrto, lentisco, olea, oleastro, malo cydonio, vel cornu  
 cerui vstum.  
 Pro Pompholyge; Spodium Diosc.  
 Pro Cadmia; Lapis calaminaris.  
 Pro Sandaraca Græcorum; Auripigmentum, & contra.

*Presens examen stirpium nihil habet S. Romanæ Ecclesiæ fidei con-  
 trarium aut Reipublicæ offensiuum: poterit ergo in multorum  
 commodum typis excudi.*

Sebastianus Baer Delphius insignis Cathed. Ec-  
 clesiæ S. Mariæ Antuerpiensis plebanus &  
 Canonicus.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".









RARE 84-B  
QK 13234  
41  
P39 INV #  
1576 124

RARE 84-B  
QK 13234  
41  
P39 INV #  
1576 124



